

Im Gennargentugebirge auf Sardinien gesammelte Coleopteren.

Von

Dr. Anton Hermann Krausse-Heldrungen.

Wie gerade die Käfer zu zoogeographischen Studien besonders geeignet sind, hat Hauptmann Jean Sainte-Claire Deville in einer interessanten Abhandlung auseinandergesetzt („De l'utilisation des Insects et particulièrement des Coléoptères dans les questions de zoogéographie“, I. Congrès International d'Entomologie, Bruxelles 1911). Ich halte es deshalb nicht für überflüssig, eine Liste der hier im Gennargentu auf Sardinien gefundenen Coleopteren zu publizieren, da es sich um eine noch wenig durchsuchte Lokalität handelt. Zudem haben die allermeisten der hier erwähnten Käfer den Herren Reitter, Deville, Formánek, Fiori vorgelegen, wodurch die Liste besonders wertvoll sein dürfte. Die größte Anzahl der angeführten Spezies stammt aus der Umgegend von Sorgono (etwa 700 m ü. d. M.), einige wenige, die von anderen Gegenden stammen, sind mit besonderer Fundortsangabe versehen. Die mit einem Stern bezeichneten Arten sind neu oder für die Insel neu oder sonst besonders bemerkenswert. — Im kommenden Herbst hoffe ich eine weitere Liste publizieren zu können, da ich bis zum Oktober hier in den einsamen Bergen zu bleiben gedenke. — Über Coleopteren anderer Gegenden Sardiniens habe ich mehrfach an anderer Stelle berichtet („Entomologische Rundschau“, „Entomologische Blätter“, „Rivista Coleotterologica Italiana“).

Cicindelidae.

Cicindela campestris corsicana
Roesch.

Bei Sorgono in etwa 800 m Höhe schon Mitte Februar. (Über sardische Varietäten dieser Spezies habe ich an anderer Stelle — Entomologische Rundschau, 1911, — berichtet und folgende aufgezählt: *saphyrina* Gené, *connata* m., *apicalis* m., *reducta* m., *neglecta* m., *viridis* m.)

Carabidae.

Calosoma sycophanta L. (Det. Born).

Carabus morbillosus Arborensis m.
Carabus Genei G.

(Die Var. *Kraussei* Born fand ich nicht im Gebirge, sie ist besonders in der Gegend von Oristano am Meere zu finden.)

**Notiophilus quadripunctatus* Dej.,
N. rufipes Curt.

Reicheia Usslaubi var. *sardoa*
Aritzo.

Bembidion Dahli Dej., *B. elongatum* Dej., *B. laterale* Dej.,
B. Genei speculari Küst., *B. Lafertei* Duv., *B. Andreae* F.,
B. Andreae var. *Bualei* Duv.

Tachys bisulcatus Nic., *T. bistriatus* Duft., **T. vittatus atratus* Costa.

Scotodipnus strictus Baudi. Aritzo,

- Sorgono, **S. strictus gigas* m. Aritzo.
- Trechus rufulus* Dej.
- Ophonus maculicornis* Duft.
- **Harpalus oblitus* Dej.
- Stenolophus teutonius* Schrnk.
- Acupalpus dorsalis* F., *A. d. notatus* M. u. R., *A. d. discus* Reitter, *A. d. sardous* Fiori.
- Anisodactylus binotatus* F.
- Diachromus germanus* L.
- Amara lucida* Duft.
- Percus cylindricus* Chd.
- Pterostichus niger* Schall, *P. vernalis* Panz.
- Calathus melanocephalus* L.
- Agonum ruficornis* Goeze, **A. numidicum* Luc., **A. angustatum* Dej.? (Det. Reitter).
- **Metabletus impressus* Dej., *M. truncatellus* L., *M. foveatus* Geoffr.
- **Microlestes laevipennis* Luc., *M. minutulus* Goeze.
- Demetrius atricapillus* L.
- Drypta dentata* Rossi.
- Brachynus sclopeta* F.
- Asaphidion flavipes* L., **A. fl.* var.
- Dytiscidae.*
- **Hydroporus obsoletus* Aubé., *H. lepidus* Ol., *H. flavipes* Ol., **H. striola* Gyllh.
- Agabus chalconotus* Panz., *A. paludosus* F.
- Staphylinidae.*
- Micropeplus fulvus* Er.
- Metopsia clypeata* Müll.
- Proteinus ovalis* Steph.
- **Phyllodrepa vilis* Er.
- Oxytelus sculpturatus* Grav.
- Platystethus alutaceus* Thoms.
- Stenus ater* Mannh., *S. impressus* Germ.
- **Astenus uniformis* Duv., *A. tristis* Er.
- Medon melanocephalus* Duv.
- Xantholinus linearis* Ol., *X. angustatus* Steph.
- Philonthus badius* Kiesw., *P. nigritulus* Grav.
- Bolitobius trimaculatus* Payk., *B. trinotatus* Er., *B. trinotatus discophorus* Rey.
- Tachyporus hypnorum* F., *T. nitidulus* F., *T. pusillus* Grav.
- Hypocyptus longicornis* Payk., *H. seminulum* Er.
- **Habrocerus capillaricornis* Grav. var.
- **Atheta triangulum* Kr., **A. orphana* Er., **A. sordidula* Er., *A. analis* Grav.
- Zyras Haworthi* Steph.
- Oxypoda alternans* Grav., *O. lurida* Woll., **O. fusina* Rey.
- Crataraea suturalis* Mannh.
- Conurus pubescens* Grav.
- **Agaricochara laevicollis* Kr.
- Acrotona pulchra* Kr.
- Pselaphidae.*
- **Trimium microphthalmum* Doderò i. l.
- Euplectes narentinus* Reitter?
- Anaurops sardoas* Sauley.
- **Brachygluta corsica* Sauley.
- Reichenbachia nigriventris* Schaum.
- Bythinus difficilis* Reitt., **B. italicus* n. v. *sanguinipennis* Reitt. i. l., *B. italicus* Baudi, *B. Aelista* Reitter (det. Melichar).
- Scydmaenidae.*
- Euthia formicetorum* Reitter.
- Stenichnus Kunzei* Gené., **S. K.* var. nov. *Kraussei* Reitter i. l.
- **Euconus cornutus* Sauley.
- Scydmaenus tarsatus* Müll., *S. cerastes* Baudi.
- Silphidae.*
- Bathyscia Damryi* Abeille, **B. Kraussei* Melichar.
- Catops nigrita* Er., *C. fuscus* Panz.

Clambidae.

Clambus minutus Strm., **C. pallidulus* Reitter nov. spec.

Corylophidae.

Sericoderus lateralis Gyll., **S. lateralis* var. (det. Reitter).

**Orthoperus coriaceus* Rey.

Trichopterygidae.

**Ptenidium laevigatum* Er.

Ptinella aptera angustula Matth.,
P. tenella Er.

Scaphidiidae.

**Scaphosoma subalpinum* Reitt.,
S. agaricinum L.

Histeridae.

Carcinops minima Aub.

**Paromalus filum* Reitt. (det. Reitter), *P. flavicornis* H. (det. Bickhardt).

**Hetaerius ferrugineus* Ol.

Abraeus globosus Hoffm.

**Acritus atomarius* Aub.

Plegaderus pusillus Rossi.

Hydrophilidae.

Sphaeridium bipustulatum F.

Cantharidae.

**Malachius aeneus* L.

Ostomidae.

**Tenebroides maroccanus* Reitt.

Nitidulidae.

Carpophilus sexpustulatus F.,

C. bipustulatus Heer.

**Epuraea longula* var.

Meligethes tristis Sturm.

Rhizophagus punctiventris Baudi.

Cucujidae.

**Airaphilus talpa* Kr.

Silvanus unidentatus F.

Uleiota planata L.

Cryptophagidae.

Cryptophagus scanicus L., *C. pilosus* Gyll.

Atomaria pusilla Payk.

Lathridiidae.

**Lathridius angusticollis* productus R.

**Corticaria corsica* Bris., *C. fulvipes*, *C. gibbosa* Hbst.

**Cartodere separanda* Reitt.

Melanophthalma distinguenda Colli.

Cisidae.

Cis boleti Scop., *C. comptus* Gyll.

Rhopalodontus fronticornis Panz.

Octotemnus glabriculus Gyll.

Colydiidae.

Colydium filiforme F.

Ditoma crenata F.

Endophloeus Markovichianus Pill.

Teredus cylindricus Ol.

Cerylon histeroides F.

Oxylaemus cylindricus Panz.

Helodidae.

Helodes Genei Guér.

Dermestidae.

Attagenus piceus Ol., **A. fallax* Géné.

Globicornis variegata Küst.

Elateridae.

Adelocera punctata Hbst.

Agriotes sordidus var. Schwarzii Buys.

Cardiophorus ulcerosus Géné., *C. Eleonora* Géné., *C. ebeninus* Germ.

Drasterius bimaculatus Rossi.

Hypnoidus meridionalis Lap.

Eucnemidae.

**Throscus corsicus* Reitt.

Buprestidae.

Aphanisticus elongatus Villa.

Ptinidae.

**Ptinus subpilosus* Strm., *P. sexpunctatus* Panz.

Anobiidae.

Anobium striatum Oliv.

- Pythidae.*
Mycterus umbellatarum F.
- Hylophilidae.*
*Hylophilus pruinus var.
- Anthicidae.*
Formicomus pedestris Rossi.
Ochthenomus tenuicollis Rossi.
- Meloidae.*
Tenebrionidae.
*Asida barbaricina Leoni, *A. rustica var., A. Combae Géné.
Scaurus striatus F.
Blaps gigas occulta Seidl., B. lethifera Marsh.
Hypophloeus fasciatus F.
Caenocorse depressa F.
- Cerambycidae.*
Leptura maculata Poda.
Cerambyx Scopoli Füssl.
Hylotrupes bajulus L. Aritzo.
Sehr variabel.
- Chrysomelidae.*
Timarcha sardoa Villa.
Gastrophysa polygona L.
*Longitarsus membranaceus Foud., L. jacobaeae Waterh., L. luridus Scop., *L. viduus All.
Propylaea 14-punctata L.
*Prasocuris vicina Luc.
Rhizobius chrysomeloides Hbst.
- Laridae.*
Bruchidius foveolatus Gyll., B. murinus Boh.
- Curculionidae.*
Rhynchites auratus Scop.
- Auletes pubescens Kiesw.
Apion seniculus Kirb.
Tychius pusillus Germ.
*Acalles variegatus Boh., A. var. fuscus Chevr.
Limobius borealis Payk.
Lixus mucronatus Ol., *L. Ascanii L.
Cleonus coenobita.
*Sitones Kraussei Formánek, S. flavescens Marsh., S. lineatus L., S. humeralis Steph.
*Brachyderes pubescens Boh.
- Ipididae.*
Hypoborus ficus Er.
Dryocoetus villosus F., *D. Devillei Eggers i. l. nov. spec.
Xyleborus Saxeseni R., X. dryographus R., X. monographus F.
Platypus cylindrus F. (det. H. Wichmann), P. cylindriformis Reitt. (det. Reitter).
- Lucanidae.*
Dorcus musimon Géné.
- Scarabaeidae.*
Pleurophorus caesus Panz.
*Aphodius affinis Panz.
Thorectes intermedius Costa.
Scarabaeus laticollis L.
Copris hispanus L.
*Triodontia alni Blanch. Im August gegen Abend in Massen an den Kastanienblüten fliegend.
Hoplina pubicollis Küst.
Oxythyrea funesta Poda.
Cetonia carthami Gory.
Sisyphus Schäfferi L.

* * *

N.B. Nach Herrn Major Prof. Dr. v. Heyden ist *Bythinus italicus* als Varietät des sehr weit verbreiteten und variablen *bulbifer* aufzufassen (v. Heyden i. l. 1911).

Sorgono, Sardinien, März 1912.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [78A_2](#)

Autor(en)/Author(s): Krausse Anton Hermann

Artikel/Article: [Im Gennargentugebirge auf Sardinien gesammelte Coleopteren. 142-145](#)