

## Beilage II.

# Sechs neue Käfer

aus

## der Umgegend von Augsburg.

Beschrieben von **Dr. Carl von Weidenbach.**

---

### 1) *Chrysomela rugicollis.*

*Brevis, elliptica, coeruleo-virens, nitida, prothorace coeruleo-nigro, rugosopunctato, lateribus non incrassato, elytris irregulariter modice punctatis. L. 3'''.*

Diese schöne *Chrysomela* gehört zu Suffrian's siebenter Gruppe mit nicht verdicktem Seitenrand des Halsschildes und steht deshalb der *Chrysomela violacea* nahe, ist jedoch mehr von der breiteren Form der *Chrysomela cerealis*. Sie unterscheidet sich von den verwandten Arten durch breitere Form und das der Länge nach namentlich an den Seiten und am Hinterrande gerunzelte, blauschwarze Halsschild, von welcher Farbe auch das ganz glatte Schildchen ist. Leider nur einmal unter einem Steine gefangen.

### 2) *Galeruca minima.*

*Oblonga, flavofusca, pubescens, vertice, prothorace subtus abdomineque, apice excepto, nigris, fortiter, punctata punctis ocellatis; elytrorum angulo apicali haud dentato. L. 1¼'''.*

Steht der *Galeruca tenella* am nächsten, ist jedoch immer kleiner und der Nahtwinkel an der Spitze der Deckschilde tritt nicht in Form

eines Zähnchens hervor, sondern bildet einen rechten Winkel; auch ist das Schildchen nicht so gerade abgeschnitten wie bei *G. tenella*, sondern etwas abgerundet. In Mehrzahl gefangen.

### 3) *Haltica punctipennis*.

*Supra nigro - aenea aut nigro - coerulea, subtus nigra, antennarum basi rufo - testacea, inter antennis linea elevata, capite prothorace elytrisque fortiter punctatis; elytris substriatim punctatis.* L.  $\frac{4}{5}$ —1'''.

Kommt der *Haltica antennata* und *atra* am nächsten, unterscheidet sich aber von ersterer durch stärkere und auf den Deckschilden etwas weitläufigere, beinahe in die Reihen gestellte Punkte, von letzterer durch bedeutendere Grösse und die immer glänzende, schwarzgrüne oder schwarzblaue Farbe, ähnlich der von *H. lepidii*, während sie in der Punktirung mehr mit der *H. atra* übereinstimmt. In Mehrzahl gefangen.

### 4) *Longitarsus (Haltica) quadrimaculatus*.

*Subtiliter parum punctatus, ovatus, nigro - brunneus, antennarum basi, pedibus, elytro singulo maculis duabus flavo-rubris, femoribus posticis nigris.* L.  $1\frac{1}{5}$ ''.

Grösser als *Longitarsus atricilla*, mit der sie in der Punktirung am meisten übereinstimmt. Der röthlichgelbe Schulterfleck ist ziemlich scharf begrenzt, während der gegen die Spitze zu sich befindliche nach aussen verwaschen ist. Die Farbe der Fühler und Beine ist etwas heller als die der Flecken. Zwischen den Fühlern befindet sich eine erhabene Längslinie.

### 5) *Apteropeda (Haltica) nigroaenea*.

*Globosa, nigroaenea, antennis pedibusque brunneo - rubris, femoribus posticis nigris, prothorace fortiter punctato, lateribus rugosopunctatis, elytris punctatostriatis, interstitiis fere impunctatis, antennarum articulo secundo tertio longitudine aequali.* L. 1'''.

Durch das starkpunktirte, an den Seiten gerunzelte Halsschild von den verwandten Arten hinreichend unterschieden.

6) *Exochomus oblongus*.

*Oblongoovatus, niger, macula lunulata intra humeros et marginem lateralem, macula rotunda paulo post elytrorum medium flavo - rubris. L. 1 1/2'''.*

Ebenso fein punktirt wie *Exochomus quadripustulatus*, jedoch etwas kleiner und namentlich länglicher mit nicht so breitem Seitenrande der Deckschilde. Die vordere mondformige Mackel steht näher am Aussenrande und verbreitet sich auch rückwärts nicht so stark nach innen wie bei *Ex. 4-pustulatus*. Vom Hinterleib ist nur das letzte Segment bräunlich.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Weidenbach Carl [Karl] von

Artikel/Article: [Beilage II.: Sechs neue Käfer aus der Umgegend von Augsburg 84-86](#)