

## Verzeichnis

der vom Hauptlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden in den Jahren 1893 mit 1902 und in der Umgegend von Fellheim in den Jahren 1903 mit 1918

### gesammelten Käfer.

Rieden, Bezirk Füssen, von dieser Stadt in nördlicher Richtung 5,2 km entfernt, westlich der Staatsstraße in einem vom Riedener Bach durchflossenen Talkessel 814 m ü. d. M. Gegen Osten der Sendenberg, gegen Westen der Faulenberg ca 950 m, nach Norden der 1000 m hohe Zwiesselberg. Östl. der Weiler Osterreinen hart am Abhang ins Lechtal. Der Staatsstraße entlang die zerstreuten Häuser von Ehrwang. Südwestl. Hopfen am Hopfensee; am Fuße des Faulenberges der Faulensee und die Höllmühle. Auf dem Ehrwang die Mündung der Weissenseer Ach in den Lech.

Fellheim, Bahnstation der Linie Memmingen—Ulm, vom ersterem 11 km, von letzterem 42 km entfernt, 568 m ü. d. M. in dem hier sehr breiten Illertal, an der Memminger Ach, welche hier durch einen „Gries“ genannten und aus Weiden, Erlen, Eschen und Birken bestehenden Auwald fließt. Der Ort ist von der Iller  $\frac{1}{2}$  km entfernt und liegt also hart an der Württemberger Grenze.

Rd. bedeutet Rieden.

Fh. „ Fellheim.

### I. Adephaga.

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| I. Familie <b>Cicindelidae.</b> | campestris L. Rd. u. Fh. gem. |
| Sandläufer.                     | campestris a. coerulescens    |
| 1. Gatt. Cicindel a. Linné.     | Schilsky. Fh. sehr selten.    |
| Sandläufer.                     | II. Familie <b>Carabidae.</b> |
| silvicola Latr. Rd. und Fh.     | Laufkäfer.                    |
| hybrida a. virescens Letzner.   | 2. Gattung. Cychrus. Fabr.    |
| Fh. selten.                     | Schaufelläufer.               |
| hybrida v. riparia Latr. Fh.    | rostratus L. Rd. und Fh.      |
| hybrida a. transversalis Dej.   | attenuatus F. Tegelberg bei   |
| Fh. 1 Expl. a. d. Iller gef.    | Füssen.                       |

3. Gatt. *Carabus*. Latreille.  
Echte od. Großlaufkäfer.  
(*Procrustes* Bon.) *coriaceus*  
L. Rd. und Fh.  
*violaceus* L. a. *subcrenatus*  
Geh. Fh.  
*violaceus* v. *exasperatus* Dft.  
Fh.  
*irregularis* F. Tegelberg bei  
Füssen.  
*intricatus* L. Altenstadt a. III.  
*auronitens* F. Rd.  
*auronitens* a. *perviridis*  
Reitt. Rd. 2 Stück.  
*convexus* F. Rd. und Fh.  
*nitens* L. Rd. Altenstadt a. I.  
*auratus* L. Rd. selten. Fh.  
nicht selten.  
*auratus* a. *picipes* Letz. Fh.  
2 ♂  
*granulatus* L. Rd. und Fh.  
*granulatus* a. *rufofemoratus*  
Letz. Fh.  
*cancellatus* Illg. Rd. u. Fh.  
*cancellatus* a. *femoralis* Geh.  
Fh.  
*Ullrichi* Germ. Rd. u. Fh.  
*arvensis* Hbst. Rd. Senden-  
berg einigemale im Frühj.  
unter Steinen.  
*arvensis* a. *ruficrus* Geh. 1  
♂ 1894 Sendenberg.  
*nemoralis* Müll. Winterrie-  
den bei Babenhausen u.  
Höhen bei Altenstadt a. I.  
*silvestris* Pz. Tegelbg. b. Fss.  
*glabratus* Payk. Rd. u. Fh.
4. Gatt. *Leistus*. Frölich.  
Bartlaufkäfer.  
*ferrugineus* L. Fh.
5. Gatt. *Nebria*. Latreille.  
Dammläufer.  
*picicornis*. Rd. a. Lech hfg.  
Fh. im Geniste a. d. Iller.  
nach Hochwasser.  
*brevicollis* F. Rd. und Fh.
6. Gattung. *Notiophilus*.  
Duméril. Eillaufkäfer.  
*palustris* Duft. Rd.  
*biguttatus* F. Winterrieden.
7. Gatt. *Omopron*. Latr.  
Grundlaufkäfer.  
*limbatum* F. Fh. a. d. Achselt.
8. Gatt. *Elaphrus*. Fabri-  
cius. Raschläufer.  
*uliginosus* F. Rd. Achmün-  
dung sehr selten.  
*cupreus* Duft. Rd. feuchte  
Stellen a. Faulenberg. Fh.  
an der Ach.  
*riparius* L. Fh.  
*Ullrichi* W. Redtb. Rd. und  
Fh. selten.  
*aureus* Müll. Fh. selten.
9. Gattung. *Lorocera*. Lat-  
reille. Riemenhorn auch  
Rennläufer.  
*pilicornis* F. Rd. nicht hfg.  
Fh. an der Ach häufig.
10. Gattung. *Clivina*. Latr.  
Spreizlaufkäfer.  
*fossor* L. Rd.  
*collaris* Hbst. Fh. im Iller-  
sand häufig.

11. Gatt. *Dyschirius*. Bonelli. Übelhand, auch Fanglaufkäfer.  
*globosus* Hbst. Rd. u. Fh.
12. Gattung. *Broscus*. Panz. Kopflaufkäfer.  
*cephalotes* L. Rd. am Lech nicht häufig.
13. Gatt. *Asaphidion*. Gozis. Schnellaufkäfer.  
*caraboides* Schr. Rd. u. Fh. Lech- u. Illersand gem.  
*pallipes* Duft. Rd. und Fh. Lech- u. Illersand gem.  
*flavipes* L. Rd. u. Fh. hfg.
14. Gatt. *Bembidion*. Latr. Ahllaufkäfer.  
*foraminosum* St. Rd. auf Lechsand, nicht selt. Der Käfer ist ein guter Flieger u. ich konnte die Tierchen bei Sonnenschein nur mit dem Netz erbeuten. Bei dieser Gelegenheit fing ich auch einige Schnarrheuschrecken mit purpurrot. Hinterflügeln. (*Bryodema tuberculata* F.), die in Schwaben nur noch bei Hinterstein i. Allgäu vorkommt. Außerdem (nach Redtenbacher) in Bayern noch im Riß- und Isartal.  
*pygmaeum* F. Rd. auf Lechsand häufig.  
*lampros* Hbst. Rd. auf Lechsand häufig.
- punctulatum* Drap. Fh. auf Illersand häufig.  
*dentellum* Thbg. Fh. auf Illersand häufig.  
*Starcki* Schm. Fh. an der Ach selten.  
*adustum*. Fh. ziemi. häufig.  
*prasinum* Duft. Fh.  
*fasciolatum* Duft. Fh.  
*tricolor* F. Fh. auf Illersand gemein.  
*tibiale* Duft. Fh. selten.  
*testaceum* Duft. Rd. u. Fh.  
*Andreae v. femoratum* Stm. Fh. häufig.  
*ustulatum* L. Rd. und Fh.  
*rupestre* L. Fh.  
*lunatum* Duft. Fh. selten.  
*modestum* F. Rd. am Lech ziemlich häufig.  
*décorum* Pz. Rd. häufig, Fh. gemein.  
*monticola* St. Rd. und Fh.  
*ruficorne* St. Tegelberg bei Füssen 2 St. Fh. selten.  
*decoratum* Duft. Fh. selten.  
4 *guttatum* F. Rd. a. L. hfg.  
4 *maculatum* L. Rd.  
*tenellum* Erichs. Rd.  
*Schüppelli* Dej. Fh. i. Frühj. a. d. Ach unter Laub hfg.  
*articulatum* Gyllh. Fh. nicht selten.  
*obtusum* Serv. Fh. einige Stücke im Herbst unter Baumrinde, wo der Käfer wohl zu überwint. suchte.

- biguttatum F. Rd. und Fh.  
 15. Gattung. *Ocys*. Stephens.  
*quinquestriatus* Gyllh. Rd.  
 und Fh.  
 16. Gatt. *Tachys*. Stephens.  
*Schnellaufkäfer*.  
*bistriatus* Duft. Fh. häufig.  
*4 signatus* Duft. Fh. gemein.  
 17. Gattung. *Tachyta*. Kirby.  
*nana*. Rd.  
 18. Gattung. *Trechus*. Clair-  
 ville. Spitzlaufkäfer.  
*discus* F. Fh. i. Gen. d. Achs.  
*micros* Herbst. Rd. am  
 Hopfensee selten.  
*quadristriatus* Schr. Rd. u. Fh.  
*rubens* F. Fh. Bei Alten-  
 stadt a. Iller im Geniste  
 des Fabrikkanals 1 Stck.  
 19. Gatt. *Patrobus*. Steph.  
*Tropflaufkäfer*.  
*excavatus* Payk. Rd. u. Fh.  
 20. Gatt. *Panagaeus*. Latr.  
*Kreuzlaufkäfer*.  
*crux major* L. unter Steinen  
 selten. Rd. und Fh.  
*crux a. Schaumi* Ganglb. Fh.  
 4 Exemplare.  
 21. Gattung. *Chlaenius*. Bo-  
 nelli. Sammtläufer.  
*vestitus* Payk. Bei Hopfen  
 sehr selten.  
*nitidulus* Schr. Rd. an den  
 Abhängen b. Oesterreinen.  
 Fh. an der Ach selten.  
*nitidulus v. tibialis* Dej. w.  
 d. vor.  
*nigricornis* F. Bei Oster-  
 reinen selten.  
 22. Gattung. *Oodes*. Bonelli.  
*Zweckenlaufkäfer*.  
*helopioides* F. Fh. an der  
 Ach selten.  
 23. Gatt. *Badister*. Dejean.  
*Wanderlaufkäfer*.  
*bipustulatus*. Rd. unt. Moos  
 und Steinen nicht selten.  
*sodalis* Duft. Rd. und Fh.  
 selten.  
 24. Gatt. *Ophonus*. Steph.  
*puncticollis* Payk. Winter-  
 rieden, sandige Äcker.  
*brevicollis* Serv. Fh. Iller-  
 gries selten.  
*pubescens* Müll. Rd. u. Fh.  
 in den Blüten von *Cirsium*  
*oleraceum* nicht selten.  
 25. Gatt. *Harpalus*. Latr.  
*Schnellaufkäfer*.  
*aeneus* F. Rd.  
*aeneus v. confusus* Dej. Fh.  
*latus* L. Rd.  
*luteicornis* Duft. Fh. selten.  
*honestus* Duft. Rd. selten.  
*politus* Dej. Winterrieden  
 selten.  
*tardus* Panz. Winterrieden  
 selten.  
 26. Gatt. *Trichotichnus*.  
 Moravitz.  
*laevicollis* Duft. Rd. selten.  
 27. Gatt. *Acupalpus*. Dej.  
*Spitzpalpenlaufkäfer*.  
*meridianus* L. Fh.

28. Gattung. *Bradycellus*.  
Erichson. Plumpläufer.  
*collaris* Payk. Fh.
29. Gatt. *Diachromus*. Erichson. Farblaufkäfer.  
*germanus* L. Fh. sehr selten.
30. Gatt. *Anisodactylus*.  
Dej. Ungleichtarsiger Laufkäfer.  
*binotatus* F. Rd. und Fh.  
*binotatus v. spurcaticornis*  
Dej. Fh.
31. Gatt. *Zabrus*. Clairville.  
Rückenlaufkäfer.  
*tenebrioides* Goeze. Fh.
32. Gattung. *Amara*. Bonelli.  
Knallaufkäfer.  
*plebeja* Gyllh. Fh.  
*similata* Gyllh. Fh.  
*ovata* F. Rd. selten.  
*montivaga* Stm. Fh. sehr  
selten.  
*communis* Pz. Rd. häufig.  
*convexior* St. Rd.  
*aenea* Deg. Rd.  
*spretta* Dej. Rd.  
*eurynota* Pz. Rd. sehr selt.  
*familiaris* Duft. Rd.  
*bifrons* Gyllh. Fh. selten.  
*apricaria* Payk. Rd. selten.  
*aulica* Pz. Rd.  
*equestris* Duft. Fh. selten.
33. Gatt. *Stomis*. Clairville.  
Freßlaufkäfer.  
*pumicatus*. Fh.
34. Gattung. *Abax*. Bonelli.  
Kiellaufkäfer.  
*ater* L. Rd., Fh. nicht selt.  
*parallelus* Duft. Fh. selten.  
*ovalis* Duft. Rd. nicht selt.  
*carinatus* Duft. Rd.
35. Gattung. *Molops*. Bonelli.  
Striemenlaufkäfer.  
*piceus* Panz. Rd. und Fh.  
ziemlich häufig.
36. Gattung. *Pterostichus*.  
Bon. Schlanklaufkäfer.  
*macer* Marsh. Fh. sehr selt.  
*lepidus* Lesk. Rd. nicht hfg.  
*cupreus* L. Rd. und Fh.  
*coerulescens* L. Fh.  
*puncticollis* Dej. Rd. 1 ♀  
*vernalis* Pz. Rd. häufig.  
*oblongopunctatus* F. Rd.  
nicht selten.  
*niger* Schall. Fh.  
*vulgaris* L. Fh. gemein.  
*nigrita* F. Fh.  
*anthracinus*. Rd. nicht hfg.  
*interstinctus* Illg. Rd. gem.  
*strenuus* Pz. Rd. gemein.  
*melas* Creutz. Rd. und Fh.  
*metallicus* F. Rd. und Fh.  
*multipunctatus* Dej. Rd. n.  
häufig.
37. Gattung. *Laemostenus*.  
Bon. Kellerlaufkäfer.  
*terricola* Hbst. Fh. einige  
Stücke im Keller des hies.  
Schulhauses.
38. Gattung. *Calathus*. Bon.  
Kreisellaufkäfer.  
*fuscipes* Goeze. Rd. u. Fh.  
gemein.

- melanocephalus L. Rd. hfg.
39. Gattung. *Synuchus*. Gyllenhal. Felslaufkäfer.  
*nivalis* Pz. Fh.
40. Gattung. *Agonum*. Bon.  
Rundhals.  
*ruficorne* Gz. am Hopfensee.  
Fh. an der Ach häufig.  
*assimile* Payk. Rd. und Fh.  
häufig.  
*6 punctatum* L. Rd. u. Fh.  
*6 punctatum a. montanum*.  
Rd. selten.  
*Mülleri* Hbst. überall gem.  
*viduum* Pz. Am Hopfensee  
Fh. an der Ach häufig.  
*micans* Nicol. Fh. a. d. Ach  
häufig.  
*dorsale* Pont. Fh. gemein.
41. Gattung. *Lebia*. Latreille.  
Prunklaufkäfer.  
*crux minor* L. Rd. sehr selt.
42. Gatt. *Lionychus*. Wissmann. Punktlaufkäfer.  
*quadrillum* Duft. Rd. u. Fh.  
*quadrillum a. bipunctatus*  
Heer. Fh. nicht häufig.
43. Gatt. *Metabletus*. Schmidt.  
Mooslaufkäfer.  
*pallipes* Ziegl. Rd.
44. Gattung. *Dromius*. Bon.  
Rindenlaufkäfer.  
*agilis* F. Fh. häufig.  
*fenestratus* F. Rd. sehr selt.  
*4 maculatus* L. Rd. und Fh.  
häufig.  
*4 nodatus* Pz. Fh. zieml. hfg.
- III. Familie. **Haliplidae**. Seidl.  
Schwimmer.
45. Gattung. *Haliphus*. Latr.  
Bachschwimmer.  
*ruficollis*. Fh. u. Winterried.
- IV. Familie. **Dytiscidae**. Aubé.  
Schwimmkäfer. -
46. Gatt. *Hygrotus*. Steph.  
*decoratus* Gyllh. Rd. selten.
47. Gatt. *Bidessus*. Scharp.  
*unistriatus* Illg. Fh.  
*geminus* F. Fh. häufig.
48. Gatt. *Hydroporus*. Clairville. Zwergschwimmk.  
*assimilis* Payk. Fh. häufig.  
*pictus* F. Im Hopfensee hfg.  
*granularis* L. Fh. häufig.  
*palustris* L. Fh. und Umgebung gemein.  
*marginatus* Duft. Fh.  
*discretus* Fairm. Rd., bei Hopfen.
49. Gattung. *Noterus*. Clair. Weiherschwimmkäfer.  
*clavicornis* Deg. Fh.
50. Gatt. *Laccophilus*. Leach.  
Lachenfreund.  
*obscurus* Panzer. Fh. und Winterrieden.
51. Gattung. *Agabus*. Leach.  
Klauenschwimmkäfer.  
*melanarius* Aubé. Fh. selten.  
*guttatus* Payk. Rd. selten.  
*bipustulatus* L. Rd. und Fh.  
häufig.  
*paludosus* F. Rd. u. Fh. hfg.  
*uliginosus* L. Fh.

- Sturmi Gyllh. Rd. in den  
Tümpeln b. d. Höllmühle.  
undulatus Schrk. Fh. hfg.
52. Gatt. *Platambus*. Thomson.  
maculatus L. Rd. a. Lech-  
ufer.
53. Gatt. *Ilybius*. Erichson.  
Schlammchwimmkäfer.  
fuliginosus F. Rd. u. Fh.  
ater Deg. Rd. a. d. W. Ach.  
obscurus Marsh. Rd. selten.  
guttiger Gyllh. Fh. selten.
54. Gatt. *Rhantus*. Lacor-  
daire. Besprengter Schk.  
punctatus Geoffr. Fh.
55. Gatt. *Acilius*. L. Schei-  
benschwimmkäfer.  
sulcatus L. Winterrieden.
56. Gatt. *Dytiscus*. L. Groß-  
taucher.  
marginalis L. Rd. u. Fh.
- V. Familie. **Gyrinidae**. Aubé.  
Taumel- oder Drehkäfer.
57. Gatt. *Gyrinus*. Geoffroy.  
wie oben.  
nadator L. Fh.

## II. Polyphaga.

### A. Staphylinoidea.

Linienkäfer, auch Kurzdecker oder Ohrwurmkäfer.

- VI. Familie. **Staphilinidae**.  
wie oben.
58. Gattung. *Micropeplus*.  
Latr. Kurzrock.  
porcatus F. Rd. und Fh.
59. Gatt. *Megarthus*. Steph.  
Großgliedlinienkäfer.  
denticollis Beck. Fh. selten.
60. Gatt. *Proteinus*. Latr.  
Vorstrecklinienkäfer.  
brachypterus F. Rd. n. selt.
61. Gatt. *Anthobium*. Steph.  
Blütenlinienkäfer.  
sorbi Gyllh. Rd. selten.  
torquatum Marsh. Rd. selt.  
limbatum Fr. Rd.  
minutum F. Rd.
62. Gattung. *Phyllodrepa*.  
Thomson.  
floralis Payk. Rd. selten.
63. Gatt. *Omalium*. Graven-  
horst. Flachlinienkäfer.  
rivulare Payk. Rd. u. Fh.  
caesum Grav. Fh.
64. Gatt. *Xylostromus*. Heer.  
concinnus Marsh. Fh. hfg.
65. Gattung. *Lathrimaeum*.  
Erichson. Feldlinienkäfer.  
atrocephalum Gyllh. Fh.
66. Gatt. *Arpedium*. Erichs.  
Mauslinienkäfer.  
quadrum Grav. Fh. häufig.  
In den Wintermonaten  
öft. im Zimmer gefang.
67. Gattung. *Lesteva*. Latr.  
Lochlinienkäfer.  
longelytrata Goeze. Fh. n.  
häufig.
68. Gattung. *Geodromicus*.  
Redtenbach. Erdlinienk.

- plagiatus F. Fh. häufig.  
 69. Gattung. *Anthophagus*.  
 Gravenhorst. Blumenfr.  
*bicornis* a. *nivalis* Rd. 1895  
 1 ♂.  
*caraboides* L. Rd. häufig.  
*praeustus* Müller. Fh. selt.  
 70. Gatt. *Deleaster*. Fabr.  
 Bockfallenlinienk.  
*dichrous* Grav. Hopfensee.  
 Fh. hfg; an lauen Som-  
 merabend. im Garten am  
 Lampenschirm öft. gef.  
 71. Gatt. *Coprophilus*. Latr.  
 Kotliebhaber.  
*striatulus* F. Rd. nicht hfg.  
 72. Gatt. *Trogophloeus*.  
 Mannerheim. Graslinienk.  
*dilatatus* Er. Rd.  
*corticinus* Grav. Fh.  
*rivularis* Motsch. Fh. selt.  
 73. Gatt. *Haploderus*. Steph.  
 Geradhalslinienkäfer.  
*caelatus* Grav. Fh.  
 74. Gatt. *Oxytellus*. Gra-  
 venhorst. Scharflinienk.  
*rugosus* F. Rd. u. Fh. hfg.  
*insecatus* Grav. Fh.  
*sculptus* Grav. Fh.  
*sculpturatus* Grav. Fh. hfg.  
 75. Gattung. *Platystethus*.  
 Mannh. Breitlinienkäfer.  
*avenarius* Geoffr. Rd. hfg.  
 76. Gatt. *Bledius*. Mannh.  
 Wurflinienkäfer.  
*opacus* Block. Fh. sehr selt.  
*fracticornis* Payk. Rd. selt.  
*dissimilis* Er. Fh. selten.  
 77. Gattung. *Oxyporus*. F.  
 Pilzlinienkäfer.  
*rufus* L. Winterrieden in  
 Pilzen häufig.  
 78. Gattung. *Stenus*. Latr.  
 Schmallinienkäfer.  
*biguttatus* L. Rd. hfg.  
*bipunctatus* Erichs. Rd. hfg.  
*guttula* Müll. am Hopfen-  
 see sehr selten.  
*bimaculatus* Gyllh. Fh. u.  
 Rd. gemein.  
*Juno* Payk. Fh.  
*ater* Mannh. Fh. selten.  
*clavicornis* Scp. Rd. zieml. s.  
*providus* Er. Fh.  
*bupthalmus* Gr. Am Hop-  
 fensee.  
*nanus* Illg. Rd. selten.  
*humilis* Er. Rd.  
*brunipes* Steph. Rd.  
*tarsalis* Ljemgh. Rd. hfg.  
*similis* Herbst. Rd. hfg.  
*cicindeloides* Schall. Rd.  
 nicht selten.  
*pubescens* Steph. Rd. n. selt.  
*binotatus* Ljungh. Am Hop-  
 fensee sehr selten.  
*pallitarsus* Steph. Rd. hfg.  
*bifoveolatus* Gyll. Rd. s. selt.  
 79. Gattung. *Astenus*. Steph.  
 Rainlinienkäfer.  
*filiformis* Latr. Rd. Senden-  
 berg i. Frühj. b. Ameisen.  
*augustatus* Payk. Im Früh-  
 jahr bei Ameisen.

80. Gatt. *Paederus*. F. Lang-  
linienkäfer.  
sanguinicollis Steph. Fh. hfg.  
gemellus Kr. Rd. hfg.  
litoralis Grav. Rd. u. Fh. hfg.  
brevipennis Lacord. Fh. selt.
81. Gatt. *Stilicus*. Serville.  
Dünnhalslinienkäfer.  
augustus Geoffr. Fh.  
rufipes Germ. Rd.  
orbiculatus Payk. Fh.
82. Gatt. *Scopaeus*. Kraatz.  
sulcicollis Steph. Fh. s. selt.
83. Gatt. *Medon*. Stephens.  
melanocephalus F. Fh. s. slt.
84. Gatt. *Lathrobium*. Gra-  
venh. Heimlichlebender.  
multipunctatum Grav. Rd.  
elongatum L. Rd. sehr selt.  
geminum Kr. Fh.  
fulvipenne Grav. Rd.  
longulum Grav. Rd.
85. Gatt. *Cryptobium*. Man-  
nerheim. Krummlinienk.  
fracticorne Payk. Rd.
86. Gattung. *Xantholinus*.  
Serville. Gelbhaar.  
punctulatus Payk. Rd.  
augustus Steph. Rd.  
glabratus Grav. Fh. selten.  
tricolor F. Rd. häufig.  
linearis Oliv. Rd. und Fh.  
nicht selten.  
linearis v. longiventris Heer.  
Rd. selten.
87. Gatt. *Nudobius* Thomson.  
lentus Grav. Boos bei Fh.
88. Gatt. *Neobisnius*. Ganglb.  
prolixus. Fh.
89. Gatt. *Philonthus*. Steph.  
Mistlinienkäfer.  
splendens F. Rd. hfg.  
laminatus Creutz. Rd.  
laevicollis Lac. Fh.  
nitidus F. Zwieselb., Fh. slt.  
aeneus Rossi. Fh.  
carbonarius Gyllh. Rd.  
temporalis Rey. Rd.  
atratus Grav. Rd.  
rotundicollis Mén. Rd.  
sordidus Grav. Rd.  
fimetarius Grav. Boos.  
marginatus Stroem. Rd.  
fuscipennis Mannh. Rd.  
varius Gyllh. Fh.  
immundus Gyllh. Fh.  
sanguinolentus Grav. Rd.  
ventralis Grav. Rd. u. Fh.  
quisquiliarius Gyllh. Fh.  
longicornis Steph. Rd.  
cruentatus Gmel. Rd.  
varians Payk. Rd.  
micans Grav. Rd.  
fulvipes F. Rd.  
tenuis F. Winterrieden.  
vernalis Grav. Rd. u. Fh.  
splendidulus Grav. Fh.  
nigritulus Grav. Fh.  
rubripennis Kiesw. Fh.
90. Gatt. *Staphylinus*. L.  
Raublinienkäfer.  
pubescens Degeer. Rd.  
fossor Scop. Füßen (Kalva-  
rienb.) Altenstadt a. Ill. selt.

- fulvipes* Scop. Rd., Altenstadt a. Iller sehr selten.  
*caesarius* Cederh. Rd. hfg., Fh. selten.  
*erythropterus* L. Rd. sehr selten.  
*olens* Müll. (*Ocybus* Kob.) Rd. häufig, Fh. selten.  
*ophthalmicus* Scop. Winterrieden und Fh.  
*similis* F. Rd. häufig.  
*fuscatus* Grav. Rd. u. Fh.  
*brunnipes* F. Altenstadt a. I.  
*picipennis* F. Rd.  
*aenocephalus* Degeer. Rd.  
*ater* G. Fh. im Keller des hies. Schulhauses 1 Stck.  
*globulifer* Geoffr. Winterr.  
 91. Gattung. *Ontholestes*. Ganglb. (*Leistotrophus* Kr.)  
*tessellatus* Geoffr. (*nebulosus* F.) Rd. und Fh.  
*murinus* L. Rd. und Fh.  
 92. Gatt. *Emus*. Curtis. Goldhaarlinienkäfer.  
*hirtus* L. Bei Altenstadt a. I. 1 Stück.  
 93. Gatt. *Creophilus*. Manerh. Fleischliebhaber.  
*maxillosus* L. Rd. u. Fh. b. Aas oft häufig.  
 94. Gattung. *Quedius*. Steph. Mistfresser.  
*ochripennis* Mén. Boos.  
*fulgidus* F. Rd.  
*mesomelinus* Marsh. Rd.  
*cinctus* Payk. Rd. und Fh.  
*fuliginosus* Grav. Rd.  
*boops* Grav. Fh.  
 95. Gattung. *Heterothops*. Steph.  
*dissimilis* Grav. Fh. selten.  
 96. Gattung. *Mycetoporus*. Mannh. Mooslinienkäfer.  
*brunnens* Marsh. Rd. selten.  
*longulus* Mannh. Fh.  
 97. Gatt. *Bolitobius*. Leach. Schwammlinienkäfer.  
*trinotatus* Er. Rd. häufig.  
*thoracius* F. (*pygmaeus* F.) Rd. häufig.  
*lunulatus* L. Rd. häufig in Steinpilzen.  
 98. Gattung. *Bryocharis*. Lacordaire.  
*nalis* Payk. Rd. zieml. selt.  
 99. Gatt. *Conosoma* Kraatz. Kegelkieferlinienkäfer.  
*littoreum* L. Rd. und Fh.  
 100. Gattung. *Tachyporus*. Gravenh. Fluchtlinienkäfer.  
*chrysomelinus* L. Rd. u. Fh.  
*hypnorum* F. Rd. und Fh.  
*solutus* Er. Fh.  
*abdominalis* F. Rd. selten.  
*obtusus* L. Rd. häufig.  
 101. Gatt. *Tachinus*. Grav. Flinklinienkäfer.  
*flavipes* F. Rd. häufig.  
*rufipennis* Grav. Altenstadt a. Iller selt. a. Fabrikkan.  
*rufipes* Deg. Rd. häufig.  
*laticollis* Grav. Rd. häufig.  
*collaris* Grav. Rd. häufig.

102. Gatt. *Oligota*. Mannh.  
Kurzlinienkäfer.  
*flavicornis* Lac. Fh. selten.
103. Gatt. *Leptusa*. Kraatz.  
*augusta* Aubé. Fh.
104. Gattung. *Bolitochara*.  
Mannh. Pilzlinienkäfer.  
*lunulata* Payk. Rd. selten.
105. Gatt. *Autalia*. Mannh.  
Zwerglinienkäfer.  
*rivularis* Grav. Rd.
106. Gatt. *Falagria*. Mann.  
Nachtlinienkäfer.  
*thoracica* Curt. Rd. selten.  
*nigra* Grav. Fh. selten.  
*obscura* Grav. Fh. häufig.
107. Gatt. *Tachyusa*. Erichs.  
Eillinienkäfer.  
*balteata* Er. Rd.
108. Gatt. *Gnypeta*. Thomson.  
*carbonaria* Mann. Fh.
109. Gattung. *Atheta*. Thom.  
(*Homalota* Man.) Glattlaufk.  
*sulcifrons* Steph. Fh.  
*longicornis* Grav. Fh.
110. Gatt. *Astilbus*. Steph.  
*canaliculatus* F. Rd. hfg.
111. Gattung. *Phloeopora*. Er.  
Rindenlinienkäfer.  
*sestacea* Mannh. Fh.
112. Gatt. *Oxypoda*. Mannh.  
Schmarotzlinienkäfer.  
*lividipennis* Mannh. Rd.  
*opaca* Grav. Rd. und Fh.
113. Gatt. *Aleochara*. Gra-  
venhorst. Staublinienk.  
*curtula* Goeze. Rd.
- crassicornis* Lac. Fh.  
*intricata* Man. Fh.  
*lanuginosa* Grav. Rd.  
*bilineata* Gyllh. Rd.  
*bipustulata* L. Rd.
- VII. Familie. **Pselaphidae**.  
Sauley. Zwergkäfer.
114. Gattung. *Brachygluta*.  
Thoms.  
*fossulata* Reichb. Fh.
115. Gatt. *Pselaphus*. Herbst.  
Ameisenzwergkäfer.  
*heisei* Herbst. Fh.
- VIII. Familie. **Clavigeridae**.  
Preysler. Keulenkäfer.
116. Gatt. *Claviger*. Preys-  
ler. Ameisenkeulenkäfer.  
*testaceus* Preysler. Fh.
- IX. Familie. **Scydmaenidae**.  
Reitter. Tastkäfer.
117. Gattung. *Scydmaenus*.  
Latr. Ameisentastkäfer.  
*tarsatus* Müll. Fh.
- X. Familie **Silphidae**.  
Reitter. Aaskäfer.
118. Gattung. *Choleva*. Latr.  
Lahmaaskäfer.  
*cisteloides* Fröl. Rd. und  
Fh. häufig.
119. Gatt. *Catops*. Paykull.  
Moderaaskäfer.  
*fumatus* Spence. Rd.  
*fuscus* Panz. Rd. im Keller  
an Fässern.  
*alpinus* Gyll. Rd.  
*morio* F. Fh.

120. Gattung. *Ptomaphagus*. Illiger.  
subvillosus Goeze. (sericeus Panz.) Winterrieden.
121. Gattung. *Necrophorus*. Fabricius. Scharraask. oder Totengräber.  
humator Goeze. Fh.  
interruptus Steph. Fh.  
„ v. centrimaculatus Rtt. Fh. 1 Stück.  
investigator Zett. Boos.  
vespilloides Hbst. Rd. u. Fh.  
vespillo L. Rd.
122. Gatt. *Necrodes*. Leach. Leichenaaskäfer.  
littoralis L. Fh.
123. Gatt. *Thanatophilus*. Samouelle.  
dispar Herbst. Fh.  
sinuatus F. Rd.  
rugosus L. Rd.
124. Gatt. *Oeceoptoma*. Sam. thoracicum L. Rd. u. Fh.
125. Gatt. *Blitophaga*. Reitt. opaca L. Fh.
126. Gatt. *Xylodrepa*. Thoms. 4 punctata Schreber. Fh.
127. Gattung *Silpha*. L. Schabenaaskäfer.  
carinata Hbst. Rd.  
obscura L. Rd. und Fh.  
tristis Illg. Rd. und Fh.  
tyrolensis v. nigrita Creutz. Auf d. Schlicke b. Füßen.
128. Gatt. *Ablattaria*. Reitter. laevigata F. Rd.
129. Gatt. *Phosphuga*. Leach. atrata L. Rd. und Fh.
- XI. Fam. **Liodidae**. Reitter. Feuchtkäfer. Schattenkäfer.
130. Gattung. *Liodes*. Latreille. Schattenfeuchtkäfer. dubia Kug. Rd.
131. Gatt. *Cyrtusa*. Erichson. Krümmerin.  
minuta Ahrens. Fh.
132. Gattung. *Amphicyllis*. Erichs. Umherwälzer.  
globus v. ferrugineus St. Fh.
133. Gattung. *Agathidium*. Illiger. Rindenfeuchtkäfer.  
nigripenne F. Illertissen.  
seminulum L. Fh.  
laevigatum Er. Fh.
- XII. Familie. **Corylophidae**. Reitter. Schildkäfer.
134. Gattung. *Corylophus*. Leach. Zwergschildkäfer.  
cassidoides Marsh. Fh.
- XIII. Fam. **Trichopterygidae**. Flach. Haar- od. Federflügler. (Ptiliidae Reitter.)
135. Gatt. *Ptiliolium*. Flach. Flaumflügler.  
Kunzei Heer. Rd. Ehrwanger Viehweide aus trocken Kuhfladen geklopft.
136. Gatt. *Trichopteryx*. Kirby. Mistfederflügler.  
grandicollis Mannh. Ehrwanger Viehweide.  
atomaria Deg. Fh., kommt g. i. d. Häus., a. Fenst. gef.

- intermedia Gillm. Rd. u. Fh.  
 fascicularis Herbst, Fh.  
 sericans Heer. Rd.
- XIV. Familie. **Scaphidiidae.**  
 Reitter. Nachen- od. Kahnk.
137. Gattung. *Scaphosoma*.  
 Leach, Fadenkahnkäfer.  
 assimile Er. Fh.
- XV. Familie. **Histeridae.**  
 Schmidt. Stutzkäfer.
138. Gatt. *Platysoma*. Leach.  
 Rindenstutzkäfer.  
 compressum Hrbst. Mindel-  
 heim unt. morsch. Eichen-  
 rinde.
139. Gattung. *Cylistosoma*.  
 Lewis.  
 augustatum Hoffm. Rd.
140. Gattung. *Hister*. Linné.  
 Glanzstutzkäfer.  
 unicolor L. Ehrwanger Vieh-  
 weide in Kuhfladen hfg.
- terricola Germar. Ehrwang.  
 Viehweide i. Kuhflad. hfg.  
 merdarius Hoffm. Fh.  
 cadaverinus Hoffm. Rd.  
 funestus Er. Fh. nicht hfg.  
 bissexstriatus F. Rd.  
 purpurascens Hbst. Fh. selt.  
 carbonarius Hoffm. Fh.  
 v. 14 striatus Gyll. Rd.  
 bimaculatus L. Fh., b. Alten-  
 stadt a. Iller selten.
141. Gattung. *Dendrophilus*.  
 Leach. Baumstutzkäfer.  
 punctatus Herbst. Fh.
142. Gattung. *Gnathonus*.  
 Erichson. Kieferbugst.  
 punctulatus Thoms. Rd. u.  
 Fh. ziemlich selten.
143. Gattung. *Saprinus*. Er.  
 Miststutzkäfer.  
 semistriatus Sevilla. Vieh-  
 weiden b. Hopfen. Fh. n.  
 selten.

## B. Palpicornia. Latr.

Kolben- oder Palpenhörner.

- XVI. Familie **Hydrophilidae.**  
 Kolbenwasserkäfer.
144. Gatt. *Helephorus*. F.  
 Runzelwasserkäfer.  
 nubilus F. Fh. ziempl. hfg.  
 aquaticus L. Rd. u. Fh.  
 granularis L. Fh.  
 viridicollis Steph. Rd.
145. Gatt. *Hydraena*. Ku-  
 gelann. Zwergwasserk.  
 riparia Kugelann. Fh. hfg.
146. Gatt. *Hydrobius*. Leach.  
 Schlammwasserk.  
 fuscipes L. Rd. und Fh.
147. Gattung. *Anacaena*.  
 Thomson.  
 limbata F. Fh.
148. Gatt. *Enochrus*. Thom.  
 melanocephalus Ol. Rd. selt.
149. Gatt. *Helochares*. Mul-  
 sant. Sumpfwasserkäfer.  
 griseus F. Rd. häufig.

150. Gattung. *Chaetarthria*.  
Steph. (*Cyllidium* Er.)  
Lachenwasserkäfer.  
*seminulum*. Fh. hfg.
151. Gatt. *Laccobius*. Erichs.  
Lachenwasserkäfer.  
*minutus* L. Rd. u. Fh. gem.  
*scutellaris* Motsch. Fh.  
*gracilis* Motsch. Rd.  
*nigriceps* Thom. Altenstadt  
a. Iller.
152. Gatt. *Limnebius*. Leach.  
Pflanzenwasserk.  
*truncatellus* Thunbg. Fh.
153. Gattung. *Coelostoma*.  
Brulle. (*Cyclonotum* Er.)  
Kugelrückenwasserkäfer.  
*orbiculave* F. Am Hopfen-  
see, Fh.
154. Gatt. *Hydrous*. Dahl.  
Riesenkolbenwasserkäf.  
*aterrimus*. Rd.
155. Gattung *Sphaeridium*.  
F. Mistwasserkäfer.
- scarabaeoides* L. Rd. und  
Fh. gemein.  
*bipustulatum* F. Rd. u. Fh.  
gemein.
156. Gatt. *Cercyon*. Leach.  
Erd- oder Steinwasserk.  
*ustulatus* Preys. A. Hopfens.  
*impressus* St. Fh.  
*haemorrhoidalis* F. Rd.  
*melanocephalus* L. Rd. und  
Fh.  
*unipunctatus* L. Rd. und  
Fh.  
*quisquilius* L. Rd. u. Fh.  
*pygmaeus* Illg. Rd.  
*nigriceps* Marsh. Rd.  
*flavipes* Thbg. Rd.
157. Gattung. *Megasternum*.  
Muls. Großbrustwasserk.  
*boletophagum* Mars. Win-  
terrieden, Fh.
158. Gatt. *Cryptopleurum*.  
Muls. Punktschwimmk.  
*minutum* F. Rd. u. Fh.

### C. Cantharoidea.

- XVII. Familie. **Cantharidae**.  
Leach. Weichkäfer.
159. Gatt. *Homaligus*. Geof-  
froy. Flachweichk.  
*suturalis* v. *monochlorus*.  
Torre. Rd. sehr selten.
160. Gatt. *Dictyopterus*.  
Latr. Blumenweichk.  
*aurora* Herbst. Rd. nur 2  
Stück erbeutet.  
*rubens* Gyllh. Rd. selten.
161. Gatt. *Pyropterus*. Muls.  
*affinus* Payk. Rd. selten.
162. Gatt. *Platycis*. Thoms.  
*minuta* F. Rd. sehr selten.
163. Gattung. *Lygistropterus*.  
Muls. Sommerweichk.  
*sanguineus* L. Rd. u. Fh.
164. Gatt. *Lampyris*. Geoffroy.  
Leuchtweichk. Johannisw.  
*noctiluca* L. Hopperwald,  
Fh. im Gries.

165. Gatt. *Phausis*. Leconte.  
Johanniskäferchen, Glühwurm.  
*splendidola* L. Rd. und Fh. gemein.
166. Gatt. *Podabrus*. Westwood. Buschweickkäfer.  
*alpinus* Payk. Rd. häufig. Fh. und Eisenburgerwald selten.
167. Gatt. *Cantharis*. L. (*Telephorus* Deg.) Warzenträger od. Heckenweickkäfer.  
*abdominalis* F. Rd.  
„ *v. cyannipennis* Bach. Rd. nicht hfg.  
*violacea* Payk. Füssen, Weißhaus, Straße n. Tirol, selten!  
*fusca* L. Rd., Fh. hfg.  
*rustica* Fall. Rd., Fh. hfg.  
*tristis* F. Rd.  
*obscura* L. Rd., Fh.  
*albomarginata* Märk. Fh.  
*nigricans* Müll. Rd., Fh. hfg.  
*pellucida* F. Rd.  
*livida* L. Rd., Fh.  
„ *v. rufipes* Herbst (*dispar* F) Rd., Fh.  
*figurata*. Fh. selten.  
*4 punctata* Müll. (*assimilis* Payk). Rd. u. Fh.  
*rufa* L. Fh.  
„ *v. liturata* Fall. Rd. u. Fh.  
*pallida* Goeze (*bicolor* Pz.) Rd.
- fulvicollis* Redtb. (*bicolor* Herbst). Rd., Fh.  
*haemorrhoidalis* F. Fh. selt.
168. Gatt. *Absidia*. Mulsant.  
*pilosa* Payk. Rd. i. d. Lechaunen 3 ♂.
169. Gattung. *Rhagonycha*. Eschscholtz. Hack.-, auch Hainweickk.  
*translucida* Kryn. Rd.  
*fulva* Scop. (*melanura* Oliv) Rd. u. Fh. gemein.  
*limbata* Thoms. Rd.  
*femorialis* Brull. Rd.  
*lignosa* Müll. Rd.  
*atra* L. Fh. selten.
170. Gatt. *Malthinus*. Latreille. Kurzweickling.  
*biguttulus* Payk. Rd.  
*flaveolus* Payk. Rd.
171. Gattung. *Malthodes*. Kiesenwetter. Wachsweickkäfer.  
*marginatus* Latr. Rd.  
*guttifer* Kiesew. Fh.  
*minus* L. Fh.  
*dispar* Germ. Rd.  
*maurus* Cast. „
172. Gattung. *Drilus*. Olivier. Kammweickk.  
*concolor* Arh. Altenstadt a. d. Iller selten.
173. Gatt. *Troglops*. Erichson. Lochdrüsenk.  
*albicans* L. Rd. u. Fh. hfg., vielfach am Fenster des Wohnzimmers gesammelt.

174. Gattung. *Charopus*. Er.  
Grasdrüsenk.  
*flavipes* Payk. Fh. an  
trockenen Abhängen.
175. Gatt. *Hypebaeus*. Kies.  
*flavipes* F. Fh. wie voriger.
176. Gatt. *Ebaeus*. Erichson.  
Kleindrüsenk.  
*flavicornis* Erichs. Fh.
177. Gattung. *Axinotarsus*.  
Motschulsky. Axttarsen-  
drüsenk.  
*ruficollis* Oliv. Fh. selten.
178. Gatt. *Malachius*. Fabri-  
cius. Warzendrüsenk.  
*aeneus* L. Rd. u. Fh.  
*marginellus* Olov. Rd.  
*bipustulatus* L. Rd. u. Fh.
179. Gattung. *Anthocomus*.  
Erichson. Blumendrüsenk.  
*bipunctatus* Harrer (eque-  
stris F.) Fh.  
*fasciatus* L. Rd.
180. Gatt. *Dasytes*. Fabricius.  
Haadrüsenk.  
*niger* L. Rd.  
*obscurus* Gyllh. Rd.  
*coeruleus* Deg. Fh. selten.  
*plumbeus* Müll. Fh. hfg.  
*fuscus* Illg. Fh. hfg.
181. Gatt. *Haplocnemus*.  
Steph. Einfachschiener.  
*nigricornis* F. Fh.
- XVIII. Fam. **Cleridae**. Klug.  
Rauchkäfer.
182. Gattung. *Opilo*. Latreille.  
Holzrauchk.  
*mollis* L. Rd. u. Fh.
183. Gatt. *Thanasimus*. Latr.  
Ameisenrauchk.  
*formicarius* L. Rd., Fh.
184. Gatt. *Trichodes*. Herbst.  
Bienenrauchk.  
*apiarius* L. Rd., Fh.
185. Gatt. *Corynetes*. Herbst.  
Kolbenrauchk.  
*coeruleus* Degeer. Fh. selt.  
„ v. *ruficornus* St.  
Rd. u. Fh. hfg.
- XIX. Fam. **Byturidae**. Latr.  
Himbeerkäfer.
186. Gattung. *Byturus*. Latr.  
Himbeerk.  
*fumatus* F. Rd. u. Fh. gemein.  
*tomentosus* F. Rd. u. Fh.  
weniger hfg.
- XX. Fam. **Ostomidae**. Reitter.  
Schimmerkäfer.
187. Gatt. *Nemosoma*. Latr.  
Borkenschimmerk.  
*elongata* L. Fh. nicht hfg.
188. Gatt. *Tenebrioides*.  
Piller. (Trogosita Olivier)  
Hausschimmerk.  
*mauritanicus* L. Fh. nicht  
selten.
- XXI. Fam. **Nitidulidae**. Erichs.  
Schimmerk.
189. Gatt. *Cateretes*. Herbst  
(*Cercus* Latr.) Frühschim-  
merk.  
*pedicularius* L. Rd. ziemi.  
hfg.
190. Gatt. *Heterhelus*. Duv.

- scutularis Heer. (sambuci Erichs.) Boos a. Sambucus racemosus hfg.
191. Gatt. Brachypterus. Kugelann. Blütenschimmerkäfer.  
urticae. Rd. auf Urtica dioica sehr hfg.
192. Gatt. Soronia. Erichson. punctatissima Illg. Fh. unter Rinde selten.  
grisea L. Fh. weniger selt.
193. Gatt. Epuraea. Erichs. Saftschimmerk.  
depressa Gyllh. Fh. zieml. hfg.  
melina Er. Rd. selten auf Blüten.  
terminalis Mannh. Fh. selten unter Rinde.  
obseleta F. Fh. am Baum-safte.  
longula Er. Rd. selten.  
floreana Er. Fh. zieml. selten.  
variegata Herbst. Fh. selt.
194. Gatt. Omosita. Erichs. Moderschimmerk.  
discoidea F. Fh. im trock. Miste nicht hfg.
195. Gatt. Nitidula F. Aas-schimmerk.  
bipunctata L. Hopfen u. Fh.  
flavomaculata Rossi. Fh. selt.
196. Gattung. Meligethes. Steph. Honigschimmerk.  
rufipes Gyllh. Rd. u. Fh. nicht selten.
- lumbaris Sturm. Fh. nicht selten.  
coracinus Sturm. Rd. auf Blüten hfg.  
aeneus F. Rd. u. Fh. gemein.  
viridescens F. Rd. zieml. hfg.  
umbrosus Sturm. Fh. selten.  
flavipes Sturm. Rd. zieml. selten.
197. Gatt. Pocadius. Erichs. Pilzschimmerk.  
ferrugineus F. Fh. u. Winterrieden in Staubpilzen.
198. Gatt. Cychramus. Kugel. Schwammschimmerk.  
luteus F. Rd. u. Fh. hfg. auf Weißdorn.
199. Gatt. Glischrochilus. Murray (Ips F). Schlupf-schimmerkäfer.  
4 pustulatus L. Rd. zieml. häufig.
200. Gattung. Pityophagus. Shuckard.  
ferrugineus L. Rd. unter Fichtenrinde.
201. Gattung. Rhizophagus. Herbst. Wurzschimmerk.  
grandis Gyllh. Rd. und Altenstadt a. I. je 1 Stück.  
ferrugineus Payk. Rd. zieml. häufig.  
nitidulus F. Altenstadt a. I. zieml. hfg.  
bipustulatus F. Fh. nicht selt.  
politus Hellw. Fh. u. Altenstadt a. I. selten.

- dispar Payk. Altenstadt  
a. I. sehr selten.
- XXII. Fam. **Cucujidae**. Reitt.  
Flachkäfer.
202. Gatt. *Monotoma*. Herbst.  
Einzelschnittflachk.  
picipes H. Rd. zieml. hfg.
203. Gatt. *Silvanus*. Latreille.  
Waldflachk.  
fagi Guér (similis Er.) Fh.  
selten.
204. Gatt. *Laemophloeus*.  
Stephens. Bastflachk.  
ferrugineus Steph. Fh. nicht  
selten.
- XXIII. Fam. **Cryptophagidae**.  
Reitter. Schlupfkäfer.
205. Gatt. *Telmatophilus*.  
Heer. Sumpfschlupfk.  
caricis Oliv. Fh. nicht selt.
206. Gatt. *Paramecosoma*.  
Curtis. Langleibschlupfk.  
melanocephala Herbst. Fh.  
im Geniste an der Iller.
207. Gatt. *Cryptophagus*.  
Herbst. Verborgenfresser.  
badius Strm. Fh. selten.  
acutangulus Gyllh. Rd. in  
altem Stroh.
208. Gatt. *Atomaria*. Steph.  
Zwergschlupfk.  
fuscicollis Mannh. Fh. unter  
abgefall. Laub.  
mesomelaena Hbst. Fh. auf  
Wiesen.  
pusilla Payk. Fh. zieml. hfg.  
fuscipes Gyllh. Fh.
209. Gattung. *Ephistemus*.  
Steph. Aufseherschlupek.  
globulus Payk. Rd. nicht  
selten.
- XXIV. Fam. **Erotylidae**. Bed.  
Rindenkäfer.
210. Gatt. *Tritoma*. Fabric.  
Dreischnittrindenk.  
bipustulata F. Rd. an  
Baumschwämmen.
- XXV. Fam. **Phalacridae**.  
Flach. Glanzk.
211. Gatt. *Phalacrus*. Payk.  
Kahlglanzk.  
fimetarius F. Rd. u. Fh.  
gemein.
212. Gatt. *Olibrus*. Erichs.  
Glattglanzk.  
aeneus F. Fh. auf Kamille.  
affinis Strm. Rd. a. Wiesen  
häufig.  
bicolor F. Fh. auf Wiesen  
nicht selten.  
bimaculatus Küst. Fh. auf  
Wiesen zieml. hfg.
213. Gatt. *Stilbus*. Seidlitz.  
Blumenglanz k.  
testaceus Panz. Fh. nicht  
selten.
- XXVI. Fam. **Lathridiidae**.  
Mannerheim. Saftk., auch  
Heimlichnager.
214. Gatt. *Lathridius*. Herbst.  
Modersaftk.  
angusticollis Gyllh. Rd.  
selten.
215. Gatt. *Enicmus*. Thoms.

- minutus L. Rd. u. Fh. gemein.  
 transversus Oliv. Rd. unt.  
 abgefall. Laub.  
 216. Gatt. *Cartodere*. Thoms.  
 elongata Curtis. Fh. an  
 aufgehängter Wäsche.  
 217. Gattung. *Corticaria*.  
 Marsham. Rindensaftk.  
 pubescens Gyllh. Rd. u. Fh.  
 häufig.  
 serrata Payk. Rd. häufig.  
 elongata Gyllh. Fh.  
 218. Gatt. *Melanophthalma*.  
 Motschulsky.  
 fuscula v. trifoveolata Redtb.  
 Fh.  
 XXVII. Fam. **Mycetophagidae**.  
 Reichenbach. Pilzfresser.  
 219. Gatt. *Litargus*. Erichs.  
 Flinkpilzk.  
 connexus Geoffr. (bisfasciatus F.)  
 Winterrieden.  
 220. Gatt. *Typhaea*. Curtis.  
 Rohrkolbenpilz.  
 stercoriarea L. (fumata L.)  
 Rd. u. Fh. in Wohnungen  
 und Scheuern.  
 XXVIII. Fam. **Cisidae**. Mellié.  
 Baumschwammk.  
 221. Gatt. *Cis*. Latr. Schwammholz-  
 k.  
 comptus Gyllh. Fh. an  
 trockenem Holze.  
 boleti Scop. Fh. hfg.  
 hispidus Gyllh. Fh. hfg.  
 micans F. Fh.  
 XXIX. Fam. **Colydiidae**. Reitt.  
 Fadenk.  
 222. Gattung. *Cerylon*. Latr.  
 Splintfadenf.  
 hysteroides F. Illertissen  
 an alten Stöcken.  
 ferrugineum Steph. Fh.  
 unter Rinde.  
 223. Gatt. *Ditoma*. Herbst.  
 Zweischnittfadenk.  
 crenata F. Altenstadt a. I.  
 XXX. Fam. **Endomychidae**.  
 Reitter. Pilzk.  
 224. Gatt. *Mycetaea*. Steph.  
 Stickpilzk.  
 hirta Marsh. Fh.  
 XXXI. Fam. **Coccinellidae**.  
 Muls. Kugelk., Marienk.  
 225. Gatt. *Subcoccinella*.  
 Huber. Kleekugelk.  
 24 punctata L. Rd. u. Fh.  
 hfg., besond. auf Kleefeld.  
 226. Gattung. *Hippodamia*.  
 Mulsant.  
 13 punctata L. Rd. häufig.  
 7 maculata Deg. Rd. auf  
 Sumpfwiesen.  
 227. Gattung. *Adonia*. Muls.  
 Adoniskäferchen.  
 variegata. Rd. zieml. hfg.  
 228. Gatt. *Anisosticta*. Du-  
 ponchel. Punktkugelk.  
 19 punctata L. Rd. auf  
 nassen Wiesen.  
 229. Gatt. *Aphidecta*. Weise.  
 obliterata L. Rd. hfg. auf  
 Kiefern.

230. Gatt. *Adalia*. Mulsant.  
*bipunctata* L. Rd. u. Fh.  
 „ *a. interpunctata* Haw.  
 Fh.  
 „ *a. 6 pustulata* L. Rd.  
 „ *a. 4 maculata* Scop. „
231. Gatt. *Coccinella*. Linné.  
 Blattlauskugelk., Sonnen-  
 kälbchen, Frauenk.  
 7 *punctata* L. Rd. u. Fh.  
 5 „ L. Rd. zieml.  
 hfg., Fh. selten.  
*hieroglyphica* L. Rd. nicht  
 selten.  
 10 *punctata* L. (*variabilis* F.)  
 Rd. häufig, besonders am  
 Faulensee.  
 10 *punctata a. bimaclata*  
 Pont. Rd. hfg.  
*punctata a. 10 pustulata* L.  
 Rd. hfg.  
 „ *a. austriaca* Schrank.  
 Rd. hfg.  
 „ *a. nigrina* Weise.  
 Fh. hfg.  
*conglobata*. Rd.
232. Gatt. *Mysia*. Mulsant.  
 Stinkkugelk.  
*oblongoguttata* L. Rd.,  
 Altenstadt a. I.
233. Gattung. *Anatis*. Muls.  
 Unschuldkugelk.  
*ocellata* L. Rd., Altenstadt,  
 auf Weißdornblüten.
234. Gatt. *Halyzia*. Muls.  
 Pikanter Kugelk.  
*sedecimguttata* L. Rd.
235. Gattung. *Vibidia*. Muls.  
 Schwielenkugelk.  
 12 *guttata* Poda. Rd.
236. Gatt. *Thea*. Muls. Schau-  
 kugelk.  
 22 *punctata* L. Rd. u. Fh.  
 nicht selten.
237. Gattung. *Calvia*. Muls.  
 Kahlkugelk.  
 10 *guttata* L. Rd. sehr selt.  
 14 *guttata* L. Rd. zieml.  
 häufig.
238. Gattung. *Sospita*. Muls.  
 Retterkugelk.  
 20 *guttata* L. Rd. sehr selt.
239. Gatt. *Propylaea*. Muls.  
 14 *punctata* L. Rd. selten.
240. Gatt. *Chilocorus*. Leach.  
 Baumkugelk.  
*renipustulatus* Scriba. Rd.  
 häufig.  
*bipustulatus* L. Fh. hfg.  
 an Weidenstämmen.
241. Gatt. *Exochomus*. Redtb.  
 Dammkugelk.  
 4 *pustulatus* L. Rd.  
 „ *v. distinctus* Brull. Fh.  
 1 Stück.
242. Gatt. *Platynaspis*. Rdtb.  
 Breitschildk.  
*luteorubra* Goeze. Bei Ulm.
243. Gattung. *Pullus*. Muls.  
*ferrugatus* Moll. (*Scymnus*  
*analisis* F.) Rd.  
*suturalis* Thunb. (*Scymnus*  
*discoideus* Schneid.) Fh.  
 sehr selten.

244. Gatt. *Scymnus*. Kugelann.  
Laubkugelk.  
*frontalis* F. Fh. nicht hfg.  
*rubromaculatus* Goeze (pygmaeus Fouc.) Rd. n. selt.
245. Gattung. *Nephus*. Muls.  
Kleinkugelk.  
4 *maculatus* Hbst. Fh. im Herbst unter Baumrinde nicht selten.  
*Redtenbacheri* Muls. Rd. sehr selten.
246. Gatt. *Stethorus*. Weise.  
*punctillum* Weise. Rd. sehr selten.
247. Gattung. *Coccidula*. Kugelann. Sumpfkugelkäfer.  
*scutellata* Hbst. Babenhäusen auf nassen Wiesen an der Günst.  
*rufa* Hbst. Rd. hfg. auf Moorwiesen.

### D. Dascilloidea.

- XXXII. Fam. **Helodidae**.  
Klimmkäfer.
248. Gatt. *Helodes*. Latreille.  
Zweckenklimmk.  
*minuta* L. Rd. auf Weiden hfg.
249. Gattung. *Cyphon*. Payk.  
Laub- oder Jochklimmk.  
*variabilis* Thunbg. Rd. hfg.  
*padi* L. Rd. hfg.  
*coarctatus* Payk. Rd. hfg.
250. Gatt. *Hydrocyphon*. Redtb. Wasserklimmk.  
*deflexicollis* Müll. Rd. hfg.
251. Gatt. *Eubria*. Latreille.  
*palustris* Germ. Rd. hfg.
- XXXIII. Fam. **Dryopidae**.  
Kuwert. (Parnidae).  
Flußkäfer od. auch Schlammkäfer.
252. Gatt. *Dryops*. Olivier. (Parnus F.) Klauenflußk.  
*striatopunctatus* Heer. Fh.  
*viennensis* Heer. Fh.
253. Gattung. *Riolus*. Muls.  
*cupreus* Müller. Fh. hfg.
- XXXIV. Fam. **Georyssidae**.  
Fugenkäfer.
254. Gatt. *Georyssus*. Latr.  
Erdaufreißer.  
*substriatus* Heer. Rd. auf Lechsand.
- XXXV. Fam. **Dermestidae**.  
Reitt. Speckk.
255. Gattung. *Dermestes*. L.  
Hausspeckk., Fellfresser.  
*frischii* Kugel. Fh. am Aase.  
*murinus* L. Hopfen.  
*bicolor* F. Fh.  
*lardarius* L. Rd. u. Fh.
256. Gattung. *Attagenus*. Latreille. Schabspeckk.  
*piceus* Oliv. Rd. u. Fh. häufig.  
*piceus* v. *megatoma* F. Rd.  
*pellio* L. Rd. u. Fh. zieml. häufig.  
*punctatus* Scop. Fh. selten.

257. Gattung. *Megatoma*.  
Samouelle. Holzspeckt.  
undata L. Rd. nicht hfg.
258. Gattung. *Trogoderma*.  
Lartr. Hautzernager.  
nigrum Herbst. Rd. selten.  
Fh. selten.
259. Gattung. *Anthrenus*.  
Fabricius. Blumenspeckk.  
pimpinellae F. Fh. selten.  
scrophulariae L. Rd.  
museorum L. Rd. u. Fh.  
häufig; seine Larven sind  
den Insektensammlungen  
sehr schädlich.  
fuscus Oliv. (claviger  
Erichs.) Rd. nicht häufig.
260. Gatt. *Trinodes*. Latr.  
Wandspeckk.  
hirtus F. Fh. im ehemal.  
isr. Schulhause hfg.
- XXXVI. Fam. **Byrrhidae**.  
Reitter. Pillen- oder Rund-  
käfer.
261. Gattung. *Simplocaria*.  
Marsham. Lockenpillenk.  
semistriata Forst. Fh. selten.
262. Gattung. *Morychus*.  
Er. Beschmiert. Pillenk.  
aeneus F. Fh. hfg.
263. Gattung. *Pedilophorus*.  
Steffahny.  
nitidus Schall. Fh.
264. Gattung. *Cytilus*. Erich-  
son. Moderpillenk.  
sericeus Forst. (varius F.)  
Rd. hfg.
265. Gatt. *Byrrhus*. Linné.  
Pillenk.  
fasciatus Forst. Fh. zieml.  
selten.  
arietinus Steff. Fh. zieml.  
selten.  
pilula L. Fh. u. Rd. gemein.  
pustulatus Forst. Rd. selten.  
luniger Germ. Rd. selten.  
glabratus Heer. Tegelberg  
bei Füßen.  
signatus Panz. Säuling bei  
Füßen.
- XXXVII. Fam. **Dascillidae**.  
Tourn. Zottenk.
266. Gatt. *Dascillus*. Latr.  
(*Atopa* Payk.) w. o.  
cervinus L. Rd., Mkt. Ober-  
dorf, Illereichen.
- XXXVIII. Fam. **Elateridae**.  
Candèz. Schnellk., Schmiede.
267. Gattung. *Brachylacon*.  
Motschulsky. Mausschnell.  
murinus L. Rd. u. Fh. gemein.
268. Gattung. *Corymbites*.  
Latreille. Scheitel-, auch  
Spitzfleckschnellk.  
pectinicornis L. Rd. zieml.  
hfg. auf Wiesen um Füßen.  
cupreus F. Rd. häufig.  
cupreus v. aeruginosus F. Rd.  
purpureus Poda (haema-  
todes F.) Rd. u. Fh.  
tesselatus L. Rd. u. Fh. hfg.
269. Gatt. *Selatosomus*. Stph.  
(*Diacanthus* Latr.), Breit-,  
auch Zweidornschnell.

- aeneus L. Rd. selten, Fh. häufig.
- aeneus a. germanus L., Rd. häufig.
- aeneus a. coeruleus Schilsky. Rd. sehr selten.
- cruciatus L. Fh. ziemlich selten.
- affinis Payk. Rd. sehr selt.
270. Gatt. Prosternon. Latreille, holosericeus Ol. Rd. u. Fh. hfg.
271. Gatt. Sericus. Eschsch. Sericosomus Redtb. Bergschnellk.
- brunneus L. Rd. ziempl. selten.
- „ v. tibialis Redtb. Rd. selten.
- subaeneus Redtenbch. Rd. sehr selten.
272. Gatt. Dolopius. Eschsch. Wiesenschnellk.
- marginatus L. Rd. u. Fh. häufig.
273. Gatt. Agriotes. Eschsch. Ackerschnellk.
- ustulatus Schall. Rd. u. Boos häufig.
- ustulatus v. flavicornis Panz. Rd. u. Fh. selten.
- lineatus L. Rd. u. Fh. häufig.
- obscurus L. Rd. u. Fh. gemein.
274. Gatt. Synaptus. Eschsch. Blumenschnellk.
- filifornis F. Rd. sehr häufig, Fh. häufig.
275. Gatt. Adrastus. Eschsch. Erdschnellk.
- limbatus F. Rd. u. Fh. häufig.
- pallens Erichs. Rd. u. Fh. montanus Scopoli. Rd. selt.
276. Gatt. Cryptohypnus. Eschsch. Sandschnellk.
- riparius F. Rd. ziemlich selten.
277. Gattung. Hypnoidus. Stephens. Steinschnell. dermestoides Herbst. Fh. auf Illersand hfg. dermestoides v. tetragraphus Germ. Rd. ziempl. selten. meridionalis Lap. (lapidicola Germ.) Fh. hfg.
278. Gatt. Cardiophorus. Eschsch. Herzschnellk. atramentarius Erichs. Fh. auf Sanddorn sehr selt. cinereus Herbst. Fh. nicht selten.
279. Gattung. Melanotus. Eschsch. Schwarzückenschneller.
- rufipes Herbst. Rd. u. Fh. punctolineatus Pelerin (niger F.). Fh. selten.
280. Gatt. Elater. Linné. Feuerschnellk.
- pomonae Step. Rd. selten. sanguinolentus Schrank. Rd. u. Fh. ziemlich hfg. ferrugatus Lac. Rd. ziempl. selten.

- elongatulus F. Rd. 1 Expl.  
 balteatus L. Rd. u. Fh.  
 zieml. häufig.  
 nigroflavus Goeze (crocatu  
 Lap.). 2 St. auf d. Höhen  
 bei Hopfen.  
 erythrogonus Müll. Rd.  
 2 Expl.  
 tristis L. Rd. (Im Bachtal  
 bei Ussenburg 2 Expl.)  
 aethiops Lac. (scrofa Ger-  
 mar). Rd. 1 Expl.  
 281. Gatt. Limonius. Eschsch.  
 Grasschnellk.  
 pilosus Leske (nigripes  
 Gyllh.) Rd. selten.  
 aeruginosus Oliv. (cylindri-  
 cus Payk.). Rd. u. Fh. hfg.  
 minutus L. Rd. u. Fh. hfg.  
 parvulus Panz. Fh. selten.  
 282. Gatt. Pheletes. Kiesen-  
 wetter. Betrüger.  
 quercus Ol. (lythrodos Germ.)  
 Rd. nicht selten.  
 283. Gatt. Athous. Eschsch.  
 Blütenschnellk.  
 hirtus Herbst. Rd. u. Fh.  
 sehr häufig.  
 niger L. Rd. sehr hfg.  
 vittatus Fabr. Rd. u. Fh.  
 sehr hfg.  
 haemorrhoidalis F. Rd. u.  
 Fh. gemein.  
 subfuscus Müll. Rd. u. Fh.  
 nicht selten.  
 Zebei Bach. Rd. manches  
 Jahr einzelne Stücke.
284. Gatt. Denticollis. Piller  
 (Campylus Fisch.), Erlens-  
 schnellk.  
 linearis L. Rd. nicht hfg.  
 Fh. gemein.  
 XXXIX. Fam. **Eucnemidae.**  
 Bonvouloir = Trixagidae  
 Reitter. Sägek.  
 285. Gatt. Trixagus. Kugelann.  
 (Throscus Latr.) Blattsägek.  
 dermestoides L. Rd. u. Fh.  
 häufig.  
 XL. Fam. **Buprestidae.**  
 Marseul. Prachtkäfer.  
 286. Gatt. Poecilonota. Esch-  
 scholtz (Lampra Meg.)  
 Laubprachtk.  
 rutilans F. Rd. manches  
 Jahr auf jungen Erlen  
 nicht selten.  
 287. Gatt. Buprestis. Linné.  
 (Ancylochira Eschsch.)  
 Holzprachtk.  
 rustica L. Rd. u. Fh. nicht  
 selten.  
 288. Gatt. Anthaxia. Eschsch.  
 Blumenprachtk.  
 nitidula L. Rd. hfg.  
 4 punctata L. Rd. u. Fh.  
 sehr hfg.  
 289. Gatt. Agrilius. Curtis.  
 Gesträuchprachtk.  
 viridis L. Rd. zieml. selten.  
 „ a. linearis F. Rd.  
 „ a. nocivus Ratzbg. Fh.  
 „ a. fagi „ „  
 betuleti Ratzbg. Rd. selten.

- integerrimus Ratzbg. Rd.  
zieml. selten.
290. Gatt. *Trachys*. Fabricius.  
Haselprachtkk.  
*minuta*. Mindelheim u. Fh.  
zieml. selten.
- XLI. Fam. **Lymexylidae**.  
Walzenk., Holzbohrer.
291. Gatt. *Hylecoetus*. Latr.  
Waldwalzenk.  
*dermestoides* L. Rd. u. Fh.  
nicht selten.
- XLII. Fam. **Lyctidae**. Reitter.  
Splintk.
292. Gatt. **Lyctus**. F. w. oben.  
*linearis* Goeze (*canalicu-*  
*latus* F.) Fh. zieml. selt.
- XLIII. Fam. **Ptinidae**. Reitter.  
Hausk., Holzbohrer.
293. Gatt. *Niptus*. Boieldieu.  
*hololeucus* Falderm. Fh.  
ziemlich häufig (im Para-  
mentenschrank d. Schloß-  
kapelle u. i. Schulhause).
294. Gatt. *Ptinus* L. Bohrhausk.  
*fur* L. Rd. u. Fh. gemein.  
*brunneus* Duft. Rd. nicht  
selten.
- raptor* Sturm. Rd. nicht selt.
- XLIV. Fam. **Anobiidae**. Kie-  
senwetter. Holzsk.
295. Gatt. *Hedobia*. Sturm.  
Thronholzk.  
*imperialis* L. Fh. selten.
296. Gatt. *Ernobius*. Thoms.  
Astholzk.  
*abietinus* Gyllh. Rd. u.  
Altenstadt a. I.  
*mollis* L. Rd. nicht selten.
297. Gatt. *Anobium*. Fabr.  
Pochholzk.  
*pertinax* L. Rd. u. Fh. zieml.  
häufig.  
*striatum* Oliv. Rd. u. Fh.  
in Balk., Möb. etc. gemein.  
*rufipes* F. Fh. nicht selten.
298. Gatt. *Sitodrepa*. Thoms.  
*panicea* L. Fh. in Speise-  
kammern.
299. Gatt. *Ptilinus*. Geoffroy.  
Federhornholzk.  
*pectinicornis* L. Fh. zieml.  
selten.
300. Gattung. *Xyletinus*.  
Latreille. Bohrholzk.  
*ater* Panz. Fh. nicht hfg.

### E. Heteromera.

- XLV. Fam. **Oedemeridae**.  
Schmidt Linnaea.  
Schmalk., Scheinböcke.
301. Gatt. *Calopus*. Fabr.  
Bergschmalk.  
*serraticornis* L. Fh. selten.
302. Gatt. *Anoncodes*. Du-  
ponchel. Sonnenschmalk.,  
Schmalbauch.  
*rufiventris* Scop. Rd., Fh.  
nicht selten.  
*rufiventris* v. ♀ *limbicollis*  
Reitter. Fh. selten.  
*ustulata* F. Fh. zieml. selt.

- fulvicollis Scop. Rd. zieml. selten.
- adusta Panz. Fh. nicht selt.
303. Gattung. *Chrysanthia*. Schmidt. Goldschmalk.
- viridissima L. Rd. u. Fh. häufig.
- viridis Schmidt. Rd. u. Fh. weniger hfg.
304. Gatt. *Oedemera*. Olivier. Dickschenkel, auch Heideschmalk.
- flavipes F. bei Blaubeuren gesammelt.
- subulata. Wie voriger.
- flavescens L. Rd. u. Fh. gem.
- virescens L. R. u. Fh. gemein.
- lurida Marsh. Rd. sehr selt.
- XLVI. Fam. **Pythidae**. Scheinrübler oder Schnauzenk.
305. Gatt. *Pytho*. F. Flachscheinrübler.
- depressus L. Fh. sehr selten.
306. Gatt. *Rhinosimus*. Latreille. Hainschnauzenk.
- ruficollis L. Rd. selten.
- planirostris F. Fh. selten.
- XLVII. Fam. **Pyrochroidae**. Feuerkäfer.
307. Gatt. *Pyrochroa*. Geoffr. Kammfeuerk.
- serraticornis Scop. (rubens F.) Fh. sehr häufig; auch aus in morsch. Zwetschgenbaum gefund. Larven gezogen.
- pectinicornis L. Fh. sehr selten.
- XLVIII. Fam. **Anthicidae**. Schmidt. Blumenk.
308. Gatt. *Anthicus*. Payk. Schirmblumenk.
- humilis Germ. Rd. nicht hfg.
- floralis L. Rd. selt. Fh. 1 St.
- hispidus Rossi. Rd. zieml. slt.
- formicarius. Fh. selten.
- XLIX. Fam. **Meloidae**. Reizkäfer.
309. Gatt. *Meloë*. Linné. Ölreizk., Maiwurm.
- proscarabaeus L. Rd. u. Fh. nicht selten.
- violaceus Marsh. Hopfen, selten.
- scabriusculus Brdt. Rd. zieml. selten.
310. Gatt. *Lytta*. Fabr. Blasenreizk., Pflasterk.
- vesicatoria L., bei Waischenfeld i. d. fränk. Schweiz gefang., im Gebiete nicht beobachtet.
- L. Fam. **Rhipiphoridae**. Gerstäcker. Fächerfühlerk.
311. Gatt. *Metoeus*. Gerst. (*Rhipiphorus* F.) w. o.
- paradoxus L. Altenstadt a. Iller. (Von Herrn Alt gefunden).
- LI. Fam. **Mordellidae**. Springkäfer.
312. Gattung. *Mordella*. L. Stachelspringk.

- maculosa* Naezen Act. Rd.  
 u. Fh. nicht selten.  
*fasciata* F. Rd. u. Fh. hfg.  
*aculeata* L. Rd. u. Fh. hfg.  
 313. Gatt. *Mordellistena*.  
 Costa.  
*abdominalis* F. Rd. u. Fh.  
 zieml. selten.  
*humeralis* L. Rd. zieml. selt.  
*pumila* Gyllh. F. nicht selt.  
 314. Gatt. *Anaspis*. Geoffroy.  
 Afterspringk.  
*frontalis* L. Rd. häufig.  
*thoracica* L. Rd. nicht hfg.  
*rufilabris* Gyllh. Rd. zieml.  
 selten.  
 LII. Fam. **Melandryidae**.  
 Seidlitz. Schwarz- auch  
 Braunk., Düsterk.  
 315. Gatt. *Melandrya*. Fabr.  
 Holzbraunk.  
*caraboides* L. Fh. nicht hfg.  
 316. Gattung. *Hypulus*. Payk.  
 Schlupfdüsterk.  
*quercinus* Quens. bei Alten-  
 stadt a. Iller.  
 LIII. Fam. **Lagriidae**. Wollk.  
 317. Gatt. *Lagria* F. Busch-  
 wollk.  
*hirta* L. Rd. u. Fh. hfg.  
 LIV. Fam. **Alleculidae**. Seid-  
 litz. Auch *Cistelidae*. Fadenk.  
 318. Gatt. *Gonodera*. Muls.  
 (*Cistela* Geof.) Pflanzen-  
 fadenk.  
*murina* L. Fh. nicht selt.  
*murina a. thoracica* F. Fh.  
 nicht selten.  
 319. Gatt. *Ctenopus*. Solier.  
 Blütenfadenk.  
*sulphureus* L. Bei Blau-  
 beuren gesammelt, im  
 Gebiet nicht beobachtet.  
 LV. Fam. **Tenebrionidae**.  
 Kraatz. Schattenk.-  
 320. Gattung. *Blaps*. Fabr.  
 Trauerschattenk.  
*lethifera* Marsh. (similis  
 Latr.) Fh. u. Winterried.  
 in Kellern nicht selten.  
 321. Gatt. *Opatrum*. Fabr.  
 Staubschattenk.  
*sabulosum* L. Fh. nicht hfg.  
 322. Gattung. *Scaphidema*.  
 Redtb. Nachenschattenk.  
*v. bicolor* F. Fh. zieml.  
 selten.  
 323. Gattung. *Hypophloeus*.  
 Fabr. Rindenschattenk.  
*unicolor* Piller. Bei Alten-  
 stadt a. I.  
 324. Gatt. *Tenebrio*. Linné.  
 Hausschattenkäfer.  
 Mehlwurm.  
*molitor* L. Rd., Fh., insbes.  
 bei Bäckern gemein.

## F. Phytophaga.

- LVI. Fam. **Cerambycidae**. 325. Gattung. *Spondylis*. F.  
 Ganglbauer. Bockkäfer. Waldbock.

- buprestoides L. Rd., Fh. selten.
326. Gatt. *Prionus*. Geoffroy. Forstbock, Sägebock.  
coriarius L. Rd. hfg.
327. Gatt. *Rhagium*. Fabr. Schrotbock.  
sycophanta Schrank. Fh., Winterrieden nicht hfg.  
mordax Deg. Rd., Fh. hfg.  
bifasciatum F. Fh. nicht häufig.  
inquisitor L. Rd. nicht hfg.
328. Gatt. *Oxymirus*. Muls. Schulterbock.  
cursor L. Rd., Boos nicht häufig.
329. Gattung. *Stenochorus*. Fabr. (*Toxotus* Serville) Blumenbock.  
meridianus Panz. Rd., Fh. sehr hfg.
330. Gatt. *Pachyta*. Steph. Vierfleckbock.  
quadrimaculata. Rd., Fh., Boos nicht selten.
331. Gatt. *Evodius*. Leconte. Fleckenbock. (*Pachyta* Muls.) Feistbock.  
clathratus F. Auf der roten Wand bei Füßen zu weilen häufig.  
clathratus F. a. nigritus Pic. w. v.
332. Gatt. *Acmaeops*. Leconte. Kugelhalsbock.  
collaris L. Rd., Fh. hfg.
333. Gatt. *Gaurotes*. Leconte. Blaubock.  
virginea L. Rd., Fh. nicht selten.
334. Gatt. *Pidonia*. Mulsant. Schnürhalsbock.  
lurida F. Rd., Füßen rote Wand, Fh. ziemi. hfg.
335. Gattung. *Leptura*. L. Schmalbock, Halsbock.  
livida F. Rd. selten.  
maculicornis Deg. Rd., Fh. häufig.  
rubra L. Rd., Fh. gemein.  
sanguinolenta L. Rd. ziemi. häufig.  
dubia Scopoli. Rd. ziemi. häufig.  
cerambiciformis Schrank. (8 maculata Fabr.) Rd., Fh. hfg.
336. Gatt. *Strangalia*. Serville. Schmalbock.  
4 fasciata L. Fh. selten.  
aethiops Poda (*atra* Laich). Fh. manches Jahr nicht selten.  
melanura L. Rd. u. Fh.  
nigra L. Rd. selten.  
attenuata L. Rd. selten.
337. Gatt. *Alosterna*. Muls. tabacicolor Deg. (*laevis* F.) Rd. u. Fh. häufig.
338. Gatt. *Grammoptera*. Serville. Blütenbock.  
ruficornis F. Rd. nicht selten.

339. Gattung. *Caenoptera*.  
Thoms. Kurzdeckenbock,  
auch Fliegenbock.  
*minor* L. Rd., rote Wand  
bei Füßen, Fh. hfg.  
*umbellatarum* Schreb., wie  
voriger, aber selten.
340. Gatt. *Obrium*. Curtis.  
Zwergbock.  
*brunneum* L. Rd., Markt  
Oberdorf, Ottobeurenselt.
341. Gatt. *Gracilia*. Serville.  
Schlankbock.  
*minuta* F. (*pygmaea* F.)  
Markt Oberdorf, Altenstadt  
a. I. sehr selten.
342. Gattung. *Criocephalus*.  
Muls. Widderbock, auch  
Halsgrubenbock.  
*rusticus* L. Rd., Fh. selten.
343. Gatt. *Asemum*. Eschsch.  
Düsterbock.  
*striatum* L. Rd. zieml. selt.  
„ *v. agreste* F. Rd.  
selten.
344. Gatt. *Tetropium*. Kirby  
(Isarthron Redtenbach.).  
Sommerbock, Gleichglied-  
hornbock.  
*castaneum* L. Rd. selten.  
„ *v. luridum* L. Rd. u.  
Fh. selten.  
„ *v. aulicum* F. Rd.  
nicht selten.  
„ *v. fulcratum* F. Rd.  
nicht selten.  
*fuscum* F. Rd. selten.
345. Gatt. *Phymatodes*. Mls.  
Baumbock.  
*testaceus* L. Rd., Fh.  
manchmal häufig.  
*testaceus a. variabilis* L.  
Rd., Fh. manchmal hfg.  
*testaceus a. praeustus* F.  
Fh. selten.
346. Gatt. *Callidium*. Fabr.  
Scheibenbock.  
*aeneum* Deg. (*dilatatum*  
Payk.) Rd., Fh. selten.  
*violaceum* L. Rd. u. Fh.  
gemein.
347. Gatt. *Hylotropes*. Ser-  
ville. Hausbock, Bohrbock.  
*bajulus* L. Rd. u. Fh. hfg.  
Ich beobachtete einige  
Exemplare b. Ausschlüpf.  
aus einem Sims (Fenster-  
brett) des hiesigen Schul-  
hauses, der schon einige  
Jahre angebracht war, ein  
Beweis, daß die Tiere zur  
Entwicklung mehr. Jahre  
benötigen. Das Brett  
mußte später, weil völlig  
zerfressen, erneuert wer-  
den. In Länge sehr ver-  
änderlich (10 bis 20 mm).
348. Gatt. *Aroma*. Serville.  
Moschusbock.  
*moschata* L. Rd. u. Fh.  
manches Jahr häufig.
349. Gatt. *Xylotrechus*.  
Chevrolat.  
*antilope* Zetterst. Rd. selten.

350. Gatt. *Clytus*. Laichartg.  
Zierbock.  
arietes L. Rd. u. Fh. nicht  
selten.  
rhamni Germ. Rd. u. Fh. selt.
351. Gatt. *Anaglytus*. Muls.  
Zierbock.  
mysticus L. Rd. selten.
352. Gatt. *Lamia*. Fabricius.  
Weberbock.  
textor L. Rd. nicht selten;  
Fh. häufig.
353. Gatt. *Monochamus*.  
Curtis. Langhornbock.  
sartor F. Bei Füßen sehr  
selten.  
sutor L. Rd. in 10 Jahren  
2 mal beobachtet u. da in  
mehr. Exempl. beisammen.
354. Gatt. *Acanthoderes*.  
Serville. Dornbock.  
clavipes Schrank. Hopfen  
sehr selten.
355. Gatt. *Acanthocinus*.  
Steph. (*Astynomus* Deg.)  
Zimmerbock.  
aedilis L. Rd., Altenstadt  
nicht selten.
356. Gatt. *Liopus*. Serville.  
Glattbock.  
nebulosus L. Fh., Altenstadt  
zieml. selten.
357. Gatt. *Pogonochaerus*.  
Geminger. Wimperbock.  
hispidus L. Rd. u. Fh. hfg.  
fasciculatus Deg. Rd. selt.  
als der vorige.
358. Gatt. *Agapanthia*. Serv.  
Scheckhornbock.  
villosoviridescens Deg. (an-  
gusticollis Gyllh.). Rd.  
u. Fh. sehr hfg. auf Wei-  
den und Disteln.
359. Gatt. *Saperda*. Fabr.  
Pappelbock.  
carcharias L. Fh. zieml.  
selten.  
populnea L. Rd. u. Fh. hfg.  
scalaris L. Hopfen, Boos,  
Altenstadt a. I.
360. Gatt. *Tetrops*. Steph.  
Augenbock.  
praeusta L. Rd. u. Fh. hfg.
361. Gatt. *Stenostola*. Muls.  
Zitterbock.  
nigripes. Rd., Fh. nicht  
selten.
362. Gatt. *Phytoecia*. Muls.  
Pflanzenbock.  
cylindrica L. Fh. nicht  
selten.  
coerulescens Scop. (vires-  
cenz F.) Fh. nicht hfg.  
coerulescens a. obscura Bris.  
Fh. selten.
363. Gatt. *Oberea*. Mulsant.  
Linienbock.  
pupillata Gyllh. Rd. u. Fh.  
auf *Lonicera* selten.  
oculata L. Rd. u. Fh. auf  
*Salix incana* oft hfg.  
linearis L. Rd. auf *Corylus*  
avellana auf dem Senden-  
berg sehr selten.

- LVII. Fam. **Chrysomelidae.**  
Blattkäfer.
364. Gatt. *Donacia*. Fabr.  
Rohrkäfer.  
*crassipes* F. Schwansee  
bei Hohenschwangau hfg.  
*clavipes* F. Rd. hfg.  
*aquatica* L. (*vittata* Oliv.)  
Rd. nicht selten.  
*vulgaris* Zschach. (*typhae*  
Ahr.) Rd. nicht selten.  
*simplex* F. (*linearis* Hoppe).  
Rd., Fh. zieml. hfg.
365. Gattung. *Plateumaris*.  
Thomson.  
*sericea* a. *micans* Panzer.  
Rd. u. Fh. hfg.  
*sericea* a. *armata* Pak. Fh.  
häufig.  
*sericea* a. *nymphaeae* F. Fh.  
sehr selten.  
*consimilis* Schr. (*discolor*  
Hoppe). Rd. sehr selten.  
*rustica* Kunze. Rd. nicht selt.
366. Gatt. *Orsodacne*. Latr.  
Keimbeisser.  
*cerasi* L. Rd. zieml. selt.  
„ a. *lineola* Lac. Rd.  
sehr selten.  
„ a. *limbata* Ol. Alten-  
stadt a. I. sehr selt.  
„ a. *Duftschmidi* Weis.  
wie voriger.
367. Gatt. *Zeugophora*. Kunz.  
Jochblattkäfer.  
*subspinosa* F. Fh. sehr selt.  
*flavicollis* Marsh. Rd. hfg.
368. Gatt. *Lema*. Lacordaire.  
Blatthähnchen.  
*puncticollis* Cart. Fh. nicht  
selten.  
*Erichsoni* Suffr. Fh. sehr  
selten.  
*cyanella* L. Rd. u. Fh.  
häufig.  
*melanopus* L. Rd. hfg.
369. Gatt. *Crioceris*. Geoffr.  
Spargelk., Lilienhähnch.  
*lilii* Scop. (*merdigera* F.)  
Rd., Fh. auf Lilien zieml.  
häufig.  
*merdigera* L. (*brunea* F.)  
Rd., Fh. wie voriger.  
*asparagi* L. Fh. auf Spargel-  
pflanzen zieml. häufig.
370. Gatt. *Labidostomis*.  
Redtenbach. Sägeblattk.  
*tridentata* L. Rd. auf Berg-  
wiesen nicht hfg.  
*longimana* L. Rd. selten.
371. Gatt. *Clytra*. Laichart.  
Sägehorn.  
*quadripunctata* L. Rd. u. Fh.  
*laevinscula* Ratzebg. Fh.  
ziemlich häufig.
372. Gatt. *Gynandroph-*  
*thalma*. Lacordaire. (Cya-  
*niris* Chevrol.) Haldenblatt-  
käfer.  
*cyanea* L. Rd., Fh. hfg.  
*flavicollis* Charp. Fh. selt.  
*affinis* Hellw. Rd. hfg.  
*xanthaspis* Germ. Rd. nicht  
selten.

373. Gatt. *Coptocephala*.  
Chevrolat. Stutzkopf.  
rubicunda Laich. Rd. hfg.
374. Gatt. *Cryptocephalus*.  
Geoffroy. Fallblattk.  
sericeus L. Rd. häufig.  
„ a. pratorum Suffr.  
Rd. zieml. selten.  
aureolus Suffr. Rd. zieml.  
selten.  
cristula Duft. Fh. hfg.  
violaceus Laich. Rd. hfg.  
nitidus L. Rd. hfg.  
coryli L. Rd. zieml. hfg.  
coryli a. dorsosignatus Reitt.  
Rd. selten.  
variegatus F. Rd. nicht selt.  
octopunctatus Scop. Rd.,  
Fh. häufiger als der vor.  
signatus Lch. Rd. zieml. hfg.  
cordiger L. Rd. nicht selt.  
flavipes F. Rd. hfg.  
pini L. Rd. häufig.  
biguttatus Scop. Rd. nicht  
selten.  
bipunctatus a. immaculi-  
pennis Pic. Rd. sehr selt.  
bipunctatus v. sanguino-  
lentus Scop. Rd. sehr selt.  
vittatus F. Rd. hfg.  
frenatus Laich. Rd. hfg.  
Moraei L. Rd. hfg.  
ocellatus Drap. (Geminus  
Gyllh.) Rd. hfg.  
labiatus L. Rd. selten.
375. Gatt. *Pachybrachus*.  
Redtenb. Scheckenblattk.
- hieroglyphicus Laich. Rd.  
häufig.  
hippohaës Suffr. Fh. hfg.
376. Gatt. *Pachnephorus*.  
Redtenbach. Duftblattk.  
pilosus Rossi (avenarius  
Panz.) Rd. hfg.
377. Gatt. *Bromius*. Redten-  
bacher. Achselblattk.  
obscurus L. Bei Hopfen  
zieml. selten.
378. Gatt. *Gastroidea*. Hope.  
(*Gastrophysa* Chevr.) Weg-  
blattk.  
polygona L. a. ruficollis F.  
Fh. selten.
379. Gatt. *Timarcha*. Latr.  
Tatzenblattk.  
metallica Laich. Rd., Fh.,  
Winterrieden nicht selten.
380. Gatt. *Chysomela*. Linné.  
Goldblattk.  
orichalcea Mull. Rd. nicht  
selten.  
hyperici Forst. (fucata F.)  
Rd. sehr selten.  
geminata Payk. Rd. sehr  
selten.  
brunsvicensis Gravh. (dupli-  
cata Zenk.) Rd. sehr selt.  
staphylea L. Rd. zieml.  
häufig.  
haemoptera L. Rd., Fh.  
nicht selten.  
purpurascens Germ. Auf  
d. Höhen b. Ussenb. u.  
a. Zwieselbg. zieml. selt.

- goettingensis L. Rd. hfg.  
 varians Schaller. Rd., Fh.  
 häufig.  
 varians a. pratensis Weise.  
 Rd. zieml. selten.  
 cerealis L. Rd. selten.  
 fastuosa Scop. Rd., Fh.  
 häufig.  
 graminis L. Rd., bei der  
 Hollmühle zieml. hfg.  
 coeruleans Scriba (violacea  
 Panz.) Rd., Fh. hfg.  
 coeruleans v. menthastri Suffr.  
 Fh. zieml. selten.  
 polita L. Rd. hfg.
381. Gatt. *Chrysochloa* a.  
 Hope. (Orina Motsch.)  
 intricata a. Anderschi.  
 Duftsch. Pöllatschlucht  
 u. bei der Marienbrücke  
 zu Hohenschwangau  
 selten.  
 gloriosa a. virgo Ws. bei  
 Ussenburg selten.  
 gloriosa a. nubila Weise.  
 Auf dem Tegelberg  
 selten.  
 gloriosa a. superba Oliv.  
 Rd. sehr selten.  
 cacaliae Schrank. Tegel-  
 bei Füßen hfg.  
 speciosissima Scopoli. Tegel-  
 berg selten.  
 speciosissima a. Letzneri  
 Weise. Tegelberg nicht  
 selten.
382. Gattung. *Phytodecta*.  
 Kirby. (Gonioctena  
 Redtenbach.) Hainblattk.  
 viminalis L. Rd. sehr selt.  
 Linnaeana Schrank. Rd., Fh.  
 zieml. hfg.  
 Linnaeana a. decostigma  
 Duft. Fh. sehr selten.  
 Linnaeana a. nigricollis  
 Westh. Rd., Fh. sehr hfg.  
 Linnaeana a. Satanas Westh.  
 Rd., Fh. hfg.  
 5 punctata F. Rd. hfg.  
 punctata a. unicolor Weise.  
 Rd. sehr selten.
383. Gatt. *Phyllodecta*.  
 Kirby. (Phratora Redten-  
 bacher) Weidenblattk.  
 tibialis Suffr. Rd. gemein.  
 vitellinae L. Rd., Fh. gem.  
 „ a. brevicollis Motsch.  
 Fh. sehr selten.
384. Gattung. *Hydrothasa*.  
 Thomson. (Helodes Payk.)  
 Bachblattkäfer, Sumpf-  
 hähnchen.  
 aucta F. Rd. zieml. hfg.
385. Gatt. *Prasocuris*. Latr.  
 Lauchhähnchen.  
 phellandrii L. Rd. auf *Caltha*  
 palustris hfg.  
 junci Brahm (violacea F.)  
 bei Hopfen hfg.
386. Gatt. *Phaedon*. Latr.  
 Glanzblattk.  
 laevigatus Duft. Rd., Fh.  
 häufig.  
 cochleariae F. Rd., Fh. hfg.

- cochleraiæ* a. *neglectus*  
 Sahlbg. Bei Hopfen sehr  
 selten.
- armoraciæ* L. Rd. u. Fh.  
 häufig.
387. Gattung. *Plagiodera*.  
 Erichson. Weidenblattk.  
*versicolor* Laich. (*armora-*  
*ciæ* F.) Fh. nicht hfg.
388. Gatt. *Melasoma*. Steph.  
 (*Lina* Redtenb.) Busch-  
 blattkäfer.
- aenea* L. Rd. sehr selten.
- cuprea* F. Bei Hohen-  
 schwangau nicht selten.
- 20 *punctata* Scop. Bei  
 Altenstadt a. I. selten.
- populi* L. Rd., Fh. häufig.
- saliceti* Weise. Fh. häufig.
- tremulæ* F. Rd., Fh. hfg.
389. Gattung. *Agelastica*.  
 Redtenb. Erlenblattk.
- alni* L. Fh. nicht selten.
390. Gatt. *Luperus*. Geoffr.  
 Langhorn, Fadenbl.
- pinicola* Duft. Rd. hfg.
- longicornis* F. Rd. zieml.  
 häufig.
- flavipes* L. Rd., Fh. hfg.
391. Gatt. *Lochmaea*. Weise.
- capreae* L. Rd. hfg.
- suturalis* Thoms: Rd. sehr  
 selten.
- crataegi* Forst (*sanguinea* F.)  
 Hopfen, Fh. zieml. selt.
392. Gattung. *Galerucella*.  
 Crotsch. Fallblattk.
- viburni* Payk. Rd., Fh. hfg.
- lineola* F. Rd., Fh. sehr  
 häufig.
- calmariensis* L. Rd. zieml.  
 selten.
- tenella* L. Rd. hfg.
393. Gatt. *Galeruca*. Geoffr.  
 (*Adimonia* Laicharting).  
 Flachblattk.
- tanaceti* L. Rd. häufig.
- pomonæ* Scop. (*rustica*  
 Schallh.) Rd. häufig.
394. Gattung. *Sermylassa*.  
 Reitter. Zierblattk.
- halensis* L. Fh. nicht hfg.
395. Gattung. *Crepidodera*.  
 Chevrolat. Springblattk.
- femorata* Gyllh. Rd. zieml.  
 selten.
- melanostoma* Redtb. Rd.  
 sehr häufig.
- ferruginea* Scop. Rd. sehr  
 häufig.
396. Gattung. *Chalcoides*.  
 Foudras. Weidenflohk.
- aurata* Marsh. Rd., Fh.  
 häufig.
397. Gatt. *Hippuriphila*.  
 Foudras. Schachtelhalm-  
 flohkäfer.
- Modeeri* L. Rd. auf Lech-  
 sand sehr selten.
398. Gatt. *Mantura*. Steph.  
*Matthewsi* Curt. Rd. sehr  
 selten.
399. Gatt. *Chaetocnema*.  
 Stephens. (*Plectroscelis*

- Redtenbacher) Schienen-  
zahnblattk.
- concinna* Marsh. Fh. selt.
- aridula* Gyllh. Rd., Fh.  
nicht selten.
- Sahlbergi* Gyllh. Rd. sehr  
selten.
400. Gattung. *Psylliodes*.  
Berthold. Flohblattkäfer.  
*napi* F. Fh. nicht selten.  
*affinis*. Rd., Fh. häufig.  
*hyoscyami* v. *chalcomera*  
Illg. Fh. zieml. selten.
401. Gatt. *Haltica*. Geoffroy.  
Hüpfblattk.  
*tamaricis* Schrank (*conso-  
brina* Dftsch.) Rd., Fh.  
häufig.  
*oleracea* L. Rd., Fh. hfg.  
*pusilla* Duft. Rd. hfg.
402. Gatt. *Hermaeophaga*.  
Foudr. Biegelkrautflohk.  
*mercurialis* F. Rd. auf  
*Mercurialis perennis* nicht  
selten.
403. Gattung. *Phyllotreta*.  
Foudras. Erdfloh.  
*armoraciae* Koch. Rd. auf  
*Cochlearia Armoracia* im  
Schulgarten sehr selten.  
*flexuosa* Illg. Rd. sehr selt.  
„ a. *fenestrata* Ws.  
Fh. sehr selten.  
*sinuata* Redtenb. (*vittata* F.)  
Rd., Fh. häufig.  
*undulata* Kutsch. Rd., Fh.  
sehr häufig.
- undulata* a. *bilineata* Ws.  
Fh. selten.
- nemorum* L. Rd., Fh. auf  
Kohlarten und Rettig in  
Gärten gemein.
- nigripes* F. (*lepidii* Koch)  
wie voriger gemein.
404. Gatt. *Aphthona*. Chevr.  
Wolfsmilchflohk.  
*cyparissiae* Koch. Winter-  
rieden nicht selten.  
*venustula* Kutsch. Rd., Fh.  
häufig.
405. Gattung. *Longitarsus*.  
Latr. Langfußblattk.  
*anchusae* Payk. Rd. hfg.  
*holsaticus* L. Rd. hfg.  
*luridus* Scop. Rd. hfg.  
„ a. *4 signatus* Duft.  
Rd. selten.
- atricillus* L. Rd. hfg.  
*suturellus* L. (*thoracicus*  
Steph.) Rd. nicht selten.  
*melanocephalus* Deg. Rd.  
häufig.
- longipennis* Kutsch. Fh.  
selten.
- pratensis* Panz. Rd. nicht  
selten.
- succineus* Foudr. Fh. nicht  
selten.
- jacobaeae* Waterh. (*tabidus*  
Panz.) Fh. zieml. hfg.
406. Gatt. *Sphaeroderma*.  
Steph. Kugelblattk.  
*testaceum* F. (*cardui* Gyllh.)  
Rd., Fh. auf Disteln hfg.

- rubidum*-Graëlls (testaceum Gyllh.) Selten. als vorig.  
 407. Gatt. *Hispella*. Chapuis. Dornblattk.  
*atra* L. Um Rd. auf trock. Bergwiesen nicht selten.  
 408. Gatt. *Cassida*. Linné. Schildblattk.  
*viridis* L. Rd. nicht selt.  
*azurea* F. (lucido Suffr.) auf ein. Kleeacker (*Trifolium hybridum*) zwisch. Rd. u. Hopfen im Sommer 1901 auf *Silene*-Arten in mehr. Exempl. gefangen.  
*margaritacea* Schall. Winterrieden nicht selten.  
*margaritacea a. melanocephala* Suffr. Winterrd. selt.  
*flaveola* Thunbg. (obsoleta Illg.) Rd. auf Disteln hfg.  
*nebulosa* L. Rd. selten.  
*atrata* F. Rd. zieml. selt.  
*rubiginosa* Mull. Rd., Fh. sehr hfg.
- vibex* L. Rd., Fh. sehr häufig.  
*denticollis* Suffr. Fh. zieml. selten.  
*sanguinolenta* Müll. Rd. nicht hfg.  
*vittata* Villers (oblonga Illg.) Fh. sehr selten.
- LVIII. Fam. **Lariidae**. Schilsky. Samenkäfer.
409. Gatt. *Spermophagus*. Steven. Distelsamenk. *sericeus* Geoffr. (*cardui* Boh.) Fh. sehr selten.
410. Gattung. *Laria*. Scop. (*Bruchus* L.) Schotenk. *rufimana* Bohem. Fh. 1 Ex. *atomaria* L. Fh. nicht selt. *loti* Payk. Fh. 1 Stück 1916 gefangen.
411. Gattung. *Bruchidius*. Schilsky. *unicolor* Oliv. (*olivaceus* Germ.) Fh. selten.

### G. Rhynchophora.

- LIX. Fam. **Anthribidae**. F.) Auf den Höhen von Illereichen selten.  
 Kurzrüßler.
412. Gatt. *Urodon*. Schönherr. Resedenrüßler. *suturalis* F. Fh. nicht selt. auf *Reseda lutea*.  
*rufipes* Oliv. Fh. daselbst häufig.
413. Gatt. *Platyrrhinus*. Clairville. Breitrüsselk. *resinosus* Scop. (*latirostris*
414. Gatt. *Platystomus*. Schneider. Rindenrüsselk. *albinus* L. Rd. u. Fh. nicht selten.
415. Gattung. *Anthribus*. Geoffroy. (*Brachytarsus* Schönherr.) Kurztarser. *fasciatus* Forst. (*scabrosus* F.) Fh. selten.

- variegatus Geoffr. (varius F.)  
Rd. hfg.
- LX. Fam. **Curculionides.**  
Rüsselkäfer.
416. Gatt. *Otiorrhynchus*.  
Germ. Dickmaulrübler.  
geniculatus Germ. Rd. nicht  
selten.  
armadillo Rossi. Rd. nicht  
selten.  
armadillo v. obsitus. Rd.  
sehr selten.  
niger F. Rd. nicht selten.  
clavipes Bon. (tenebricosus)  
Rd. nicht selten.  
morio F. (unicolor) Rd.,  
Fh. hfg.  
porcatus Hbst. Rd. hfg.  
scaber L. (septentrionis  
Hbst.) Rd. nicht selten.  
singularis L. (picipes F.)  
Rd. nicht selten.  
salicis Ström. (lepidoptorus  
F.) Rd. hfg.  
gemmatus Scop. Füßen,  
rote Wand, häufig.  
ovatus L. Rd., Fh. nicht  
selten.  
ligustici L. Rd. u. Fh.  
nicht häufig.
417. Gattung. *Phyllobius*.  
Schönh. Blattnager, Grün-  
rübler.  
calcaratus F. (glaucus Scop.)  
Rd. nicht selten.  
calcaratus a. atrovirens  
Gyllh. Rd., häufiger Fh.
- calcaratus v. densatus  
Schilsky. Rd. nicht selt.,  
Fh.  
psittacinus Germ. Rd., Fh.  
ziemlich hfg.  
psittacinus a. acuminatus  
Boh. Fh. ziemi. hfg.  
maculicornis Germ. Rd.  
hfg., Fh. nicht selten.  
piri L. Rd., Fh. häufig.  
„ a. mali Gyllh. Fh. 1 St.  
argentatus L. Rd. häufig.  
oblongus L. Rd., Fh. hfg.  
„ a. floricola Herbst.  
Rd. selten.  
pomonae Ol. Rd., Fh. hfg.  
virideaeris Laich. (parvulus  
Gyllh.) Rd. nicht häufig.  
viridicollis F. Rd. häufig.
418. Gatt. *Polydrusus* Germ.  
Taurüsselkäfer.  
impar Gozis (mollis Germ.)  
Rd., Fh. häufig.  
atomarius Ol. Rd., Fh.  
häufig.  
mollis Ström. (micans F.)  
Rd. ziemlich selten.  
mollis a. chlorophanus Wsth.  
Fh. selten.  
amoenus Germ. Rd. ziemi.  
häufig.  
sericeus Schall. Rd., Fh.  
ziemi. hfg.  
cervinus L. Rd., Fh. ziemi.  
häufig.  
cervinus a. melanotus Steph.  
Rd., Fh. sehr selten.

- tereticollis* Deg. (*undatus* F.)  
 Rd., Fh. selten.  
*pterygomalis* Boh. Rd.,  
 Illertissen selten.  
 419. Gatt. *Sciaphilus*. Steph.  
 Schattenrüsselk.  
*asperatus* Bousd. (*muricatus*  
 F.) Rd., Fh. häufig. Ich  
 sammelte 1 Stück, das auf  
 der recht. Kopfseite kein  
 Auge besitzt. Die Stelle  
 ist glatt und beschuppt.  
 420. Gattung. *Liophloeus*.  
 Germar. Rindennager.  
*tessulatus* Müller. Rd. nicht  
 selten.  
 421. Gatt. *Strophosomus*.  
 Steph. Sandrüsselk.  
*melanogrammus* Forster.  
 (*coryli* F.) Rd. häufig.  
*obesus* Marsh. (*capitatus*  
 Deg.) bei Ulm 1 Stück.  
*faber* Herbst. Rd. 1 Stück.  
 422. Gattung. *Barynotus*.  
 Germ. Hochrückenrüßler.  
*obscurus* F. Rd. nicht selt.  
*moerens* F. Rd. ziemlich  
 selten.  
 423. Gatt. *Sitona*. Germar.  
 Schmalrüsselkäfer.  
*regensteinensis* Herbst.  
 Winterrieden selten.  
*tibialis* Herbst. Fh. selten.  
*lineatus* L. Rd., Fh. gemein.  
*suturalis* Steph. Fh. selten.  
*suleifrons* Thunbg. Rd., Fh.  
 häufig.  
*flavescens* Marsh. Rd., Fh.  
 häufig.  
*hispidulus* F. Rd., Fh. hfg.  
 424. Gattung. *Tropiphorus*.  
 Schönherr. Kielrüsselk.  
*carinatus* Mull. (*mercurialis*  
 F.) Rd. 1 Stück.  
 425. Gatt. *Chlorophanus*.  
 Germar. Grünrüßler.  
*viridis* L. Fh. hfg.  
*gibbosus*. Rd. hfg.  
 426. Gattung. *Tanymeus*.  
 Schönh. Schlankrüsselk.  
*palliatu*s F. Fh. nicht selt.  
 427. Gatt. *Cleonus*. Schönh.  
 Heiderüsselk.  
*grammicus* Panz. Fh. 2 Stck.  
 428. Gatt. *Lixus*. F. Schwanz-  
 rüsselk.  
*algi*rus L. (*angustatus* F.)  
 Rd. sehr selten.  
 429. Gatt. *Larinus*. Germar.  
 Distelrüsselk.  
*sturnus* Schall. Rd. hfg.,  
 Fh. seltener.  
*jaceae* F. Rd. häufig., Fh.  
 seltener.  
*planus* Herbst (*flavescens*  
 Germ.) Rd., Fh. nicht selt.  
 430. Gattung. *Rhinocyllus*.  
 Germ. Maulrüsselk.  
*conicus* Froelich. (*latirostris*  
 L.) Rd., Fh. hfg.  
 431. Gatt. *Hypera*. Germar.  
 Keulenrüsselk.  
*intermedia* Boh. Rd. nicht  
 selten.

- comata Boh. Rd. nicht  
selten.
432. Gattung. *Phytonomus*.  
Schönh. Eirüsselkäfer.  
punctatus F. Rd., Fh.  
zieml. hfg.  
rumicis L. Fh. zieml. selt.  
asperatus a. histrio Boh.  
Rd. 1 Stück.  
arator L. (polygona L.)  
Fh. 2 Stück.  
pedestris Payk. Rd. nicht  
selten.  
variabilis Herbst. Rd., Fh.  
zieml. hfg.  
nigrirostris F. Rd. nicht  
selten.  
nigrirostris a. Stierlini Cap.  
Rd. 1 Stück.
433. Gattung. *Alophus*. Schönh.  
Herzrüsselk.  
triguttatus F. Rd., Fh.  
nicht häufig.
434. Gattung. *Lepyrus*. Germ.  
Spindelrüsselk.  
palustris Scop. (colon L.)  
Rd., Fh. nicht selten.
435. Gattung. *Hylobius*. Germ.  
Forstrüsselk.  
piceus Deg. Auf d. Schlicke  
bei Füßen 1 Stück.  
abietis L. Rd., Fh. gemein.
436. Gattung. *Liparus*. Olivier.  
(*Molytes* Schönh.) Dick-  
rüsselkäfer.  
glabrirostris Küst. Rd. nicht  
selten.
- germanus L. Rd. hfg., Fh.  
zieml. selten.
- coronatus Goeze. Fh. nicht  
häufig.
437. Gattung. *Liosoma* Steph.  
Glattleibrüsselk.  
deflexum Panz. Fh. 1 Stck.
438. Gattung. *Pissodes*. Germ.  
Pechrüsselk.  
piceae Illg. Fh. 1 Stück.  
notatus F. Rd. nicht selt.  
pini L. Rd. selten.
439. Gattung. *Magdalis*. Germ.  
Walzenrüsselk.  
flavicornis Gyllh. Rd. sehr  
selten.  
quercicola Weise. Fh. sehr  
selten.  
cerasi L. Rd., Fh. nicht  
selten.  
carbonaria L. Rd. sehr  
selten.  
frontalis Gyllh. Rd. sehr  
selten.  
duplicata Germ. Rd. sehr  
selten.  
nitida Gyllh. Rd., Fh. nicht  
selten.  
violacea L. Rd., Fh. hfg.
440. Gattung. *Anoplus*. Schönh.  
Fußrüsselk.  
roboris Suffr. Fh. zieml. hfg.  
setulosus Kirsch. Fh. zieml.  
häufig.
441. Gattung. *Eremotes*. Wol-  
laston. (*Rhyncolus*).  
ater L. (*chloropus* F.) Rd.

442. Gatt. *Rhyncolus* Germ.  
Stutzrüsselk.  
truncorum Germ. Fh. hfg.
443. Gatt. *Cossonus*. Clair-  
ville. Holzwurm.  
linearis F. Fh. 1 Stück.
444. Gatt. *Cryptorrhynchus*.  
Illiger. Fugenrüsselk.  
lapathi L. Rd., Fh. nicht  
selten.
445. Gattung. *Coeliodes*.  
Schönh. Windrüsselk.  
trifasciatus Bach. Fh. sehr  
selten.  
dryados Gml. Rd., Fh.  
nicht selten.
446. Gattung. *Stenocarus*.  
Thomson.  
fuliginosus Marsh. Rd., Fh.  
selten.
447. Gatt. *Cidnorrhinus*.  
Thomson.  
4 maculatus L. Fh. selten.
448. Gatt. *Ceuthorrhynchidius* Duval.  
troglodytes F. Rd., Fh.
449. Gatt. *Ceuthorrhynchus*.  
Germ. Falzrüsselk.  
posthumus Germar. Fh.  
1 Stück.  
geographicus Goeze. Fh.  
nicht selten.  
litura F. Fh. sehr selten.  
rugulosus Herbst. Fh. sehr  
selten.  
campestris Gyllh. Rd. nicht  
selten.
- pollinarius Forst. Fh. zieml.  
häufig.  
denticulatus Schrank. Rd.,  
Fh. ziemlich häufig.  
macula = alba Herbst. Fh.  
sehr selten.  
punctiger Gyllh. Rd., Fh.  
nicht selten.  
marginatus Payk. Rd. 1Stck.  
syrites Germ. Rd. 1 Stück.  
rapae Gyllh. Rd. 1 Stück.  
turbatus Schultze. Rd., Fh.  
nicht selten.  
atomus Boh. Rd., Fh. ziem-  
lich häufig.  
pleurostigma Mrsh. Rd.,  
Fh. zieml. selten.  
erysimi F. Hopfen b. Rd.  
1 Stück.
450. Gatt. *Rhinoncus*. Steph.  
Hackenrüsselkäfer.  
pericarpus L. Rd. nicht  
selten.
451. Gattung. *Poophagus*.  
Schönh. Grasrüsselkäfer.  
sisymbrii F. Fh. selten.
452. Gattung. *Baris*. Germ.  
Glanzrüsselk.  
picicornis Marsh. (abrotani  
Germ.) Fh. nicht selten.  
Auf *Artemisia vulgaris*.  
Talbus L. Rd., Fh. nicht  
selten.
453. Gattung. *Balaninus*.  
Samouelle. Nußrüßler.  
nucum L. Rd. nicht selten,  
Fh. selten.

454. Gatt. *Balanobius*. Jek.  
Bohrrübler.  
crux F. Rd., Fh. nicht selt.  
salicivorus Payk. Rd., Fh.  
zieml. häufig.  
pyrrhoceras Marsh. Fh. selt.
455. Gatt. *Anthonomus*.  
Germ. Blütenrübler.  
varians Payk. Rd., Fh.  
zieml. häufig.  
pomorum L. Rd., Fh. zieml.  
selten.  
humeralis Panz. Fh. sehr selt.  
sorbi Germ. Fh. zieml. hfg.  
druparum L. Rd., Fh. selt.
456. Gatt. *Dorytomus*. Steph.  
Buschrüsselk.  
longimanus Forst. (vorax F.)  
Rd., Fh. nicht selten.  
longimanus a. macropus  
Redtenb. Fh. 1 Stück.  
tremulae Payk. Rd. 1 Stck.  
tortrix L. Rd. nicht selt.  
flavipes Panz. Fh. selten.  
Schönherri Faust. Rd. selt.  
melanophthalmus Payk. Rd.  
nicht selten.  
melanophthalmus v. lateralis  
Faust. Rd. sehr selten.  
affinis Payk. Rd., Fh. sehr  
selten.  
salicis Walton. Rd. selten.  
dorsalis L. Rd. selten.  
„ a. Linnei Faust.  
Rd. sehr selt.  
„ a. nigrifrons Faust.  
Rd. sehr selten.
457. Gatt. *Notaris*. Steph.  
acridulus L. Am Hopfensee  
nicht selten.
458. Gatt. *Grypidius*. Steph.  
Krummrüsselk.  
equiseti F. Rd., Fh. nicht  
selten.
459. Gatt. *Bagous*. Schön-  
herr. Sumpfrüsselk.  
nigritarsus Thomson. Rd.  
nicht selten.
460. Gattung. *Acalyptus*.  
Schönh. Unverhüllter.  
carpini Herbst. Altenstadt  
1 Stück.  
carpini a. alpinus Villa. Fh.  
1 Stück.
461. Gatt. *Tychius*. Germ.  
Pfriemrüsselk.  
5 punctatus L. Fh. selten.  
meliloti Steph. Fh. sehr  
selten.  
tomentosus Herbst. Rd.,  
Fh. nicht selten.
462. Gatt. *Sibinia*. Germ.  
Zwergrübler.  
viscariae L. Fh. selten.
463. Gatt. *Orchestes*. Ill.  
(*Rhynchaenus* Clairville.)  
Hüpfüsselkäfer.  
lonicerae Herbst. Rd. nicht  
selten.  
fagi L. Fh. selten.  
rufitarsus Germ. F. nicht  
selten.  
salicis L. Rd., Fh. nicht  
selten.

- populi F. Fh. nicht selten.  
 464. Gatt. *Rhamphus*. Clairville. Krummschnabel.  
*pulicarius* Herbst. Fh. hfg.  
 465. Gatt. *Mecinus*. Germ. Wiesenrüsselk.  
*collaris* Germ. Rd. selten.  
*pyraaster* Herbst. Fh. nicht selten.  
 466. Gattung. *Gymnetron*. Schönherr. Nackbauchrübler.  
*beccabungae* v. *veronicae* Germ. Rd. nicht selten.  
*tetrum* F. Rd., Fh. zieml. häufig.  
*antirrhini* Payk. Fh. selt.  
 467. Gatt. *Miarus*. Steph. *longirostris* Gyllh. Fh. nicht selten.  
*graminis* Gyllh. Rd., Fh. zieml. häufig.  
*campanulae* L. Rd., Fh. zieml. häufig.  
 468. Gatt. *Cionus*. Clairville. Wollblumenrübler.  
*tuberculosis* Scop. (*verbasci* F.) Rd. zieml. hfg.  
*scrophulariae* L. Rd., Fh. zieml. häufig.  
*hortulans* Geoffr. Rd., Fh. nicht selten.  
*thapsi*. Rd., Fh. nicht selt.  
*alauda* Herbst. Füßen, rote Wand selten.  
 469. Gattung. *Nanophyes*. Schönh. Kleinrüsselk.  
*marmoratus* Goeze (*lythri* F.) Rd., Fh. nicht selt.  
 470. Gatt. *Apion*. Herbst. Birnrüsselkäfer, Spitzmausrübler.  
*pomonae* F. Rd., Fh. nicht selten.  
*cracca* L. Rd., Fh. nicht selten.  
*cerdo* Gerst. Rd. selten.  
*opeticum* Bach. Rd. selt.  
*subulatum* Kirby. Fh. selt.  
*carduorum* Kirby. Fh. sehr selten.  
*onopordi* Kirby. Rd. hfg.  
*fuscirostre* F. Rd. selten.  
*aeneum* F. Fh. auf Malven nicht selten.  
*radiolus* Kirby. Fh. auf Malven nicht selten.  
*laevigatum* Payk. (*sorbi* F.) Fh. zieml. häufig.  
*urticarium* Herbst (*vernale* Payk.) Rd. sehr selten.  
*pallipes* Kirby. Rd., 1 Stck.  
*rufirostre* F. Fh. auf Malven nicht selten.  
*pubescens* Kirby. Rd., Fh. auf Malven nicht selten.  
*atomarium* Kirby. Fh. selt.  
*seniculus* Kirby. Rd., Fh. häufig.  
*frumentarium* Payk. Rd. selt.  
*flavipes* Payk. Rd., Fh. je 1 Stück.  
*apricans* Herbst (*fagi* Kirby) Rd. selten.

- aestivum* Germ. (trifolii Bach). Auf Kleefeldern nicht selten.  
*assimile* Kirby. Rd., Fh. häufig.  
*sedi* Germ. Rd. 1 Stück.  
*brevirostre* Herbst. Rd. sehr selten.  
*marchium* Herbst. Rd., Fh. häufig.  
*violaceum* Kirby. Fh. selt.  
*Spencei* Kirby. Fh. 1 Stck.  
*meliloti* Kirby. Fh. sehr selten.  
*virens* Herbst. Rd., Fh. häufig.  
*ononis* Kirby. Rd. selten.  
*loti* Kirby. Rd., Fh. je 1 Stück.  
*aethiops* Herbst. Fh. selt.  
 471. Gattung. *Rhynchites*. Schneider. Blattroller.  
*betulae* L. Rd., Fh. zieml. häufig.  
*tomentosus* Gyllh. Fh. ziemlich häufig.  
*germanicus* Herbst. Fh. zieml. häufig.  
*cupreus* L. Rd. zieml. hfg.  
*populi* L. Fh. nicht selt.  
 472. Gattung. *Attelabus* L. Rollrüßler.  
*nitens* Scop. (curculionides L.) Fh. selten.  
 473. Gattung. *Apoderus*. Olivier. Haselrüßler.  
*coryli* L. Rd. nicht selten.
- LXI. Fam. **Nemonychidae**.  
 474. Gatt. *Rhinomacer* F. Langnasenrüßler.  
*attelaboides* F. Bei Altstadt 1 ♀.  
 LXII. Fam. **Ipidae**. Eichhoff. Borkenkäfer.  
 (Scolytidae Kirby. Bostrichidae F.)  
 475. Gatt. *Scolytus* Geoffr. Stutzbastkäfer.  
*multistriatus* Marsh. Fh. sehr selten.  
 476. Gatt. *Hylesinus* F. Waldbastkäfer.  
*fraxini* Paus. Fh. gemein.  
 477. Gatt. *Dendroctonus*. Erichson. Baumtöter.  
*micans*. Bei Altstadt 1 St.  
 478. Gattung. *Hylurgops*. Leconte.  
*palliatus* Gyllh. Rd., Fh. hfg.  
 479. Gatt. *Hylastes*. Erichs. Holzmacher.  
*ater* Payk. Rd., Fh. nicht selten.  
*cunicularis* Erichson. Rd. nicht selten.  
*opacus* Erichs. Fh. nicht selten.  
 480. Gatt. *Myelophilus* (Blastophagus). Eichh.  
*piniperda* L. Fh. selten.  
 481. Gatt. *Polygraphus*. Erichson.  
*polygraphus* L. (pubescens F.) Fh. zieml. häufig.

482. Gattung. *Crypturgus*.  
 Erichs. Verborgenwirker,  
 Zwergborkenkäfer.  
*hispidulus* Thomson. Rd.  
 1 Stück.  
*pusillus* Gyllh. Rd. nicht  
 selten.  
*cinereus* Herbst. Rd. nicht  
 selten.
483. Gattung. *Cryphalus*.  
 Erichs. Baumborkenkäf.  
*abietes* Ratzebg. Rd. nicht  
 selten.
484. Gatt. *Xyloterus*. Erichs.  
 Holzzerstörer.  
*lineatus* Oliv. Rd. zieml. selt.
485. Gattung. *Xylocleptes*.  
 Ferrari. Holzdieb.  
*bispinus* Duft. Fh. nicht  
 selten.
486. Gatt. *Pityophthorus*.  
 Eichhoff.  
*micrographus* L. Rd., Fh.  
 nicht häufig.
487. Gattung. *Pityogenes*.  
 Bedel.  
*chalcographus* L. Rd., Fh.  
 nicht häufig.
488. Gattung. *Ips*. Degeer.  
 (*Bostrychus* F., *Tomicus*  
 Latr.)  
*typographus* L. Rd. nicht  
 selten.  
*laricis* F. Rd. nicht  
 selten.  
*suturalis* Gyllh. Rd. selten.
489. Gatt. *Dryocoetes*. Eichh.  
*autographus* Ratzebg. Rd. u.  
 Fh. nicht selten.
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s): Pröbstle Leonhard

Artikel/Article: [Verzeichnis der vom Hauptlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden in den Jahren 1893 mit 1902 und in der Umgegend von Fellheim in den Jahren 1903 mit 1918 gesammelten Käfer 187-230](#)