

Penis kürzer und gedrungener, die dünnhäutige Dorsalfläche zwischen den beiden stärker chitinierten Rändern schmal.

Verbreitung: Suchoj Fontan (Coll. Leonhard), Lissi Osero (Coll. Faust), Kisil-Arwat, Saramsakli/Transkasprien (Coll. Leonhard).

Penis länger, die dünnhäutige Dorsalfläche breiter.

Verbreitung: Osch/Turkestan (Type, Coll. Faust), Ost-Buchara (Karateghin?)/Turkestan. (Museum Bremen).

Die turkestanische Subspezies ist besonders durch den Penis sehr stark von den anatolischen und kaukasischen Formen geschieden. Die Transkaspischen Exemplare leiten durch ihre gestrecktere Körperform bereits zum echten *turkestanicus* Fst. über, der gedrungene Penis beweist aber eindeutig ihre Zugehörigkeit zu *circumcinctus* Boh.

Beiträge zur schlesischen Käferfauna.

Von G. Polentz, Breslau.

Die hier folgende Zusammenstellung seltenerer Käferarten stellt ein zweijähriges Sammelergebnis dar und enthält meist neue Fundorte sowie eine Reihe für Schlesien neuer Aberrationen. Die von mir entdeckten Abänderungen sind gemäß dem Vorschlage von Herrn Heikertinger, Wien, nicht benannt, sondern nur mit einem Kennwort versehen worden. Die Bestimmung der Arten habe ich selbst besorgt; in Zweifelsfällen ist die Sammlung des verstorbenen Rektors Kolbe zu Rate gezogen worden. Geordnet sind die Arten der Einfachheit halber nach der III. Auflage des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens von Gerhardt.

Cicindela campestris L. a. *impunctata* Westh., a. *affinis* Fisch., v. *connata* Heer, a. *manca* D. Torre. Von Herrn Dr. Nötzel, Breslau, auf dem Haubenberge bei Flinsberg gefangen. VI. 29.

Calosoma inquisitor L. a. *viridescens* Rtrr. Von Herrn Sauer, Breslau, in Breslau-Oswitz gefunden. V. 30.

Bembidion atrocoeruleum Steph. Leiterberg im Altvatergeb. VII. 29.

B. nitidulum Mrsh. s. *alpinum* Deg. Wölfelsgrund. VI. 27.

Badister bipustulatus F. a. *binotatus* Fisch. Im Auspülicht der Oder. Ohlau. XI. 30.

B. bipustulatus F. f. *lunulatus*. Wie voriger. Flügeldecken bis auf eine schwarze Makel in den Spitzen vollständig gelb. Beide Makeln zusammen bilden am Ende der Decken eine kleine, mondförmige Bogenbinde.

Amara spreata Dej. In der III. Auflage des Verzeichnisses der Käfer

- Schlesiens von Gerhardt werden als Fundorte nur Pantener Höhen, Vorderheide, Goldberg und Glatz aufgeführt. Der Käfer kommt aber ziemlich häufig überall in der Ebene und im niederen Gebirge vor.
- Hygrotus decoratus* Gyll. Aus einem Tümpel bei Neumarkt. V. 30.
- Platambus maculatus* L. a. *inaequalis* Pz. Großer Teich im Riesengebirge. VI. 30.
- Anthobium alpinum* Heer. Dieses sonst im Gebirge lebende Tier wurde im Anspülicht der Oder bei Ohlau gefunden. XI. 30.
- Phyllodrepa melanocephala* F. Aus Moos gesiebt. Maltsh a. O. IV. 29.
- Oxytelus rugosus* F. a. *pulcher* Gr. Breslau. XI. 29.
- Oxytelus Fairmairei* Pand. Breslau. V. 30.
- Bledius nanus* Er. In einer Sandgrube. Kapsdorf bei Breslau. IV. 29.
- B. longulus* Er. Im Odersande. Linden Kr. Brieg. V. 29.
- B. talpa* Gyll. Aus Laub gesiebt. Winkelsdorf im Altvatergeb. VII. 29.
- Stenus pubescens* Steph. An einem Teich gestreift. Breslau. IV. 30.
- St. Kolbei* Gerh. Auf Holzklaftern und aus Laub gesiebt. Breslau-Ransern und Kottwitz Kr. Ohlau. IV. 30.
- Medon castaneus* Gr. Aus einem Maulwurfsnest gesiebt. Breslau. XII. 28.
- Lathrobium pallidum* Nordm. Im Anspülicht der Oder. Ohlau. XI. 30.
- Quedius longicornis* Kr. f. *nigromarginalis*. Die Seitenränder sowie der Hinterrand der Flügeldecken schwarz, so daß nur die Mitte der Decken rot geblieben ist. Das Schildchen pechbraun. Aus einem Maulwurfsnest. Breslau-Dt. Lissa. XI. 29.
- Qu. cruentus* Ol. a. *virens* Rttbg. Bei Breslau an Eichensaft fast so häufig wie die Art.
- Qu. scitus* Gr. An Eichen. Breslau. VI. 30.
- Qu. laevigatus* Gyll. a. *resplendens* Thoms. Altvatergeb., Glatzgeb. VII. Wie die Art häufig unter Fichtenrinde.
- Vellejus dilatatus* F. An Eichensaft. Breslau VI. 29 und 30.
- Tachinus marginatus* Gyll. Aus Laub gesiebt. Neumarkt. IV. 29.
- Euryusa optabilis* Heer und *sinuata* Er. In Eichen bei *Lasius brunneus*. Breslau. VI. 27 und 28.
- Gnypeta ripicola* Ksw. An der Oder, auch von Herrn Rektor Hedwig, mehrfach gefunden. Breslau. VI. 30.
- Atheta pagana* Er. Aus Laub gesiebt. Winkelsdorf im Altvatergeb. VII. 29.
- Atemeles pubicollis* Bris. Bei *Formica rufa*. Breslau. VI. 28.
- Ilyobates nigricollis* Payk. Aus Laub gesiebt. Maltsh a. O. V. 29.
- Calodera uliginosa* Er. Aus sehr feuchtem Laub gesiebt. Ohlau. V. 30.
- C. riparia* Er. Im Anspülicht der Oder. Ohlau. XI. 30.
- Ocalea badia* Er. Aus Laub gesiebt. Breslau. X. 28.

- Ocyusida rufescens* Kr. Im Anspülicht der Oder. Ohlau. XI. 30.
- Oxygoda soror* Thoms. Aus Graswurzeln gesiebt. Altvatergeb. VII. 29.
- Microglossa marginalis* Gr. An alten Eichen; lebt bei *Lasius fuliginosus*.
Breslau. V. 30.
- Aleochara erythroptera* Gr. Aus Laub gesiebt. Breslau-Ransern. VI. 39.
- Euplectus punctatus* Muls. Neumarkt. XII.
- Bibloporus bicolor* Denny. Aus Moos an Ahornen gesiebt. Winkelsdorf
im Altvatergeb. VII. 29.
- Brachygluta fossulata* Rchb. a. *aterrimus* Rtrr. und a. *rufescens* Rtrr.
Aus sehr feuchtem Laub gesiebt. Breslau. VI. 30.
- Bythinus crassicornis* Mot. Wie voriger. Ohlau. V. 29.
- Scydmaenus Perrisi* Rtrr. Unter Eichenrinde bei *Lasius brunneus*. Breslau
und Neumarkt. V. 29. XII. 28.
- Catops fuliginosus* Er. An Aas. Mahlen Kr. Trebnitz. VI. 30.
- Hister marginatus* Er. In einem Maulwurfsnest. Ohlau. XI. 29.
- Gnathoncus rotundatus*. Kug. An Aas. Mahlen Kr. Trebnitz. VI. 30.
- Abraeus parvulus* Aub. An einer Eiche. Breslau. V. 29.
- Helophorus tuberculatus* Gyll. Im Anspülicht der Oder. Glogau. II. 25.
- H. fallax* Kuw. Auf einer moorigen Wiese in Maulwurfsnestern. Breslau.
XI. 30.
- Cryptarcha strigata* F. f. *unifasciata*. Nur die vordere, bindenartige
Zeichnung ist vorhanden. Flügeldecken schwarz. An Eichensaft. Breslau.
V. 30.
- Rhizophagus perforatus* Er. An alten Eichen. Breslau. V. 29.
- Pediacus depressus* Hbst. Wie voriger. VI. 30.
- Cryptophagus dorsalis* Sahlg. Unter der Rinde alter Kiefern. Kottwitz
Kr. Ohlau. I. 31.
- C. Schmidtii* Strm. In Maulwurfsnestern. Breslau. XI. 29.
- Atomaria alpina* Heer. Aus Laub gesiebt. Winkelsdorf im Altvatergeb.
VII. 29.
- Dacne bipustulata* Thunbg. a. *Jekeli* Rtrr. An an Bäumen wachsenden
Pilzen. Breslau. V. 30.
- Anonimum trisulcum* Geoffr. Einmal zahlreich an abgestorbenen Rüstern.
Breslau-Ransern. VI. 30.
- Cerylon fagi* Bris. Unter Buchenrinde. Strehlen. V. 29.
- Aphidecta oblitterata* L. a. *livida* Deg. und a. *sublineata* Ws. Ohlau.
Sudeten. Wohl überall in Schlesien vorkommend.
- Sospita vigintipunctata* L. a. *Linnei* Ws. Im Anspülicht der Oder. Ohlau.
XI. 30.
- Procrærus tibialis* Lac. An alten Kirschbäumen. Breslau. VI. 30.

- Elater nigroflavus* Gz. a. *podolicus* Rtrr. Wie voriger. V. 30.
- Athous vittatus* F. a. *filicti* Buys. Nimkau Kr. Neumarkt. V. 30.
- Denticollis linearis* a. *suturalis* Duf. und a. *variabilis* Deg. Wie voriger.
- Aprilus laticornis* a. *coerulescens* Schilsky. Wie *Ath. a. filicti* Buys.
- Sphaericus gibboides*** Boield. Von Herrn Oberpräparator Pohl, Breslau, in Kamillentee gefunden und weitergezüchtet. Breslau. Während des ganzen Winters 30/31 waren Käfer vorhanden. Neu für Schlesien.
- Ptinus sexpunctatus* Pz. An alten Eichen. Breslau. V. 30.
- Ptinus tectus*. Von Herrn Rektor Hedwig, Breslau, in Gegräube gefunden. Breslau. I. 31.
- Dryophilus longicollis* Aub. Riesengeb. und Altvatergeb. VII. In der III. Auflage der Käfer Schlesiens von Gerhardt nicht aufgeführt.
- Stegobium paniceum* L. a. *ireos* Rey. An einer Hauswand. VI. 30. Wahrscheinlich neu für Deutschland.
- Aderus pygmaeus* Deg. a. *oculatus* Pz. Breslau. VI. 30.
- Scraptia fuscata* Müll. An alten Eichen. Breslau. VI. 30.
- Anisoxia fuscata* Ill. Wie vorige.
- Scaphidema metallicum* F. a. *bicolor* F. Neumarkt. V. 30.
- Caenocorse depressa* F. Unter Eichenrinde. Ieltsch Kr. Ohlau. IV. 29.
- Rhamnusium bicolor* Schrk. a. *glaucopterum* Schll. Brieg. Breslau. VI. 95. Aus Kollektion Pietsch.
- Necydalis major* L. An alten Kirschbäumen. Breslau. VI. 28. 29. 30. In den letzten Jahren wohl überall in Schlesien selten geworden.
- Axinopalpis gracilis* Kryn. Von Herrn Sauer in Breslau-Oswitz auf einem Wege gefangen.
- Phymatodes testaceus* L. a. *rufipes* Costa. An Eichen. Breslau. VII. 29.
- Plagionotus arcuatus* L. a. *Reichei* Thoms. Überall, wo die Art auftritt.
- Xylotrechus antilope* Zett. a. *obliquefasciatus* Pic. Neumarkt. VII. 30.
- Acanthocinus reticulatus* Raz. Ein Stück von Herrn Sauer, Breslau. Kohlfurter Heide. VI. 24.
- Gynandrophthalma aurita* L. Auf *Salix fragilis*. Nimkau Kr. Neumarkt. V. 29.
- Melasoma cuprea* F. Wie vorige.
- M. vigintipunctata* Scop. f. *vigintiduopunctata*. Neben dem Nahtsaum der Flügeldecken jederseits vor deren Spitze noch ein elfter Punkt. Nimkau Kr. Neumarkt. V. 30.
- M. vigintipunctata* Scop. f. *duodevigintipunctata*. Bei einem in meiner Sammlung befindlichen Stück aus den bayrischen Alpen fehlt jederseits der hinter dem Schulterfleck stehende Punkt.

- Cassida ferruginea* Gz. Von Herrn Rektor Hedwig bei Nimkau Kr. Neumarkt auf einer Wiese gestreift. VI. 30.
- Notaris acridulus* L. a. *punctum* F. In Schlesien häufig wie die Art.
- Baris laticollis* Mrsh. In einer Sandgrube. Paschkerwitz Kr. Trebnitz IV. 30.
- Sphenophorus piceus* Poll. Je ein Stück von Herrn Sauer bei Ndr. Lomnitz Kr. Hirschberg und Herrn Rektor Hedwig bei Nimkau Kr. Neumarkt erbeutet.
- Bradybatus Kellneri* Bach. Von Ahornbäumen geklopft. Neumarkt. VI. 29.
- Nanophyes circumscriptus* Aub. a. *Lebedewi* Rtrr. Breslau. VI. 30.
- Magdalis phlegmatica* Hbst. Von Kiefern geklopft. Ohlau. Nimkau Kr. Neumarkt. V. 30.
- Rhynchites aequatus* L. a. *Paykulli* Schilsky. In Schlesien häufig wie die Art.
- Dryocoetes alni* Georg. Breslau. VI. 30.
- Aphodius granarius* L. a. *concolor* Muls. Breslau. Ohlau. Oberrnigk.
- A. limbolarius* Rtrr. Altvatergeb. (Hohe Heide) VI. 29.
- Melolontha melolontha* L. Von dieser Art fing Herr Tietze, Breslau, einen Zwitter. Breslau. V. 29.

Frühlingssammeltage auf Corsica.

Von Hans Wagner, Berl.-Mariendorf.

(Fortsetzung).

Ich schlug mich nun zurück durch das Dornengewirr zur Chaussee, die dem Tal des Taravo folgt. Erst wurde der Uferzone dieses ganz ansehnlichen Gebirgsflusses das nötige Augenmerk verliehen, das aber leider sehr geringe Erfolge zeigte. Nun ging es talaufwärts der Chaussee entlang, nach günstigeren Sammelmöglichkeiten ausspähend. Bald hinter dem Örtchen Bains de Guitera liegt ein großes Sägewerk und in dessen unmittelbarer Nähe lagen in dem feuchten Wiesengrund der hier das Tal verbreitert, zur Straßenpflasterung bestimmte, große Granitplatten. Als ich die erste dieser schweren Platten umdrehte, kamen gleich einige *Carabus Genei* und einige *Percus grandicollis* zum Vorschein, ein verheißungsvoller Anfang. Mein Reisegefährte war indessen auch herangekommen und nun ging es gemeinsam an die Arbeit, die ein erfreuliches Resultat lieferte; ca. 25 *Car. Genei* und eine ganz erhebliche Anzahl *Percus grandicollis*, darunter einige Riesenkerle, nebst allerlei Harpalen, Amaren und anderen Klein-Carabiden mußten ihr Leben lassen. Nachdem auch die letzte Platte umgedreht war, hielten wir nach anderen Sammelplätzen Umschau, es war aber nichts rechtes mehr zu finden. Das Abklopfen der

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Coleopterologisches Centralblatt - Organ für systematische Coleopterologie der paläarktischen Zone](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Polentz Georg

Artikel/Article: [Beiträge zur schlesischen Käferfauna. 44-48](#)