

Erstfund des Schwarzen Kugelkäfers in Niederbayern (Coleoptera, Coccinellidae)

Helmut Fürsch, Ruderting

F. APFELBACHER fand am 15.10.1990 ein Weibchen von *Scymnus* (*Neopullus*) *ater* KUGELMANN. Er siebte diesen seltenen Marienkäfer in einem etwa 1500 m² großen Flurgehölz bei Offenberg, das mit Pappeln, Erlen und Weiden bestanden war.

Damit ist diese seltene Art auch für den Bayerischen Wald nachgewiesen. Sie ist überall selten und von Nordeuropa sporadisch bis ins Mittelmeergebiet verbreitet. Dort wird sie von Eichen geklopft, bei uns lebt sie in erster Linie auf Weiden, auch auf Haselnuß, Eichen, Erlen, Eschen, Pappeln und Linden. Hier stellt sie der Weidenschildlaus *Chionaspis salicis* nach. Um mehr Daten über die Biologie dieses nur 1-1,5 mm langen schwarzen Käfers zu erfahren, sei die Weidenschildlaus in Abb. 3 skizziert. Im übrigen Bayern häufen sich die Funde aufgrund von Sammleraktivitäten in der Umgebung Münchens. Ein guter Lebensraum sind die Weichholzlauen südlich von München. Ältere Funde stammen aus Pfaffenhofen und dem Botanischen Garten Erlangen (von Eichen geklopft) (FÜRSCHE, 1958). Aus Oberösterreich fehlen sichere Nachweise (KREISSL, 1959).

In der Roten Liste der gefährdeten Tiere in der Bundesrepublik Deutschland gilt *Scymnus ater* als stark gefährdet, die Neufassung der Roten Liste der gefährdeten Tiere Bayerns ist derzeit in Arbeit und wird diesen seltenen Käfer in die Reihe der vom Aussterben bedrohten Tiere einordnen. Die Bestandssituation dieser Art ist nach unseren derzeitigen Informationen auf wenige isolierte Lebensräume beschränkt, die aufgrund absehbarer Eingriffe ernsthaft bedroht sind. Nur Bestrebungen zum Erhalt der Lebensräume könnten zur Rettung dieser Art beitragen.

Literatur

FÜRSCHE, H. (1958): Die mitteleuropäischen Scymnini und deren Verbreitung mit besonderer Berücksichtigung Bayerns. - Nachrbl. Bayer. Entomol. 7(8): 75-91.
 FÜRSCHE, H. (1988): Die Marienkäfer Niederbayerns. - Der Bayerische Wald 18(1): 3-14.
 GOURREAU, J.M. (1974): Systematique de la Tribu des Scymnini. - Ann. Zool. Ecol. Animale.
 HORION, A. (1961): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. - Bd.8: 283-365.
 KREISSL, E. (1959): Die Marienkäfer Oberösterreichs. - Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz: 129-140.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Helmut Fürsch
 Bayerwaldstr. 26
 8391 Ruderting




Abb. 2:

Scymnus (*Neopullus*) *ater* KUGELMANN:
 a-d: männliche Genitalorgane;
 a: Siphonalbasis, b: Siphospitze, c: Phallobasis
 e: Habitus (nach GOURREAU)




Abb. 1:

Verbreitungskarte *Scymnus ater*

■ Apfelbacher




Abb. 3:

Weidenschildlaus *Chionaspis salicis*
 a: männliches Tier
 b: weibliches Tier

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Der Bayerische Wald](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [28_2_alt](#)

Autor(en)/Author(s): Fürsch Helmut

Artikel/Article: [Erstfund des Schwarzen Kugelkäfers in Niederbayern \(Coleoptera, Coccinellidae\) 12](#)