

Ueber einige *Haltica*-Arten etc. von Weimar.

Aphthona pallida Bach. an *Geranium pratense* L. am Viaduct und bei Denstedt häufig, darunter zahlreiche Stücke, welche einen deutlichen, scharf begrenzten, in der Mitte verbreiterten und hinten abgekürzten, schwarzen Nahtsaum auf den Fld. haben: *Aphth. pallida* var. *geranii*. Diese Abänderung ist genau wie *Aphth. nigriceps* Redtb. gefärbt, so daß als leicht bemerkbare äußere Unterschiede von dieser nur noch die schmalen Schultern mit kleiner Beule und die kräftigere Punktirung der Fld., welche hinten am Nahtwinkel stärker abgerundet sind, übrig bleiben.

Aphth. herbigrada Curt. Ausschließlich an *Cistus helianthemum* L. bei Jena sehr häufig. Redtenbacher giebt das Thier auf *Campanula rotundifolia* lebend an, es scheint mir jedoch zweifelhaft, daß es sich dort nähren könnte; denn die Wurzelblätter vertrocknen und die Stengelblätter gewähren für eine Menge von Thieren zu wenig Nahrung.

Unter der bekannten, schlank gebauten Form lebte eine auffällige, kurz-eiförmige Varietät, die ich *gibbula* nenne. Bei derselben erweitern sich die Fld. von der Basis aus gleichmäßig nach hinten, erreichen die größte Breite weit hinter der Mitte und runden sich hierauf schnell (jede einzeln) in einem weiten Bogen ab. Die Fld. hinten beinahe doppelt so breit wie bei der normalen Form, so daß man beim ersten Anblick des Thieres glaubt, eine verschiedene Art vor sich zu haben.

Longitarsus obliteratus Rosh. Die größere Form an *Salvia pratensis* hinter dem Parke von Denstedt, die kleinere Form an *Euphorbia cyparissias* auf dem Ettersberge.

Long. ballotae Marsh. an *Ballota nigra* L. in Ettersburg, Denstedt, Sulza und Saaleck.

Long. pellucidus Foudr. und *rubiginosus* Foudr. häufig nahe der Schäferei auf dem Ettersberge, ersterer an *Medicago lupulina* L., letzterer an *Convolvulus sepium* L.

Dibolia Schillingi Letzn. an blühender *Salvia pratensis* L. bei Denstedt, *Dib. cryptocephala* Koch und *timida* Ill. an *Eryngium campestre* über der Teufelskrippe auf dem Ettersberge, *Dib. depressiuscula* an *Ballota nigra* L.

Rhizobius litura und *subdepressus* Seidl. untereinander auf Fichten (*Pinus abies* L.) am Waldschlöfchen, ersterer sparsam, letzterer sehr häufig.

J. Weise.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [1891](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [Ueber einige Haltica- Arten etc. von Weimar. 379](#)