

Nachträge zu Schilskys „Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg. (Col.)

Von Georg Reineck, Berlin.

Mit 2 Textfiguren.

I. *Coccinellidae*.

*Hippodamia 13-punctata* a. *padana* Muls. Finkenkrug (Fkg.) bei Berlin und Erkner (Berlin).

a. *4-punctata* de Rossi. Mecklenburg, Fürstenberg (Konow).

a. *c-nigrum* Ws. Ist auch in der Mark heimisch: Dameswalde bei Oranienburg, Fkg., Brieselang (Brslg.) und Jungfernheide (Jgfhd.) bei Berlin. Ferner auch in Mecklbg. Fürstenbg. (Konow).

*Adalia 2-punctata* a. *sesquipunctata* Haw. fing ich einige Male in der Umgebung Berlins, und zwar in der Jgfhd., in Fkg. und bei Karow (Bernau).

Die seltene a. *Simoni* Ws. besitze ich aus Sagan (e. coll. Degenhardt).



1

*Coccinella 7-punctata* L. Den in Schilskys Verzeichnis aufgeführten Aberrationen sind als märkische Formen hinzuzufügen die a. *turcica* Ws. (Makel 2 + 1/2 verbunden), von mir bei Blankenburg (Berlin) gefunden, IX. 05, und die a. *confusa* Wiedem. Bei dieser Form sind alle 7 Punkte in der Form, wie die Abbildung zeigt, verbunden. Dieses interessante Exemplar fing Herr G. Böttcher bei Tiefensee (Berlin), V. 09.

Von der überaus variablen *C. 10-punctata* L. kommt eine Reihe von Formen in der Mark Brandenburg vor, welche im Verzeichnis als solche bisher nicht kenntlich gemacht waren.

a. *lateralis* Ws. Bredower Forst, IV. 09.

a. *thoracica* Schneid. Buch (K Schubert).

a. *relicta* Heyd. Gehört in der Mark zu den häufigeren Formen. Jgfhd., Bredower Forst, Spandauer Forst, von Mitte März bis in den April hinein vom dünnen Laub jüngerer Buchen und Eichen in Anzahl zu klopfen, später auch vom frischen Laub der Buchen, Eichen und anderen Laubhölzer. Die Käfer überwintern, kommen an warmen Tagen hervor und sind dann an Baumstämmen, Zäunen usw. fast den ganzen Winter hindurch vereinzelt zu finden. Dasselbe gilt von allen märkischen Formen.

a. *centromaculata* Ws. Jgfhd., Spandau und Gatow an der Havel.

a. *semifasciata* Ws. Nieder-Schönhausen (Berlin), 13. X. 12.

- a. *triangularis* Ws. Jgfhd.  
 a. *ephippiata* Ws. Jgfhd. und Spandauer Forst, Lübars (Berlin),  
 XII. 05, Nieder-Schönhausen (Berlin).  
 a. *consolida* Ws. Jgfhd. und Spandauer Forst.  
 a. *limbella* Ws. Jgfhd. und Spandauer Forst, Nieder-Schönhausen (Berlin).  
*C. 14-pustulata* a. *abundans* Ws. Fkg.  
*C. 4-punctata* a. *rustica* Ws. Jgfhd., Pankow-Berlin (J. Arendt).  
 Auch die dunklen Formen a. *Haupti* Ws. und a. *Häneli* Ws. dürften noch in der Mark aufgefunden werden, wie einige Übergangsstücke zu diesen Formen aus der Jgfhd. andeuten.  
*Anatis ocellata* a. *bicolor* Ws. Jgfhd.  
 a. *Böberi* Cederj. Jäglitz bei Nauen, 26. V. 07. Auch in Mecklbg. Fürstenberg (Konow).  
 a. *subfasciata* Ws. Fkg.  
 a. *2-vittata* Ws. 1 Exemplar aus Treseburg, 26. VI. 11 (G. Böttcher).  
*Sospita 20-guttata* a. *Kochi* Heyd. Buch (Berlin), auch in Mecklbg. Fürstenberg (Konow).

*Exochomus 4-pustulatus* a. *marchicus* m. Über diese neue auf der Oberseite ganz dunkle Form berichtete ich schon in der D. E. Z. 1912, 744. Bei sehr starker Vergrößerung bemerkt man noch 2 sehr kleine düsterrote Fleckchen hinter der Schulterbeule (mit bloßem Auge nicht sichtbar), als letzte Andeutung der großen mondformigen Schultermakel der Stammform. Von meinem Vater am 29. IX. 12 im Brslg. gefunden.

*Novius cruentatus* Muls. Als deutsche und märkische Form ist die a. *10-punctatus* Kraatz hinzuzufügen. Diese Form besitzt rote Flügeldecken mit 10 schwarzen Flecken (1, 2, 2). Müggelsee bei Berlin, Potsdam (Pape). Übergangsformen hierzu, bei welchen die roten Makel der Flügeldecken bereits in verschiedener Form zusammengefloßen sind, z. B. 1 + 2, 4 + 4 oder 4 + 5 sind um Berlin nicht selten. Jgfhd. und Fkg., Pankow-Schönholz (Berlin).

## II. *Cerambycidae*.

*Oxymirus cursor* a. *Verneuli* Mls. Diese einfarbig rostfarbene Abart kommt auch in Schlesien, im Riesengebirge vor (B. Gaude).

*Stenochorus (Toxotus) meridianus* a. *chrysogaster* Schrank und a. *cantharinus* Herbst kommen beide in der Mark Brandenburg vor, und zwar im Brslg., Mitte Juni bis Juli.

*St. quercus* a. *dispar* Panz. Thüringen, Buchfart bei Weimar. Anfang Juli auf Blüten.

*Evodnius clathratus* a. *nigritus* Pic. Diese Form mit ganz schwarzen Flügeldecken fing ich auf dem Kamme des Altvaters, am Glatzer Schneeberge und in Wölfelsgrund in Gesellschaft der a. *brunnipes* Muls. auf Blüten Anfang Juli.

*Cortodera humeralis* v. *inhumeralis* Pic. Liegt in 2 märkischen Exemplaren vor aus der Jgfhd. und der Bredower Forst, 2. VI. 12.



*Leptura 6-maculata* a. *tyrolensis* n. nov. a. Flügeldecken schwarz, ein querer Fleck an der Basis, eine schmale zackige, an der Naht unterbrochene Binde vor der Mitte, und ein querer strichartiger länglicher Fleck jederseits vor der Spitze, gelb. Fig. 2. Rolle-Pafs, Süd-Tirol, 22. VII. 11.

*Phymatodes pusillus* F. Von Herrn E. Heidenreich aus Eichenästen aus dem Klein-Zerbster Busch bei Dessau gezogen.

*Ph. lividus* Rossi. Für Berlin durch die Herren Junack und Lichtwardt (24. IV. 08) nachgewiesen.

*Plagionotus arcuatus* a. *Reichei* Thms. In der Umgebung Berlins in Gemeinschaft mit der Stammform auf Eiche in der Jgfhd., Bredower Forst, Brslg. 25. V. 12, Jäglitz bei Nauen 26. V. 07.

*Saperda perforata* a. *deficiens* n. nov. a. Unterscheidet sich von der Stammform durch das vollständige Fehlen der Makel vor der Spitze der Flügeldecken. Das letzte Viertel der Flügeldecken ist also einfarbig grünlichgrau. Als Fundort dieser abweichenden Form ist Deutschland (ohne nähere Bezeichnung) angegeben.

## Beitrag zur Kenntnis der Sagridengattungen *Rhagiosoma* Chap. und *Atalasis* Lac. (Col.)

Von **Georg Reineck**, Berlin.

(Mit 5 Textfiguren.)

1. *Rhagiosoma* Chap. Ann. Soc. Ent. Belg. 1878. 143.

Von den Herren A. Heyne und H. Rolle erhielt ich einige Exemplare des madagassischen Sagridengenus *Rhagiosoma*, welche ich zuerst für *Rh. madagascariense* Chap. hielt, deren nähere Untersuchung aber ergeben hat, dafs es sich um eine neue Art dieser Gattung handelt, welche ich unter folgendem Namen einführe:

*Rh. grossum* n. sp.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [1913](#)

Autor(en)/Author(s): Reineck Georg

Artikel/Article: [Nachträge zu Schilskys "Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands" mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg. \(Col.\) 298-300](#)