

Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.)

Von **Paul Delahon**, Luckenwalde.

* = kommt in der Mark Brandenburg vor.

Lck. = Luckenwalde.

I. Im Verzeichnis Schilskys ohne Stern oder überhaupt nicht angeführte Arten und benannte Abänderungen.

- ?**Acupalpus elegans* Dej. a. *inornatus* Reitt. 1 St. bei Lck. April 1901 auf Ackerland gef. Dasselbe ist bis auf den wenig dunkleren Kopf und die Fühler und Taster einfarbig rötlich-gelb. An den Fühlern ist nur das erste Glied gelb, das zweite zum Teil so dunkel wie die folgenden Glieder. Nach Schaufufs (Calver) scheint dies bei der Reiterschen Form nicht der Fall zu sein. In meiner Samml.
- **Dromius quadrinotatus* Panz. a. n. *rufipennis* m. Flgd. einfarbig rötlich. 1 St. am 8. März 1913 bei Lck. (Elstal) mit der Nominatform unter Kiefernrinde gef. Der Fangzeit nach schwerlich unausgefärbt. In meiner Samml.
- **Hyphydrus ovatus* L. v. *variegatus* Steph. Bei Lck. nicht selten mit der Nominatform gef.
- **Graphoderes zonatus* Hoppe a. *interjectus* Westh. Bei Lck. in manchen Jahren (März-April) nicht selten in Sumpflöchern und Wiesentümpeln mit der Nominatf. gef.
- **Graphoderes zonatus* Hoppe a. n. *biconnatus* m. Beide Randbinden des Halsschildes liegen dicht an der Basis und der Spitze, ohne gelben Zwischenstreifen. Westhoff vermutete schon, daß sich solche Exemplare finden würden; vgl. Käfer Westfalens (1881), Nachtrag. Bei Lck. wie die vorige Form, nur seltner.
- **Gyrinus Suffriani* Scriba. März und April 1914 zusammen 3 St. in einem Tümpel auf Lehm Boden (Ziegelei Birner) in der Abenddämmerung gef. In meiner Samml.
- **Philonthus dimidiatus* Sahlb. a. *apicalis* Leinb. und a. *unicolor* Leinb. Erstere häufiger, letztere selten bei Lck. unter Unkrauthaufen im April und September mit der Nominatform auf Äckern gef. Beide a. sind in Schilskys Verzeichnis und in Kuhnts

Tabellen nicht, wohl aber im Calver-Schaufuß angeführt.
In meiner Samml.

- **Quedius fuliginosus* Grav. v. n. *impunctifrons* m. Die beiden mittleren Stirnpunkte fehlen. Juni 1909 1 St. bei Lck. gef., in meiner Samml. In dieser auch 1 bei Lck. gef. St., bei welchem nur einer der inneren Stirnpunkte fehlt.
- **Liodes dubia* Kugel. a. *rufipennis* Payk. September 1913 und Juli 1914 je 1 St. bei Lck. gef., in meiner Samml.
- **Liodes calcarata* Er. a. *ruficornis* Fleisch. und v. *picta* Reiche. September 1913 je 1 St. bei Lck. gef., in meiner Samml.
- **Liodes nigrita* Schmidt. Juni 1907 1 St. bei Rheinsberg i. M. gef., in meiner Samml.
- **Anacaena limbata* F. a. *ochracea* Steph. Bei Lck. selten in Wiesengräben gef., in meiner Samml.
- ?**Anacaena limbata* F. a. *ovata* Reiche. Bei Lck. nicht selten in Wiesengräben. Meine St. habe ich nach Seidlitz Fauna balt. ed. II bestimmt. Kuwert bringt in den Bestimmungstabellen der Hydrophiliden *nitida* Heer. zu *ovata* Reiche, was nach seiner Beschreibung auch zutrifft, Seidlitz hat aber die Kuwertschen Tabellen gekannt. Nach D. E. Z. 1888 p. 366 hat Schilsky *An. ovata* Reiche zahlreich bei Berlin gef. In Kuhnts Tabellen ist *ovata* nicht angeführt.
- **Cercyon haemorrhoidalis* F. a. *erythropterus* Muls. fing ich bei Lck. öfter mit der Nominatform.
- **Melanophthalma transversalis* Gyll. a. *hortensis* Mannh., von Schilsky als synonym zur Nominatform, in Kuhnts Tabellen besonders angeführt. Bei Lck. vereinzelt gef., in meiner Samml.
- **Cyphon variabilis* Thunb. a. *rufipectus* Rey, von Schilsky nicht, wohl aber in Kuhnts Tabellen angeführt. Bei Lck. öfter gef., auch mit der Nominatform.
- **Attagenus piceus* Ol. a. *megatoma* F. April 1914 und Juli 1914 zusammen 3 St. in meiner Wohnung in Lck. gef., in meiner Samml.
- **Porcinolus murinus* F. a. *transversalis* Fleisch. Bei Lck. 1 St. zusammen mit der Nominatform in einem Forstgraben gef., beim Präparieren leider zertreten.
- Athous subfuscus* Müll. a. *polonicus* Reitt., in Schilskys Tabellen nicht, dagegen in den Kuhntschen erwähnt. Juli 1914 1 St. bei Ruhla in Thüringen gef., nach Kuhnt für Deutschland fraglich. In meiner Samml.
- **Ernobius pini* Sturm v. *crassiusculus* Muls. Bei Lck. öfter im Kiefernwald gekäschert. Die Nominatform ist bei Lck. häufig.

- **Xyletinus pectinatus* F. a. *scutellaris* Schils. Juni 1913 1 St. bei Lck. auf Weidengebüsch gef. Wohl nur zufällig auf solchen; die Nominatform habe ich bei Lck. von Disteln oder bei solchen gekäschert. In meiner Samml.
- **Leptura maculata* Poda a. *binotata*. Bei Lck. selten mit der Nominatform gef., in meiner Samml.
- **Ceutorrhynchus punctiger* Gyll. a. *rufitarsis* Gyll. Bei Lck. öfter gef., Nominatform ist dort häufig.
- **Aphodius sticticus* Panz. a. *prolongatus* Muls. April 1896 1 St. bei Lck. gef., Nominatform dort in Pferdemit nicht selten. In meiner Samml.

II. Sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland.

- **Anatis ocellata* L. a. *15 punctata* Deg. Im Mai 1914 fing ich bei Lck. 1 St., bei dem die Seitenränder des Halsschildes nur in der vorderen Hälfte weißgelb gefleckt sind. In den Hinterwinkeln steht noch ein sehr kleiner Fleck. Diese Form erwähnt Weise in den Bestimmungstabellen (1885) nicht, auch in anderen Beschreibungen ist davon nicht die Rede. In meiner Samml.
- **Byrrhus fasciatus* a. *cinctus* Ill. mit goldbrauner Grundfarbe, bei Lck. gef., wird von Reitter, wenigstens nach Kuhnts Tabellen, nicht erwähnt. Schilsky führt als synonym zur Nominatform c. Kugel. an, c. Ill. nicht. In meiner Samml.
- Adrastus lacertosus* Er. in der ganz dunklen Form fing ich Juli 1914 bei Ruhla in Thüringen (1 Ex.), in meiner Samml. Nach Kuhnts Tabellen für Deutschland fraglich. Wegen „*lacertosus*“ vgl. D. E. Z. 1913 p. 642.
- **Cardiophorus cinereus* Herbst, Fühler und Vorderbeine ganz rot, bei Lck. gef., habe ich noch nicht erwähnt gef. In meiner Samml.
- **Cerambyx cerdo* L. Am 28. Juni 1914 fing ich bei Lck. (Holbeck) am Stamm einer alten Eiche 1 ♂ von nur 28 mm Länge. Vielleicht waren solche zwerghafte Stücke aus der Mark noch nicht bekannt. In meiner Samml.
- **Chrysomela quadrigemina* Suffr. Ende Juni 1914 fing ich bei Lck. auf *Hypericum perforatum* ganz schwarze, nicht blau schimmernde Stücke. Nach Weise (*Chrysomelidae*) sind solche Exemplare im Gegensatze zu *Chr. hyperici* Forst. (a. *privigua*) noch nicht beobachtet. Mit letzterer habe ich sie schwerlich verwechselt. In meiner Samml.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [1915](#)

Autor(en)/Author(s): Delahon Paul

Artikel/Article: [Nachträge zu "Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands" von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. \(Col.\) 394-396](#)

