

gedeuteten stumpfen Hinterwinkeln, äußerst fein und ziemlich dicht, kaum erkennbar punktiert und ziemlich dicht grau behaart, wodurch der Glanz stark herabgemindert wird.

Flügeldecken viel länger als der Halsschild, ähnlich wie der Halsschild, jedoch etwas deutlicher und dichter punktiert und ebenso behaart.

Hinterleib deutlich und mäfsig dicht punktiert.

Länge: 1,5 mm.

Bolivien: Yuracaris.

Hypocyptus laeticornis Fauv. i. l.

In der Sammlung des Hamburger Zoologischen Museums und in meiner eigenen.

Xenocephalus Wasm.

(Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 411.)

Wegen *Xenocephalus* Kaup (*Pisces*, 1858) ändere ich den Wasmannschen Gattungsnamen in *Wasmannotherium* ab.

Nachträge zu „Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. (Col.)

Von Paul Delahou, Luckenwalde, Treuenbrietzener Str. 122.

X.

* = kommt in der Mark Brandenburg vor.

Lck. = Luckenwalde.

I. Im Verzeichnis Schilskys ohne * angeführte Arten und benannte Abänderungen.

* *Omalium septentrionis* Thoms., in Schilskys Verz. ohne *, kommt nach Fauna germ. auch in der Mark Br. vor.

* *Lathrobium fulvipenne* Grav. v. *letzneri* Gerh., im März 1901 und 1920 je 1 St. von mir bei Lck. (Elstal) an sumpfiger Stelle aus Laub usw. gesiebt, in m. Samml.

* *Bythinus bulbifer* Reichb. v. *extremitalis* Reitt., am 24. III. 20 1 St. von mir bei Lck. (Elstal) wie zuvor gef., in m. S.

- * *Catops Watsoni* Spence v. *amoena* Reitt., am 14. VIII. 20 von mir 2 St. bei Lck. (Elstal) unter Laubbäumen gestr., in m. S.
- * *Atomaria gutta* Steph. v. *rhenana* Kr., Juni 13 1 St. von mir bei Lck. (Elstal) gef., Nomf. kommt dort auch vor, bisher in m. S. von mir übersehen.
- * *Cyanegetis impunctata* L. v. *palustris* Redt., am 23. VII. 20 von mir 1 St. bei Lck. (Elstal) mit der dort häufigen Nomf. gestr., in m. S.
- * *Cyphon Paykulli* Guér. v. *alpina* Bourg., bei Lck. an verschiedenen Stellen öfter von mir mit der Nomf. im Mai, Juni gef., Belegstück in m. S. Die Abänd. dürfte auch anderwärts in der Mark nicht fehlen und bisher öfter übersehen sein.
- * *Byrrhus fasciatus* Forst. a. *subornata* Reitt., bei Lck. von mir öfter im April, Mai in Forstgräben mit der Nomf. und anderen Abänderungen gef., bisher in m. S. übersehen. Von Herrn Pfarrer Hubenthal 1 St. mit der Bezettelung „Berlin Umgebung“ erhalten.
- * *Chrysanthia viridissima* L. a. *cuprina* Reitt., am 25. VII. 20 von mir 1 St. bei Lck. (Klosterheide) im Kiefernwald am Rande einer Wiese von Calluna gestr., in m. S. Nomf. kommt auch bei Lck. vor, aber selten.
- * *Cryptocephalus 4-pustulatus* Gyll. a. *similis* Suffr., bei Lck. von mir öfter im Mai—Juli mit der Nomf. gestr., auch mit a. *rhaeticus* Heyd. Bisher in der Samml. übersehen.
- * *Phytonomus adpersus* F. a. *histrion* Boh., am 12. VIII. 20 von mir 1 St. bei Lck. (Elstal) am Rande eines Sumpfes gestr., in m. S.

II. Sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland.

- * *Graphoderes austriacus* Sturm fing ich bei Lck. meist in Stücken von beträchtlich über 13 mm bis fast 15 mm Länge. Vgl. Schaum (Naturgeschichte), Seidlitz (Fauna baltica, ed. II), Fauna germanica, Kuhnts Tab., Calwer-Schaufufs, wo überall nur 13 mm steht. So große St. dürften im weiblichen Geschlecht leicht mit ♀♀ von *Graph. zonatus* a. *bicornata* m. (D. E. Z. 1915 S. 394) verwechselt werden können.
- * *Phyllocrepa ioptera* Steph. mit rötlichem Kopf, am 26. II. 20 von mir 1 St. bei Lck. (Elstal) am Boden einer Scheune aus Heu- und Strohabfällen gesiebt, in m. S. Diese Form fand ich noch nicht erwähnt.
- * *Meligethes aeneus* F.: Flgd. blau, Hsch. messingfarbig, fand ich noch nicht erwähnt, von mir vereinz. bei Lck. gef. Ebenso:

- * Dieselbe Art: Oberseite schwarz mit schwachem, bläulichem Schimmer. Juli 20 von mir 1 St. bei Lck. gef., in m. S.
- * *Olibrus aeneus* F. mit ganz rein schwarzer Oberseite, am 12. VIII. 20 von mir 1 St. bei Lck. (Elstal) gestr., in m. S.; fand ich noch nicht erwähnt. Obwohl ich bei genauer Vergleichung mit normalen St. keine anderen Unterschiede herausfinden konnte, möchte ich bei der m. M. recht schwierigen Gattung doch einen Irrtum nicht von der Hand weisen.
- * *Euglenes nigrinus* Germ. ♀ mit rotem Hsch., sonst normal gefärbt. Bei Lck. (Rauhes Luch) am 4. VII. 20 1 St. im Kiefernwald gestr., in m. S. Diese Abänderung fand ich noch nicht erwähnt. Die normale Form ist bei Lck. nicht selten.
- * *Cryptocephalus sericeus* L. In Schilskys Verz. (1909) und in Fauna germ. ist eine a. *purpurascens* Ws. (ohne *) angeführt. Herr Weise hat aber, wenigstens in *Chrysomelidae*, 1893, S. 183, eine Benennung der a. (v.) nicht vorgenommen, sondern die Färbung (*purpurascens*) nur erwähnt; vgl. den verschiedenen Druck. Purpurne St. kommen bei Lck. vor.
- * *Sitona flavescens* Mrsh. muß mit *S. puncticollis* Steph. entweder von Seidlitz in F. balt. ed. II S. 590 einerseits oder in F. germ. V S. 72 und Kuhnts Tab. S. 943 andererseits verwechselt sein. Die Beschreibung von Schaufuß-Calwer S. 1064 für *puncticollis* Steph. steht der Seidlitzschen zwar nicht entgegen, jedoch gehört die Fig. (Taf. 38 Nr. 2, nicht Nr. 1, welche offenbar zu *griseus* gehört) jedenfalls zu *flavescens* Seidl. In Kuhnts Tab. sind die beiden Merkmale: Stirnfurche nur bis zur Augenmitte reichend, Abdomen seitlich beschuppt für *puncticollis* angeführt. Hier liegt offenbar ein Irrtum vor. Vielleicht nimmt jemand, dem die Originalbeschreibungen erreichbarer sind wie mir, Veranlassung zur Aufklärung in der E. Z.
- * *Aphodius depressus* Kug. a. *atramentaria* Er. ist nach F. germ. die dunkle Form schlechthin, was nach Erichsons Beschr. (Naturgeschichte) nicht zutrifft. Vgl. auch Seidlitz: F. balt. ed. II. Bei Lckw. kommen nebeneinander die rotdeckige Form sowie die Formen: *depressus* mit dunklen Decken und *atramentaria* Er. vor.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [1921](#)

Autor(en)/Author(s): Delahon Paul

Artikel/Article: [Nachträge zu "Schilskys Systematischem Verzeichnis der Käfer Deutschlands" von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer aus Deutschland. \(Col.\) 77-79](#)

