

## Käfer vom Cilicischen Taurus.

Mitgetheilt von

Major z. D. Dr. *L. von Heyden.*

---

Herr Max Korb aus München besuchte im Vorsommer 1886 den Cilicischen Taurus und sammelte besonders in der Umgegend von Smyrna und Adalia. Da ich Gelegenheit hatte, einen großen Theil der Ausbeute zu bestimmen, auch eine Anzahl Unica für meine Sammlung erhielt, so gebe ich hier ein Verzeichniß hervorragender Arten. S. bedeutet Smyrna, Ad. = Adalia, Kü. = Külek, T. = Tarsus. Die zwei Zahlen bedeuten Datum und Monat des Fanges, Zahlen allein den Monat.

*Harpalus sulphuripes* Germ. var. *pygmaeus* Dej. — S. 13. 3.

*Pangus scaritides* Sturm. — S. 13. 3., auch 4.

*Tapinopterus laticornis* Fairm. — Ad. 20. 5.

*Deronectes laeviventris* Rche. — Kü. 3. 7.

*Cafius sericeus* Holme var. *filum* Ksw. — S. 3.

*Boreaphilus velox* Heer (Eppelsheim vidit). — S. 3.

*Xantholinus relucens* Grav. var. *hebraicus* Rche. — Ad. 5. 5.

*Nargus Mohamedis* Sauley. — S. 3.

*Ablattaria arenaria* Krtz. — Ad. 5.

*Amphicoma syriaca* L. (Deckenende mit Zahn). — S. 4. und 6.

*Aurigena pilosa* Ganglb. (*chlorana* Marsl.). Häufig.

*Lycostomus Kraatzi* Bourg. — Ad. 15. 7.

*Cantharis rufocapitata* Gmgr. — Ad. 5.

*C. pulicaria* F. — S. 2. 4.

*Rhagonycha kuleghana* Marsl. — Ad. 5.

*Drilus bicolor* Schaafs. — Ad. 5. — Ein Ex. dieser ganz gelben Art mit gebräunter Deckenspitze.

*Malachiüs ornatus* Faldm.

*M. ephippiger* Retdb. nec Peyr. (*montanus* Peyr.).

*M. cervicornis* Abble. (*ephippiger* Peyr. nec Redtb.). Alle drei Arten von T. 6. 6. und von Abeille de Perrin bestimmt.

*Dasytes striatulus* Brllé. — Ad. 2. 5.

*Danacaea cervina* Küst. — S. 18. und 23. 3.

*Iphthimus Truquii* Peyr. — Ad. 5.

*Raiboscelis coelestinus* Walzl. — T. 3. 7. — S. 23. 3.

*Scryptia bifoveolata* Küst. — Ad. 27. 4.

*Opsimea quadrinervosa* Reche. (*ventralis* Mill.). — Ad. 5.

*Oedemera rubricollis* Reitter. — Ad. 5.

*O. anatolica* Reche. (Ann. France 1862, p. 544). — Ad. 5. —

Sehr auffallend gefärbtes Thier.

*Psallidium forcipatum* Reche. — Ad. 13. 4.

*Leptura verticalis* Germ. var. *Adaliae* Reitt. — Ad. 4. häufig.

*Phytoecia Merkli* Ganglb. — Kü. 6.

*Gynandrophthalma tibialis* Brllé. var. *hellenica* Mars. — Ad. 4.

*Cryptocephalus Tappesi* Mars. — Kü. 6.

*Luperus (Calomicrus) lividus* Mars. — Ad. 17. und 18. 5.

Bei seiner Anwesenheit in Frankfurt zeigte mir Herr Korb ferner einen großen mattschwarzen, glatten *Carabus*, den ich für die von Motschulsky als *Sphodristus acuticollis* beschriebene Art halten möchte, die Halsschildhinterecken sind auffallend lang und spitz.

Ferner einen *Omphreus*, ähnlich dem griechischen *Krüperi* Reitt.

Neue Arten sind:

1. *Pachybrachys Adaliensis* Weise. Vom Autor, Deutsche E. Z. 1886, p. 24, beschrieben nach Korb'schen Stücken, die ich ihm mittheilte. — Ad. 5.

2. *Harpalus smyrnensis* Heyden n. sp. *Supra laete viridis, aut violaceo tinctus, aut totus violaceus, subtus niger, femoribus tibisque piceis, tarsis magis rufis; antennis piceis, articulis 1—3 rufis, palpis rufis. — Interstitiis elytrorum densissime reticulatis inde sericeis.*

*Capite minutissime punctulato. Thorace parum convexo, fere quadrato, sed parum latiore quam longo, margine antico basique recte truncatis, angulis omnibus obtusis, non prominulis, lateribus uno sinu rotundatis, maxima latitudine in medio, supra ut in capiti disperse minutissime punctulato, basi tota fortiter punctato, striga utrinque basali parum impressa, medio canaliculato, ante basin leviter transversim impresso. Scutello nigro-aeneo, impunctato. Elytris thorace latioribus, convexis, humeris rotundatis, lateribus magis parallelis, apice parum (in ♀ magis) sinuatis; striis aequaliter impressis, in striis punctatis, interstitiis planis, punctis majoribus deficientibus, disperse solum punctis multis difficile visibilibus, permulto minus quam in ullo Ophono, in stria tertia puncto unico in  $\frac{1}{4}$  longitudinis ante apicem, inter striam sextam et septimam ante apicem punctis 2—3 magnis impressis. Episterna metathoracica*

*non elongata. Femoribus posticis punctis 4 piligeribus.* — Long. 7—8 mill.

Nonnulla exemplaria prope Smyrnam a Dom. Max Korb 13.—24. III. 1886 reperta.

Ich kann die Art mit keiner anderen in nähere Beziehung bringen; die gewissermaßen leuchtende Farbe meiner 9 Ex., die durch einen gewissen Seidenglanz der Decken gemildert wird, lassen die Art auf den ersten Blick erkennen. Kopf und Halsschild (mit Ausnahme der Scheibe, wo die Punktur undeutlicher wird) sind durchweg äußerst fein punkulirt, die Basis bis weit nach vorn stark punktirt, die Deckenstreifen sind schwach, zwischen den Streifen 6 und 7 stehen nur 2 oder 3 Punkte; alle Halsschildwinkel sind stark abgerundet. Am besten noch in die Nähe des *Harp. rubripes* zu stellen.

3. *Malachius Dama* Abeille n. sp. *Nigro-coeruleus, capite antice antennarumque 6 primis articulis infra flavis, thoracis angulis anticis flavo-rufis, elytris laete coccineis, his vitta tenui circa scutellum et suturali abbreviata coerulea.* ♂ *antennarum articulo secundo valde producto in laminam tenuem, convexam, ad tertium articulum curvatam, hoc dilatato, ad secundum converso, 4<sup>o</sup> dilatato-rotundato; tibiis anticis flavis.* — Taille: 4 $\frac{3}{4}$  mill.

♂. D'un bleu noirâtre, à pubescence blanche obsolète, à poils noirs denses sur l'avant-corps, courts et rares sur les élytres. Front profondément et transversalement déprimé derrière les yeux, avec une petite fossette au milieu; creusé en arrière de l'épistôme d'une rigole peu profonde, du milieu de laquelle surgit un tubercule tronqué, saillant et velu; devant de la tête flave jusqu'au milieu des yeux et au point d'insertion antennaire, la couleur bleue descendant entre les antennes où elle se termine carrément, sauf une pointe qui arrive à couvrir le tubercule médian. Une tache sur l'épistôme, sommet des mandibules et palpes noirs. Antennes dépassant peu la moitié des élytres, à 1<sup>er</sup> article long et conique, peu renflé au bout; 2<sup>e</sup> très court, fortement prolongé en dessous en une pointe quatre fois longue comme lui, cylindrique, mousse au sommet et recourbée en avant vers le 3<sup>e</sup> article; celui-ci deux fois au moins plus long que le 2<sup>e</sup>, en triangle équilatéral dont l'hypothénuse, un peu échancrée, est tournée du côté du 2<sup>ème</sup>; 4<sup>e</sup> fortement renflé par dessous au sommet où il est subarrondi; les suivants plus allongés, de moins en moins déprimés, triangulairement obconiques. Les 6 1<sup>ers</sup> articles sont de moins en moins jaunes par dessous. Corselet transversal, assez mat, taché de rouge-flave aux angles

antérieurs. Elytres très mates, subparallèles, d'un rouge éclatant, avec une tache noir-bleu ne couvrant pas les épaules, entourant étroitement l'écusson et prolongée étroitement et parallèlement jusqu'au milieu de la suture. Mésépimères concolores. Dessous du corps sombre; segments bordés de carné. Pattes bleuâtres, tarsi noirs, tibias antérieurs flaves dans leurs deux tiers apicaux.

♀. Antennes à 1<sup>er</sup> article non renflé, 2<sup>e</sup> très court, un peu prolongé en dessous, 3<sup>e</sup> triangulaire aussi long que large, subarrondi par dessous, 4<sup>e</sup> de même forme, mais moins large et plus long, les suivants allongés. Tibias antérieurs un peu rougeâtres au bout par dessous.

Mr. von Heyden m'a communiqué plusieurs sujets des deux sexes provenant de Külek et de Smyrne (Asie mineure).

Cette curieuse espèce, par sa petite taille, la forme de sa tache scutellaire, la couleur vive de ses élytres et surtout la structure originale des antennes du ♂, ne pourra se confondre avec aucune de ses voisines.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [32\\_1888](#)

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius  
Dominicus von

Artikel/Article: [Käfer vom Cilicischen Taurus. 68-71](#)