

Übersicht über die Nachweise der Coccinellidae im Ohre-Aller-Hügelland

von Werner WITSACK

Vorbemerkungen

Die eigenen Nachweise (l/d Witsack) stammen aus standardisierten Kescherfängen (vgl. WITSACK 1975) auf einer Vielzahl von Untersuchungsflächen in den unterschiedlichsten Habitaten (z.B. Feuchtestandorte, mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen, Kalk- und Sand-Magerrasen, Laub- und Nadelwäldungen u.a.). Zu folgenden Terminen fanden Kontrollfänge statt: 8.6.2004 (7 Fangorte = Fo), 9.6.2006 (13 Fo), 10.6.2006 (8 Fo), 5.9.2006 (13 Fo), 1.6.2007 (2 Fo), 2.6.2007 (7 Fo), 3.6.2007 (1 Fo), 1.8.2007 (11 Fo), 6.8.2007 (10 Fo).

Die Nachweise sind in folgender Reihenfolge dargestellt:

Datum; Fundort-Nummer (Tagebuch-Nr.); Lage- und Habitatangabe; Anzahl an Individuen; geografische Koordinaten (N = Nord, E = Ost); leg./det.

Die restlichen Nachweise stammen von Wolfgang Bäse (Bä) und Manfred Jung (Ju).

Liste der nachgewiesenen Arten

RL ST: Rote Liste Sachsen-Anhalt (WITSACK et al. 2004)

l/d Witsack = leg. und det. Witsack

62-003-001-	
	1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen ; 5 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; l/d Witsack
62-004-001-	<i>Cyanegetis impunctata</i> (L.,1767)
	9.6.2006; Fo-2; 1 km S Schwanefeld, Feuchtestelle; 2 Ex.; 52°15'23,6''N; 11°05'12,5''E; l/d Witsack
62-005-002-	<i>Coccidula rufa</i> (HERBST, 1783)
	8.6.2004; Fo-39; W Flechtingen, 1 km E Behnsdorf, Kiefern-Wald u. Magerrasen; 12 Ex.; 52°18'52,9''N; 11°10'06,8''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1km NE Satuelle, Kiefern-Wald; 2 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kiefern-Wald; 4 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kiefern-Wald; 8 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; l/d Witsack; 5.9.2006; Fo-8; 1,5 km NW Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 1 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; l/d Witsack; 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 1 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; l/d Witsack;
62-006-001-	<i>Rhyzobius litura</i> (FABRICIUS,1787)
	5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; l/d Witsack;
62-006-002-	<i>Rhyzobius chrysoloides</i> (HERBST,1792)
	5.9.2006; Fo-3a; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Kiefern-Wald; 4 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; l/d Witsack; 1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; l/d Witsack
62-008-003-	<i>Scymnus frontalis</i> (FABRICIUS,1787)
	10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-3; 1,8 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 8 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; l/d Witsack; 1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; l/d Witsack;
62-008-010-	<i>Scymnus haemorrhoidalis</i> HERBST, 1797 – RL ST V
	8.6.2004; Fo-38; 2 km W Flechtingen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°19'38,8''N; 11°12'21,6''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-41; 2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 8 Ex.; 52°21'59,7''N; 11°16'05,2''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1km NE Satuelle, Kiefern-Wald; 4 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3c; 1 km SW Schwanefeld, Bu-Fi-Wald ; 1 Ex.; 52°15'30,7''N; 11°04'41,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand ; 1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km

	SE Hørsingen, Exrl. Forst, Kie-Misch-Wald; 1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; l/d Witsack;
62.-008.-015.-	<i>Scymnus suturalis</i> THUNBERG, 1795
	8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; l/d Witsack; 1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kiefern-Wald; 2 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; l/d Witsack; 1.8.2007; Fo-2; 2 km N Ostingersleben, Hirsefeld; 1 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; l/d Witsack;
62.-012.-002.-	<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1850)
	Hasselburg, 10.06.2006 (Ju)
62.-013.-001.-	<i>Exochomus quadripustulatus</i> (L., 1758)
	8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Satuelle, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; l/d Witsack;
62.-015.-0031.	<i>Hyperaspis concolor</i> Suffr., 1843 – RL ST 2
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju);
62.-018.-001.-	<i>Hippodamia tredecipunctata</i> (L., 1758)
	5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese ; 1 Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; l/d Witsack
62.-018.-003.-	<i>Hippodamia variegata</i> (GOEZE, 1777)
	5.9.2006; Fo-8; 1,5 km NW Schwanefeld, Halbtr.-Rasen; 1 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 3 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; l/d Witsack; 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR. ; 1 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; l/d Witsack;
62.-022.-001.-	<i>Tytthaspis sedecipunctata</i> (L., 1761)
	8.6.2004; Fo-38; 2 km W Flechtingen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°19'38,8''N; 11°12'21,6''E; l/d Witsack; 8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calfförde, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-2; 1 km S Schwanefeld, Feuchtestelle; 1 Ex.; 52°15'23,6''N; 11°05'12,5''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen ; 5 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-4b; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Lichtung; 6 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; l/d Witsack; 5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese ; 6 Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; l/d Witsack; 5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 1 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; l/d Witsack; 5.9.2006; Fo-3a; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; l/d Witsack; 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerrwiese ; 2 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 1 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 4 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 2 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; l/d Witsack; 1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtr.-Rasen; 1 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; l/d Witsack; 1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtr.-Rasen ; 3 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; l/d Witsack; 1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtr.-Rasen am Hang; 2 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; l/d Witsack; 6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 2 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; l/d Witsack; 6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, Bromus erectus-Rasen; 3 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; l/d Witsack; 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR. ; 1 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; l/d Witsack; 6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 1 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; l/d Witsack; Lemsell, 10.06.2006 (Ju);
62.-023.-002.-	<i>Adalia decempunctata</i> (L., 1758)
	9.6.2006; Fo-2; 1 km S Schwanefeld, Feuchtestelle; 1 Ex.; 52°15'23,6''N; 11°05'12,5''E; l/d Witsack; Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju), Lemsell, 10.06.2006 (Ju);
62.-025.-003.-	<i>Coccinella septempunctata</i> L., 1758
	9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 1 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtr.-Rasen; 2 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Walbeck, Halbtr.-Rasen; 1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; l/d Witsack; 5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 3 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 1 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; l/d Witsack; Lemsell, 10.06.2006 (Ju); Flechtingen, Schlosspark, 08.07.2008 (Le).
62.-025.-004.-	<i>Coccinella magnifica</i> Redt., 1843 – RL ST 3
	Wiegitz, 11.06.2006 (Ju)
62.-026.-001.-	<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (L., 1758)
	6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 1 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; l/d Witsack;

6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR. ; 1 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; l/d Witsack;	
62-.028-.002-.	<i>Harmonia axyridis</i> (PALLAS, 1771) 1)
6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR. ; 1 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; l/d Witsack; Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); BoFL3, 14.12.2007; Flechtingen, Schlosspark, 08.07.2008 (Le); Ivenrode, 07.06.2008 (Bä); Weferlingen, 07.06.2008 (Bä)	
62-.031-.001-.	<i>Calvia decemguttata</i> (L., 1767)
Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju)	
62-.031-.002-.	<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (L., 1758)
5.9.2006; Fo-3a; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; l/d Witsack;	
62-.032-.001-.	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (L., 1758)
9.6.2006; Fo-2; 1 km S Schwanefeld, Feuchtestelle; 1 Ex.; 52°15'23,6''N; 11°05'12,5''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-3c; 1 km SW Schwanefeld, Bu-Fi-Wald ; 1 Ex.; 52°15'30,7''N; 11°04'41,1''E; l/d Witsack; 9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 1 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; l/d Witsack; 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hösingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; l/d Witsack; 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 1 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; l/d Witsack; 2.6.2007; Fo-2; Bischofswald bei Ivenrode, Buchen-Wald; 1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack; 1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 1 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; l/d Witsack; 6.8.2007; Fo-1; S Schwanefeld, Feuchtestelle m. <i>Carex panic.</i> ; 2 Ex.; 52°15'25,0''N; 11°05'11,2''E; l/d Witsack; 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR. ; 1 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; l/d Witsack	
62-.033-.001-.	<i>Myzila oblongoguttata</i> (L., 1758)
Lemsell, 10.06.2006 (Ju);	
62-.034-.001-.	<i>Anatis ocellata</i> (L., 1758)
10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kiefern-Wald; 1 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; l/d Witsack; Lemsell, 10.06.2006 (Ju);	
62-.035-.001-.	<i>Halyzia sedecimguttata</i> (L., 1758) – RL ST 3
1.6.2007; Fo-2; - Lichtfang- Bischofswald bei Ivenrode, Waldrand - Feuchtwiese; 1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; l/d Witsack; Lemsell, 10.06.2006 (Ju);	
62-.037-.001-.	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (L., 1758), Syn.: <i>Thea vigintiduopunctata</i> (L., 1758)
1.8.2007; Fo-6; Sandgrube 3,5 km N Ostingersleben; 1 Ex.; 52°14'36,6''N; 11°10'26,6''E; l/d Witsack; 6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, Bromus erectus-Rasen; 1 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; l/d Witsack;	

Anmerkungen

Bemerkenswert ist der Nachweis der in der Roten Liste in Kat. 3 (gefährdet) gestellten Marienkäfer-Art *Halyzia sedecimguttata*, der durch Lichtfang gelang und der Nachweis von *Coccinella magnifica* Redt., 1843. Bei Bodendorf konnte *Hyperaspis concolor* (RL ST 2) aufgefunden werden.

Der in der Roten Liste in Kat. V (Vorwarnstufe) eingeordnete *Scymnus haemorrhoidalis* wurde an insgesamt sieben Standorten (teilweise sogar in Anzahl) in Kiefernwäldern in der Gras- und Krautschicht gefangen. Offenbar lebt diese Art dort in den Grasbeständen.

Literatur

WITSACK, W., KLAUSNITZER, B. & K. SCHNEIDER (2004): Rote Liste der Marienkäfer (Coleoptera: Coccinellidae) des Landes Sachsen-Anhalt. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 39 : 308-310.)

Anschrift des Autors:

Dr. Werner Witsack
Stieger Weg 55
06120 Halle

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [17_2009](#)

Autor(en)/Author(s): Witsack Werner

Artikel/Article: [Übersicht über die Nachweise der Coccinellidae im Ohre-Aller-Hügelland 114-116](#)