

Entomologische Nachrichten.

Herausgegeben
von

Dr. F. Katter.

Putbus, den 1. Juli.

Jeden 1. des Monats erscheint ein Heft. Abonnement durch die Post jährlich 4 Mark, durch den Buchhandel 4,50 M. Inserate 25 Pf. pro Zeile oder deren Raum. Bei wiederholter Insertion oder bei Inseraten von 1 Seite und darüber 20% Rabatt. Beilagen bis zur Stärke eines Bogens 5 M.

Zur Synonymie der deutschen Käferarten von Prof. Dr. Karl v. Dalla Torre in Linz.

- | | |
|--|---|
| Donacia linearis Hoppe pr. simplex Fbr. | Cryptocephalus variabilis Schneid. pr. octopunctatus Scop. |
| Donacia typhae Brhm. r. Abr. pr. vulgaris Zschach. | Cryptocephalus interruptus Suffr. pr. signatus Laich. |
| Donacia hydrocharidis Fbr. pr. cinerea Hrbst. | Cryptocephalus coloratus Fbr. pr. quattuordecimmaculatus Schneid. |
| Haemonia equiseti Fbr. pr. appendiculata Pnz. | Cryptocephalus Boehmei Grm. pr. Bohemius Drap. |
| Clythra tibialis Lac. pr. lusitaniae Grm. var. | Cryptocephalus lobatus Fbr. pr. Schaefferi Schrk. |
| Clythra axillaris Lac. pr. lucida Grm. var. | Cryptocephalus duodecimpunctatus Fbr. pro quinquepunctatus Har. |
| Clythra longipes Fbr. pr. 6-punctata Scop. | Cryptocephalus nitens L. pr. nitidus L. |
| Clythra cyanea Fbr. pr. salicina Scop. | Cryptocephalus nitidulus Gyll. pr. ochrostoma Harold. |
| Clythra bucephala Fbr. pr. musciformis Göze. | Cryptocephalus flavoguttatus Oliv. r. Schrk. pr. Moraei L. |
| Clythra tetradyrna Küst. pr. rubicunda Laich. | Cryptocephalus quadripustulatus Gyll. pr. Wydleri Fldm. |
| Clythra quadrimaculata L. pr. unifasciata Scop. | Cryptocephalus decemmaculatus L. pr. decempunctatus L. |
| Clythra floralis Oliv. pr. rubicunda Laich. (var.). | Cryptocephalus frenatus Laich. (var.) pr. flavescens Schneid. |
| Pachnophorus arenarius Pnz. pr. pilosus Rossi. | Cryptocephalus fulcratus Grm. pr. nigrocoeruleus Göze. |
| Cryptocephalus imperialis Fbr. pr. primarius Harold. | Cryptocephalus flavilabris Payk. pr. parvulus Müll. |

- Cryptocephalus tessellatus* Grm. pr. *elegantulus* Grvh.
Cryptocephalus vittula Suffr. pr. *amoenus* Drap.
Cryptocephalus minutus Fbr. pr. *fulvus* Göze.
Cryptocephalus gracilis Fbr. pr. *rufipes* Göze.
Cryptocephalus Hübneri Fbr. pr. *biguttatus* Schall.
Cryptocephalus digrammus Suffr. pr. *labiatus* L. (var.).
Cryptocephalus Wasastjernae Gyll. pr. *exiguus* Schneid.
Cryptocephalus geminus Gyll. pr. *ocellatus* Drap.
Cryptocephalus salicis Fbr. pr. *trimaculatus* Rossi.
Cryptocephalus bistrispunctatus Grm. pr. *imperialis* Laich.
Cryptocephalus bipustulatus Fbr. pr. *bipunctatus* L. (var.).
Pachybrachys histrio Oliv. pr. *tessellatus* Oliv.
Pachybrachys fimbriolatus Suffr. pr. *tristis* Laich.
Timareba coriaria Fbr. r. Laich. pr. *violaceonigra* Deg.
Chrysomela gibba Hoppe Hornsch. fehlt.
Chrysomela Schotti Suffr. pr. *erythromera* Luc.
Chrysomela coerulea Suffr. pr. *carnifex* Fbr.
Chrysomela violacea Puz. pr. *coeruleans* Scriba.
Chrysomela lamina Fbr. pr. *oricalcia* Müll.
Chrysomela fucata Fbr. pr. *hyperici* Forst.
Chrysomela duplicata Znk. pr. *brunsvicensis* Groh.
Chrysomela nivalis Heer. recte Suffr. pr. *viridis* Dft.
Chrysomela speciosa L. pr. *gloriosa* Fbr.
Chrysomela tristis Fbr. pr. *Cacaliae* Schrk.
Chrysomela nigriceps Fbr. fehlt.
Entomoscelis dorsalis Fbr. pr. *sacra* L.
Gonioctena triandrae Suffr. pr. *linnaeana* Schrk.
Gonioctena 6-punctata Pnz. pr. *fornicata* Brügge.
Gonioctena litura Fbr. pr. *olivacea* Forst.
Gonioctena aegrota Fbr. pr. *variabilis* Oliv.
Gastrophysa raphani Fbr. r. Herbst. pr. *viridula* Deg.
Plagiodera armoraciae Fbr. pr. L. pr. *versicolora* Laich.
Phaedon orbicularis Suffr. pr. *pyritosus* Rossi.
Phaedon pyritosus Oliv. pr. *graminicola* Dft.
Phaedon sabulicola Suffr. pr. *galeopsis* Letz.
Phaedon betulae L. r. Küster pr. *armoraciae* L.
Phaedon neglectus Shlb. pr. *pyritosus* Rossi.
Prasocuris beccabungae Ill. pr. *junci* Brhm.
Adimonia rustica Schall. pr. *pomona* Scop.
Adimonia Villae Com. *laticollis* Shlb.
Adimonia aptera Bon. pr. *melanoccephala* Ponza.
Adimonia sanguinea Fbr. pr. (*Galerucella Crotch*) *crataegi* Forst.
Galleruca crataegi Forst. ist *xanthomelaena* Schrk.
Luperus circumfusus Mrsh. pr. *nigrofasciatus* Göze.

- Luperus xanthopus* Dft. pr. *violaceus* Harold.
Luperus rufipes Fabr. pr. *xanthopus* Schrk.
Luperus betulinus Fre. r. *Joan* pr. *rufipes* Scop.
Luperus dispar Ksw. pr. *nigra* Göze.
Graptodera erucæ Oliv. pr. *quer-cetorum* Foudr.
Graptodera hippophaës Aubé pr. *tamaricis* Schrk.
Aphthona abdominalis All. pr. *albinea* Foudr.
Aphthona coerulea Payk. pr. *non-striata* Göze.
Aphthona ovata Foudr. pr. *euphorbiae* Schrk.
Aphthona euphorbiae Schrank pr. *veustula* Kutsch. r. All.
Argopus haemisphaericus Dft. pr. *Ahrensi* Grm.
Phyllotreta antennata Koch pr. *nodicornis* Mrsh.
Phyllotreta atra Koch. pr. *crucifera* Göze.
Phyllotreta brassicae Fbr. pr. *exclamationis* Thnb.
Plectroscelis dentipes Hoffm. r. Koch pr. *concinna* Mrsh.
Plectroscelis meridionalis Foudr. pr. *obesa* Boield.
Plectroscelis subcoerulea Kutsch. fehlt.
Plectroscelis aridella Payk. pr. *hortensis* Fourc.
Apteropoda ciliata Oliv. pr. *orbiculata* Mrsh.
Thyamis verbasci Puz. pr. *tabidus* Fbr.
Thyamis melanocephala Gyll. pr. *atricapillus* Dft.
Thyamis pratensis All. pr. *longipennis* Kutsch.
Thyamis atriceps Kutsch. pr. *atricapillus* Dft.
Thyamis obliterated Rosh. pr. *pulex* Schrk.
Thyamis quadripustulata Fbr. pr. *4-guttatus* Pontopp.
Thyamis femoralis Mrsh. pr. *exoletus* L.
Thyamis substriata Kutsch. pr. *juncicola* Foudr.
Thyamis thoracica All. pr. *sutnrella* Dft.
Thyamis tabida Ol. pr. *Jacobeae* Wth.
Thyamis parvula Payk. pr. *ater* Fbr.
Psylliodes nigricollis Mrsh. pr. *chrysocephala* L. (var.).
Psylliodes napi Koch pr. *rapae* Ill.
Psylliodes herbacea Foudr. pr. *epronitens* Först.
Psylliodes rufilabris Koch nec Hoffm. ist *picina* Mrsh.
Cassida austriaca Fbr. pr. *canaliculata* Laich.
Cassida vittata Fbr. pr. *fastuosa* Schall.
Cassida rubiginosa Ill. r. Müller pr. *vibex* L.
Cassida thoracica recte Fourc. pr. *ferruginea* Göze.
Cassida vibex Fbr. nec L. pr. *liriophora* Kirby.
Cassida languida Corn. pr. *chloris* Suff.
Cassida azurea Fbr. pr. *ornata* Crtz.
 „ *lucida* Suff. pr. *ornata* Crtz.
 „ *oblonga* Ill. pr. *vittata* Vill.
 „ *ferruginea* Fbr. pr. *subferruginea* Schrk.
Cassida obsoleta Ill. pr. *flaveola* Thnbg.
Cassida equestris Fbr. pr. *viridis* L.
Engis sanguinicollis Fbr. pr. [*Com-bocerus* Bed.] *glaber* Schall.

- Engis humeralis* Fbr. pr. 2-pustulata Thnb.
Engis 2-bupustulata Fbr. pr. notata Gmel.
Triplax ruficollis Steph. pr. melanocephala Ltr.
Triplax bicolor Mrsh. recte Gyll. pr. scutellaris Charp.
Coccinella mutabilis Scriba pr. variegata Göze.
Coccinella notata Laich. fehlt.
 „ 19-notata Gebl. pr. Lichatschovii Humm.
Coccinella marginepunctata Schall. pr. 4-punctata Pontopp.
Coccinella impustulata L. pr. 18-punctata Scop.
Coccinella duodecimpustulata Fbr. pr. lyncea Oliv.
Coccinella variabilis Ill. pr. 10-punctata L.
Coccinella magnifica Rdth. pr. distincta Fldm.
Halyzia bis-7-guttata pr. 15-guttata Fbr.
Halyzia 14-punctata L. pr. 14-guttata L.
Micraspis 12-punctata L. pr. 16-punctata L.
Chilocorus renipustulatus Scriba pr. similis Rossi.
- Exochomus auritus* Scriba pr. nigromaculatus Göze.
Epilachna 11-maculata Fbr. pr. argus Frer.
Epilachna globosa Schneid. pr. [Subcoccinella Huber] 24-punctata L.
Platynaspis villosa Fourc. pr. luteorubra Göze.
Seymnus quadrilunulatus Ill. pr. pulchellus Hrbst.
Seymnus biverrucatus Pnz. pr. bipunctatus Kug.
Seymnus pygmaeus Fourc. pr. rubromaculatus Göze.
Seymnus marginalis Rossi pr. interruptus Göze.
Seymnus fasciatus Fourc. pr. subvillosus Göze.
Seymnus Hausmanni Grdl. fehlt.
 „ discoideus Ill. pr. suturalis Thnbg.
Seymnus analis Fbr. pr. ferrugatus Moll.
Orthoperus atomus Gyll. pr. picatus Steph.
Orthoperus atomarius pr. punctata Mrsh.
Moronillus ruficollis pr. velox Woll.

Zwei Puppen in einem Cocon von *Cecropia* fand C. E. Worthington in Chicago nach seiner Mittheilung im *Canadian Entomologist*, 1877, 3. Sie waren verschiedenen Geschlechts und befanden sich in entgegengesetzter Lage; keine von beiden war vollkommen gebildet. Am Cocon war nichts von der Arbeit zweier Larven zu bemerken, nur ein kleiner Spalt, der das Abdominalende der männlichen Puppe einschloss, zeigte sich.

Lancashire and Cheshire Entomological Society. Unter diesem Namen ist in England vor Kurzem ein neuer entomologischer Verein gegründet worden (in Lancaster oder Chester?) P. Now. Ent.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl
[Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Zur Synonymie der deutschen Käferarten 101-104](#)