

schönste dieser Färbungen ist die meiner *trilunata*, bei der (wie bei *austriaca*, Scribae) die Stellung des Schulterpunktes ganz verschoben erscheint, will man selben nicht als ganz fehlend annehmen, wobei denn freilich die die Schultermakel umgebende Schwärzung als vom so schwankenden Schildchenflecke oder von der Mitte aus vordringend gedacht werden muss. *Trilunata* ist ein Zeichnungsgegenstück (freilich etwa mit umgekehrtem Hell und Dunkel) der *Coccinella trifasciata*. Die Makeln sind hochroth, die Decken tief schwarz. Ich klopfte 2 Stück von einem Gewirre einer Schlehenstaude mit Hundrose, leider entfiel mir das eine und war weg. Ich kann daher nicht behaupten, dass sie vielleicht Gatten waren, obzwar sie verdächtig nahe auf einem Zweige sasssen, da ein Schlag sie lieferte.

Halyzia ocellata L.

Grundform bekannt genug, Flecken der Decken normal 2, 4, 3, 1; — ohne schwarze, nur mit hellen Makeln (*bicolor* Weise), mit 2 schwarzen Makeln: 1 (*biocellata* Weise), mit 6 Makeln und zw. 1, 2, 6 (*Boeberi* Cederhjem), mit 12 Makeln und zw. 1, 2, 3, 4, 6, 7 (*tricolor* Weise), mit 16 schwarzen Makeln, wobei von den normalen entweder 8 und 10 fehlen (*vulgaris* Weise oder 5 und 10 *nana mihi*) oder 2 und 10 (*egrensis mihi*), mit 18 schwarzen Makeln (10 fehlt) (*15-punctata* Deg.); — mit schwarzen, theilweise verbundenen Makeln u. zw. 8 + 9 (*subfasciata* Weise), 1 + 3 + 4 (*bivittata* Weise), in diesen Fällen quer, dagegen mit 3 Längsbinden (erste aus 1 + 3 + 4 + 7 + 10, zweite 2 + 5 + 8, dritte 6 + 9) (*hebraea* Linn.)

Von *nana* besitze ich nur 1 Stück, dagegen ist *egrensis* in meinem Fanggebiete ebenso häufig als *vulgaris* und die Grundform. Die fehlenden Makeln sind eben bis auf jede Spur einer Bräunung verschwunden.

Eger, Anfang August 1880.

Heinrich Gradl.

~~~~~

**Lygris var. *Ovulata mihi*.**

Von Hugo Borgmann, Oberförster in Oberaula.

Seit einigen Jahren ziehe ich alljährlich eine grössere Anzahl von *Lygris Reticulata* F. aus den Anfangs October an *Impatiens* gefundenen Raupen und erhalte hierunter etwa 6—8% einer in mannichfacher Beziehung interessanten Zeichnungs-Varietät. Da ich nunmehr diese Varietät auch im Freien gefangen habe, und demnächst Herr Schilde in

Bautzen in dem II. Theil seiner Widerlegungen der Weismann'schen Studien diese Varietät einer eingehenden Besprechung zu unterziehen gedenkt, so will ich hier die Beschreibung derselben folgen lassen.

Ovulata ist stets kleiner als Reticulata, von ca. 18 mm Flügelspannung, während Reticulata bis 26 mm und darüber hat. Während bei Reticulata die dritte weisse Querlinie des Mittelfeldes (die vordere Einfassung derselben als erste gerechnet) kurz vor der Mitte, und die 4. Querlinie derselben kurz hinter der Mitte in den Vorderrand auslaufen, mithin den mittleren Theil des Mittelfeldes nach vorne offen lassen, vereinigen sich bei Ovulata diese Querlinien auf dem gemeinschaftlichen Stiele der Rippe 6 und 7, mithin an der vorderen Anhangszelle oder auf der Lubrostral-Rippé. Durch diese Vereinigung wird die Discusparthie eiförmig abgegrenzt und bleibt der Vorderrand von der 2. Querlinie bis zur fünften vor der Subcostal-Rippe breit schwarz. Bei einem Stück ist die Vereinigung der beiden Querlinien bis in die Mittelzelle hereingerückt und die eiförmige Zeichnung zur kreisrunden geworden. ♂ und ♀ variiren in ganz gleicher Weise.

### Die Raupe von *Mamestra splendens* im Vergleich mit der von *Mamestra oleracea*.

Von Adolph Streckfuss.

Die Raupe von *Mamestra splendens* ist wohl nur wenigen Sammlern<sup>1)</sup> bekannt. Ich bin leider zu sehr Laie, um einen Anspruch auf Kenntniss der gesammten einschlägigen Literatur machen zu können und weiss also nicht, ob die Raupe der schönen und seltenen Eule schon gut beschrieben worden ist; in denjenigen Werken, welche mir zugänglich waren, habe ich keine Beschreibung gefunden und folge deshalb dem Wunsche mehrerer entomologischer Freunde, indem ich nachstehende Beschreibung veröffentliche und insbesondere auf die Unterschiede zwischen den beiden nahe verwandten *Mamestra*-Arten, *splendens* und *oleracea*, aufmerksam mache.

<sup>1)</sup> Der verstorbene Berliner Sammler, Herr Kretschmar, kannte die Raupe; er zog alljährlich einige Exemplare, aber er gehörte zu jenen Sammlern, welche ihre Geheimnisse nicht verrathen. Auf vielfaches Verlangen gab er von der Raupe folgende Beschreibung: „Es ist eine bunte Raupe, sie lebt auf einem grünen Kraut, welches im Wald und auf Wiesen wächst.“ — Zur Bereicherung der entomologischen Kenntniss hat diese Beschreibung nicht viel beigetragen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Borgmann Hugo

Artikel/Article: [Lygris var. Ovulata mihi. 278-279](#)