

Synopsis

der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera

von **Gustav Zehe,**

Oberförster in Volpersdorf (Grafsch. Glatz.)

(Fortsetzung.)

Ptinoidae.

- Hedobia pubescens* F. Oestr.
 „ *imperialis* L. Gl. n. s. 4. 5. Deutschl.
 „ *regalis* Dfts. Oestr. Rgsbg.
- Ptinus variegatus* Rossi. Gl. aus Taubenmist s. ausgesiebt. 9.
 Oestr.
 „ *6-punctatus* Pnz. Gl. unter Ahorn-Rinde, auch in Kellern
 n. s. 3—10. Erl. Kl. Rhn. Mch. Hbg. Oestr. Rgsbg.
 Frbg.
 „ *fur* L. Deutschl.
 „ *pallipes* Dfts. Mhr. Han. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.
 Oestr. Rgsbg.
 „ *raptor* St. Oberschles. Han. Rhn. Mch. *Thrg.*
 „ *rufipes* Oliv. Gl. s. 4—9. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch.
 Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
 „ *pusillus* St. Rhn.
 „ *latro* F. Mhr. Erl. Han. Rhn. Mch. Tyr. Thrg. Oestr.
 „ *nitidus* Dfts. Han. Rhn.
 „ *dubius* St. Han.
 „ *crenatus* F. Gl. in Kellern gem. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr.
 Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.
 „ *minutus* Dfts. Mch. Hbg. Oestr.
- Gibbium scotias* F. Erl. Pr. Mch. Tyr. Thrg. Oestr. Sachsen.
 Rgsbg.
- Mastigus palpalis* Hfng. Baiern.
- Anobium tessellatum* F. Deutschl.
 „ *pertinax* L. Deutschl.
 „ *denticolle* Crtz. Oberschl. an schadhafte Weissbuchen
 s. Han. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg. Rgsbg.
 „ *serricorne* Dfts, Hbg. Oestr.
 „ *brevicorne* Rtzb.
 „ *rufipes* F. Deutschl.
 „ *nitidum* F. Gl. an Fichten s. 6—8. Deutschl.
 „ *striatum* Oliv. Deutschl.
 „ *fulvicorne* Dhl. Han. Kl. Rhn. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.
 „ *cinnamomeum* St. Tyr.
 „ *brunneum* Oliv. Han. Rhn. Hbg. Oestr. Mark.

- Anobium emarginatum* Mgl. Gl. z. s. 4--10. Han. Rhn. Tyr.
Thrg. Oestr.
- „ *pini* Er. Rhn. Oberschl.
- „ *abietinum* Gyll. Han. Tyr. Thrg. Pr. Oberschl. Rgsbg.
- „ *longicorne* Kn. Thrg.
- „ *angusticolle* Rtz. Gl. einige Mal auf freien Grasplätzen gekötschert. 6--8. Rhn. Thrg. Hz.
- „ *nigrinum* Er. Gl. mit *Tortrix Resinana* zusammen erzeugen. Pr. Thrg. Oestr. Rgsbg.
- „ *molle* L. Gl. s. Deutschl.
- „ *abietis* F. Gl. in Fichtenzapfen gem. Erl. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
- „ *gentile* Rosenhr. Tyr.
- „ *paniceum* L. Deutschl.
- „ *plumbeum* Ill. Deutschl.
- „ *minutum* F. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch.
- „ *castaneum* Kug. Han. Rhn. Pr. Mch.
- „ *immarginatum* Millr. Hz. Oestr.
- Dryophilus pusillus* Gyll. Gl. auf Holzschlägen n. s. 5--9. Han. Mch. Tyr. Thrg. Pr. Oestr. Rgsbg. Frbg.
- Ochina sanguinicollis* Dfts. Oestr. Rgsbg.
- „ *hederac* Müll. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Oestr.

Cioidae.

- Hendecatonus reticulatus* Mell. Mhr. Mch. Tyr. Thrg. Oestr.
- Cis boleti* Scop. Deutschl.
- „ *micans* F. Deutschl.
- „ *hispidus* Pk. Deutschl.
- „ *festivus* Pnz. Gl. s. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr.
- „ *laricinus* Rehn. Oestr.
- „ *2-dentatus* Gyll. Gl. an birkenen Schwämmen s. 9. Han. Kl. Rhn. Pr. Hbg. Thrg.
- „ *perforatus* Gyll. Deutschl. (gen. *Rhopalodontus* Mellié.)
- „ *alni* Gyll. Han. Kl. Tyr. Oestr.
- „ *glabriculus* Gyll. Pr. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Thrg.
- „ *cornutus* Gyll. Han. Kl. Rhn. Pr. Oestr. (Ennearthron.)
- „ *laminatus* Er. Brl. Erl. Han. Kl. Mch.
- „ *punctulatus* Gyll. Han. Kl.
- „ *2-dentulus* Rosenhr. Tyr.
- „ *affinis* Gyll. Gl. in Fichtenschwämmen h. Han. Kl. Rhn. Pr. Hbg. Thrg. (Ennearthron.)
- „ *elongatulus* Gyll. Han. Kl.
- Entypus fronticornis* Pnz. Brl. Han. Kl. Rhn. Pr. Tyr. Hbg. Oestr. Erl. Mch. (gen. *Ennearthron* Mell.)
- Oróphius mandibularis* Gyll. Erl. Han. Mch. Tyr. Oestr.
- „ *nitidus* F. Gl. s. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr.

- Dorcotoma dresdensis* Hbst. Gl. aus Erlen-Schwämmen h. erzogen. Deutschl.
- „ *chrysomelina* Mgl. Erl. Han. Mch. Tyr. Oestr.
- „ *flavicornis* F. Gl. s. s. Rhn. Thr. Oestr.
- „ *bovistae* Koch. Gl. s. 5. Deutschl.
- „ *affinis* St. Han. Mch. Oestr.
- „ *rubens* Koch. Han. Kl. Thrg. Oestr.
- Xyletinus pectinatus* F. Deutschl.
- „ *ater* Pnz. Erl. Mch. Pr. Rgsbg.
- „ *laticollis* Dfts. Kl. Pr. Oestr.
- „ *testaceus* Crtz. Rhn. Mch. Hbg. Oestr. Rgsbg.
- „ *niger* Mllr. Mch. Oestr.
- Ptilinus pectinicornis* L. Gl. aus anbrüchigen Buchen n. s. erzogen. Deutschl.
- „ *costatus* Gyll. Gl. Mhr. in Weiden s. 4—10. Deutschl.
- Apate capucina* L. Oberschl. Mhr. in Eichen. Erl. Han. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Oestr. Frbg.
- „ *Dufouri* Latr. Han. Hbg. Oestr. Darmstadt.
- „ *substriata* Pk. Oestr.
- „ *elongata* Pk. Oestr.
- „ *muricata* L. Tyr. in Weinreben. Oestr.
- „ *sinuata* F. Erl. Kl. Mark.
- „ *humeralis* Luc. Tyr.
- Psoa Viennensis* Hbst. Oestr.

Lymexyloides.

- Hylecoetus dermestoides* F. Gl. in Buchen- und Nadelholz-Stöcken h: 5. Deutschl.
- Lymexylon navale* L. Deutschl.
- „ *flabelllicorne* Shlb. Pr.

Tenebrionina.

- Asida fascicularis* Grm. Tyr.
- *Blaps mortisaga* L. Deutschl.
- „ *fatidica* St. Deutschl.
- „ *obtusa* St. Deutschl.
- Platyscelis melas* Fisch. Oestr.
- *Pedinus femoralis* L. Mhr. auf Sandboden s. 4. 5. Pr. Tyr. Oestr. Rgsbg.
- Heliopates gibbus* F. Pr. Oestr. In den Dünen an der Ostsee h.
- Pandarus emarginatus* F. Tyr.
- *Opatrum sabulosum* L. Deutschl.
- „ *Viennense* Dfts. Oestr.
- „ *pedestre* Rosenhr. Tyr.
- „ *pusillum* F. Oestr. Rgsbg.

- Microzoum tibiale* F. Mhr. in Gemülle s. 4. Erl. Han. Rhn. Pr.
 Mch. Hbg. Thrg. Oestr. bei Stettin gem.
- Crypticus quisquilius* L. Auf Sandboden. Deutschl.
- Lithophilus connatus* F. Oestr.
- Eledona crenata* F. Gl. in faulen Buchen und deren Schwämmen
 s. 4—9. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg.
- „ *interrupta* Ill. Oestr.
- „ *armata* F. Rhn. Mch. Hbg. Oestr. Frbg.
- „ *agaricola* Latr. Gl. aus Birnbaum-Schwämmen h. er-
 zogen. Deutschl.
- Pentaphyllus testaceus* F. Han. Kl. Rhn. Pr. Hbg. Thrg. Oestr.
- Alphitophagus 4-pustulatus* Steph. Kl. Oestr.
- Phyletus populi* Meg.
- Scaphidema bicolor* F. Gl., Brl. Erl. Rgsbg. Han. Kl. Rhn. Pr.
 Mch. Tyr. Thrg. Oestr.
- Platydema violacea* F. Han. Kl. Rhn. Pr. Hbg. Oestr. Rgsbg.
 Stettin.
- „ *Dejeanii* Lap. Rhn. Oestr.
- Hoplocephala haemorrhoidalis* F. Pr. Oestr.
- Diaperis boleti* L. Gl. in Buchen-Schwämmen gem. 5—9. Erl.
 Han. Kl. Pr. Mch. Tyr.
- Heterophaga diaperina* Kug. Pr. Mch. Oestr.
- „ *fagi* Pnz. Oestr.
- „ *mauritanica* F.
- „ *chrysomelina* Rossi. Oestr.
- Uloma culinaris* F. Deutschl.
- Tribolium castaneum* M. L. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Pr.
- „ *2-foveolatum* Dfts. Rhn,
- „ *madens* Charp. Pr. Oestr.
- Cerandria cornuta* F. Brl.
- Hypophloeus castaneus* F. Deutschl.
- „ *pini* Pnz. Mch. Hbg. Oestr. Rgsbg. Steyermark.
- „ *fraxini* Kug. Mch. Hbg. Oestr. Obschl.
- „ *linearis* Gyll. Han. Rhn. Pr. Oestr.
- „ *bicolor* F. Han. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Pr.
 Rgsbg. Oberschl.
- „ *fasciatus* F. Han. Kl. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr.
 Berl.
- „ *depressus* F. Erl. Han. Kl. Pr. Mch. Tyr. Hbg.
 Thrg. Oestr. Brl.
- „ *piceae* Rtz. Gl. Erl. Oberschl.
- „ *fagi* Rtz. Mark. Han. Münden.
- „ *rufulus* Rosenhr. Brl. Windsheim.
- Eustrophus dermestoides* F. Deutschl.
- Orchesia micans* Ill. Deutschl.
- „ *fasciata* Pk. Rhn. Pr. Oestr.

- Orchesia* *flavicollis* Redtb. Oestr. Tyr.
 puncticollis Rosenhr.
 sepicola Rosenhr. Tyr.
Hallomenus *humeralis* F. Gl. auf Blumen s. 7. Erl. Rhn. Pr.
 Mch. Tyr. Thrg. Oestr.
 fuscus Gyll. Gl. unter Rinde fichtner Störcke s. Mch.
 Oestr. Pr.
 affinis Pk. Gl. mit dem vorigen. Rhn. Mch. Tyr.
 Hbg. Pr. Oestr.
 flexuosus Pk. Gl. aus Erlen-Schwämmen h. erzogen.
 Erl. Han. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Pr. Oestr.
Dircaea *discolor* F. Gl. Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Oestr. Rgsbg.
 tenuis Rosenhr. Erl. Tyr.
 4-guttata Pk. Pr. Oestr.
 3-guttata Gyll. Pr. Stettin s. selten.
Xylita *ferruginea* Pk. Han.
Osphya *praeusta* Oliv. Rhn. Thrg. Oestr. Hrzs.
Hypulus *2-fasciatus* F. Pr. Brl. Mch. Oestr.
 quercinus Pk. Rhn. Pr. Thrg. Oestr. Brl. Oberschl.
Serropalpus *barbatus* Schall. Pr. Mch. Hbg. Oestr. Frbg. Ober-
 schlesien.
 Vaudouerii Latr. Darmstadt.
Conopalpus *flavicollis* Gyll. Oestr.
Melandrya *caraboides* L. Deutschl.
 canaliculata F. Pr. Mch. Tyr. Thrg. Oestr.
 flavicornis Dfts. Kl. Pr. Oestr.
Phryganophilus *ruficollis* F. Oestr.
 nigriventris Hampe. Oestr.
Pytho *depressus* L. Gl. in alten Stöcken s. s. Pr. Mch. Oestr.
Tenebrio *obscurus* F. Deutschl.
 molitor L. Deutschl.
 curvipes F. Han. Pr. Hbg. Oestr. Frbg.
 loripes Ill. Pr. Oestr.
Boros *corticalis* Pk. Oestr. Erl. Han.
Helops *coeruleus* F. Tyr. Dalmatien.
 lanipes F. Deutschl.
 badius Redtb. Oestr.
 caraboides Pnz. Deutschl.
 dermestoides Ill. Tyr. Oestr.
 quisquilus F. Hbg. Oestr.
Laena *viennensis* St. Oestr.
Allecula *morio* F. Deutschl.
Prionychus *ater* F. Deutschl.
 fuscus Pnz. Kl. Rgsbg. Frbg.

- Mycetochares flavipes* F. Gl. aus faulem Holze von Jugl. regia
erzogen. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg.
Thrg. Oestr.
- „ *2-pustulatus* Ill. Erl. Kl. Pr. Mch. Tyr. Hbrg.
Oestr. Rgsbg.
- „ *morio* Redtb. Mch. Tyr. Oestr.
- „ *barbata* Latr. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr.
Hbg. Oestr. Rgsbg.
- „ *brevis* Pnz. Mch. Kl. Oestr. Brl.
- „ *scapularis* Pnz. Kl. Mch. Oestr.
- „ *axillaris* Pk. Kl. Pr. Hbg. Rgsbg.
- „ *humeralis* F. Rhn. Pr. Tyr. Hbg. Frbg.

Cistelina.

- Omophlus lepturoides* F. Mhr. auf Holzplätzen, auch an Getreide
h. 5. Han. Pr. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg.
- „ *pinicola* Redtb. Oberschl. Oestr.
- „ *picipes* F. Mhr. auf trocknen Grasplätzen gem. 5.
Han. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Oberschl.
- *Cistela ceramboides* L. Erl. Han. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr.
Hbg. Tyr. Rgsbg. Frbg. Schles.
- „ *varians* F. Erl. Oestr.
- „ *rufipes* F. Gl. Erl. Han. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.
Oestr. Rgsbg.
- „ *fulvipes* F. Mhr. auf Blüten s. 5. Han. Rhn. Pr. Mch.
Tyr. Hbg. Oestr. Hrz. Thrg. Rgsbg. Frbg.
- „ *nigrita* F. Tyr. Oestr.
- „ *sulphurea* L. Deutschl.
- „ *2-color* F. Erl. Pr. Oestr.
- „ *sulphuripes* Grm. Mhr. auf Blumen s. s. 5. Oestr.
- „ *murina* L. Deutschl.

Lagrioidae.

- *Lagria pubescens* L. Deutschl.

Pyrochroidae.

- *Pyrochroa coccinea* L. Gl. die Larve in Laub und Nadelholz-
stöcken h. Deutschl.
- „ *rubens* F. Mhr. unter Eichenrinde n. s. 5. Deutschl.
- „ *pectinicornis* F. Gl. die Larven unter Buchen-Rinde
lebend. Deutschl.

Anthicoidae.

- Agnathus decoratus* Grm. Oestr.
- *Notoxus monoceros* L. Deutschl.
- „ *major* L. Rhn. Tyr. Oestr. Rgsbg.

- Notoxus cornutus* F. Rhn. Meh. Tyr. Oestr. Gl. in Gemülle
s. s. 6.
- „ *3-fasciatus* Rossi. Oestr.
- „ *armatus* Schmidt. Tyr.
- „ *rhinoceros* F. Meh. Thrg. Oestr. Magdeburg.
- Anthicus sellatus* Pnz. Mhr. au. Sandbänken der March s. 5.
Rhn. Oestr. Magdeb. Erl. Frankfurt.
- „ *2-maculatus* Ill. Rhn. Pr. Hbg. Frankf. a. O. Swinem.
Seestrand h.
- „ *nectarinus* Pnz. Magdeb. Hbg. Mannh. Kiel.
- „ *antherinus* L. Deutschl.
- „ *longicollis* Schm. Tyr.
- „ *floralis* F. Deutschl.
- „ *hispidus* Rossi. Mhr. in Gemülle s. 5. Pr. Tyr. Oestr.
Sachsen.
- „ *4 guttatus* Rossi. Hbg. Oestr. Frbg.
- „ *2-fasciatus* Rossi. Han. Oestr.
- „ *1-fasciatus* Schm. Tyr.
- „ *ater* Pnz. Pr. Oestr. Kiel. Braunschw.
- „ *unicolor* Schm. Oestr.
- „ *flavipes* Pnz. Mhr. in Gemülle s. 5. Han. Rhn. Pr. Tyr.
Hbg. Thrg. Oestr.
- „ *gracilis* Pnz. Han. Pr. Oestr. Brl. Erl. Swinemünder
Seestrand s.
- „ *axillaris* Schm. Tyr.
- „ *luteicornis* Schm. Oestr. Baiern.
- „ *humilis* Grm. Han. Meh. Tyr. Thrg. Oestr. Mag-
deburg.
- „ *pedestris* Rossi. Mhr. um Bäume n. s. 5. Rhn. Tyr.
Oestr.
- „ *gsnistae* Rosenhr. Tyr.
- „ *Schmidtii* Rosenhr. Tyr.
- Ochthenomus tenuicollis* Schm. Brl. Oestr. Tyr.
- Xylophilus oculatus* Pk. Hbg. Oestr.
- „ *populneus* F. Erl. Han. Kl. Meh. Tyr. Hbg. Thrg.
Oestr. Pr. Rgshg.
- „ *pygmaeus* Gyll. Tyr.
- „ *nigrinus* Grm. Gl. auf Waldplätzen s. 8. Han. Pr.
Hbg. Thrg. Brl.
- Scraptia fusca* Ltr. Han. Kl. Tyr. Oestr.
- „ *fuscula* Mllr. Kl. Pr. Oestr.

Rhipiphorides.

- Pelecotoma fennica* Pk. Pr. Birstein am Donnersberg. Erfurt.
- Metoecus paradoxus* F. In Wespennestern. Pr. Erl. Meh. Rgsh. Oestr.
- Rhipidius blattarum* Sundev. Oestr.

Mordellina.

- Mordella 12-punctata Rossi. Mch. Tyr. Oestr.
 „ guttata Pk. Gl. auf Blumen s. 7. Erl. Pr. Tyr. Thrg.
 Oestr.
 „ 2-signata Redtb. Mch. Oestr.
 „ fasciata F. Deutschl.
 „ aculeata L. Deutschl.
 „ villosa Schek. Oestr. Thrg.
 „ grisea Frhl. Gl. s. s. Hbg.
 „ parvula Gyll. Han.
 „ pumila Gyll. Gl. Mhu. s. 5—7. Erl. Kl. Rhn. Pr.
 Mch. Hbg. Frbg. Thrg. Oestr.
 „ pusilla Redtb. Pr. Mch. Thrg. Oestr. Schles.
 „ abdominalis F. Deutschl.
 „ ventralis F. Gl. Rhn. Mch. Thrg. Pr.
 „ humeralis L. Gl. auf Waldwiesen s. 7. Han. Rhn.
 Mch. Tyr. Thrg. Oestr. Pr. Brl.
 „ axillaris Gyll. Rhn. Mch. Hbg. Oestr. Erl.
 „ variegata F. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg.
 Oestr. Rgsbg.
 „ testacea F. Thrg. Rgsbg. Frbg.
 „ brunnea F. Obschl. Rhn. Mch. Thrg. Oestr. Rgsbg.
 „ flavescens Mrsh. Rhn.
 — Anaspis frontalis L. Deutschl.
 „ clypeata Er. Rhn. Thr. Ems.
 „ rufilabris St. Deutschl.
 „ lateralis F. Han. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr. Ems.
 Frbg. Schles.
 „ humeralis F. Erl. Rhn. Oestr. Rgsbg. Frbg.
 „ ruficollis F. Gl. s. s. 6. Rhn. Thrg. Oestr. Ems. Rgsbg.
 Frbg.
 „ Geoffroyi Mllr. Shn. Oestr.
 „ phalerata Grm. Oestr.
 „ 4-pustulata Mllr. Han. Rhn. Ems.
 „ maculata Geoffr. Rhn.
 „ aretica Schh. Rhn. Thrg.
 „ flava L. Mhr. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg.
 Oestr. Frbg. Rgsbg.
 „ thoracica L. Deutschl.
 „ atra F. Gl. 5—8. Han. Kl. Rhn. Ems.
 „ nigra Megl. Erl. Kl. Rgsbg.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Zebe Gustav

Artikel/Article: [Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera 33-40](#)