

Synopsis

der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera

von **Gustav Zebe**,

Oberförster in Volpersdorf (Grafsch. Glatz.)

(Schluss.)

Chrysomeloidae.

(Fortsetzung.)

- Cryptocephalus pallifrons Gyll. Mch. Oestr. Rgshg.
 „ bistrispunctatus Crtz. Gl. auf jungen Eichen s. 8.
 Tyr. Oestr. Pr.
 — „ 2-punctatus L. Deutschl.
 „ 6 pustulatus Rossi. Gl. auf Blumen s. Han. Mch.
 Hbg. Oestr. Brl.
 — „ vittatus F. Deutschl.
 „ tessulatus Grm. Oestr.
 „ 2-lineatus L. Deutschl.
 „ vittula Suffr. Tyr.
 — „ pygmaeus F. Deutschl.
 „ minutus F. Deutschl.
 „ pusillus F. Schles. Han. Kl. Pr. Mch.
 „ gracilis F. Deutschl.
 — „ Hübneri F. Deutschl.
 — „ labiatus L. Deutschl.
 „ Wasastjernii Gyll. Gl. auf Birken. Han. Rhn.
 — „ geminus Gyll. Deutschl.
 „ querceti Suffr. Gl. auf Birken s.
 „ frontalis Msh. Pr. Thrg.
 „ strigosus Grm. Oestr.
- Pachybrachys hippophaes Suffr. Tyr.
 — „ hieroglyphicus F. Deutschl.
 „ histrio Oliv. Han. Rhn. Pr. Mch. Oestr. Rgshg.
 „ fimbriolatus Suffr. Mhr. auf Blumen s. 5. Erl. Tyr.
 Oestr.
- Stylosomus minutissimus Grm. Baiern.
- Timarcha laevigata L. Deutschl.
 „ pratensis Mgl. Mch. Tyr. Frbg. Triest.
 — „ coriaria F. Deutschl.
 „ metallica F. Gl. Mhr. unter Steinen, Moos n. s. 8–10.
 Deutschl.
 „ splendens Koch. Schl. unter Moos u. Steinen s. s. 5. 6.
- Chrysomela atra Dhl. Schles.
 — „ Göttingensis L. Deutschl.
 „ acrea Dfts. Mch. Oestr.

- Chrysomela crassimargo* Grm. Tyr. Oestr.
 „ *Dahlii* Knoch. Gl. s. s.
 „ *hemisphaerica* Dfts. Gl. i. Frühj. a. Wegen herumlaufend.
 „ *purpurascens* Grm. Gl. auf feuchtem Moos n. s. gesiebt. Mhr. 3—10.
 „ *rufa* Dfts. Gl. s. s. Mch. Tyr. Oestr.
 — „ *haemoptera* L. Deutschl.
 — „ *sanguinolenta* L. Deutschl.
 „ *marginalis* Dfts. Gl. s. Rhn. Thrg. Oestr. Pr.
 „ *gypsophilae* Kstr. Danzig.
 „ *Rossii* Ill. Rhn. Tyr.
 „ *limbata* L. Deutschl.
 „ *carnifex* F. Rhn. Pr. Hbg. Oestr. Frbg.
 — „ *marginata* L. Deutschl.
 — „ *analis* L. Deutschl.
 „ *Banksii* F. Deutschl.
 „ *opulenta* Fisch. Gl. Mhr. aus Moos n. s. gesiebt. 4—10.
 „ *lamina* F. Deutsch.
 — „ *molluginis* Dhl. Oestr. Thrg.
 „ *salviae* Grm. Oestr.
 — „ *geminata* Pk. Deutschl.
 „ *fucata* F. Deutschl.
 „ *4-gemina* Suffr. Gl. auf Hyper. perforat. manchmal h. 6—8.
 „ *cuprina* Dfts. Rhn. Oestr.
 — „ *varians* F. Deutschl.
 „ *Islandica* Grm. Auf dem Kamme des Riesengebirges. Gl. unter isländ. Moos n. s. Oestr.
 „ *fulgida* F. Deutschl.
 „ *graminis* L. Deutschl.
 — „ *fastuosa* L. Deutschl.
 „ { *menthae* Schott. Deutschl.
 „ { *menthastri* Suffr.
 — „ *cerealis* L. Deutschl.
 „ *relucens* Rosenhr. Tyr.
 „ *mixta* Kstr. Tyr.
 — „ *violacea* Pnz. Deutschl. Mhr.
 „ *americana* L. Oestr.
 — „ *staphyleae* L. Deutschl.
 — „ *polita* L. Deutschl.
 „ *lurida* L. Deutschl.
 „ *olivacea* Suffr. Gl. unter Moos s. 4.
 „ *squalida* Suffr. Gl. unter Moos s. 4.
 „ *punctata* Chl. Gl. auf Senecio gem. 6—8. Oestr.
 „ *calaliae* Schrk. Schles s. Rhn. Tyr. Oestr.
 „ *senecionis* Schum. Gl. auf Senecio gem. Tyr.

Chrysomela elongata Zettst. Steier. Alpen.

„ *monticola* Dfts. Tyr. Oestr.

„ *gloriosa* F. Schles. Mch. Tyr. Hbg. Frbg.

„ *alpicola* Hoppe. Schles. Oestr.

„ *phalerata* Ill. Schles. Oestr.

— „ *speciosa* Pnz. Schles.

„ *nivalis* Heer. Tyr. Oestr.

„ *melancholica* Heer. Oestr.

„ *intricata* Grm. Gl. auf *Senecio* z. h. 6—8.

„ *Peirolerii* Brullé. Oestr.

„ *melanocephala* Dfts. Oestr.

„ *vittata* Dhl. Gl. auf *Senecio* s. 8.

— *Lina populi* L. Deutschl.

— „ *tremulae* F. Deutschl.

— „ *cuprea* F. Deutschl.

— „ *aenea* L. Deutschl.

„ *Lapponica* L. Gl. Mhr. s. 6—8. Deutschl.

„ *20-punctata* Scop. Mhr. auf Weiden n. s. 4. Deutschl.

„ *collaris* L. Deutschl.

— „ *alpina* Zettst. Darkehmen in Pr.

„ *longicollis* Suffr. Bei Putzig in Pr. h.

Eutomoscelis adonidis F. Erl. Mch. Hbg. Oestr.

— *Gonioctena viminalis* L. Deutschl.

— „ *rufipes* DG. Deutschl.

— „ *affinis* Schh. Heutschl.

— „ *pallida* L. Deutschl.

— „ *5-punctata* F. Thrg. Pr.

„ *6-punctata* Pnz. Schles. Mhr. Han. Rhn. Mch. Oestr.

„ *aegrota* F. Hbg.

— „ *litura* F. Deutschl.

„ *triandrae* Suffr. Putzig in Pr. n. s.

Plagiodera armoraciae L. Deutschl.

Gastrophysa polygoni L. Deutschl.

„ *raphani* F. Gl. Mhr. n. s. 4 — 9. Erl. Han. Pr.

Thrg. Oestr.

— *Phratora vitellinae* L. Deutschl.

— „ *vulgatissima* L. Deutschl.

„ *tibialis* St. Schles. Thrg.

Phaedon Carniolicus Dfts. Gl. an sumpfigen Stellen h. Han. Rhn.

Tyr. Thrg. Oestr.

„ *pyritosus* Rossi. Deutschl.

„ *graminicola* Dfts. Mhr h. 5. Han. Kl. Rhu. Hbg. Oestr.

„ *sabulicola* Hbst. Han.

„ *grammicus* Dfts. Oestr.

„ *neglectus* Dj. Schles.

— „ *betulae* L. Deutschl.

- Phaedon egenus Zgl. Mhr. Kl. Pr. Tyr. Hbg.
 " salicinum Heer. Oestr.
 " {concinus Steph. Putzig i. Pr auf Triglochis maritimum.
 " {Triglochis Schaum. Halle.
 — Helodes marginella L. Deutschl.
 — " Hannoverana F. Deutschl.
 — " aucta F. Deutschl.
 — " phellandrii F. Deutschl.
 — " beccabungae Hellw. Deutschl.
 Colaphus sophiae Schall. Mhr. z. h. 5. Kl. Rhn. Pr. Thrg. Oestr.
 — Adimonia tanacetii L. Deutschl.
 — " rustica Schall. Deutschl.
 " Florentina Redtb. Mch. Tyr. Oestr.
 " interrupta Geoffr. Erl. Han. Rhn. Pr. Thrg. Oestr.
 " pallida Mgl. Thrg.
 " rufa Grm. Rhn. Oestr.
 " haematidea And. Pr. Oestr.
 " sanguinea F. Deutschl.
 " capreae L. Deutschl.
 — Gallereua viburni Pk. Deutschl.
 " nymphaeae F. Deutschl.
 " sagittariae Gyll. Rhn. Pr. Hbg. Thrg.
 — " lineola F. Deutschl.
 " Calmariensis L. Deutschl.
 " tenella F. Deutschl.
 Malacosoma Lusitanica Oliv. Tyr.
 — Agelastica alni L. Deutschl.
 " Halensis L. Deutschl.
 Phyllobrotica 4-maculata L. Gl. s. s. 6. Deutschl.
 " adusta Crtz. Oestr.
 — Luperus rufipes F. Deutschl.
 — " flavipes L. Deutschl.
 " coerulescens Dfts. Oestr.
 " pallipes Dj. Mhr. auf Viburn. lantana s. s. 5.
 " xanthopus Ill. Oestr.
 — " pinicola Andr. Deutschl.
 " circumfusus Mrsh. Gl. auf Genista tinctor. h. 6—8.
 Rhn. Oestr.
 — Haltica mercurialis F. Mhr. n. s. 4—9. Deutschl.
 " vitis Chvr. Baiern.
 " eruae Dfts. Gl. s. Rhn. Mch. Oestr.
 — " oleracea F. Deutschl.
 " consobrina Dfts. Oestr.
 " lythri Aubé. Gl. s. s.
 " transversa Mrsh. Gl. z. h. 6—8. Rhn. Hbg. Frbg. Augsb. g.
 " ferruginea Schr. Deutschl.

- Haltica impressa* F. Thrg. Oestr.
 — „ *rufipes* L. Deutschl.
 „ *melanostoma* Redtb. Oestr.
 „ *femorata* Dfts. Gl. Pr. Mch. Thrg. Oestr.
 „ *cyanescens* Dfts. Mch.
 „ *nigritula* Gyll. Gl. s. 6—8.
 — „ *nitidula* L. Deutschl.
 — „ *helxines* L. Deutschl.
 — „ *Modeeri* L. Deutschl.
 „ *ventralis* Ill. Rhn.
 „ *pubescens* E. H. Deutschl.
 „ *atropae* Mkl. Gl. auf Atrop. belladonna n. s. 6—8. Sachs.
 — „ *armoraciae* E. H. Deutschl.
 „ *tetrastigma* Knz. Schles.
 „ *brassicae* F. Deutschl.
 — „ *sinuata* Redtb. Deutschl.
 „ *excisa* Redtb. Rhn. Oestr. Mhr.
 „ *flexuosa* Ill. Deutschl.
 — „ *nemorum* L. Deutschl.
 „ *vittula* Redtb. Gl. Thrg. Oestr.
 „ *antennata* E. H. Erl. RhnHb g. Thrg. Oestr. Rgsbg. Schl.
 — „ *atra* F. Deutschl.
 „ *procera* Redtb. Mch. Oestr.
 — „ *lepidii* E. H. Deutschl.
 — „ *cyparissiae* E. H. Deutschl.
 „ *lutescens* Gyll. Han. Kl. Rhn. Pr. Frbg. Brl.
 — „ *euphorbiae* Schrk. Deutschl.
 „ *cyanella* Redtb. Rhn. Oestr.
 „ *palustris* Chvr. Erl.
 „ *coerulea* Pk. Deutschl.
 „ *campanulae* Redtb. Gl. Thrg. Oestr.
 „ *divaricata* Redtb. Oestr.
 — „ *rubi* Pk. Deutschl.
 „ *obtusata* Gyll. Rhn. Pr.
 „ *chrysanthemi* E. H. Deutschl.
 „ *fuscipes* F. Deutschl.
 „ *fuscicornis* L. Deutschl.
 „ *malvae* Ill. Erl. Rhn. Oestr. Pr. Rgsbg.
 „ *striatella* Ill. Mch.
- Longitarsus fuscoaeneus* Redtb. Oestr.
 „ *coerulea* Pk. Deutschl.
 „ *echii* E. Hft. Deutschl.
 „ *Linnaei* Dfts. Oestr.
 — „ *niger* E. H. Kl. Mch. Oestr.
 — „ *anchusae* Pk. Deutschl.
 „ *analisis* Crtz. Rhn. Tyr. Thrg. Oestr.

- Longitarsus** apicalis Beck. Mch.
 " Holsaticus L. Deutschl.
 " 4-pustulatus F. Erl. Han. Mch. Thrg. Rgsbg. Frbg.
 " dorsalis F. Erl. Rhn. Rgsbg.
 " sisymbrii F. Han. Mch. Rgsbg.
 " verbasci Pk. Schles. Kl. Rhn. Pr. Rgsbg. Frbg.
 " melanocephalus Gyll. Deutschl.
 " ochroleucus Mrsh. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Rgsbg.
 " nigriceps Redtb. Oestr.
 " lutescens Gyll. Oestr. Mch. Thrg.
 " tabidus F. Deutschl.
 " atricillus L. Deutschl.
 " brunneus Dfts. Oestr.
 " femoralis Mrsh. Gl. Mch. Tyr. Oestr.
 " nasturtii F. Deutschl.
 " pratensis Pnz. Deutschl.
 " longicornis Web. Schles. Han. Kl.
 " pusillus Gyll. Deutschl.
 " spretus Schpp. Brl.
 " luridus Oliv. Deutschl.
 " parvulus Pk. Deutschl.
Psylliodes dulcamarae E. H. Deutschl.
 " chalcomera Ill. Rhn. Thrg.
 " hyoscyami L. Deutschl.
 " ecalcarata Redtb. Oestr.
 " chrysocephala L. Deutschl.
 " picipes Redtb. Oestr.
 " alpina Redtb. Oestr.
 " melanophthalma Dfts. Oestr.
 " cyanoptera Ill. Hbg. Oestr. Brl.
 " rapae Ill. Deutschl.
 " cuprea E. H. Deutschl.
 " fuscicornis Ill. Oestr.
 " attenuata E. H. Erl. Mch. Tyr. Hbg.
 " serpylli Kn. Tyr.
 " cucullata Ill. Deutschl.
 " picea Redtb. Rhn. Oestr.
 " rufilabris E. H. Rhn. Mch. Oestr.
 " circumdata Redtb. Oestr.
 " affinis Pk. Deutschl.
 " propinqua Redtb. Oestr.
 " marcida Ill. Pr.
Plectroscelis semicoerulea E. H. Deutschl.
 " chlorophana Dfts. Oestr.
 " dentipes E. H. Deutschl.
 " tarda Mkl. Sächs. Schweiz.

- Plectroscelis Mannerheimii* Gyll. Schles. Mch. Oestr. Brl.
 „ *Salbergii* Gyll. Deutschl.
 — „ *aridella* Pk. Deutschl.
 — „ *aridula* Gyll. Deutschl.
 „ *angustula* Rosenhr. Tyr.
 „ *compressa* Letzn. Schles.
 — *Dibolia femoralis* Redtb. Kl. Mch. Thrg. Oestr. Hr. Dalmatien.
 „ *rugulosa* Redtb. Mch. Oestr.
 „ *cynoglossi* E. H. Deutschl.
 „ *cryptocephala* E. H. Mch. Tyr. Thrg. Oestr.
 „ *occultans* E. H. Deutschl.
Argopus hemisphaericus Dfts. Han. Rhn. Tyr. Oestr. Rgsb. Mgdb.
 — *Sphaeroderma testacea* Pnz. Deutschl.
 „ *cardui* Gyll. Dl. Rhn. Mch. Thrg. Oestr.
Apteropeda ovulum Ill. Thrg.
 — „ *ciliata* Oliv. Gl. n. s. Deutschl.
 „ *conglomerata* Ill. Erl. Mch. Hbg. Oestr. Sachsen. Kl.
 „ *caricis* Mkl. Gl. auf nassen Waldwiesen n. s. 6—8:
 Tyr. Thrg. Sachsen.
Mniophila muscorum E. H. Gl. in feuchtem Moos gem. 4—10.
 Han. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.
 — *Hispa atra* L. Deutschl.
Cassida equestris F. Deutschl.
 „ *hemisphaerica* Hbst. Deutschl. überall s.
 — „ *Austriaca* F. Deutschl.
 „ *vittata* F. Deutschl.
 — „ *Murraea* L. Deutschl.
 — „ *sanguinosa* Crtz. Deutschl.
 — „ *rubiginosa* Müll. Deutschl.
 „ *thoracica* Kug. Mhr. n. geschöpft. 4. 5. Deutschl.
 „ *rufovirens* Suffr. Rhn. Hbg. Thrg. Hr.
 — „ *vibex* L. Deutschl.
 „ *denticollis* Suffr. Gl. Mhr. z. s. 5—9. Deutschl.
 — „ *chloris* Suffr. Deutschl.
 „ *sanguinolenta* Müll. Deutschl.
 „ *lineola* Crtz. Schles. Oestr. Leipz. Frbg.
 „ *azurea* F. Mch. Tyr. Oestr. Sächs. Erzgebirge.
 „ *lucida* Suffr. Ems.
 — „ *margaritacea* Schall. Deutschl.
 „ *subreticulata* Mgl. Oestr.
 — „ *nobilis* L. Deutschl.
 — „ *oblonga* Ill. Deutschl.
 „ *Berolinensis* Suffr. Brl. Stettin s. s.
 — „ *obsoleta* Ill. Deutschl.
 — „ *ferruginea* F. Deutschl.
 — „ *nebulosa* L. Deutschl.

- Cassida atrata F. Schles. Mhr. Mch. Oestr.
 „ languida Cornelius. Elberfeld.

Erotyloidae.

- Engis sanguinicollis F. Mhr. unter Steinen s. 5. Deutschl.
 „ humeralis F. Gl. Mhr. unter Rinde an Schwämmen gem.
 Deutschl.
 „ rufifrons F. Deutschl.
 „ 2-pustulata F. Kl. Pr. Thrg. Oestr. Schles. in Schwämmen z. s. 5.
 Triplax Russica L. Deutschl.
 „ elongata Lacord. Oestr.
 „ ruficollis Steph. Rhn.
 „ aenea Pk. Gl. aus Schwämmen h. erzogen. Deutschl.
 „ bicolor Mrsh. Gl. in Schwämmen s. 7. Rhn. Oestr.
 „ rufipes Pnz. Han. Pr. Mch. Oestr.
 Tritoma 2-pustulata F. Deutschl.
 Alexia pilifera Müll. Deutschl.
 „ pilosa Pnz. Rhn. Thrg. Oestr. Kl.
 „ globosa St. Han. Mch. Oestr.
 Leiestes seminigra Gyll. Oestr.
 Orestia alpina Grm. Oestr.

Endomychoidea.

- Endomychus coccineus L. Gl. Mhr. an alten Stöcken h. Deutschl.
 Mycetina cruciata Schall. Gl. an Schwämmen alter Stöcke n. s.
 6—8. Erl. Han. Pr. Mch. Oestr. Tyr.
 Lycoperdina succincta L. Pr. Hbg. Oestr.
 „ bovistae F. Deutschl.
 Dapsa 3-maculata Motsch. Han. Kl.
 „ denticollis Grm. Oestr.

Securipalpes.

- Hippodamia 13-punctata L. Deutschl.
 „ 7-maculata F. Deutschl.
 Anisosticta 19-punctata L. Deutschl.
 Coccinella mutabilis Ser. Deutschl.
 „ livida D. G. Deutschl.
 „ Bothnica Gyll. Schles. Tyr.
 „ 2-punctata L. Deutschl.
 „ alpina Villa Mch. Tyr. Oestr.
 „ 11-notata Schn. Erl. Mch. Tyr. Oestr.
 „ 11-punctata L. Deutschl.
 „ 7-punctata L. Deutschl.
 „ magnifica Redtb. Mch. Oestr.
 „ hieroglyphica L. Deutschl.

- Coccinella* 14-punctata L. Deutschl.
 „ variabilis Ill. Deutschl.
 „ marginepunctata Schall. Deutschl.
 „ impustulata L. Deutschl.
 „ 12-pustulata F. Schles.
 „ 18-guttata L. Deutschl.
 „ oblongoguttata L. Deutschl.
 „ ocellata L. L. Deutschl.
 „ tigrina L. Deutschl.
 „ 14-guttata L. Deutschl.
 „ 10-guttata L. Deutschl.
 „ bis-7-punctata Schall. Deutschl.
 „ 16-guttata L. Deutschl.
 „ 12-guttata Poda. Deutschl.
 „ 14-punctata L. Deutschl.
 „ 22-punctata L. Deutschl.
 — *Micraspis* 12-punctata L. Deutschl.
 — *Chilocorus* renipustulatus Scr. Deutschl.
 „ 2-pustulatus L. Deutschl.
 — *Exochomus* 4-pustulatus L. Deutschl.
 „ auritus Scr. Deutschl.
Hyperaspis reppensis Hbst. Deutschl.
 „ 4-maculata Redtb. Oestr.
 „ campestris Hbst. Deutschl.
Epilachna Argus Fourc. Han. Rhn. Frbg. Pr. Hbg. Kl.
 „ chrysomelina F. Oestr.
 — *Lasia* globosa Schneid. Deutschl.
 „ impunctata L. Deutschl.
Novius cruentatus Muls. Brl. unter Rinde starker Kiefern. Danzig. Oestr.
Platynaspis villosa Fourc. Deutschl.
Scymnus nigrinus Kug. Deutschl.
 „ pygmaeus Fourc. Deutschl.
 „ marginalis Rossi. Han. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.
 „ flavicollis Redtb. Oestr.
 „ Apetzii Muls. Oestr.
 „ frontalis F. Deutschl.
 „ 4-lunulatus Ill. Deutschl.
 „ biverrucatus Pnz. Deutschl.
 „ Redtenbacheri Muls. Oestr.
 „ fasciatus Fourc. Hbg. Oestr. Dresden.
 „ abietis Pk. Deutschl.
 „ capitatus F. Hbg. Oestr.
 „ analis F. Deutschl.
 „ haemorrhoidalis Hbst. Gl. Mbr. Erl. Han. Thrg. Oestr.
 „ ater Kug. Deutschl.

- *Seymus discoideus* Ill. Deutschl.
- „ *minimus* Pk. Deutschl.
- „ *arcuatus* Rossi. Hbg.
- *Nundina litura* F. Deutschl.
- *Coccidula scutellata* Hbst. Deutschl.
- „ *rufa* Hbst. Deutschl.
- *Clambus pubescens* Redtb. Rhn. Thr. Oestr. Gl. aus trockenem
Laube n. s. gesiebt. 5.
- „ *armadillus* D. G. Deutschl.
- *Calyptomerus alpestris* Redtb. Oestr.
- *Microsphaera corticalis* Redtb. Oestr.
- *Orthoperus atomus* Gyll. Rhn. Pr.

Clypeastres.

- *Clypeaster pusillus* Gyll. Kl. Rhn. Tyr. Hbg. Pr. Oestr.
- *Gryphinus lateralis* Gyll. Thrg. Oestr. Pr.
- „ *piceus* Comolli. Hbg. Oestr.
- *Corylophus cassidiodes* Mrsh. Deutschl.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Zebe Gustav

Artikel/Article: [Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera 173-182](#)