

10. Die Farbe in zerstreuten Atomen, welche glanzlose kahle Flächen berühren, ist das schwächste Produkt der Farbezeugenden Kräfte.

Es wäre von Interesse, nach diesen Normen zunächst die Mediterran Fauna zu sichten.

## Nachträge

zum Käfer-Verzeichniss der Nieder-Elbe.

Von

**B. Endrulat** in Hamburg.

So mancherlei Mängel das von mir und H. Tessien im vorigen Jahre herausgegebene Verzeichniss der um Hamburg bisher gefundenen Käfer auch haben mag, so hat es in einer Beziehung doch schon unseren Absichten zu entsprechen angefangen. Es ist unleugbar seit seinem Erscheinen namentlich unter den jüngeren hiesigen Entomologen ein grösserer Eifer bemerkbar geworden, der sich natürlich zunächst nur auf die äusserliche Feststellung unsrer Käfer-Fauna erstrecken kann. In Folge dessen sind mir manche Funde mitgetheilt worden, von deren Richtigkeit ich mich überzeugt habe, manche Art ist auch von mir und meinen näheren Freunden neuerdings hier aufgefunden und endlich manche schon früher gefundene mit Sicherheit bestimmt worden. Die in der Februar-Nummer der Zeitung enthaltene Bemerkung unseres verehrten Vereinsmitgliedes Herrn Fr. Boie über *Mesosa*, die eine Beziehung auf unsern Katalog enthielt, veranlasste mich zunächst dazu, ihm mitzutheilen, dass auch hier im verflossenen Hochsommer zwei Exemplare von *Mesosa nebulosa* Fabr. an verschiedenen Orten gefangen sind, und veranlasst mich weiter zur Veröffentlichung sämmtlicher nachträglich hier aufgefundenen Arten, in der Meinung, dass, da ausser unserm Verzeichnisse meines Wissens kein anderer Anhalt für die hiesige Käferfauna vorhanden ist, eine solche Mittheilung nicht ohne einiges Interesse für die Gesamtheit sein möchte.

Nachzutragen sind:

- Amara brunnea* Gyll. (*Acrodon* Zimm.)
- Trechus palpalis* Dej.
- Bembidium nigricolle* Redt. (*Peryphus* Meg.)
- — *lunatum* Dfl. (*Peryphus* Meg.)
- — *ephippium* Marsh. (*Notaphus* Meg.)
- Laccophilus variegatus* Germ.

- Hydroporus bilineatus* Sturm.  
*Halipus fulvus* Fabr.  
*Megasternum boletophagum* Marsh.  
*Catops anisotomoides* Spence.  
*Scydmaenus collaris* M. et K.  
 — — *tarsatus* M. et K.  
*Bryaxis Lefeburei* Aubé.  
 — — *impressa* Panz.  
*Bythinus nodicornis* Aubé.  
*Trimium brevipenne* Chand.  
*Euplectus signatus* Reich.  
*Myrmedonia humeralis* Grav. Unter Ameisen.  
*Gymnusa laticollis* Er.  
*Conurus bipustulatus* Grav.  
*Staphylinus chalcocephalus* Panz. Unter Kuhmist und Laub.  
*Ocypus falcifer* Nordm.  
*Philonthus splendidulus* Grav.  
*Bledius dissimilis* Er.  
*Anthophagus abbreviatus* Fabr.  
*Hister* 14—*striatus* Gyll.  
*Saprinus virescens* Payk. Ausschliesslich unter trockenem Menschen-  
 koth in Sandgegenden.  
*Abraeus granulum* Er.  
*Brachypterus gravidus* Ill.  
*Carpophilus* 4—*signatus* Er.  
*Epuraea silacea* Herbst.  
 — — *melina* Er.  
 — — *pygmaea* Gyll.  
*Rhizophagus nitidulus* Fabr.  
 — — *politus* Kelln.  
 — — *parvulus* Payk.  
*Cryptophagus scanicus* Linn.  
*Atomaria pusilla* Payk.  
*Ephistemus dimidiatus* Sturm. Im Moose.  
*Agrilus quercinus* Redt.  
*Microrhagus pygmaeus* Fabr. Bei Holzstapeln fliegend gefangen.  
*Cardiophorus cinereus* Herbst.  
*Diacanthus metallicus* Payk. Von *Sorbus aucuparia* Linn.  
*Cyphon deflexicollis* Müll.  
*Charopus pallipes* Oliv.  
*Hypophloeus linearis* Gyl.  
*Hypulus bifasciatus* Fabr. 1 Exemplar an einem morschen mit  
 Schwämmen bedeckten Weidenstamm.  
*Pyrochroa rubens* Fabr.  
*Bruchus variegatus* Germ.  
*Tropideres sepicola* Herbst. Auf Eichengebüsch.

- Rhamphus flavicornis* Clairv.  
*Sitones medicaginis* Redt.  
 — — *discoideus* Schönh.  
 — — *promptus* Schh.  
*Phyllobius calcaratus* Fabr.  
*Lixus turbatus* Schh.  
*Eirrhinus scirpi* Fabr.  
*Hydronomus alismatis* Marsh.  
*Elleschus scanicus* Payk.  
*Sibynes canus* Herbst.  
*Acalyptus carpini* Herbst.  
*Phytobius granatus* Schh.  
*Orchestes fagi* Linn.  
 — — *stigma* Germ.  
*Styphlus setiger* Germ.  
*Baridius chloris* Fabr.  
*Coeliodes rubicundus* Payk.  
 — — *guttula* Fabr.  
*Acalles lemur* Germ.  
*Sitophilus oryzae* Linn.  
*Hylurgus ligniperda* Fabr.  
*Bostrichus curvidens* Germ.  
 — — *chalcographus* Linn.  
*Pogonocherus ovalis* Gyll.  
*Mesosa nebulosa* Fabr.  
*Stenostola nigripes* Fabr. Von jungen Linden und Sahlweiden  
 (*Salix caprea* L.)  
*Oberea pupillata* Schh.  
 — — *linearis* Linn. Auf Haselsträuchern.  
*Toxotus meridianus* Linn.  
*Leptura scutellata* Fabr. Mehrfach auf Brombeerblüthen, auch  
 auf Holzstapeln.  
*Sphaeroderma testacea* Panz.  
 — — *cardui* Gyll.  
*Exochomus auritus* Scriba.  
*Scymnus marginalis* Rossi.  
*Halycia 12-guttata*. Pod. (*Vibidia* Muls.) Von Eichen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Endrulat B.

Artikel/Article: [Nachträge zum Käfer-Verzeichniss der Nieder-Elbe. 185-187](#)