

## Käferfunde der Jahre 1996 und 1997 aus Hessen

9. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen <sup>1)</sup>

ULI BRENNER

### Summary

Faunistic records of 121 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 74 are dealt with as endangered species in the Red Book of Animals of Germany. Two species are new to Germany and nine species are recorded as new to Hesse.

### Zusammenfassung

Es werden 121 Fundmeldungen aus 34 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen 3 Arten nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (1998) als vom Aussterben bedroht (1), 27 Arten als stark gefährdet (2) und 43 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. Acht weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste (V), eine Art weist eine geographische Restriktion (R) und eine weitere Art eine defizitäre Datenlage (D) auf, so daß keine Einstufung möglich ist. Zwei Arten werden als Neunachweise für Deutschland (*Melanophthalma sericea* (MANNERHEIM), *Noxius curtirostris* (MULSANT)) und neun Arten als Neunachweise für Hessen angesehen: *Baeocrara japonica* (MATTHEWS), *Siagonium humerale* GERMAR, *Gabrius astutus* (ERICHSON), *Ocypus macrocephalus* (GRAVENHORST), *Nephus bisignatus claudiae* FÜRSCH, *Corticeus bicoloroides* (ROUBAL), *Phratora atrovirens* (CORNEL), *Longitarsus membranaceus* (FOUDRAS), *Ceutorhynchus pumilio* (GYLLENHAL).

Etwa 40 % der hier als faunistisch interessant mitgeteilten Arten aus Hessen leben in Totholz, die anderen Arten sind entweder phytophag (ca. 14 %), mycetophag (ca. 7 %) oder ernähren sich räuberisch (ca. 40 %).

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten die Gefährdungskategorie nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 1998) (= RL D), bei abweichender Einstufung der Carabiden zusätzlich auch nach MALTEN (1998) (= RL Hessen) geklammert angegeben [(RL D)/(RL Hessen)]. Auch in diesen Bericht wurden wieder Funde aus teilweise weit zurückliegenden Jahren aufgenommen, wenn deren Bedeutung erst jetzt erkannt wurde.

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Horst BATHON (Roßdorf), Günter BORNHOLDT (Schlüchtern), Uli BRENNER (Frankfurt am Main), Günter FLECHTNER (Frankfurt am Main), Matthias ERNST (Alsbach), Johannes FRISCH (Gießen), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Günter HOFMANN (Stockstadt), Damir KOVAC (Frankfurt am Main), Andreas MALTEN (Dreieich), Carsten MORKEL (Butzbach), Bernd NAUMANN (Gunzenhausen), Andreas SCHMIDT (Wetzlar) und Martin SCHROTH (Hanau).

<sup>1)</sup> 8. Bericht in: Hess. faun. Briefe 17(2/3): 45-59, 1998.

## Carabidae

- Carabus coriaceus* LINNAEUS: Soisberg bei Hohenroda/Rhön (NB 62), 1 Expl. unter Totholz in Buchenwald, 15.8.1997, leg. NAUMANN. – Schellnhäusen/Vogelsberg (NB 11), 1 Expl. unter Meterholzstapel in Buchenwald, Mai 1996, leg. NAUMANN. Die Art ist in Hessen im allgemeinen zwar recht häufig, wird aber in den Mittelgebirgen, insbesondere im Vogelsberg (SCHERF 1968, SCHERF & DRECHSEL 1971), nur selten gefunden.
- Carabus cancellatus* ILLIGER: Nähe Schotten-Eichelsachsen (NA 08), vom 22.4.-6.5.1995 insgesamt 7 Expl. auf Mähwiese, 15 Expl. in Weizenfeld und 9 Expl. an einer Straßenböschung in Bodenfallen, und vom 27.6.-11.7.1995 insgesamt 2 Expl. auf Mähwiese und 34 Expl. in Haferfeld ebenfalls in Bodenfallen, leg. SCHMIDT. (V)
- Carabus arvensis* HERBST: Amöneburg, Brücker Wald (MB 92), 1 Expl. unter Moos auf Totholz, April 1996, leg. NAUMANN. (V)/(3)
- Nebria livida* (LINNAEUS): Groß-Gerau (MA 63), 2 Expl. an Tümpelrand, 16.9.1997, leg. HÖHNER. (3)
- Brosicus cephalotes* LINNAEUS: Homberg/Ohm (NB 02), 5 Expl. in Sandgrube unter Steinen im Uferbereich der Tümpel, 19.7.1997, leg. NAUMANN. (V)/(2)
- Bembidion gilvipes* STURM: Groß-Gerau (MA 63), 2 Expl. in Hochwassergnist, 1.3.1997, leg. HÖHNER. (V)/(zur Zeit nicht gefährdet)
- Bembidion azurescens* (DALLA TORRE): Homberg/Ohm (NB 02), 1 Expl. in Sandgrube im Uferbereich eines Tümpels, 19.7.1997, leg. NAUMANN, det. BUCK. (2)
- Diachromus germanus* (LINNAEUS): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), alle Expl. in Bodenfallen in Gebüschnähe auf Enzian-Schillergrasrasen auf Basalt oder Magerer Fettweide (*Lolium-Cynosuretum*), insgesamt 7 Expl. im April, Mai, Juli und November 1996 sowie im März 1997, leg. MORTEL. – Vogelsberg, Breungeshain (NA 19), 1 Expl. in Bodenfalle auf Borstgrasrasen, 24.6.-1.7.1996, leg. FRISCH und MORTEL (in coll. FRISCH). (keine Einstufung)/(3)
- Harpalus signaticornis* (DUFTSCHMID): Gießen-Allendorf (MB 70), 1 Expl. auf Therophyten-Magerrasen am Hoppenstein in Bodenfalle, Juni 1995, leg. SCHMIDT. (keine Einstufung)/(3)
- Ophonus stictus* STEPHENS: Ronneburg-Hüttengesäß (NA 06), 1 Expl. in Bodenfalle an Wegrain zwischen Getreidefeldern, 29.7.1994, leg. BORNHOLDT, det. BRENNER. (D)/(2)
- Pterostichus quadrioveolatus* LETZNER: Nähe Rauschenberg-Bracht, Burgwald (MB 84), 4 Expl. unter Steinen in Sandgrube, 16.8.1998, leg. NAUMANN. (V)
- Pterostichus cristatus* (DUFOR): Homberg/Ohm, Hartdtschlucht (NB 01), 3 Expl. unter Steinen am Rand eines Fichtenforstes, 5.10.1997, leg. NAUMANN. (keine Einstufung)/(V)
- Platynus longiventris* (MANNERHEIM): Riedstadt, Kühkopf (MA 51), 5 Expl. unter toter Rinde, 26.2.1996, leg. HÖHNER. (2)
- Platynus livens* (GYLLENHAL): Groß-Gerau (MA 63), 1 Expl. an Tümpelrand, 24.8.1996, leg. HÖHNER. (3)
- Chlaenius nigricornis* (FABRICIUS): Homberg/Ohm (NB 02), 1 Expl. in Lehmgrube im Uferbereich eines Tümpels, 18.5.1997, leg. NAUMANN. (V)/(3)
- Panagaeus cruxmajor* (LINNAEUS): Homberg/Ohm (MB 91), 5 Expl. im Uferbereich des Schächchenbachs unter einem Weidenpfosten, 26.2.1997, leg. NAUMANN. (V)/(3)
- Philorhizus sigma* (ROSSI): Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. an Schilf, leg. HÖHNER. (V)/(3)

## Dytiscidae

*Nartus grapii* (GYLLENHAL): Hanau, Klein-Auheim (MA 95), 1 Expl. am 15.10.1983 und 4 Expl. am 21.9.1984 auf überschwemmter Sumpfwiese, leg. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen von vor 1950** vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)!

*Rhantus consputus* STURM: Groß-Gerau (MA 63), 1 Expl. in lehmigem Tümpel, 24.8.1996, leg. HÖHNER. (2)

*Dytiscus circumflexus* FABRICIUS: Groß-Gerau (MA 63), 1 Expl. in lehmigem Tümpel, 24.8.1996, leg. HÖHNER.

## Hydraenidae

*Limnebius papposus* MULSANT: Wiesbaden-Schierstein (MA 44), 1 Expl., 30.4.1923, in coll. HÖHNER befindet sich dieses Exemplar. Es ist bislang das einzige hessische Stück dieser Art aus dem 20. Jahrhundert, die aus Hessen bislang **nur von sehr alten Funden aus dem 19. Jahrhundert bekannt** war (HEYDEN 1904, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)! Der Sammler ist unbekannt. (3)

*Limnebius atomus* (DUFTSCHMID): Groß-Gerau (MA 63), 2 Expl. am 25.9.1982 in Moos und 3 Expl. am 30.4.1983 an einem Tümpelrand, leg. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen aus dem 19. Jahrhundert** vor (HEYDEN 1904, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)! (3)

## Histeridae

*Plegaderus dissectus* ERICHSON: Groß-Gerau (MA 63), 5 Expl. an verpilztem Roßkastanienholz, 16.9.1997, leg. HÖHNER. (3)

*Hister quadrinotatus* SCRIBA: Neuberg bei Hanau (NA 06), 1 Expl. an Rübenmiete, 2.4.1997, leg. HÖHNER. – Erlensee (MA 95), 1 Expl. an Rübenmiete, 25.4.1997, leg. HÖHNER. (3)

## Cholevidae

*Anemadus strigosus* (KRAATZ): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. in Eichenmulm, 29.5.1996, leg. HÖHNER. (2)

## Ptiliidae

*Baeocrara japonica* (MATTHEWS): Schlüchtern (NA 37), 5 Expl. in altem Heu in Ufernähe der Kinzig in Gesellschaft von *Nephanes titan* (NEWMAN), 13.9.1997, leg. FLECHTNER.

Diese Adventivart, die vorher nur aus Japan und von den Philippinen bekannt war, tauchte in Europa 1974 zuerst in Finnland und 1976 in Schweden auf (LOHSE 1989). 1992 wurde sie erstmals in Mitteleuropa in Rankweil (Vorarlberg, Österreich) festgestellt (KÖHLER 1998). Im Juni 1997 konnte sie dann in Deutschland an Mosel (Cochem-Cond) und Mittelrhein (Rheinbrohl) nachgewiesen werden (KÖHLER 1998). Auch aus Schleswig-Holstein scheint die Art vorzuliegen (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Der Fund aus Schlüchtern stellt einen **Neunachweis für Hessen** dar!

## Staphylinidae

*Siagonium humerale* GERMAR: Frankfurt, Enkheimer Wald (MA 85), 2 Expl. unter der teilweise noch saftenden Rinde einer dicken, entwurzelten Hainbuche, 6.4.1997, leg. FLECHTNER. In Deutschland ist die Art nur aus Aschaffenburg (Bayern) gemeldet worden (BATHON 1992, ELBERT 1994). Weitere mitteleuropäische

- Vorkommen liegen in Österreich (HORION 1963). Der Fund von Frankfurt stellt einen **Neunachweis für Hessen** dar!
- Phloeonomus bosnicus* BERNHAUER: Riedstadt, Kühkopf (MA 51), 1 Expl. unter Rinde, 26.2.1996, leg. HÖHNER.
- Medon piceus* (KRAATZ): Mainhausen-Zellhausen (MA 94), 1 Expl. an *Calluna vulgaris* (L.) HULL, 22.3.1997, leg. HÖHNER. (3)
- Gabrius astutus* (ERICHSON): Darmstadt (MA 72), 1 Expl. im Autokäscher, 16.3.1972, leg. VOGT, in coll. HÖHNER. Bei diesem Exemplar handelt es sich um den **ersten sicheren Nachweis aus Hessen** (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)!
- Ocybus macrocephalus* (GRAVENHORST): Soisberg bei Hohenroda/Rhön (NB 62), 1 Expl. unter Totholz in Buchenwald, 15.8.1997, leg. NAUMANN, det. BUCK, in coll. BUCK. Nach HORION (1965) ist die Art in den Mittelgebirgen des östlichen Mitteleuropa verbreitet. In Deutschland dringt sie im Westen bis in den Thüringer Wald, den Harz und das Wesergebirge vor. In der Rhön war sie bislang nur auf dem bayerischen Kreuzberg gefunden worden. Somit stellt der Fund aus der nördlichen Rhön einen **Neunachweis für Hessen** dar!
- Mycetoporus forticornis* FAUVEL: Mainhausen-Zellhausen (MA 94), 1 Expl. an *Calluna vulgaris* (L.) HULL, 22.3.1997, leg. HÖHNER.
- Lamprinodes saginatus* (GRAVENHORST): Vogelsberg, Breungeshain, Gackerstein (NA 19), 2 Expl. in Bodenfalle, 24.6.-8.7.1996, leg. FRISCH und MORKEL (in coll. FRISCH).
- Encephalus complicans* STEPHENS: Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. in Bodenfalle in Hecke, 16.8.1996, leg. MORKEL.
- Gyrophana rousi* DVORAK: Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 3 Expl. an Pilz, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (2)
- Gyrophana polita* (GRAVENHORST): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 2 Expl. an Pilz, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (3)
- Agaricochara latissima* (STEPHENS): Gettenbach (NA 16), 3 Expl. an Weiden-Porling, 25.1.1997, leg. HÖHNER. (3)
- Aloconota insecta* (THOMSON): Bad Nauheim-Wisselsheim (MA 88), 1 Expl. in Uferschotter, 17.8.1996, leg. HÖHNER.
- Aloconota ultima* (BENICK & LOHSE): Groß-Gerau (MA 63), 3 Expl. am Rand eines Tümpels, 16.9.1997, leg. HÖHNER. (2)
- Liogluta granigera* (KIESENWETTER): Vogelsberg, Breungeshain, Oberwald (NA 19), 3 Expl. in Bodenfallen in Buchenbestand, 24.6.-8.7.1996, leg. FRISCH und MORKEL (in coll. FRISCH).
- Liogluta wuesthoffi* (BENICK): Vogelsberg, Breungeshain, Oberwald (NA 19), 4 Expl. in Bodenfallen in Fichtenforst, 24.6.-8.7.1996, leg. FRISCH und MORKEL (in coll. FRISCH).
- Atheta sequanica* BRISOUT: Groß-Gerau (MA 63), 4 Expl. am Rand eines Tümpels, 24.8.1996, leg. HÖHNER.
- Zyras laticollis* (MÄRKEL): Nähe Hanau (MA 95), 2 Expl. in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 17.5.1984, leg. SCHROTH, in coll. HÖHNER. – Mühlheim-Dietesheim (MA 95), 1 Expl. in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 28.8.1984, leg. SCHROTH, in coll. HÖHNER. – Frankfurt, Enkheimer Ried (MA 85), ), 1 Expl. in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 11.12.1984, leg. SCHROTH, in coll. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen aus dem 19. Jahrhundert** vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)!
- Lomechusa emarginata* (PAYKULL): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. in Bodenfalle auf Enzian-Schillergasrasen auf Basalt, 21.6.1996, leg. MORKEL.

*Thiasophila inquilina* (MÄRKEL): Mühlheim-Lämmerspiel (MA 94), 1 Expl. in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 9.7.1983, leg. SCHROTH, in coll. HÖHNER. – Frankfurt, Seckbacher Ried (MA 85), in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 14.6.1985, leg. SCHROTH, in coll. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen aus dem 19. Jahrhundert** vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)! (2)

### **Pselaphidae**

*Bryaxis nodicornis* (AUBÉ): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. in Bodenfalle in Gebüsch, 26.7.1996, leg. MORKEL.

*Claviger testaceus* PREYSSLER: Steinau an der Staße (NA 37), 1 Expl. in Ameisennest, 4.6.1972, leg. HÖHNER. – Roßdorf, Roßberg (MA 82), 2 Expl. unter einem Stein, 1.10.1988, leg. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen aus dem 19. Jahrhundert** vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)! (3)

### **Malachiidae**

*Troglops albicans* (LINNAEUS): Lorch (MA 14), 1 Expl. an Eichen-Ast, 27.7.1996, leg. HÖHNER. (3)

*Ebaeus thoracicus* (FOURCROY): Lorch (MA 14), 1 Expl. an Eichenast, 3.7.1997, leg. HÖHNER. (3)

### **Cleridae**

*Opilo domesticus* STURM: Alsbach, Katharinenberg (MA 71), 1 Expl. an Licht 20.8.1997, leg. ERNST, det. BATHON. (2)

*Necrobia ruficollis* (FABRICIUS): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. am Licht auf magerer Fettweide (*Lolium-Cynosuretum*), 19.8.1996, leg. MORKEL.

### **Trogositidae**

*Tenebroides fuscus* (GOEZE): Groß-Gerau (MA 63), 1 Expl. unter Eichenrinde, 1.3.1997, leg. HÖHNER. (2)

### **Elateridae**

*Ampedus rufipennis* (STEPHENS): Groß-Gerau (MA 63), 2 Expl. an verpilztem Roßkastanienholz, 16.9.1997, leg. HÖHNER. (2)

*Ampedus brunnicornis* GERMAR: Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 2 Expl. in Eichenmulm, 29.5.1996, leg. HÖHNER. (1)

*Ampedus nigerrimus* (LACORDAIRE): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. in Eichenmulm, 29.5.1996, und 1 Expl. an Eichenstamm, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (3)

*Anostirus castaneus* (LINNAEUS): Vogelsberg, Hoherodskopf (NA 19), 1 Expl. 11.6.1996, leg. MORKEL.

*Stenagostus rufus* (DEGEER): Alsbach, Katharinenberg (MA 71), 2 Expl. am Licht, 12.7. und 18.7.1997, leg. ERNST, det. BATHON. (3)

*Stenagostus rhombeus* (OLIVIER): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. am Licht auf magerer Fettweide (*Lolium-Cynosuretum*) in der Nähe eines Eichen-Hainbuchenwaldes, 7.8.1996, leg. MORKEL. (3)

### **Eucnemidae**

*Eucnemis capucina* AHRENS: Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. in einem Eichen-Hainbuchenwald von Hainbuchen-Altholz geklopft, 2.8.1996, leg. MORKEL. (3)

*Dirhagus lepidus* (ROSENHAUER): Frankfurt am Main, Stadtwald (Oberrad) (MA 84), 3 Expl. an einem dickem, rindenlosem Ast einer liegenden, toten, während der 1990er-Orkane gefällten Buche, 29.5.1997, leg. FLECHTNER. (3)

## **Buprestidae**

*Agrilus guerini* LACORDAIRE: Hanau-Steinheim (MA 95), 2 Expl. an *Salix caprea* L., 22.6.1996, ein weiteres Stück wurde aus einem eingetragenen Ast gezogen, es schlüpfte am 15.9.1996, leg. HÖHNER. (3)

*Agrilus subauratus* GEBLER: Hanau-Steinheim (MA 95), 1 Expl. am 5.8.1996, 3 Expl am 6.6.1997, 2 Expl. am 11.6.1997 und 1 Expl. am 28.6.1997 an *Salix caprea* L., leg. HÖHNER. (3)

*Aphanisticus emarginatus* (OLIVIER): Hanau-Steinheim (MA 95), 1 Expl. in *Sphagnum*, 9.5.1997, leg. HÖHNER. (3)

## **Cerylonidae**

*Philothermus evanescens* (REITTER): Groß-Gerau (MA 63), 13 Expl. an verpilztem Roßkastanienholz, 16.9.1997, leg. HÖHNER. (1)

## **Erotyliidae**

*Triplax lepida* (FALDERMANN): Groß-Gerau (MA 63), jeweils 2 Expl. an trockenen Ästen und am Schuppigen Porling (*Polyporus squamosus* (HUDS. ex FR.) FR.), 14.5.1977, leg. HÖHNER. Die einzigen weiteren Funde dieses Pilzkäfers aus diesem Jahrhundert stammen aus Lampertheim (BRENNER 1997). (2)

## **Cryptophagidae**

*Cryptophagus labilis* ERICHSON: Frankfurt, Enkheimer Wald (MA 85), 3 Expl. im morschem Holz eines Hainbuchen-Dürrständers (15-20 cm Durchmesser), 6.9.1997, leg. FLECHTNER.

## **Latridiidae**

*Melanophthalma sericea* (MANNERHEIM): Hanau (MA 95), 1 Expl. an *Chenopodium album* L., 9.9.1996, leg. HÖHNER. Die bisher bekannten Vorkommen dieser Art liegen in Portugal, Südfrankreich, Italien, Griechenland, der Schweiz, der Tschechoslowakei, dem Libanon, Iran und Afghanistan (RÜCKER 1992). Sie ist somit **neu für Deutschland!** Der Fund stellt das bislang nördlichste Vorkommen der Art dar.

## **Mycetophagidae**

*Mycetophagus populi* FABRICIUS: Vogelsberg, Hoherodskopf (NA 19), 1 Expl. am Licht, 4.6.1996, leg. MORTEL. (2)

## **Colydiidae**

*Colydium elongatum* (FABRICIUS): Groß-Gerau (MA 63), 2 Expl. unter Eichenrinde, 1.3.1997, leg. HÖHNER. (3)

## **Corylophidae**

*Orthoperus nigrescens* STEPHENS: Lorch (MA 14), 1 Expl. an Eichenast, 27.7.1996, leg. HÖHNER. (2)

## **Endomychidae**

*Endomychus coccineus* (LINNAEUS): Biblis (MA 60), 1 Expl. am Licht, 2.8.1985, leg. KRISTAL, in coll. BATHON. – Messel (MA 83), 1 Expl. an Eichen-Ast, 22.5.1993, leg. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen von vor 1950** vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)!

## Coccinellidae

*Scymnus ater* KUGELANN: Umgebung Echzell (MA 98), 3 Expl. an *Salix*-Stamm, 3.7.1996, leg. HÖHNER. (2)

*Nephus bisignatus claudiae* FÜRSCH: Lorch, Nollig (MA14), 1 Expl. von grasigem Weinbergsweg gekäschert, 15.6.1996, leg. HOFMANN, det. FÜRSCH, in coll. HOFMANN. Die Nominatform (*N. bisignatus bisignatus* BOHEMAN) dieser Art findet sich in Deutschland in Küstennähe nicht selten auf Kraut- und Zwergstrauchvegetation (FÜRSCH 1967, HORION 1961). Die ssp. *claudiae* konnte bisher nur am Kaiserstuhl (Baden-Württemberg) nachgewiesen werden (FÜRSCH 1984). Damit stellt der Fund vom Nollig einen **Neunachweis für Hessen** dar! (R)

*Coccinella hieroglyphica* LINNAEUS: Mainhausen-Zellhausen (MA 94), 2 Expl. an *Calluna vulgaris* (L.) HULL, 22.3.1997, leg. HÖHNER. (3)

## Anobiidae

*Oligomerus ptilinoides* (WOLLASTON): Darmstadt (MA 72), mehrere Exemplare aus Möbeln, die vor etwa einem Jahr von Italien nach Deutschland gebracht worden waren. 16.7.1997, leg. BATHON.

*Gastrallus laevigatus* (OLIVIER): Lorch (MA 14), 1 Expl. an Eichenast, 16.6.1997, leg. HÖHNER. Zum ersten Mal nicht an Walnuß! (2)

*Dorcatoma robusta* STRAND: Dreieich (MA 74), 6 Expl. an Baumpilz einer Birke in Gesellschaft von *Bolitochara obliqua* ERICHSON, *Placonotus testaceus* (FABRICIUS), *Enicmus rugosus* HERBST, *Litargus connexus* (FOURCROY), *Rhopalodontus perforatus* (GYLLENHAL), *Bolitophagus reticulatus* (LINNAEUS) und *Taphrorychus bicolor* HERBST, 4.6.1996, leg. MALTEN, in coll. BRENNER. (2)

## Oedemeridae

*Oedemera femoralis* OLIVIER (= *Oncomera femorata* FABRICIUS): Alsbach, Katharinenberg (MA 71), mehrere Expl. an Licht 1.11.1996 und 3.5.1997 (davon je 1 Belegexpl.), leg. ERNST, det. BATHON. - Ebenfalls von Alsbach (Schloß) wird das wohl erste in Hessen gesammelte Exemplar gemeldet (SCRIBA 1869). Die Tiere werden nur sehr vereinzelt gefangen, da sie nachtaktiv sind und Lichtfang bei Koleopterologen nur recht selten betrieben wird. HORION (1956) kennt nur alte Funde bis 1903 aus Hessen; neuere Funde scheinen zu fehlen. (2)

## Scaptiidae

*Scaptia fuscula* MÜLLER: Lorch, (MA 14), 1 Expl. an Eichenast, 3.7.1997, leg. Höhner. - Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 1 Expl. an Eichenstamm, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (3)

*Anaspis costai* ERMISCH: Lorch (MA 14), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 13.7.1996, leg. HÖHNER. (3)

## Melandryidae

*Orchesia fasciata* (ILLIGER): Lorch (MA 14), 1 Expl. an Kirschbaumrinde, 13.7.1996, leg. HÖHNER. (3)

*Anisoxia fuscula* (ILLIGER): Lorch (MA 14), 1 Expl. an Eichenast, 3.7.1997, leg. HÖHNER. (3)

*Conopalpus brevicollis* KRAATZ: Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. in Eichen-Hainbuchenwald von Hainbuchen-Altholz geklopft, 26.6.1996, leg. MORTEL. (2)

### Alleculidae

- Allecula morio* (FABRICIUS): Lorch, Nollig (MA14), 1 Expl. von Eiche geklopft, 3.8.1996, leg. BRENNER. (3)  
*Allecula rhenana* BACH: Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 1 Expl. an Eichenstamm, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (2)  
*Cteniopus flavus* (SCOPOLI): Lorch (MA 14), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 13.7.1996, leg. HÖHNER. (3)

### Tenebrionidae

- Bolitophagus reticulatus* (LINNAEUS): Rodenbach bei Hanau (NA 05), 1 Expl. an Buchenstamm, 16.1.1996, leg. HÖHNER. – Messel (MA 83), 1 Expl. in *Fomes*, 26.10.1996, leg. HÖHNER. (3)  
*Corticium bicoloroides* (ROUBAL): Frankfurt, Enkheimer Wald (MA 85), 3 Expl. im morschem Holz eines Hainbuchen-Dürrständers (15-20 cm Durchmesser), 6.9.1997, leg. FLECHTNER. Diese Art wurde bisher von Niedersachsen und Brandenburg bis Tirol nachgewiesen (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, SCHAWALLER & GRIMM 1992). Für Hessen lag aber bislang noch keine Meldung vor, weshalb die Art hier als **Neunachweis für Hessen** eingestuft wird!  
*Tenebrio obscurus* FABRICIUS: Hornberg/Ohm, Ober-Ofleiden (MB 92), 1 Expl. im Hausflur der Alten Mühle, 14.7.1996, leg. NAUMANN, vid. BUCK, in coll. BUCK.

### Scarabaeidae

- Polyphylla fullo* (LINNAEUS): Alsbach, Katharinenberg (MA 71), 1 Expl. an Licht 14.7.1997, leg. ERNST. (2)

### Cerambycidae

- Rhamnusium bicolor* (SCHRANK): Lampertheimer Wald (MV 69), insgesamt etwa 10 Expl. in einer morschen Stelle in Buchenstamm, 31.5.1997, leg. BRENNER, FLECHTNER, HÖHNER, KOVAC. (2)  
*Leptura sexguttata* FABRICIUS (nach BENSE (1995) in der Gattung *Anoplodera*): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte an besonntem Waldrand, 10.6.1996, leg. MORKELE. (3)  
*Leptura scutellata* FABRICIUS: Mörfelden, Mönchbruch (MA 63), 1 Expl. an Buchenstamm, 11.6.1996, leg. HÖHNER. (3)  
*Ropalopus spinicornis* (ABEILLE): Lampertheimer Wald (MV 69), 1 Expl. auf dem Boden in Eichenwald, 31.5.1997, leg. BRENNER. (2)  
*Xylotrechus arvicola* (OLIVIER): Lorch (MA 14), 1 Expl. an *Crataegus*-Holz, 13.7.1996, leg. HÖHNER. (2)  
*Chlorophorus sartor* (MÜLLER): Lorch, Nollig (MA14), am 13.7.1996 (leg. HÖHNER) 1 Expl. von Wiese gekäschert, am 3.8.1996 (leg. BRENNER) 2 Expl. auf Umbelliferen-Blüte. (3)  
*Anaesthetis testacea* (FABRICIUS): Mörfelden, Mönchbruch (MA 63), 1 Expl. an trockenem Weidenast, 13.6.1997, leg. HÖHNER. (3)  
*Exocentrus adpersus* MULSANT: Lorch, Nollig (MA14), am 6.7.1991 2 Expl. und am 3.8.1996 1 Expl. von Eiche geklopft, leg. BRENNER. (3)  
*Menesia bipunctata* (ZOUBKOFF): Mörfelden, Mönchbruch (MA 63), 2 Expl. von *Rhamnus frangula* L., 13.6.1997, leg. HÖHNER. (3)

## Chrysomelidae

- Zeugophora frontalis* SUFFRIAN: Hanau (MA 95), am 9.9.1996 erst 2 Expl., am 16.9.1996 noch einmal 3 Expl. und am 5.9.1997 schließlich 1 Expl. von *Populus tremula* L. geklopft, leg. HÖHNER. (2)
- Phratora atrovirens* (CORNEL): Nähe Hanau (MA 95), 1 Expl. unter Kastanien-Rinde, 15.1.1972, leg. HÖHNER. – Gründau-Gettenbach (NA 16), 1 Expl. an *Populus tremula* L., 18.8.1979, leg. HÖHNER. – Obertshausen (MA 84), 1 Expl. an trockenem Ast, 23.7.1988, leg. HÖHNER. – Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 1 Expl. auf einem trockenen Weiden-Ast, 9.8.1993, leg. HÖHNER. Diese einige Zeit zurückliegenden, aber bislang nicht publizierten Funde stellen **die ersten sicheren Nachweise für Hessen** dar!
- Aphthona violacea* (KOCH): Groß-Gerau (MA 63), 12 Expl. an *Euphorbia palustris* L., 24.8.1996, leg. HÖHNER. (2)
- Longitarsus aeruginosus* (FOUDRAS): Hanau-Steinheim (MA 95), 1 Expl. an *Eupatorium cannabinum* L., 6.8.1997, leg. HÖHNER. (3)
- Longitarsus membranaceus* (FOUDRAS): Erlensee (MA 95), 1 Expl. an *Lamium album* L., 18.5.1977, leg. HÖHNER. – Gründau-Breitenborn (NA 16), 2 Expl. an *Galeopsis tetrahit* L., 24.9.1977, leg. HÖHNER. – Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. von Trockenrasen gekäschert, 18.9.1993, leg. BRENNER. Diese Funde des an *Teucrium*-Arten lebenden Blattfloh stellen **die ersten sicheren Nachweise aus Hessen** dar!
- Longitarsus obliteratoides* GRUEV: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. von Wegrand gekäschert, 8.8.1997, leg. HOFMANN, det. FLECHTNER. (2)
- Cassida murraea* LINNAEUS: Bad Nauheim-Wisselsheim (MA 88), 3 Expl. an *Pulicaria dysenterica* L., 17.8.1996, leg. HÖHNER.

## Anthribidae

- Rhaphitropis marchicus* (HERBST): Hanau-Steinheim (MA 95), 2 Expl. an *Salix caprea* L., 22.6.1996, leg. HÖHNER.
- Noxius curtirostris* (MULSANT): Lorch, Nollig (MA14), am 13.7. (leg. HÖHNER) 1 Expl., am 27.7. (leg. HÖHNER) 1 Expl. und am 3.8.1996 (leg. HÖHNER & BRENNER) 13 Expl. von *Cotoneaster integerrimus* MEDIKUS geklopft. Diese mediterrane Art konnte nördlich bis Südtirol nachgewiesen werden (FRIESER 1981). Die Funde vom Nollig stellen somit einen **Neunachweis für Deutschland** dar, und zusammen mit einem neuen Fund aus der Slowakei (FRIESER 1998) sind sie **die einzigen Nachweise aus Mitteleuropa!**

## Curculionidae

- Cossonus cylindricus* SAHLBERG: Umgebung Echzell (MA 98), 1 Expl. an *Salix*-Stamm, 3.7.1996, leg. HÖHNER. (3)
- Anthonomus bituberculatus* THOMSON: Erlensee (MA 95), 1 Expl. von Weißdorn geklopft, 20.3.1996, leg. HÖHNER. (3)
- Hypera pastinacae* (ROSSI): Lorch (MA 14), 1 Expl. an *Anthemis tinctoria* L., 13.7.1996, leg. HÖHNER. (2)
- Gasterocercus depressirostris* (FABRICIUS): Alsbach, Katharinenberg (MA 71), 1 Expl. an Licht 2.7.1997, leg. ERNST, det. BATHON; s.a. BATHON & BRENNER (1996). (1)
- Cryptorhynchus lapathi* (LINNAEUS): Hanau-Steinheim (MA 95), 1 Expl. an *Salix caprea* L., leg. HÖHNER.
- Acalles dubius* SOLARI: Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 1 Expl. an Eichenstamm, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (3)

- Baris morio* (BOHEMAN): Lorch (MA 14), 1 Expl. an *Reseda luteola* L., 13.7.1996, leg. HÖHNER. (3)
- Baris lepidii* GERMAR: Erlensee (MA 95), 1 Expl. an *Berteroa incana* (L.) DE CANDOLLE., 25.6.1996, leg. HÖHNER.
- Baris fallax* (BRISOUT): Lorch (MA 14), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 16.6.1997, leg. HÖHNER. (3)
- Baris picicornis* (MARSHAM): Hanau (MA 95), 3 Expl. an *Reseda luteola* L., 10.6.1996, leg. HÖHNER.
- Ceutorhynchus ignitus* GERMAR: Erlensee (MA 95), 3 Expl. an *Berteroa incana* (L.) DE CANDOLLE, 25.6.1996, leg. HÖHNER.
- Ceutorhynchus pumilio* (GYLLENHAL): Rodenbach (NA 05), 5 Expl. an *Teesdalia nudicaulis* (LINNAEUS) BROWN, 22.5.1977, leg. HÖHNER. – Hanau-Großauheim (MA 95), 1 Expl. im Wurzelbereich von *Calluna vulgaris* (LINNAEUS) HULL, 26.5.1979, leg. HÖHNER. – Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. an *Betula carpatica* WALDSTEIN & KITAIBEL, 30.6.1995, leg. HÖHNER. Die Art wurde in der Vergangenheit zwar mehrfach in Hessen gesammelt, aber nie publiziert (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998), weswegen sie hier als **Neufund für Hessen** gemeldet wird!
- Weitere Funde aus dem benachbarten Bayern: Alzenau (Unterfranken) (NA 04), 1 Expl. gekäschert, 12.5.1983, leg. HÖHNER. – Kahl (Unterfranken) (NA 04), 1 Expl. an *Teesdalia nudicaulis* (LINNAEUS) BROWN, 7.5.1993, leg. HÖHNER.
- Miarus micros* (GERMAR): Lorch (MA 14), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 16.6.1997, leg. HÖHNER. (3)

## Literatur

- BATHON, H. (1992): Käferfunde der Jahre 1990 bis 1992 aus Hessen. – Hess. faun. Briefe **12**(4): 60-64, Darmstadt.
- BATHON, H. & U. BRENNER (1996): Käferfunde des Jahres 1993 aus Hessen. 6. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen. – Hess. faun. Briefe **15**(1): 1-10, Darmstadt.
- BENSE, U. (1995): Longhorn Beetles / Bockkäfer. – Margraf Verlag, Weikersheim.
- BRENNER, U. (1997): Käferfunde des Jahres 1994 aus Hessen. – Hess. faun. Briefe **16**(2): 17-28, Darmstadt.
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft **55**, 434 S., Bonn-Bad Godesberg.
- ELBERT, A. (1994): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Untermaingebiet zwischen Hanau und Würzburg. 2. Nachtrag zur Gebietsfauna von Dr. Karl Singer, 1955. – Mitt. naturwiss. Mus. Aschaffenburg **16**: 3-113, Aschaffenburg.
- FRIESER, R. (1981): 90. Familie: Anthribidae (Breitmaulrüßler). – In: H. FREUDE, K.W. HARDE & G.A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas, Band **10**: 22-34, Goecke & Evers, Krefeld.
- FRIESER, R. (1998): 90. Familie: Anthribidae. – In: W.H. LUCHT & B. KLAUSNITZER: Die Käfer Mitteleuropas, Band **15** (4. Supplementband): 325, G. Fischer, Jena.
- FÜRSCH, H. (1967): 62. Familie: Coccinellidae (Marienkäfer). – In: H. FREUDE, K.W. HARDE & G.A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas, Band **7**: 227-278, Goecke & Evers, Krefeld.

- FÜRSCH, H. (1984): Bemerkenswerte Coccinelliden-Funde vom Kaiserstuhl (Coleoptera, Coccinellidae). – Nbl. Bayer. Entomol. **33**(4): 116-119, München.
- HEYDEN, L. von (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main.
- HORION, A. (1956): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 5: Heteromera. – Entomol. Arb. Mus. Frey, Sonderband, Tutzing.
- HORION, A. (1961): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 8: Clavicornia 2. Teil (Thorictidae bis Cisidae), Teredelia, Coccinellidae. – Überlingen (Selbstverlag).
- HORION, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 9: Staphylinidae, 1. Teil. Micropeplinae bis Euaesthetinae. – Überlingen (Selbstverlag).
- HORION, A. (1965): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 10: Staphylinidae, 2. Teil: Paederinae bis Staphylininae. – Überlingen (Selbstverlag).
- KÖHLER, F. (1998): 21. Familie: Ptiliidae. – In: W.H. LUCHT & B. KLAUSNITZER: Die Käfer Mitteleuropas, Band **15** (4. Supplementband): 117-118. – G. Fischer, Jena.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomol. Nachr. Ber. Beiheft **4**: 1-185, Dresden.
- LOHSE, G.A. (1989): 21. Familie: Ptiliidae. – In: G.A. LOHSE & W.H. LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas, Band **12** (1. Supplementband): 118-120, Goecke & Evers, Krefeld.
- LOHSE, G.A., W. SCHAWALLER & R. GRIMM (1992): 83. Familie: Tenebrionidae. In: G.A. LOHSE & W.H. LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas Band **13** (2. Supplementband): 193-199, Goecke & Evers, Krefeld.
- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz (Natur in Hessen), Wiesbaden.
- RÜCKER, W.H. (1992): 58. Familie: Latridiidae. – In: G.A. LOHSE & W.H. LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas, Band **13** (2. Supplementband): 139-160, Goecke & Evers, Krefeld
- SCHERF, H. (1968): Die Carabidenfauna des Naturschutzparkes Hoher Vogelsberg. – Entomol. Bl. **64**(3): 130-156, Krefeld.
- SCHERF, H. & U. DRECHSEL (1971): Die Carabidenfauna des Naturschutzparkes Hoher Vogelsberg. 1. Nachtrag. – Entomol. Bl. **67**(3): 147-156, Krefeld.
- SCRIBA, W. (1869): Die Käfer im Großherzogthum Hessen und seiner nächsten Umgebung. – Ber. oberhess. Ges. Natur- und Heilkde. **13**: 89-99, Gießen.

## Verfasser

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde der Jahre 1996 und 1997 aus Hessen 17-27](#)