

## Käferfunde des Jahres 2011 aus Hessen

20. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen <sup>1)</sup>

ULI BRENNER

### Summary

Faunistic records of 305 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 208 are delisted as endangered species in the Red Book of Animals in Germany. One species is recorded as new to Central Europe, eight species are regarded as new to Hesse.

### Zusammenfassung

Es werden 386 Fundmeldungen von 305 Arten aus 65 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen 14 Arten nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) als vom Aussterben bedroht (1), 59 Arten als stark gefährdet (2) und 123 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. Elf weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste (V). Die Angabe „R“ bei *Pterostichus negligens* (STURM) aus der Deutschlandliste von BINOT et al. (1998) und bei *Trox perrisii* FAIRMAIRE aus der hessischen Roten Liste von SCHAFFRATH (2003) bedeutet, dass die Arten seit jeher extrem selten bzw. sehr lokal vorkommend sind. Eine Art wird als Neunachweis für Mitteleuropa angesehen: *Urophorus humeralis* (FABRICIUS). Acht Arten wurden erstmals in Hessen nachgewiesen: *Notiophilus substriatus* WATERHOUSE, *Scydmorephes sparshalli* (DENNY), *Anthaxia suzannae* THÉRY, *Dryophilus rugicollis* (MULSANT & REY), *Variimorda basalis* (COSTA), *Mordellistena brunneospinosa* ERMISCH, *Alocentron curvirostre* (GYLLENHAL) und *Pachyrhinus lethierryi* (DESBROCHERS). Zwei Arten stellen Wiederfunde in Hessen nach über 100 Jahren dar: *Ptinus lichenum* MARSHAM und *Dibolia foersteri* BACH. Eine Art wurde nach mehr als 75 Jahren in Hessen wiedergefunden: *Margarinotus ruficornis* (GRIMM). Für eine weitere Art, deren Vorkommen als fraglich galt, existiert nun ein erster sicherer Nachweis aus Hessen: *Mycetoporus nigricollis* STEPHENS.

Auch für diese Ausgabe der „Käferfunde“ sandten mir die hessischen Koleopterologen wieder die Ergebnisse ihrer Aufsammlungen zu, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Außerdem gehen in die Zusammenstellung auch die Resultate der vier gemeinschaftlichen Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen ein, die 2011 stattfanden. Diese Sammelausflüge gingen auf den Engweger Kopf bei Lorch–Lorchhausen (30.4.2011), auf die Oberreifenberger Wiesen bei Schmitt–Oberreifenberg im Taunus (14.5.2011), auf einen ehemaligen Truppenübungsplatz, den Weinberg bei Wetzlar–Magdalenenhausen (4.6.2011) und in das Rote Moor in der Hohen Rhön (25.6.2011). Gewohnheitsgemäß gehen auch Fundmeldungen aus zum Teil länger zurückliegender Zeit wieder in diese Zusammenstellung ein.

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten die Gefährdungskategorien nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) (=RL D), bei abweichender Einstufung der Carabidae bzw. Scarabaeidae und Lucanidae zusätzlich auch nach den hessischen Roten Listen von MALTEN (1998) und SCHAFFRATH (2003) (=RL H), geklammert angegeben [(RL D)/(RL H)].

<sup>1)</sup>19. Bericht in: Hess. faun. Briefe 31(3): 33-48(2012)

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Andreas BERGER (Hanau), Uli BRENNER (Schlüchtern), Günter HOFMANN (Stockstadt in Unterfranken), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Werner HORN (Erbach), Michael KARNER (Frankfurt), Mathias KOCH (Darmstadt), Roland KUNZ (Hadamar), Frank LANGE (Niedernhausen), Rüdiger PESCHEL (Chemnitz), Rüdiger RUPP (Wetzlar) und Nina STIEHR (Hasselroth).

## Carabidae

*Calosoma inquisitor* (LINNAEUS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. am Boden in Eichen-Wald laufend, 30.4.2011, leg. BERGER; am selben Fundort 1 Expl. auf Weg in Weinberg laufend, 30.4.2011, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. auf Eichen-Gebüsch beobachtet, 30.4.2011, vid. HÖHNER. (3)

*Leistus piceus* FRÖLICH: Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. zwischen Steinen am Ufer eines sumpfigem Quellbachs der Weil, 14.5.2011, leg. RUPP. (-/3)

*Notiophilus aquaticus* (LINNAEUS): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. auf nassem Rohboden am Ufer eines angestauten Moorteichs auf dem offenen Hochmoor, 25.6.2011, leg. HOFMANN. (VI/-)

*Notiophilus germinyi* FAUVEL: Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotböhl (MA 73), 1 Expl. unterirdisch an Graswurzeln, 24.9.2011, HÖHNER; am selben Fundort, 1 Expl. auf Sandboden, 25.9.2011, leg. LANGE. (3)

*Notiophilus substriatus* WATERHOUSE: Geisenheim (MA 23), 1 Expl. bei Rheinhochwasser an schwimmendem Schaumstoffstück, 15.1.2011, leg. LANGE.

KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) nennen Vorkommen dieser Art sowohl aus dem Süden als auch aus dem Norden Deutschlands; lediglich im Osten des Landes scheint die Art nicht vorzukommen. Auf welchen Fund sich allerdings der Eintrag für Hessen bezieht, ist nicht klar; auf eine Meldung in der in der zugehörigen Datenbank genannten Arbeit (SCHERF 1981) jedenfalls nicht, da die Art dort nicht genannt wird. Da mir kein Fund aus Hessen bekannt geworden ist, stellt das Tier aus Geisenheim einen **Neunachweis in Hessen** dar!

*Elaphrus uliginosus* (FABRICIUS): Reichelsheim–Kirchbeerfurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Barberfalle, 15.4.2011, leg. HORN. (2/2)

*Clivina collaris* (HERBST): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. an sandigem Bachufer, 7.4.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. (2)

*Broscus cephalotes* (LINNAEUS): Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotböhl (MA 73), 1 Expl. auf Sandboden, 25.9.2011, leg. LANGE. (VI/2)

*Trechus splendens* GEMMINGER & HAROLD: Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. am Ufer eines sumpfigen Quellbachs der Weil, 14.5.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Rhön, Rotes Moor (NA 79), 4 Expl. in Birken-Falllaub, 19.11.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. (-/3)

*Bembidion bruxellense* WESMAEL: Rhön, Rotes Moor (NA 79), 3 Expl. auf nassem Rohboden am Ufer eines angestauten Moorteichs auf dem offenen Hochmoor, 25.6.2011, leg. HOFMANN. (-/3)

*Bembidion articulatum* (PANZER): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. auf nassem Rohboden am Ufer eines angestauten Moorteichs auf dem offenen Hochmoor, 25.6.2011, leg. HOFMANN. **Neunachweis für das Rote Moor** (siehe FRISCH 1995)!

*Bembidion guttula* (FABRICIUS): Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. in Wäldchen mit Fichten am Ufer der Weil, 14.5.2011, leg. HOFMANN. (VI/-)

- Ocys quinquestriatus* (GYLLENHAL): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch, 1.5.2011, leg. LANGE. (2)
- Diachromus germanus* (LINNAEUS): Reichelsheim–Kirchbeerfurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Barberfalle, 14.5.2011, leg. HORN. (-/3)
- Harpalus smaragdinus* (DUFTSCHMID): Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotböhl (MA 73), 1 Expl. unterirdisch an Graswurzeln, 24.9.2011, leg. HÖHNER. (-/V)
- Harpalus dimidiatus* (ROSSI): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Silikat-Trockenrasen, 30.4.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. (V)
- Anthracus consputus* (DUFTSCHMID): Oestrich-Winkel-Winkel (MA 23), 1 Expl. bei Rheinhochwasser an schwimmendem Schaumstoffstück, 16.1.2011, leg. LANGE. (3)
- Poecilus lepidus* (LESKE): Griesheim, Spargelfelder nordwestlich der Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. unter Kunststoff-Folie am Rand eines Spargelfelds, 20.3.2011, leg. LANGE. (V/3)
- Pterostichus negligens* (STURM): Dornburg–Frickhofen, NSG „Dornburg“, Eisstollen (MA 39), 1 Expl. in Moos zwischen Basaltblöcken, 27.4.2011, leg. KUNZ.  
Dieser äußerst seltene Laufkäfer ist in Deutschland lediglich aus der Eifel, dem Harz, dem Thüringer Wald und auch von einem hessischen Fundort, dem Hohen Meißner, bekannt (MOLENDI 1999). Der Fund von der Dornburg stellt somit den zweiten Nachweis in Hessen dar. Da die Art erst nach Erscheinen der Roten Liste Hessens (MALTEN 1998) in Hessen nachgewiesen wurde, ist sie dort nicht verzeichnet. Es wäre dort eine Zuordnung zur Kategorie „R“ angezeigt. (R/-)
- Pterostichus diligens* (STURM): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 2 Expl. auf über-schwemmten Bulten von *Carex* (Segge), 25.6.2011, leg. HOFMANN. (V/-)
- Agonum gracile* (GYLLENHAL): Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. am Ufer eines sumpfigen Quellbachs der Weil, 14.5.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Rhön, Rotes Moor (NA 79), 2 Expl. auf über-schwemmten Bulten von *Carex* (Segge), 25.6.2011, leg. HOFMANN. (3)
- Zabrus tenebrioides* (GOEZE): Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 2 Expl. an milchreifen Samen auf Grasähren, 30.7.2011, leg. HÖHNER. (2/3)
- Amara kulti* FASSATI: Reichelsheim–Kirchbeerfurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Barberfalle, 10.8.2011, leg. HORN. (-/3)
- Amara montivaga* STURM: Reichelsheim–Kirchbeerfurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Barberfalle, 5.6.2011, leg. HORN. (V/3)
- Chlaenius nigricornis* (FABRICIUS): Reichelsheim–Kirchbeerfurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 3 Expl. in Barberfalle, 14.5.2011, leg. HORN. (V/3)
- Callistus lunatus* (FABRICIUS): Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. in der Nähe eines Tümpels, 7.4.2011, leg. BERGER. (2)
- Panagaeus cruxmajor* (LINNAEUS): Reichelsheim–Kirchbeerfurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 6 Expl. in Barberfalle, 17.4., 1.5., 29.6. und 26.7.2011, leg. HORN. (V/3)
- Cymindis axillaris* (FABRICIUS): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Weinbergsbrache, 2.4.2011, leg. LANGE. (2)
- Calodromius spilolus* (ILLIGER): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. an *Pinus sylvestris* LINNAEUS (Waldkiefer) auf offenem Hochmoor, 25.6.2011, leg. HOFMANN.  
**Neunachweis für das Rote Moor** (siehe FRISCH 1995)!
- Philorhizus notatus* STEPHENS: Idstein–Lenzhahn (MA 56), 2 Expl. auf Gebüsch an Waldrand, 3.9.2011, leg. LANGE. (V)
- Philorhizus melanocephalus* DEJEAN: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf *Rosa canina* LINNAEUS (Hunds-Rose), 30.4.2011, leg. HOFMANN. (-/V)

*Brachinus crepitans* (LINNAEUS): Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. in der Nähe eines Tümpels, 7.4.2011, leg. BERGER. (V)

### Dytiscidae

*Hydroporus obscurus* STURM: Rhön, Rotes Moor (NA 79), 3 Expl. in kleinem *Sphagnum*-Tümpel auf offenem Hochmoor, 25.6.2011, leg. HOFMANN. (3)

*Hydroporus longulus* MULSANT: Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 2 Expl. auf sumpfiger Wiese, 14.5.2011, leg. HOFMANN. (3)

*Agabus labiatus* (BRAHM): Hanau–Klein-Auheim, Binsig (MA 94), 1 Expl. auf überschwemmter Sumpfwiese, 29.5.2011, leg. BERGER, det. HOFMANN. (2)

*Ilybius aenescens* THOMSON: Rhön, Rotes Moor (NA 79), 2 Expl. in angestaumtem Moorteich auf offenem Hochmoor; 3 Expl. befanden sich in der Puppenwiege im Torfboden am Ufer dieses Moorteichs, 25.6.2011, leg. HOFMANN. (3)

### Hydrophilidae

*Crenitis punctatostrata* (LETZNER): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 3 Expl. in kleinem *Sphagnum*-Tümpel auf offenem Hochmoor, 25.6.2011, leg. BERGER (2 Expl.), det. HOFMANN, leg. HOFMANN (1 Expl.). (3)

### Histeridae

*Plegaderus dissectus* ERICHSON: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in morschem Eichen-Holz, 23.3.2011; 1 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche; 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 10.5.-14.7.2011, leg. RUPP. – Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 29.3.2011, leg. BRENNER. (3)

*Abraeus granulum* ERICHSON: Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. unter der toten Rinde einer Eiche, 6.2.2011, leg. LANGE. – Frankfurt–Schwanheim, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. in Baumhöhle im Fuß einer lebenden Eiche, 30.12.2011, leg. LANGE. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 16 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche, 24.5.-28.7.2011, leg. RUPP. (3)

*Abraeus parvulus* AUBÉ: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche, 26.4.-10.5.2011, leg. RUPP. (2)

*Dendrophilus pygmaeus* (LINNAEUS): Pfungstadt, Wald zwischen Pfungstadt und Seeheim (östlich der A5) (MA 71), 2 Expl. an Holzstücken auf Haufen von *Formica* (Waldameise), 20.3.2011, leg. LANGE.

*Margarinotus merdarius* (HOFFMANN): Niedernhausen–Niederseelbach, Gelände der Firma Hartmann (MA 45), 1 Expl. zwischen Verpackungsmaterial in Paket aus Linnich (Nordrhein-Westfalen, Kreis Düren, importiert), 19.5.2011, leg. POLUTTA, in coll. LANGE.

*Margarinotus ruficornis* (GRIMM): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise) in hohler Eiche, 30.4.2011, leg. HOFMANN, leg. LANGE; je ein weiteres Expl. am selben Fundort, 4.6.2011 und 3.9.2011, leg. LANGE.

Aus Hessen liegen nur alte Funde von Frankfurt–Enkheim und Schwanheimer Wald, Wiesbaden–Dotzheim und Seligenstadt vor (BÜCKING 1930-32, HEYDEN 1904, HORION 1949, SINGER 1955). Der jüngste Fund scheint von Darmstadt–Eberstadt aus dem Jahr 1935 zu datieren (HORION 1949), weshalb die Tiere aus Lorchhausen einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 75 Jahren** darstellen! (3)

*Hister quadrinotatus* SCRIBA: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Sandboden, 2.6.2011, leg. BERGER. (3)

## Catopidae

- Nemadus colonoides* (KRAATZ): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 2 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche und 2 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 24.5.-28.7.2011, leg. RUPP. (3)
- Nargus brunneus* (STURM): Lorch, Nollig (MA 14), 2 Expl. in der Streu auf stark sonnenexponiertem Hang, 6.3.2011, leg. LANGE.

## Scydmaenidae

- Neuraphes carinatus* (MULSANT): Frankfurt–Schwanheim, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. in Baumhöhle im Fuß einer lebenden Eiche, 30.12.2011, leg. LANGE.
- Scydmorephes sparshalli* (DENNY): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 1 Expl. in der Streu auf Waldboden, 3.12.2011, leg. LANGE.  
Dieses Taxon wurde früher lange mit *Scydmorephes helvolus* (SCHAUM) vermergt. Alte Angaben (aus Deutschland) von *S. sparshalli* sind deshalb sehr zweifelhaft (HORION 1949). Die Meldungen aus Hessen bei BÜCKING (1930-32), HEYDEN (1904) und HORION (1949) könnten sich deshalb auch auf *S. helvolus* beziehen. Deshalb wird der Fund von *Scydmorephes sparshalli* aus dem Groß-Gerauer Wald als **erster sicherer Nachweis in Hessen** angesehen!  
(3)
- Stenichnus godarti* (LATREILLE): Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. in morschem Buchen-Holz, 2.4.2011, leg. BRENNER.
- Euconnus fimetarius* (CHAUDOIR): Großelnüder–Bimbach (NB 40), 3 Expl. in faulendem Heu, 2.5.2011, leg. PESCHEL, det. APFEL.
- Scydmaenus hellwigii* (HERBST): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 73), 8 Expl. in morschem Laubholz, 18.4.2004, leg. KARNER. (3)

## Ptiliidae

- Ptenidium gressneri* ERICHSON: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 6 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche, 10.5.-24.6.2011; 2 Expl. in altem Nest von *Vespa crabro* LINNAEUS (Hornisse), 29.10.2011, leg. RUPP. (3)

## Staphylinidae

- Plectrophloeus nubigena* (REITTER): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 3 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche, 6.-24.6.2011, leg. RUPP. (3)
- Eusphalerum primulae* (STEPHENS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 3 Expl. in Blüten von *Cardamine bulbifera* (LINNAEUS) CRANTZ (Zwiebel-Zahnwurz), 30.4.2011, leg. HOFMANN. (3)
- Phyllodrepa melanocephala* (FABRICIUS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 1 Expl. in der Streu auf Waldboden, 3.12.2011, leg. LANGE. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Buche, 23.9.-7.10.2011, leg. RUPP. (3)
- Phyllodrepa nigra* (GRAVENHORST): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 8 Expl. in Fensterfallen an Buche und Eiche, 29.10.-25.11.2011, leg. RUPP. (3)
- Hapalareae pygmaea* (PAYKULL): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 3 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche, 10.-24.6.2011; 19 Expl. in Fensterfallen an Eiche (12 Expl.) und Buche (7 Expl.), 25.8.-7.10.2011, leg. RUPP. (3)
- Hypopycna rufula* (ERICHSON): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 2 Expl. in der Streu am Boden, 5.2.2011, leg. LANGE. (3)
- Omalius validum* KRAATZ: Oberursel, Hohe Mark (MA 66), 1 Expl. in Bodenfalle unter Stein, 1.-7.12.2011, leg. LANGE.

- Acidota cruentata* (MANNERHEIM): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 2 Expl. in Laubwald auf Schnee laufend, 1.1.2011, leg. LANGE.
- Stenus providus* ERICHSON: Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. auf überschwemmter Bulte von *Carex* (Segge), 25.6.2011, leg. HOFMANN.
- Astenus gracilis* (PAYKULL): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. in der Streu auf stark sonnenexponiertem Hang, 6.3.2011, leg. LANGE.
- Hypnogyra angularis* (GANGLBAUER): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. am Boden in Eichen-Wald laufend, 30.4.2011, leg. HOFMANN. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 2 Expl. in Fensterfalle an Eiche und 2 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche, 26.4.-24.6.2011, leg. RUPP. – Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 29.3.2011, leg. BRENNER. (3)
- Philonthus spinipes* SHARP: Niedernhausen–Niederseelbach, Oberseelbacher Straße (MA 45), 4 Expl. in Kompost, 17.10.2011, leg. LANGE.
- Philonthus lepidus* (GRAVENHORST): Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotböhl (MA 73), 1 Expl. an Graswurzeln, 24.9.2011, leg. HÖHNER.
- Ocyopus tenebricosus* (GRAVENHORST): Reichelsheim–Kirchbeerfurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Barberfalle, 5.6.2011, leg. HORN. (3)
- Quedius truncicola* FAIRMAIRE & LABOULBÈNE: Lampertheim, Lampertheimer Wald (MV 69), 3 Expl. im nassem Mulm einer hohlen Buche, 21.7.2001, leg. KARNER. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Buche, 12.-26.4.2011, leg. RUPP. (3)
- Quedius semiaeneus* (STEPHENS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Rohsee (MA 64), 1 Expl. am Ufer eines Waldsees, 9.5.1999, leg. KARNER.
- Mycetoporus nigricollis* STEPHENS: Wiesbaden–Bieblich, Schlosspark (MA 44), 1 Expl. in der Streu am Boden, 5.2.2011, leg. LANGE. – Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation am Rande eines Weinbergwegs, 26.3.2011, leg. LANGE. – Geisenheim (MA 23), 1 Expl. bei Rheinhochwasser an schwimmendem Schaumstoffstück, 15.1.2011, leg. LANGE.
- Das Taxon *Mycetoporus nigricollis* galt lange Zeit als in Mitteleuropa weit verbreitet (HORION 1967, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) bis SCHÜLKE & KOCIAN (2000) darlegten, dass sich unter diesem Namen mehrere deutlich zu unterscheidende Arten verbergen. Daraufhin änderte KÖHLER (2011) den Status der Art unter dem alten Namen als „fraglich in Hessen“ (und auch in verschiedenen anderen Regionen Deutschlands). Mit den Funden von Wiesbaden, Lorch und Geisenheim liegen nun von *Mycetoporus nigricollis* **die ersten sicheren Nachweise aus Hessen** vor!
- Bolitobius cingulatus* (MANNERHEIM): Reichelsheim–Kirchbeerfurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Barberfalle, 1.5.2011, leg. HORN.
- Sepedophilus bipunctatus* (GRAVENHORST): Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 2 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 29.3.2011, leg. BRENNER.
- Atheta arctica* (THOMSON): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. in der Laubstreu eines Karpaten-Birken-Waldes (*Vaccinio-Betuletum-carpaticae*), 25.6.2011, leg. HOFMANN. (3)
- Atheta hybrida* (SHARP): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 2 Expl. in Fensterfalle an Buche, 11.-25.11.2011, leg. RUPP. (3)
- Thamiaraea cinnamomea* (GRAVENHORST): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 8 Expl. in Fensterfallen an Eiche und Buche, 10.5.-25.8.2011, leg. RUPP. (3)
- Thamiaraea hospita* (MÄRKEL): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 4 Expl. in Fensterfallen an Eiche und Buche, 10.5.-14.9.2011; 1 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche, 26.4.-10.5.2011, leg. RUPP. (2)

*Pella laticollis* (MÄRKEL): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 4 Expl. am Fuß einer hohlen Eiche mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 6.6.2011, leg. LANGE; am selben Fundort 2 Expl. 3.9.2011, leg. LANGE.

*Ocyusa picina* (AUBÉ): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. auf überschwemmter Bulte von *Carex* (Segge), 25.6.2011, leg. HOFMANN.

*Stichoglossa semirufa* (ERICHSON): Dornburg–Thalheim, NSG „Thalheimer Kiesgrube“ (MA 39), 1 Expl. am Fuß einer Eiche (Bodenfalle), 8.-27.9.2011, leg. KUNZ. (3)

*Haploglossa gentilis* (MÄRKEL): Reichelsheim–Kirchbeerfurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Barberfalle, 8.5.2011, leg. HORN. (3)

*Haploglossa marginalis* (GRAVENHORST): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 12 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 12.4.-14.7.2011, leg. RUPP. (3)

### **Pselaphidae**

*Trichonyx sulcicollis* (REICHENBACH): Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Viehtriftweg (MA 72), 1 Expl. an abgebrochenem Stamm einer toten Buche, 15.6.2011, leg. LANGE. (3)

### **Lycidae**

*Platycis cosnardi* (CHEVROLAT): Gründau–Gettenbach, Gettenbacheiche (NA 16), 2 Expl. um Buchen-Klafterholz fliegend, 6.5.2011, leg. RUPP. (2)

### **Cantharidae**

*Cantharis terminata* FALDERMANN: Wetzlar–Magdalenenhausen, Weinberg (MA 69), 1 Expl. auf Magerwiese, 4.6.2011, leg. KUNZ. (3)

*Rhagonycha lignosa* (MÜLLER): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. auf *Betula pubescens carpatica* WALDSTEIN-WARTEMBERG & KITABEL (Karpaten-Birke) am Rand des offenen Hochmoors, 25.6.2011, leg. HOFMANN. **Neunachweis für das Rote Moor** (siehe FRISCH 1995)!

### **Malachiidae**

*Troglops albicans* (LINNAEUS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 30.4.2011, leg. LANGE. (3)

*Hypebaeus flavipes* (FABRICIUS): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 4 Expl. in Fensterfalle an Buche, 24.5.-24.6.2011, leg. RUPP. (3)

*Troglops albicans* (LINNAEUS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 30.4.2011, leg. LANGE. (3)

*Clanoptilus elegans* (OLIVIER): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Blüte von *Rosa pimpinellifolia* LINNAEUS (Bibernell-Rose), 30.4.2011, leg. HOFMANN. (3)

### **Dasytidae**

*Aplocnemus virens* (SUFFRIAN): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Blüte von *Rosa pimpinellifolia* LINNAEUS (Bibernell-Rose), 30.4.2011, leg. HOFMANN; am selben Fundort 2 Expl. auf Gebüsch an Wegrand, 30.4.2011, leg. LANGE; am selben Fundort je 1 Expl. an Rosen-Blüte und an Kiefern-Ast, 30.4.2011, leg. RUPP. (2)

*Dasytes subaeneus* SCHÖNHERR: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 4.6.2011, leg. LANGE. (3)

## Melyridae

*Aplocnemus virens* (SUFFRIAN): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. auf Büschen neben Weinbergsbrache, 30.4.2011, leg. LANGE. (2)

## Phloiophilidae

*Phloiophilus edwardsii* STEPHENS: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 29.3.-12.4.2011, leg. RUPP. (2)

## Cleridae

*Tillus elongatus* (LINNAEUS): Reichelsheim–Rohrbach (MA 90), 1 Expl. in 10 m Höhe in alter Eiche (Eklektor), 12.7.2011, leg. HORN. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 1 Expl. in dickem, totem Ast von *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) an toter Eiche, der am 1.1.2011 eingetragen wurde, am 22.1.2011 daraus geschlüpft, leg. LANGE. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Buche, 10.-24.5.2011, leg. RUPP. (3)

*Tilloidea unifasciata* (FABRICIUS): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Hausgarten, 11.5.2011, leg. LANGE. (2)

*Trichodes alvearius* (FABRICIUS): Greifenstein–Arborn, Wetzlarer Hütte (MB 40), 1 Expl. auf *Polygonum bistorta* LINNAEUS (Schlangen-Knöterich), 13.5.2011, leg. RUPP. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 30.4.2011, leg. RUPP. (3)

## Trogossitidae

*Tenebroides fuscus* (GOEZE): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 2 Expl. in Rissen im weißfaulen, am Boden liegenden Stammteil einer Buche mit zahlreichen Fruchtkörpern von *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm), 17.12.2011, leg. LANGE. (2)

## Peltidae

*Thymalus limbatus* (FABRICIUS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. unter der toten Rinde eines liegenden Eichen-Stamms, 30.4.2011, leg. RUPP. (3)

## Elateridae

*Ampedus rufipennis* (STEPHENS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 73), 1 Expl. auf morschem Eichen-Ast, 18.4.2004, leg. KARNER. (2)

*Ampedus brunnicornis* GERMAR: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Buche, 23.5.-6.6.2011, leg. RUPP. (1)

*Ampedus quercicola* (BUYSSON): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Zweig, 30.4.2011, leg. BERGER, det. RUPP. (3)

*Ampedus nigroflavus* (GOEZE): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 23.5.-6.6.2011, leg. RUPP. – Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 3 Expl. im Holz eines toten stehenden Pappel-Stamms, 19.11.2011, leg. HÖHNER; am selben Fundort noch einmal 2 Expl., 21.12.2011, leg. BERGER. – Ranstadt–Bobenheim (NA 07), 1 Expl. in trockenmürbem Holz unter Eichen-Rinde, 25.3.2011, leg. RUPP. (3)

*Ampedus elongatulus* (FABRICIUS): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 12.-26.4.2011, leg. RUPP. (3)

*Brachygonus megerlei* (LACORDAIRE): Reichelsheim–Rohrbach (MA 90), 1 Expl. in 10 m Höhe in alter Eiche (Eklektor), 18.5.2011, leg. HORN. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 1 Expl. in einem Riss im weißfaulen, am Boden liegenden Stammteil einer Buche mit zahlreichen Fruchtkörpern von *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm), 17.12.2011, leg. LANGE. (2)



- Procræus tibialis* (LACORDAIRE): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. auf Buchen-Zweig, 7.4.2011, leg. BERGER, det. RUPP. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 2 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche; 1 Expl. in Fensterfalle an Buche, 26.4.-6.6.2011, leg. RUPP. (2)
- Melanotus castanipes* (PAYKULL): Hilders, Auersberg (NB 70), 1 Expl. in morschem Holz, 1.1.1989, leg. KARNER.
- Haplotarsus incanus* (GYLLENHAL): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. auf *Betula pubescens carpatica* WALDSTEIN-WARTEMBERG & KITABEL (Karpaten-Birke) am Rand des offenen Hochmoors, 25.6.2011, leg. HOFMANN. **Neunachweis für das Rote Moor** (siehe FRISCH 1995)!
- Haplotarsus angustulus* (KIESENWETTER): Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 2 Expl. auf Bergwiese, 14.5.2011, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 14.5.2011, leg. RUPP; am selben Fundort 4 Expl. auf Zweig von *Sorbus aria* (LINNAEUS) CRANTZ (Mehlbeere), 14.5.2011, leg. KUNZ.
- Calambus bipustulatus* (LINNAEUS): Reichelsheim–Rohrbach (MA 90), 1 Expl. in 10 m Höhe in alter Eiche (Eklektor), 18.5.2011, leg. HORN.
- Hypoganus inunctus* (LACORDAIRE): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 30.4.2011, leg. RUPP. – Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 14.5.2011, leg. RUPP. (3)
- Denticollis rubens* PILLER & MITTERPACHER: Braunfels, Urwaldzelle (MA 59), 1 Expl. unter Buchen-Rinde, 4.4.2011, leg. RUPP. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 23.3.2011, leg. RUPP. (2)
- Stenagostus rhombeus* (OLIVIER): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Larve unter der toten Rinde einer liegenden *Aesculus hippocastanum* LINNAEUS (Gewöhnliche Rosskastanie), 24.3.2011, die Imago schlüpfte im Juni 2012, leg. RUPP. (3)
- Crepidophorus mutilatus* (ROSENHAUER): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 23.5.-6.6.2011, leg. RUPP. (2)
- Cardiophorus nigerrimus* ERICHSON: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf *Acer monspessulanum* LINNAEUS (Französischer Ahorn) auf Fels-sporn, 30.4.2011, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), leg. 30.4.2011, LANGE. (3)

## **Eucnemidae**

- Eucnemis capucina* AHRENS: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 10.-24.5.2011, leg. RUPP. (3)
- Dromaeolus barnabita* (VILLA): Reichelsheim–Rohrbach (MA 90), 1 Expl. in 10 m Höhe in alter Eiche (Eklektor), 12.7.2011, leg. HORN. (2)
- Microrhagus pygmaeus* (FABRICIUS) = *Dirhagus pygmaeus* (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH (Besenginster), 2.6.2011, leg. BERGER, det. RUPP. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. an trockenem Buchen-Ast, 21.5.2011, leg. HÖHNER. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. abends auf Triebspitze von *Crataegus* (Weißdorn), 14.7.2011; 3 Expl. in Fensterfallen an Eiche und Buche, 24.6.-14.7.2011, leg. RUPP. – Wetzlar–Magdalenenhausen, Weinberg (MA 69), 1 Expl. auf Apfelbaum-Ast, 4.6.2011, leg. KUNZ. (3)
- Microrhagus lepidus* ROSENHAUER: Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. an dürrer Eichen-Ast, 23.5.2007, leg. KARNER. (3)

*Hylis foveicollis* (THOMSON): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Mönchbruchpfad (MA 63), 2 Expl. an liegendem Stamm einer *Aesculus hippocastanum* LINNAEUS (Rosskastanie), 16.6.2011, leg. LANGE.

## Buprestidae

*Ptosima undecimmaculata* (HERBST) (= *flavoguttata* (ILLIGER)): Lorch, Nollig (MA 14), 2 Expl. auf Gebüsch, 1 Expl. auf *Melampyrum arvense* LINNAEUS (Acker-Wachtelweizen), 1.5.2011, leg. LANGE. – Lorch-Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch, 30.4.2011, leg. BERGER; am selben Fundort 2 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 30.4.2011, vid. HÖHNER, leg. LANGE. (2)

*Anthaxia suzannae* THÉRY: Lorch-Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 30.4.2011, leg. LANGE.

Nach einigem nomenklatorischem Hinundher stellte sich heraus, dass die bislang unter dem Taxon *Anthaxia semicuprea* KÜSTER geführten Tiere zu zwei distinkten Arten gehören, deren sicheres Vorkommen in Hessen durch die Bestimmung eines Exemplars vom Edersee zuerst nur für *A. semicuprea* feststand (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, NIEHUIS 2004, NIEHUIS & MÜLLER 2005). Durch den Fund von Lorchhausen, der den **ersten sicheren Nachweis aus Hessen** darstellt, ist nun auch das Vorkommen von *A. suzannae* in Hessen belegt. (2)

*Trachys troglodytes* GYLLENHAL: Schmitten-Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. auf Bergwiese, 14.5.2011, leg. KUNZ.

*Trachys scrobiculata* KIESENWETTER: Oestrich-Winkel-Oestrich (MA 33), 1 Expl. bei Rheinhochwasser an schwimmendem Schaumstoffstück, 14.1.2011, leg. LANGE. – Oestrich-Winkel-Winkel (MA 23), 1 Expl. bei Rheinhochwasser an schwimmendem Schaumstoffstück, 16.1.2011, leg. LANGE.

Die Art wurde lange in der mitteleuropäischen Faunistik unter dem Namen *Trachys pumilus* ILLIGER geführt. *Trachys pumila* (so der korrekte Name) kommt jedoch in der mitteleuropäischen Fauna nicht vor, sondern ist in Südeuropa, Nordafrika und dem Nahen Osten zu finden (NIEHUIS 2004). Die unter *T. pumila* geführten Meldungen sind wohl auch in Hessen auf *Trachys scrobiculata* zu beziehen, so dass der bei BATHON (1992) genannte Fund ebenfalls zu dieser Art zu stellen ist. Die Meldung sei hier noch einmal genannt:

Nidderau, NSG Krebsbachtal (MA 86), 1 Expl. in Bodenfalle auf buschreichem Trockenhang, Juni 1992 leg. FRISCH.

KÖHLER (2011) nennt als weiteren hessischen Fundort das Wispertal im Rheintaunus. Da die Art in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit zahlreichen Meldungen vertreten ist (NIEHUIS 2004), ist sie sicher auch in Hessen nicht selten.

## Scirtidae

*Cyphon padi* (LINNAEUS): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. an *Pinus sylvestris* LINNAEUS (Waldkiefer) auf offenem Hochmoor, 25.6.2011, leg. HOFMANN. **Neunachweis für das Rote Moor** (siehe FRISCH 1995)!

*Prionocyphon serricornis* (MÜLLER): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 3 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 6.6.-14.7.2011, leg. RUPP. (3)

*Scirtes hemisphaericus* (LINNAEUS): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. auf der Ufervegetation am Rand eines Moorweihers, 25.6.2011, leg. HOFMANN. **Neunachweis für das Rote Moor** (siehe FRISCH 1995)!

## Eucinetidae

*Eucinetus haemorrhoidalis* (GERMAR): Oestrich-Winkel-Oestrich (MA 33), 4 Expl. bei Rheinhochwasser an schwimmendem Schaumstoffstück, 15.1.2011, leg. LANGE.

– Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. in der Streu an stark sonnenexponiertem Hang, 6.3.2011, leg. LANGE. (3)

## Elmidae

*Elmis latreillei* BEDEL: Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 2 Expl. unter Stein in sumpfigem Quellbach der Weil, 14.5.2011, leg. BERGER (2 Expl.), det. HOFMANN, leg. HÖHNER (1 Expl.). (3)

## Dermestidae

*Attagenus punctatus* (SCOPOLI): Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. an blühender *Crataegus* (Weißdorn), 8.5.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. (2)

*Trogoderma glabrum* (HERBST): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Hausgarten, 23.7.2011, leg. LANGE.

*Megatoma undata* (LINNAEUS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch, 30.4.2011, leg. BERGER. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. an Fensterfalle an Buche, 10.-24.6.2011, leg. RUPP. – Wetzlar, Nähe Ruine Kalsmunt (MA 69), 1 Expl. an Apfelbaum-Stamm in Hausgarten, 27.2.2011, leg. RUPP. – Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 4 Expl. in morschem Buchen-Holz, 2.4.2011, leg. BRENNER. (3)

*Ctesias serra* (FABRICIUS): Eppstein–Bremthal (MA 55), 3 Larven unter der toten Rinde einer Eiche, am 20.11.2011 eingetragen und unter Rinde, Holzmehl und Insektenreste in Wohnung aufbewahrt, die Käfer erschienen am 10.1.2012, leg. LANGE.

*Trinodes hirtus* (FABRICIUS): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 6 Expl. in Fensterfalle an Eiche; 1 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche, 6.6.-25.8.2011, leg. RUPP. (3)

## Nitidulidae

*Urophorus humeralis* (FABRICIUS): Schlüchtern (NA 37), 1 Expl. auf Apfel in Supermarkt, 8.6.2011, leg. BRENNER.

Die Art ist kosmopolitisch verbreitet. Ihr Auftreten in Mitteleuropa war von SPORNRAFT (1992) erwartet worden. Die Äpfel (Bio-Pinova), in deren Verpackungskiste der Käfer gefunden wurde, stammten aus Latsch im Vintschgau (Südtirol), wo sich ein Apfel-Lager der in der Nähe wirtschaftenden Produzenten befindet (mündl. Mitt. Herr Guido FRÖLICH, Firma tegut in Fulda, bei dem ich mich für das freundliche Gespräch und die Informationen, die er mir zukommen ließ, an dieser Stelle herzlich bedanken möchte). Hier ist der seltene Fall gegeben, dass man die Verschleppung einer Art in ein bislang unbesiedeltes Gebiet mit großer Sicherheit nachweisen kann. Mir ist kein weiterer Fund dieses Käfers aus Mitteleuropa bekannt, weshalb ich die Art hier als **Neunachweis in Mitteleuropa** werten möchte.

*Meligethes persicus* FALDERMANN: Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 3 Expl. an *Betonica officinalis* LINNAEUS (Heil-Ziest) auf Bergwiese, 14.5.2011, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. KUNZ (2 Expl.).

*Thalycra fervida* (OLIVIER): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. in der Laubstreu am Fuß einer Eiche, 11.1.2004, leg. KARNER.

## Cybocephalidae

*Cybocephalus fodori* ENDRÖDY-YOUNGA: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. auf Gebüsch neben Weinbergsbrache, 3.9.2011, leg. LANGE. (3)

## Monotomidae

*Monotoma angusticollis* (GYLLENHAL): Pfungstadt, Wald zwischen Pfungstadt und Seeheim (östlich der A5) (MA 71), 2 Expl. an Holzstücken auf Haufen von *Formica* (Waldameise), 20.3.2011, leg. LANGE.

*Rhizophagus parallelocollis* GYLLENHAL: Geisenheim (MA 23), 15 Expl. bei Rheinhochwasser an schwimmenden Schaumstoffklötzen, 15.1.2011, leg. LANGE.

## Erotylidae

*Triplax lepida* (FALDERMANN): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. auf Buchen-Zweig, 13.6.2011, leg. BERGER. (2)

*Triplax rufipes* (FABRICIUS): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 5 Expl. in stark verrottetem Baumpilz an liegendem Buchen-Stamm, 13.6.2009, leg. KARNER. (1)

## Cryptophagidae

*Cryptophagus micaceus* REY: Dornburg–Thalheim, NSG "Thalheimer Kiesgrube" (MA 39), 8 Expl. in altem Nest von *Vespa crabro* LINNAEUS (Hornisse) in Nistkasten, 31.10.2011, leg. KUNZ. – Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in verlassenen Nest von *Vespa crabro* LINNAEUS (Hornisse) in hohler Linde, 27.10.2011, leg. LANGE, det. ESSER. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 4 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 28.7.-11.8.2011, leg. RUPP. (2)

*Cryptophagus labilis* ERICHSON: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 7 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche, 10.5.-28.7.2011, leg. RUPP. (2)

## Languriidae

*Cryptophilus integer* (HEER): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Expl. in Streu am Boden, 17.9.2011, leg. LANGE.

## Phalacridae

*Phalacrus nigrinus* (MARSHAM) (= *Phalacrus caricis* STURM): Hanau–Klein-Auheim, Alte Fasanerie (MA 94), 1 Expl. an *Caltha palustris* LINNAEUS (Sumpfdotterblume), 23.4.2011, leg. HÖHNER.

## Laemophloeidae

*Notolaemus unifasciatus* (PAYKULL): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 2 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 30.6.-14.7.2011, leg. RUPP. (2)

## Latridiidae

*Enicmus testaceus* (STEPHENS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. auf Buchen-Zweig, 13.6.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 4 Expl. in Fensterfallen an Eiche und Buche, 14.7.-11.8.2011, leg. RUPP. (2)

## Mycetophagidae

*Mycetophagus quadriguttatus* MÜLLER: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. im Nestbereich von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise) in hohler Eiche, leg. 30.4.2011, LANGE. – Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in verlassenen Nest von *Vespa crabro* LINNAEUS (Hornisse) in hohler Linde, 6.11.2011, leg. LANGE. – Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. in morschem Buchen-Holz, 2.4.2011, leg. BRENNER.

- Mycetophagus multipunctatus* FABRICIUS: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 2 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche; 1 Expl. in Fensterfalle an Buche, 7.4.-10.5.2011, leg. RUPP. – Wetzlar, Weinberg (MA 69), 1 Expl. unter toter Birnbaum-Rinde, 25.11.2011, leg. RUPP. – Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 2 Expl. in morschem Buchen-Holz, 2.4.2011, leg. BRENNER. (3)
- Berginus tamarisci* WOLLASTON: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Weinbergsbrache, 4.6.2011; am selben Fundort 1 Expl. 3.9.2011, leg. LANGE.

### **Colydiidae**

- Pycnomerus terebrans* (OLIVIER): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 3 Expl. in Rissen im weißfaulen, am Boden liegenden Stammteil einer Buche mit zahlreichen Fruchtkörpern von *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm), 17.12.2011, leg. LANGE. (1)
- Langelandia anophthalma* AUBÉ: Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 5 Expl. am 5.2.2011, 3 Expl. am 17.9.2011 und 2 Expl. am 15.12.2011 in der Streu am Boden, leg. LANGE. (2)
- Cicones variegatus* (HELLWIG): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 2 Expl. unter der toten Rinde einer liegenden *Aesculus hippocastanum* LINNAEUS (Gewöhnliche Rosskastanie), 24.3.2011, leg. RUPP. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 28 Expl. in Köderfalle mit Käse an Buche, 10.5.-25.8.2011, leg. RUPP. (3)
- Colydium elongatum* (FABRICIUS): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Buche, 25.8.2011, leg. RUPP. (3)

### **Corylophidae**

- Sacium nanum* (MULSANT & REY): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Mönchbruchpfad (MA 63), 2 Expl. auf toten Zweigen, 16.6.2011, leg. LANGE. (2)
- Orthoperus nigrescens* STEPHENS: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 2 Expl. in Fensterfalle an Buche, 14.9.2011, leg. RUPP. (2)

### **Coccinellidae**

- Scymnus apetzi* MULSANT: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf *Rumex scutatus* LINNAEUS (Schild-Sauerampfer) auf Felssporn, 30.4.2011, leg. HOFMANN. (1)
- Scymnus interruptus* (GOEZE): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Hausgarten, 10.9.2011, leg. LANGE. (3)
- Clitostethus arcuatus* (ROSSI): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), ca. 20 Expl. auf knospendem *Crataegus* (Weißdorn) (zahlreiche weitere Expl. wurden gesehen), 12.4.2007, leg. KARNER. (2)
- Hippodamia undecimnotata* (SCHNEIDER): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. auf kleiner Eiche in Garten, 5.8.2011, leg. LANGE. (3)
- Adalia decempunctata* (LINNAEUS): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. an *Salix aurita* LINNAEUS (Ohr-Weide) auf teilabgetorfte Moorfläche, 25.6.2011, leg. HOFMANN. **Neunachweis für das Rote Moor** (siehe FRISCH 1995)!
- Calvia decempunctata* (LINNAEUS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Viehtriftweg (MA 72), 1 Expl. auf einem der unteren Zweige einer großen, freistehenden Linde, 3.6.2011; am selben Fundort 2 Expl. 15.6.2011, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 1 Expl. auf Gebüsch am Rand eines Waldwegs, 16.6.2011, leg. LANGE.

## Cisidae

*Ropalodontus perforatus* (GYLLENHAL): Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an liegender Buche, 14.5.2011, leg. RUPP. (3)

*Cis glabratus* MELLIÉ: Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 3 Expl. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an liegender Buche, 14.5.2011, leg. RUPP. – Florstadt, Nidda-Aue (MA 97), 43 Expl. in *Phellinus ignarius* (LINNAEUS ex FRIES) QUÉLET (Weiden-Feuerschwamm) an Weide, 25.3.2011, leg. RUPP. – Ranstadt–Bobenhausen (NA 07), 33 Expl. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES an Kirsche, 25.3.2011, leg. RUPP. (3)

*Cis fagi* WALTZ: Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 12 Expl. an Pilzresten unter Buchen-Rinde, 14.5.2011, leg. RUPP.

*Orthocis pygmaeus* (MARSHAM): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 4 Expl. auf totem Eichen-Ast auf Felssporn, 30.4.2011, leg. HOFMANN. – Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 3 Expl. in *Ganoderma lipsiense* (BATSCH ex PERSON) ATKINSON (Flacher Lackporling) an Hainbuche, 9.11.2011, leg. RUPP. – Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 1 Expl. unter toter Kiefern-Rinde, 5.2.2011, leg. HÖHNER. (3)

## Lyctidae

*Lyctus cavicollis* LÉCONTE: Lorch, Wispertal (MA 14), 2 Expl. auf gelagerten Eichen-Stämmen, 4.6.2011, leg. LANGE.

## Bostrichidae

*Xylopertha retusa* (OLIVIER): Hüttenberg–Großrechtenbach, Hohe Birken (MA 69), 21 Expl. auf trockenem Eichen-Reisig, 2.6. (15 Expl.) und 28.6.2011 (6 Expl.), leg. RUPP. (3)

## Anobiidae

*Dryophilus rugicollis* (MULSANT & REY): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 15 Expl. auf mit *Clematis vitalba* LINNAEUS (Waldrebe) überwachsener Esche, 4.6.2011; am selben Fundort 1 Expl. 3.9.2011, leg. LANGE.

Nachdem bislang nur aus Baden (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) sowie aus dem Rheinland und der Pfalz (KÖHLER 2011) sichere deutsche Funde bekannt waren, stellen die Tiere aus Lorchhausen einen **Neunachweis in Hessen** dar!

*Ochina latreillei* (BONVOULOIRE): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. auf totem Eichen-Ast auf Felssporn, 30.4.2011, leg. HOFMANN. (1)

*Ochina ptinoides* (MARSHAM): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) an Felsen, 9.5.2011, leg. LANGE. (3)

*Oligomerus brunneus* (OLIVIER): Reichelsheim–Rohrbach (MA 90), 2 Expl. in 10 m Höhe in alter Eiche (Eklektor), 22.6. und 12.7.2011, leg. HORN. (3)

*Gastrallus immarginatus* (MÜLLER): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 28.7.2011, leg. RUPP. (3)

*Anobium hederae* IHSEN: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 8 Expl. in dickem, totem Ast von *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) an toter Eiche, der am 1.1.2011 eingetragen wurde, am 11.2.2011 daraus geschlüpft, leg. LANGE. (3)

*Anobium denticolle* (CREUTZER): Reichelsheim–Rohrbach (MA 90), 4 Expl. in 10 m Höhe in alter Eiche (Eklektor), 30.5., 12.7. und 6.8.2011, leg. HORN. (3)

*Mesocoelopus niger* (MÜLLER): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), je 1 Expl. auf *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) an Felsen, 30.4.2011, 9.5.2011 und

- 4.6.2011, leg. LANGE. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 4 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 14.-28.7.2011, leg. RUPP. (3)
- Dorcatoma flavicornis* (FABRICIUS): Reichelsheim–Rohrbach (MA 90), 1 Expl. in 10 m Höhe in alter Eiche (Eklektor), 22.6.2011, leg. HORN. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. auf dürrer Eichen-Ast an Waldrand, 6.6.2011, leg. KUNZ. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 14 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 24.6.-11.8.2011, leg. RUPP. (3)
- Dorcatoma chrysolina* STURM: Reichelsheim–Rohrbach (MA 90), 1 Expl. in 10 m Höhe in alter Eiche (Eklektor), 30.5.2011, leg. HORN. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 10 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 24.6.-14.7.2011, leg. RUPP. (3)
- Dorcatoma substriata* HUMMEL: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 4 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 14.-28.7.2011, leg. RUPP. (2)
- Dorcatoma dresdensis* HERBST: Wetzlar, Nähe Ruine Kalsmunt (MA 69), 5 Expl. in *Phellinus pomaceus* (PERS. ex GRAY) MAIRE (Pflaumen-Feuerschwamm) an Pflaume in Garten, 1.3.2011, leg. RUPP. – Florstadt, Nidda-Aue (MA 97), 1 Expl. in *Phellinus ignarius* (LINNAEUS ex FRIES) QUÉLET (Weiden-Feuerschwamm) an Weide, 25.3.2011, leg. RUPP. – Aßlar, Bornbachtal (MB 60), 39 Expl. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES an Esche, 16.8.2011, leg. RUPP. (3)

## Ptinidae

- Ptinus lichenum* MARSHAM: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) an Felsen, 30.4.2011; am selben Fundort 4 Expl. am 4.6.2011 und 2 Expl. am 6.6.2011, leg. LANGE.  
Bislang lagen von dieser Art aus Hessen nur Funde aus dem 19. Jahrhundert vor. HEYDEN (1904) kennt Nachweise aus Frankfurt, Rüdesheim und Bad Soden, HORION (1961) weitere von Darmstadt und Ortenberg. Da ein Vorkommen der Art danach scheinbar nicht mehr festgestellt werden konnte, stellen die Tiere von Lorchhausen einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar! (1)
- Ptinus bicinctus* STURM: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 2 Expl. in Bodenfalle mit Käse im Wurzelbereich einer Buche, 12.-26.4.2011, leg. RUPP. (3)
- Ptinus moorei* KHNZORIAN & KARAPETIAN: Schlüchtern (NA 37), ca. 20 Expl. in der Füllung (Gras, Detritus) zwischen den Balken einer alter Scheune, 14.2.2011; an der selben Stelle noch einmal ca 50 Expl. (zahlreiche weitere Expl wurden gesehen), 30.3.2011, leg. BRENNER.
- Ptinus calcaratus* KIESENWETTER: Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 3 Expl. in Eichen-Laubstreu, 9.5.1999, leg. KARNER.

## Oedemeridae

- Nacertes carniolica* (GISTL): Niedernhausen–Niederseelbach ,Gelände der Firma Hartmann (MA 45), 1 Expl. an weißer Hauswand sitzend, 7.9.2011, leg. LANGE. (3)
- Ischnomera sanguinicollis* (FABRICIUS): Aßlar, Langhecke (MB 60), 1 Expl. auf Pflaumen-Zweig, 8.5.2011, leg. RUPP. (3)
- Ischnomera caerulea* (LINNAEUS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 3 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 30.4.2011, leg. BERGER (2 Expl.), det. HÖHNER, leg. LANGE (1 Expl.). (3)
- Ischnomera cinerascens* (PANDELLÉ): Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. auf Bergwiese, 14.5.2011, leg. KUNZ. (2)
- Oedemera femoralis* (OLIVIER): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 30.4.2011, leg. RUPP. (2)

## Scraptiidae

*Scraptia fuscula* MÜLLER: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 4 Expl. auf Eichen-Ästen an Waldrand, 16.6.2011, leg. LANGE. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 9 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 24.6.-25.8.2011, leg. RUPP. (3)

*Anaspis varians* MULSANT: Lorch, Nollig (MA 14), 2 Expl. auf blühender Vegetation am Rand eines Wegs neben Weinberg, 17.4.2011, leg. LANGE.

## Aderidae

*Aderus populneus* (CREUTZER): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. auf dürrer Eichen-Ast, 9.5.1999; 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden, abgestorbenen Eiche, 11.1.2004, leg. KARNER. – Hadamar (MA 38), 1 Expl. auf Apfelbaum-Ast auf Streuobstwiese, 21.6.2011, leg. KUNZ. (3)

*Euglenes oculus* (PANZER): Niedernhausen–Niederseelbach, Gelände der Firma Hartmann (MA 45), 1 Expl. von außen an Fenster angefliegen, 25.7.2011, leg. LANGE. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. auf dürrer Eichen-Ast an Waldrand, 21.7.2011, leg. KUNZ. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 17 Expl. in Fensterfallen an Eiche und Buche, 6.6.-28.7.2011, leg. RUPP. (2)

## Meloidae

*Lytta vesicatoria* (LINNAEUS): Bad Homburg, Stadtgebiet (MA 76), 1 Expl. am Boden auf Parkplatz laufend, 12.7.2005, leg. KARNER. (3)

*Meloe decorus* BRANDT & ERICHSON: Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf Hochwasserschutzdamm, 7.4.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. (1)

## Mordellidae

*Variimorda basalis* (COSTA): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. an Vegetation auf Sandboden, 30.7.2011, leg. LANGE, vid. HOFMANN.

KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) nennen mit Bayern, Baden, Württemberg und der Pfalz sowie mit Sachsen-Anhalt und Thüringen nur wenige Gebiete in Deutschland mit Funden dieses Stachelkäfers. Da bislang kein Fund aus Hessen bekannt geworden ist, stellt das Tier aus der Viernheimer Heide einen **Neunachweis in Hessen** dar! (3)

*Mordellistena brunneospinosa* ERMISCH: Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotbühl (MA 73), 4 Expl. aus im Januar 2011 eingetragenen Stengeln verschiedener *Artemisia*-Arten (*A. vulgaris* LINNAEUS, *A. campestris* LINNAEUS, *A. absinthium* LINNAEUS) (Beifuß, Wermut), die Käfer schlüpfen von März bis April 2011 in beheiztem Raum, leg. LANGE, vid. HOFMANN.

Dieser extrem seltene Stachelkäfer war innerhalb Deutschlands bislang nur aus Bayern bekannt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Deshalb stellt der Fund vom Rotbühl einen **Neunachweis in Hessen** dar! (2)

*Mordellistena bicoloripilosa* ERMISCH: Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotbühl (MA 73), 3 Expl. aus im Januar 2011 eingetragenen Stängeln verschiedener *Artemisia*-Arten (*A. vulgaris* LINNAEUS, *A. campestris* LINNAEUS, *A. absinthium* LINNAEUS) (Beifuß, Wermut), die Käfer schlüpfen von Mitte März bis Mitte April 2011 in beheiztem Raum, leg. LANGE. (2)

*Mordellistena weisei* SCHILSKY: Hanau, Bahngelände Nähe Hauptbahnhof (MA 95), 1 Expl. auf Ruderalfläche, 23.6.2011, leg. BERGER, det. HOFMANN. (3)

*Mordellistena acuticollis* SCHILSKY: Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotbühl (MA 73), 9 Expl. aus im Januar 2011 eingetragenen Stängeln verschiedener *Artemisia*-Arten (*A. vulgaris* LINNAEUS, *A. campestris* LINNAEUS, *A. absinthium* LINNAEUS)



(Beifuß, Wermut), die Käfer schlüpfen von Mitte März bis Mitte April 2011 in beheiztem Raum, leg. LANGE. (3)

### Melandryidae

- Abdera quadrfasciata* (CURTIS): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf abgestorbenem, verpilztem Eichen-Ast (Totfund), 13.9.2011, leg. LANGE. (3)
- Abdera triguttata* (GYLLENHAL): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. auf trockenem Buchen-Ast, 21.5.2011, leg. HÖHNER.
- Phloiotrya rufipes* (GYLLENHAL): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 2 Expl. auf trockenem Erlen-Ast, 4.6.2011, leg. RUPP. (3)
- Melandrya caraboides* (LINNAEUS): Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. unter totem Ast am Boden (Totfund), 14.5.2011, leg. HOFMANN. (3)
- Melandrya barbata* (FABRICIUS): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Buche, 26.4.-10.5.2011, leg. RUPP. (2)
- Conopalpus brevicollis* KRAATZ: Braunfels–Tiefenbach, Weinberg (MA 59), 1 Expl. an Eichen-Klafferholz, 20.5.2011, leg. RUPP. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 30.4.2011, leg. RUPP. (2)
- Osphya bipunctata* (FABRICIUS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch, 30.4.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER; am selben Fundort 1 Expl. an blühender *Crataegus* (Weißdorn), 30.4.2011, leg. RUPP. – Glashütten–Schloßborn, Rentmauer (Butznickel) (MA 56), 1 Expl. auf Gebüsch, 26.5.2011, leg. LANGE. – Braunfels–Tiefenbach, Weinberg (MA 59), 1 Expl. an Rebholz, 20.5.2011, leg. RUPP. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. an *Viburnum opulus* LINNAEUS (Gemeiner Schneeball), 24.5.2011, leg. RUPP. – Wetzlar, Weinberg (MA 69), 1 Expl. an Apfelbaum-Ast, 4.6.2011, leg. RUPP. – Greifenstein–Arborn, Wetzlarer Hütte (MB 40), 4 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 13.5.2011, leg. RUPP. – Aßlar, Langhecke (MB 60), 1 Expl. auf Wiese unter Obstbäumen, 8.5.2011, leg. RUPP. (2)

### Tetratomidae

- Tetratoma fungorum* FABRICIUS: Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 5 Expl. an *Pleurotus* (Seitling) an liegendem Buchen-Stammteil, 6.2.2011, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 3 Expl. an *Pleurotus* an Buche, 3.12.2011, leg. LANGE. – Eppstein–Bremthal (MA 55), 3 Expl. an aus Buchen-Hochstubben wachsenden Hutpilzen und unter der toten Rinde in der Nähe der Pilze, 20.11.2011, leg. LANGE.
- Tetratoma desmarestii* LATREILLE: Lorch, Nollig (MA 14), 6 Expl. auf abgestorbenen, verpilzten Eichen-Ästen, 13.9.2011, leg. LANGE. (1)
- Tetratoma ancora* FABRICIUS: Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 1 Expl. auf dürrem Buchen-Ast, 15.5.2004, leg. KARNER. (3)

### Alleculidae

- Allecula morio* (FABRICIUS): Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 4 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 8.-28.7.2011, leg. RUPP. (3)
- Allecula rhenana* BACH: Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 11.8.2011, leg. RUPP. (2)
- Prionychus ater* (FABRICIUS): Wetzlar–Steindorf, Eschkaut (MA 69), 1 Expl. in der Stammhöhle eines Apfelbaums, 7.2.2011, leg. RUPP. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 2 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 14.7.-11.8.2011, leg. RUPP. (3)

- Pseudocistela ceramboides* (LINNAEUS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf alter *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu), 30.4.2011, leg. HOFMANN. (2)
- Mycetochara maura* (FABRICIUS) = *Mycetochara linearis* (ILLIGER): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. auf Buchen-Zweig, 13.6.2011, leg. BERGER.
- Cteniopus sulphureus* (LINNAEUS) = *Ct. flavus* (SCOPOLI): Hanau–Klein-Auheim (MA 94), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 12.7.2011, leg. BERGER. (3)

### Tenebrionidae

- Bolitophagus reticulatus* (LINNAEUS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 1 Expl. in einem Riss im weißfaulen, am Boden liegenden Stammteil einer Buche mit zahlreichen Fruchtkörpern von *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm), 17.12.2011, leg. LANGE. – Eppstein–Bremthal (MA 55), 5 Expl. in stark zerfressenem Fruchtkörper von *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES an Buche, 20.11.2011, leg. LANGE. – Glashütten, Nähe „Rotes Kreuz“ (MA 66), 4 Expl. in altem Fruchtkörper von *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES an Buche, 24.9.2011, leg. LANGE. – Aßlar, Bornbachtal (MB 60), 11 Ex. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES an Esche, 16.8. und 21.8.2011, leg. RUPP. (3)
- Neomida haemorrhoidalis* (FABRICIUS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 3 Expl. in Rissen im weißfaulen, am Boden liegenden Stammteil einer Buche mit zahlreichen Fruchtkörpern von *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm), 17.12.2011, leg. LANGE. (1)
- Platydema violaceum* (FABRICIUS): Reichelsheim–Rohrbach (MA 90), 1 Expl. in 10 m Höhe in alter Eiche (Eklektorfang), 30.5.2011, leg. HORN. (3)
- Palorus depressus* (FABRICIUS): Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. in morschem Buchen-Holz, 2.4.2011, leg. BRENNER. (3)
- Uloma culinaris* (LINNAEUS): Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 1 Expl. im Holz eines toten stehenden Pappel-Stamms, 21.12.2011, leg. BERGER. (2)

### Trogidae

- Trox perlatus* (GOEZE): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 13 Expl. 29.3.-27.8.1996, 10 Expl. 31.1.-1.9.1997, 16 Expl. 7.1.-23.7.1998 und 5 Expl. 9.3.-29.6.1999 in Bodenfallen in der Streu unter einer Eiche; 4 Expl. 7.1.-4.5.1998 in Bodenfallen in der Streu unter einem Apfelbaum; 13 Expl. 27.3.-23.7.1998 in Bodenfallen in der Streu unter einer Kiefer; 1 Expl. 27.3.-4.5.1998 in Bodenfalle auf Weinberg-Brache; 12 Expl. 9.3.-22.4.1999 auf Silikat-Trockenrasen, leg. BRENNER; am gleichen Fundort, 2 Expl. am Boden in lichtem Eichen-Wald bzw. an trockenem Kot am Wegrand neben Weinberg-Brache, 6.6.2011, leg. LANGE. (2)
- Trox perrisii* FAIRMAIRE: Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 73), 1 Expl. in Rinden- und Mulmgesiebe, 18.4.2004, leg. KARNER. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 24.5.2011, leg. RUPP. (1/R)

### Scarabaeidae

- Onthophagus verticicornis* (LAICHARTING): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf auf Silikat-Trockenrasen, 30.4.2011, leg. BERGER. (3)
- Psammodyus asper* (FABRICIUS): Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotbühl (MA 73), 3 Expl. auf Sandboden laufend, 20.3.2011, leg. LANGE. (-/3)
- Rhyssalus germanus* (LINNAEUS): Reichelsheim–Kirchbeefurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Barberfalle, 1.5.2011, leg. HORN. (-/3)

- Diastictus vulneratus* (STURM): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. unter Stein in Nest von *Tetramorium caespitum* (LINNAEUS) (Gemeine Rasenameise), 13.3.2011, leg. LANGE. (2/1)
- Pleurophorus caesus* (CREUTZER): Oestrich-Winkel, Oestrich (MA 33), 1 Expl. bei Rheinhochwasser an schwimmendem Schaumstoffstück, 14.1.2011, leg. LANGE. – Oestrich-Winkel, Winkel (MA 23), 1 Expl. bei Rheinhochwasser an schwimmendem Schaumstoffstück, 16.1.2011, leg. LANGE. – Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. in Eichen-Wald fliegend, 18.6.2002, leg. KARNER. (2/3)
- Maladera holosericea* (SCOPOLI): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. unter Stein auf Sandboden, 29.3.2011, leg. LANGE. (3)
- Rhizotrogus marginipes* MULSANT: Hanau–Klein-Auheim (MA 94), 21 Expl. in Pflanz-erde auf dem begrünten Mittelstreifen einer Straße eingegraben, 12.4.2011, am 23.5.2011 konnte noch einmal 1 Expl. unter den gleichen Fundumständen beobachtet werden, leg. BERGER. – Hanau–Steinheim, Ortsmitte (MA 95), 1 Expl. auf Wiese auf Spielplatz, 27.4.2011, leg. BERGER. (1)
- Rhizotrogus aestivus* (OLIVIER): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. auf dem Boden in Eichen-Wald, 30.4.2011, leg. BERGER; am selben Fundort 3 Expl. bei Einbruch der Dunkelheit auf frei stehender, blühender *Crataegus* (Weißdorn) sitzend und fliegend, 9.5.2011, leg. LANGE. – Wetzlar, Nähe Ruine Kalsmunt (MA 69), ca. 12 Expl. abends um Apfelbaum in Garten schwärmend beobachtet, 20.4.2011, an den darauf folgenden Abenden schwärmten noch mehr Expl., vid. RUPP. (3/-)
- Melolontha melolontha* (LINNAEUS): Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. auf Weg an Waldrand, 30.10.2011, leg. BRENNER. Dieser außergewöhnlich spät im Jahr getätigte Nachweis ist wohl auf den besonders milden Herbst des Jahres zurückzuführen. Die Wärme trieb die im Erdreich auf das Frühjahr wartende Imago an die Oberfläche. Sie gehörte also der Imaginalpopulation des folgenden Jahres an.
- Oxythyrea funesta* (PODA): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 30.4.2011, leg. BERGER, leg. HOFMANN. – Wetzlar–Magdalenenhausen, Weinberg (MA 69), 1 Expl. auf Blüte von *Rosa canina* LINNAEUS (Hunds-Rose), 4.6.2011, leg. HÖHNER. (2/3)
- Protaetia aeruginosa* (DRURY): Hanau, Alte Fasanerie (MA 94), 1 Expl. auf Weg in Eichen-Wald (Totfund), 12.4.2011, leg. BERGER. (1)

## Lucanidae

- Sinodendron cylindricum* (LINNAEUS): Greifenstein–Arborn, Wetzlarer Hütte (MB 40), 1 Expl. in weißfaulem Buchen-Holz, 13.5.2011, leg. RUPP. (3)

## Cerambycidae

- Ergates faber* (LINNAEUS): Rodenbach–Niederrodenbach, Niederrodenbacher Weinberg (Wingerte) (NA 05), 1 Expl. in Garten (Totfund), 19.7.2011, leg. STIEHR. (2)
- Cortodera femoralis* (FABRICIUS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 30.4.2011, leg. RUPP. (3)
- Cortodera humeralis* (SCHALLER): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 30.4.2011, leg. RUPP. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 1 Expl. in Fensterfalle an Buche, 24.5.2011, leg. RUPP. (3)
- Leptura aurulenta* (FABRICIUS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Viehtriftweg (MA 72), 1 Expl. bei der Eiablage im rindenlosem Bereich am Stamm einer toten Birke, 15.6.2011, leg. LANGE. (2)

- Anoploclera rufipes* (SCHALLER): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. um blühende *Crataegus* (Weißdorn) fliegend, 30.4.2011, leg. RUPP. (3)
- Anoploclera sexguttata* (FABRICIUS): Hüttenberg–Großrechtenbach, Hohe Birken (MA 69), 1 Expl. auf *Aegopodium podagraria* LINNAEUS (Giersch), 2.6.2011, leg. RUPP. (3)
- Cerambyx scopoli* FUESSLY: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 30.4.2011, leg. BERGER; am selben Fundort 1 Expl. auf blühender *Crataegus* beobachtet, 30.4.2011, vid. HÖHNER; am selben Fundort ca. 5 Expl. auf *Rosa canina* LINNAEUS (Hunds-Rose) beobachtet, vid. HOFMANN. (3)
- Glaphyra umbellatarum* (SCHREBER) (= *Molorchus umbellatarum* (SCHREBER)): Wetzlar–Magdalenenhausen, Weinberg (MA 69), 1 Expl. auf blühender *Cornus sanguinea* LINNAEUS (Blutroter Hartriegel), 4.6.2011, leg. BERGER.
- Ropalopus femoratus* (LINNAEUS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch, 30.4.2011, leg. BERGER. (3)
- Poecilium rufipes* (FABRICIUS) (= *Phymatodes rufipes* (FABRICIUS)): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Zweig von *Prunus spinosa* LINNAEUS (Schlehe), 30.4.2011, leg. BERGER; am selben Fundort 2 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 30.4.2011, leg. RUPP. (2)
- Plagionotus detritus* (LINNAEUS): Reichelsheim–Rohrbach (MA 90), 1 Expl. in 10 m Höhe in alter Eiche (Eklektor), 22.6.2011, leg. HORN. (2)
- Dorcadion fuliginator* (LINNAEUS): Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf Magerrasen auf Hochwasserdamm, 27.4.2011, leg. KOCH. (2)
- Lamia textor* (LINNAEUS): Dornburg–Wilsenroth (MA 39), 1 Expl. unter Stein zwischen jungen Weiden in Basaltbruch, 8.9.2011, leg. KUNZ. (2)
- Mesosa nebulosa* (FABRICIUS) : Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. in Eichen-Wald fliegend beobachtet, 30.4.2011, vid. HOFMANN. (3)
- Anaethetis testacea* (FABRICIUS): Hadamar, Galgenberg (MA 38), 1 Expl. auf dürrer Apfelbaum-Ast auf Streuobstwiese, 27.6.2011, leg. KUNZ. (3)
- Leiopus linnei* WALLIN, NYLANDER & KVAMME: Wetzlar–Magdalenenhausen, Weinberg (MA 69), 2 Expl. auf Apfelbaum-Ästen, 4.6.2011, leg. KUNZ.
- Exocentrus adspersus* MULSANT: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. auf Buchen-Zweig, 13.6.2011, leg. BERGER. – Hüttenberg–Großrechtenbach, Hohe Birken (MA 69), 6 Expl. an trockenem Eichen-Reisig, 2.6.2011 und 16 Expl. am selben Fundort, 28.6.2011, leg. RUPP. – Braunfels–Neukirchen, Weipersgrund (MA 59), 1 Expl. auf Eichen-Klafterholz, 3.7.2011, leg. RUPP. (3)
- Agapanthia pannonica* KRATOCHVIL (? *cardui* (LINNAEUS) siehe BRENNER 2012): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation am Rand eines Wegs neben Weinberg, 1.5.2011, leg. LANGE. (2)
- Saperda carcharias* (LINNAEUS): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Wohnhaus (Totfund), 20.11.2011, leg. PRÖSSL, in coll. LANGE.
- Menesia bipunctata* (ZOUBKOFF): Hanau–Klein-Auheim, Binsig (MA 94), 3 Expl. an Zweig von *Frangula alnus* MILLER (Faulbaum), 29.5.2011, leg. BERGER. (3)
- Phytoecia pustulata* (SCHRANK): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. an Weinbergsmauer, an deren Fuß zahlreiche *Achillea millefolium* LINNAEUS (Gemeine Schafgarbe) wuchsen, 26.3.2011; am selben Fundort 5 Expl. 2.4.2011, leg. LANGE. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. an *Achillea millefolium* LINNAEUS (Gemeine Schafgarbe), 30.4.2011, leg. BERGER; am selben Fundort 1 Expl. über Silikat-Trockenrasen fliegend beobachtet, 30.4.2011, vid. HÖHNER. (2)

## Chrysomelidae

- Plateumaris sericea* (LINNAEUS): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. auf *Scirpus sylvaticus* LINNAEUS (Wald-Simse) auf teilabgetorfte Moorfläche, 25.6.2011, leg. HOFMANN. Bisher war die Art im Roten Moor nur subfossil durch Fragmente im Torf belegt. Nach FRISCH (1995) sollen diese Fragmente in einem etwa 2000 Jahre alten Torfhorizont zu finden sein. Auch bei dieser Exkursion wurden im Torf an der Abbaukante des offenen Hochmoors wieder mehrere blaue Flügeldecke aufgefunden (vid. HOFMANN, vid. BRENNER). Um so erfreulicher ist, dass die Art nun auch **erstmalig lebend im Roten Moor nachgewiesen** werden konnte (siehe FRISCH 1995)!
- Cryptocephalus distinguendus* SCHNEIDER: Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. an *Betula pubescens carpatica* WALDSTEIN-WARTEMBERG & KITAIBEL (Karpaten-Birke) am Rand des offenen Hochmoors, 25.6.2011, leg. HOFMANN (siehe auch BRENNER 1998). (2)
- Cryptocephalus parvulus* MÜLLER: Hanau–Klein-Auheim, Binsig (MA 94), 1 Expl. an Zweig von *Frangula alnus* MILLER (Faulbaum), 29.5.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Glashütten–Schloßborn, Rentmauer (Butznickel) (MA 56), 1 Expl. auf Gebüsch am Rande einer Blockhalde, 26.5.2011, leg. LANGE.
- Cryptocephalus elegantulus* GRAVENHORST: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14): 1 Expl. auf *Geranium sanguineum* LINNAEUS (Blutroter Storchschnabel), 30.4.2011, leg. RUPP. (3)
- Cryptocephalus populi* SUFFRIAN: Hünfelden–Mensfelden, Mensfelder Kopf (MA 37), 1 Expl. auf Pappel-Zweig, 7.7.2011, leg. KUNZ. (3)
- Chrysolina fastuosa* (SCOPOLI): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. auf *Galeopsis tetrahit* LINNAEUS (Gemeiner Hohlzahn) neben Fichtenschlag am Rande des eigentlichen Moorgebiets (Nähe Parkplatz), 25.6.2011, vid. HOFMANN. **Neunachweis für das Rote Moor** (siehe FRISCH 1995)!
- Neophaedon pyritosus* (ROSSI): Oestrich-Winkel–Oestrich (MA 33), 5 Expl. bei Rheinhochwasser an schwimmenden Schaumstoffstücken, 14.1.2011, leg. LANGE. – Oestrich-Winkel–Winkel (MA 23), 1 Expl. bei Rheinhochwasser an schwimmendem Ast, 16.1.2011, leg. LANGE. (3)
- Gonioctena intermedia* (HELLER): Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 6 Expl. an Zweigen von *Sorbus aucuparia* LINNAEUS (Eberesche), 14.5.2011, leg. BERGER (2 Expl.), det. HÖHNER, leg. KUNZ (2 Expl.), leg. KOCH (2 Expl.). (2)
- Phyllotreta procera* (REDTENBACHER): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 7 Expl. an *Reseda luteola* LINNAEUS (Färber-Resede), 4.6.2011, leg. LANGE. (3)
- Aphthona pallida* (BACH): Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 1 Expl. auf Magerrasen, 17.8.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)
- Longitarsus ochroleucus* (MARSHAM): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf mehligem *Verbascum* (Königskerze), 30.4.2011, leg. HOFMANN. (3)
- Longitarsus aeruginosus* (FOUDRAS): Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotböhl (MA 73), 1 Expl. auf Sandboden, 24.9.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)
- Longitarsus ganglbaueri* HEIKERTINGER: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Silikat-Trockenrasen, 30.4.2011, leg. HOFMANN.
- Longitarsus brisouti* HEIKERTINGER: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. auf *Rumex scutatus* LINNAEUS (Schild-Sauerampfer) auf Felssporn, 30.4.2011, leg. HOFMANN. (1)
- Altica palustris* WEISE: Hanau–Klein-Auheim, Alte Fasanerie (MA 94), 1 Expl. an *Caltha palustris* LINNAEUS (Sumpfdotterblume), 23.4.2011, leg. HÖHNER. (3)

*Altica helianthemii* (ALLEN) (= *Altica pusilla* DUFTSCHMID): Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 9 Expl. auf Bergwiese mit *Sanguisorba officinalis* LINNAEUS (Großer Wiesenknopf), 14.5.2011, leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. HOFMANN (6 Expl.), leg. KUNZ (1 Expl.), leg. KOCH (1 Expl.).

*Crepidodera nitidula* (LINNAEUS): Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. auf Weiden-Ast, 14.5.2011, leg. HÖHNER.

*Dibolia foersteri* BACH: Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 2 Expl. auf Bergwiese, 14.5.2011, leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. KUNZ (1 Expl.); am selben Fundort 5 Expl. auf *Betonica officinalis* LINNAEUS (Heil-Ziest) auf Bergwiese, leg. HOFMANN (4 Expl.), leg. KOCH (1 Expl.).

Von diesem Erdflöhen bislang nur alte hessische Funde aus dem 19. Jahrhundert von Königstein–Falkenstein, vom Feldberg im Taunus und von Weilburg vor (HEYDEN 1904). Da keine neueren Funde bekannt geworden sind, stellen die Tiere von Oberreifenberg einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar!(3)

### **Bruchidae**

*Bruchidius varius* (OLIVIER): Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. an blühender *Crataegus* (Weißdorn), 27.4.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch an Wegrand, 30.4.2011, leg. LANGE. (1)

### **Anthribidae**

*Tropideres albirostris* (HERBST): Lorch, Wispertal (MA 14), 2 Expl. auf gelagerten Eichen-Stämmen, 4.6.2011, leg. LANGE. (3)

*Choragus sheppardi* KIRBY: Groß-Gerau, Groß-Garauer Wald, Hirtenhäuserschneise, Nähe Falltorhaus (MA 63), 1 Expl. auf abgeknicktem Kiefern-Ast, 11.6.2011, leg. LANGE. (3)

### **Scolytidae**

*Phthorophloeus spinulosus* REY: Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. auf Fichten-Ast, 14.5.2011, leg. HÖHNER. (1)

*Phloeosinus thujae* PERRIS: Steinau an der Straße, Weinberg (NA 37), ca. 50 Expl. aus am 16.1.2011 eingetragenen Wacholder-Holz gezogen, geschlüpft am 16.2.2011, leg. BERGER. Aus dem selben Holzstück schlüpften auch 3 Expl. von *Phloeosinus aubei* (PERRIS).

### **Platypodidae**

*Platypus cylindrus* (FABRICIUS): Lorch, Wispertal (MA 14), 1 Expl. auf gelagertem Eichen-Stamm, 4.6.2011, leg. LANGE. – Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. auf dürrer Eichen-Ast, 7.6.2007, leg. KARNER. (3)

### **Rhynchitidae**

*Neocoenorhinus interpunctatus* (STEPHENS) (= *Caenorhinus interpunctatus* (STEPHENS)): Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. auf Ast, 14.5.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER.

### **Apionidae**

*Alocentron curvirostre* (GYLLENHAL): Hanau–Steinheim, Ortsmitte (MA 95), 2 Expl. an *Alcea rosea* LINNAEUS (Stockrose) in Garten, 23.6.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER.

Dieser Spitzmausrüssler ist von Vorderasien und Südeuropa über das südöstliche Europa bis nach Mitteleuropa verbreitet. Hier trat er bislang in Österreich sowie in Mähren und der Slowakei auf (BEHNE 1994). Nach Deutschland gelangte er offensichtlich – wie vorher bereits bei *Rhopalapion longirostre* (OLIVIER) geschehen – durch die Verbreitung neuer für den Gärtner interessanter Formen seiner Nahrungspflanze *Alcea rosea*, in deren Stengelmark sich die Larve entwickelt. KÖHLER (2011) kennt deutsche Nachweise aus Württemberg und dem Weser-Ems-Gebiet. Der Fund von Hanau stellt somit einen **Neunachweis in Hessen** dar!

*Squamapion cineraceum* (WENCKER): Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 2 Expl. an *Prunella vulgaris* LINNAEUS (Gemeine Braunelle), 30.7.2011, leg. HÖHNER; an der selben Stelle noch einmal 5 Expl. an *Prunella vulgaris* LINNAEUS, 17.8.2011, leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. BERGER (4 Expl.), det. HÖHNER. (3)

*Squamapion flavimanum* (GYLLENHAL): Schlüchtern–Hohenzell, (NA 37), 2 Expl. auf Kalk-Trockenrasen, 1.9.2011, leg. HÖHNER.

*Hemitrichapion reflexum* (GYLLENHAL): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalk-Trockenrasen, 1.9.2011, leg. HÖHNER.

### Nanophyiidae

*Nanophya brevis* BOHEMAN: Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 1 Expl. auf *Phragmites australis* (CAVANILLES) TRINIUS ex STEUDEL (Gemeines Schilf), 17.8.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 4 Expl. auf *Lythrum salicaria* LINNAEUS (Blutweiderich) in einem Graben in der Feldflur, 4.8.2011, leg. KUNZ. (2)

### Curculionidae

*Pachyrhinus lethierryi* (DESBROCHERS): Hadamar (MA 38), 1 Expl. in der Nähe von *Juniperus* (Wacholder) und *Thuja* (Lebensbaum) fliegend, 14.6.2011, leg. KUNZ. Der Grüne Zypressenrüssler ist nach RHEINHEIMER & HASSLER (2010) autochthon nur in Südfrankreich sowie auf Korsika und Sardinien vorkommend. Diese Autoren vermerken, dass er nach Mitteleuropa eingeschleppt wurde, wo er im Siedlungsbereich wegen seiner Nahrungspflanzen (*Chamaecyparis*, *Juniperus*, *Cupressus* und *Thuja*) in etlichen Siedlungen stabil eingebürgert sein dürfte. Sie zitieren Funde aus dem Elsass, der Schweiz, Südeuropa, vom Nordrhein, aus Baden-Württemberg, der Pfalz und Sachsen-Anhalt. HIRSCH (2012) kennt weitere deutsche Nachweise von Baden-Württemberg (Heilbronn–Horkheim, Niefern-Öschelbronn), Berlin (Rudow), Niedersachsen (Braunschweig, Braunschweig–Rüningen) und vom Weser-Ems-Gebiet (Bad Zwischenahn). Ein hessisches Vorkommen war bislang nicht nachgewiesen worden, weshalb der Fund von Hadamar einen **Neunachweis in Hessen** darstellt!

*Barypeithes tenex* (BOHEMAN): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. auf trockenem Buchen-Ast, 21.5.2011, leg. HÖHNER.

*Barypeithes mollicomus* (AHRENS): Wetzlar–Magdalenenhausen, Weinberg (MA 69), 1 Expl. auf Gebüsch, 4.6.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER.

*Sitona cambricus* STEPHENS: Reichelsheim–Kirchbeefurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Barberfalle, 23.4.2011, leg. HORN.

*Larinus beckeri* PETRI: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), je 1 Expl. auf *Centaurea scabiosa* LINNAEUS (Skabiosen-Flockenblume), 4.6.2011 und 3.9.2011, leg. LANGE. (3)

*Rhyncolus punctatulus* BOHEMAN: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. am Fuß von hohler Eiche mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 6.6.2011, leg. LANGE. (2)

- Hexarthrum capitulum* (WOLLASTON): Groß-Umstadt (MA 92), 22 Expl. in einer Wohnung in altem Fachwerkhause, 4.7.2011, leg. HORN.
- Dorytomus ictor* (HERBST): Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 1 Expl. im Holz eines toten stehenden Pappel-Stamms, 19.11.2011, leg. HÖHNER.
- Tournotaris bimaculata* (FABRICIUS) (= *Notaris bimaculatus* (FABRICIUS)): Reichelsheim–Kirchbeerfurth, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Barberfalle, 1.5.2011, leg. HORN.
- Bradybatus fallax* GERSTÄCKER: Frankfurt–Schwanheim, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. unter einer Rindenschuppe eines *Acer pseudoplatanus* LINNAEUS (Berg-Ahorn), 30.12.2011, leg. LANGE.
- Curculio elephas* (GYLLENHAL): Frankfurt–Bockenheim, Varrentrapstraße (MA 75), aus einer im Oktober 2010 mitgenommene Frucht von *Quercus cerris* LINNAEUS (Zerr-Eiche) schlüpfte nach wenigen Tagen eine Larve, die sich im Frühjahr 2011 zur Imago entwickelte, die schließlich am 5.3.2011 schlüpfte, leg. LANGE. (1)
- Magdalis ruficornis* (LINNAEUS): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 2 Expl. auf *Sorbus aucuparia* LINNAEUS (Eberesche) in Karpaten-Birken-Wald (*Vaccinio-Betuletum-carpathicae*), 25.6.2011, leg. HOFMANN. **Neunachweis für das Rote Moor** (siehe FRISCH 1995)!
- Acalles dubius* SOLARI: Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 3 Expl. in der Streu am Boden, 5.2.2011, leg. LANGE. (3)
- Acalles ptinoides* (MARSHAM): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 1 Expl. in der Laubstreu eines Buchen-Waldes, 3.12.2011, leg. LANGE.
- Baris fallax* (BRISOUT): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. auf kleiner verwachsener *Isatis tinctoria* LINNAEUS (Färber-Waid) mit aufgetriebenem Wurzelhals, 30.4.2011, leg. HOFMANN; am selben Fundort 3 Expl. an *Isatis tinctoria* LINNAEUS am Fuß einer Weinbergsmauer, die Käfer befanden sich an bodennahen Pflanzenteilen, teilweise unter der Erde, 30.4.2011, leg. LANGE. (3)
- Rhinoncus henningsi* WAGNER: Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 5 Expl. auf *Polygonum bistorta* LINNAEUS (Schlangen-Knöterich) auf Feuchtwiese, 14.5.2011, leg. HOFMANN. (3)
- Thamiocolus signatus* (GYLLENHAL): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation am Rand eines Wegs neben Weinberg, 17.4.2011, leg. LANGE. (3)
- Ceutorhynchus sulcicollis* (PAYKULL): Lorch, Nollig (MA 14), 2 Expl. auf Vegetation am Rande eines Weinberg-Wegs, 2.4.2011; am selben Fundort 1 Expl. 6.3.2011, leg. LANGE. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Silikat-Trockenrasen, 30.4.2011, leg. HÖHNER; am selben Fundort 2 Expl. auf kleiner verwachsener *Isatis tinctoria* LINNAEUS (Färber-Waid) mit aufgetriebenem Wurzelhals, 30.4.2011, leg. HOFMANN.
- Cionus olens* FABRICIUS: Hanau, Bahngelände Nähe Hauptbahnhof (MA 95), 1 Expl. an *Verbascum* (Königskerze), 23.6.2011, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)
- Orchestes fagi* (LINNAEUS): Rhön, Rotes Moor (NA 79), 2 Expl. auf *Betula pubescens carpathica* WALDSTEIN-WARTEMBERG & KITABEL (Karpaten-Birke) am Rand des offenen Hochmoors (weit und breit keine Buche!), 25.6.2011, leg. HOFMANN. **Neunachweis für das Rote Moor** (siehe FRISCH 1995)!

## Literatur

- BATHON, H. (1992): Käferfunde der Jahre 1990 bis 1992 aus Hessen, Teil 1: Familien Carabidae bis Buprestidae. – Hess. Faun. Briefe 12(3): 44-48, Darmstadt.



- BEHNE, L. (1994): 92.e Familie: Apionidae, 1. Unterfamilie: Apioninae. – In: LOHSE & LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas. 3. Supplementband (Bd. 14): 184-246, Krefeld.
- BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRÜTTKE & P. PRETSCHER (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenr. Landschaftspf. Natursch., Bonn-Bad Godesberg, 55: 3-434.
- BRENNER, U. (1998): Käferfunde des Jahres 1995 aus Hessen. 8. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen. – Hess. faun. Briefe 17(2/3): 45-59, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2012): Käferfunde des Jahres 2010 aus Hessen. 19. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen. – Hess. faun. Briefe 31(3): 33-48, Darmstadt.
- BÜCKING, H. (1930-32): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Erster Nachtrag zur II. Auflage des Hauptverzeichnisses von Lucas von HEYDEN (1904). – Entomol. Bl. 26: 145-163; 27: 39-42, 83-89, 122-128, 174-183; 28: 73-80, 122-125, 167-170, Berlin.
- FRISCH, J. (1995): Die Käferfauna des Roten Moores (Insecta: Coleoptera). Eine ökologisch-faunistische Studie zur Käferfauna der Rhönmoore. – Beitr. Naturkde. Osthessen 30: 3-180, Fulda.
- HEYDEN, L. von (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main.
- HIRSCH, J. (2012): *Otiorhynchus* ssp. (Coleoptera: Curculionidae) as pest in horticulture – genetics and management options with entomopathogenic fungi. – Dissertation, Universität Hohenheim, 138 S.  
opus.ub.uni-hohenheim.de/volltexte/2012/773/pdf/Dissertation\_Jacqueline\_Hirsch.pdf
- HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 2: Palpicornia–Staphylinoidea (außer Staphylinidae). – Frankfurt am Main.
- HORION, A. (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 11: Staphylinidae, 3. Teil: Habrocerinae bis Aleocharinae (Ohne Subtribus Athetae). – Überlingen.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomol. Nachr. Ber., Beiheft 4: 1-185, Dresden.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) (Coleoptera) Teil 1. – Entomol. Nachr. Ber. 55(2-3): 109-174, Dresden.
- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz: Natur in Hessen).
- MOLENDI, R. (1999): *Pterostichus negligens* (STURM, 1824) (Coleoptera, Carabidae) in Kaltluft erzeugenden Blockhalden in Thüringen und Hessen. – Thüringer faun. Abh. 6: 145-147, Erfurt.
- NIEHUIS, M. (2004): Die Prachtkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 31: 1-713, Landau.
- NIEHUIS, M. & T. MÜLLER (2005): Nachweise von *Anthaxia semicuprea* KÜSTER, 1851 (sensu BÍLÝ 1999) in Deutschland (Coleoptera, Buprestidae). – Entomol. Bl. 101(1): 65-68, Keltern.
- RHEINHEIMER, J. & M. HASSLER (2010): Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. – Naturschutz-Spektrum, Themen 99, 944 S., Karlsruhe.
- SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera: Familienreihen Scarabaeoidea und Lucanoidea). – 47 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen).
- SCHERF, H. (1981): Die im Vogelsberg bisher nachgewiesenen Käfer aus der Familie Pytidae. – Entomol. Z. 91(12): 138-141, Stuttgart.

- SCHÜLKE, M. & M. KOCIAN (2000): Revision der Artgruppe des *Mycetoporus nigricollis* STEPHENS, 1835 (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae). – Entomol. Bl. **96**: 81-126, Keltern.
- SINGER, K. (1955): Die Käfer (Coleoptera). Beiträge zur Fauna des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. – Mitt. Naturwiss. Mus. Stadt Aschaffenburg, N. F. **7**: 1-272, Aschaffenburg.
- SPORNRAFT, K. (1992): 50. Familie: Nitidulidae. – In: LOHSE & LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas. 2. Supplementband (Bd. 13): 91-110, Krefeld.

### **Verfasser**

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde des Jahres2011 aus Hessen 20. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen 23-48](#)