

- Barypithes Pirazzolii* Strl.: Piano della Fugazza (Lessinische Alpen).
Lepyrus armatus Weise: Neusiedlersee, Brucker Haide (Oestl. Niederösterreich), Karwendelgebirge, Lessinische Alpen (Monte Pasubio, Campo grosso), Monte Baldo, Monte Generoso (Tessin).
Tropiphorus Bertolini Strl.: Rolle-Pass (Cadorische Dolomiten).
Hylastinus Frankhauseri Rtrr.: Krain (Fuchs).
Orestia Electra Grdl.: Campo grosso (Lessinische Alpen), Monte Generoso (Tessin).

D^r. J. Daniel, Ingolstadt:

- Tapinopterus placidus* Rosh.: Val Sugana: Lalensola-Pass, 15. 5. 1894 (K. Daniel). — Venetianer Alpen: M^{te} Grappa, 10. 6. 1897 (K. Daniel).
Veleiopsis marginiventris Fairm.: Konia, 12. 6. 1899 (Korb).
Aphodius parallelus Muls.: Konia, 1899 (Korb), bisher nur aus Frankreich, Spanien und Istrien bekannt.
Aphodius satyrus Rtrr.: Judicarien: Val Daone, 3. 7. 1894 (J. Daniel). — Bernina-Alpen: Val Masino, 26. 7. 1893 (J. Daniel). — Penninische Alpen: M^{te} Bo, 8. 8. 1894 (K. Daniel). — Grajische Alpen: Valle di Viù, 22. 6. 1893 (J. Daniel). — Seealpen: Vesubiataler, 7. 1896 (J. Daniel). — Ligurische Alpen: Val Pesio, 3. 8. 1890 (K. Daniel). — Dobratsch (Strasser).
Homalilus taurinensis Baudi: Südl. cottische Alpen: Val Maira, 4. 6. 1898 (J. Daniel).
Nacerdes fulvicollis v. *media* Grdl.: Judicarien: Cima Tombea, Val Daone, Condino. Wohl sicher nur Varietät des ♂, die ♀♀ von denselben Localitäten normal. (J. Daniel).
Clytra puberula Weise: (Arch. Nat. 1898, 181) ♂♀, Lanjaron, 1. 7. u. 18. 7. 1895 (Korb), aus Barcelona (Mont Serrat) beschrieben.
Labidostomis armeniaca Lac. und *Gymndrophthalma biornata* Lefr.: Eriwan, 1898 (Korb), im Cat. Col. Eur. Cauc. nachzutragen.
Cryptocephalus albolineatus Sffr.: Südtirol: Col Santo, 26. u. 27. 6. 1894 (J. Daniel).
Cryptocephalus tardus Weise: Lombardei: Val Borleggia, 8. 8. 1899 (K. Daniel). Bisher nur vom M^{te} Rosa bekannt.
Orina viridis ignita Com.: Hospice de France, 6. 8. 1884 (K. Daniel) bei Bagnères de Luchon (Hautes-Pyrénées).
Orina melanocephala melancholica Heer: Mühlebach-Alpe, 29. 7. 1896 (K. Daniel) im Canton Glarus. — Val Piora, im Canton Tessin (Strasser). Heer kannte sie vom Berglisceli (Canton Glarus) und vom M^t Joli in Savoyen.
Luperus gularis Grdl.: Seealpen: Tenda, 6. 7. 1896 (J. Daniel), häufig auf Föhren.

D^r. K. Daniel, München:

- Nebria diaphana* Dan.: Langkofel-Hütte, 1900. — Contrin-Hütte, Marmolada, 1900. — Tosa-Hütte, Brenta, 1901 (Röttgen).

- Nebria cordicollis* Chaud.: Val Masino, Bernina-Alpen, 25. 7. 1893 (J. Daniel).
- Nebria laticollis* Dej.: Alpes maritimes (coll. Prof. v. Heyden) (*morula* Dan. Pic det.).
- Notiophilus pusillus* Waterh., Spaeth: München (Oettel, Kurz). — Eriwan, 1898 (Korb).
- Oriocorabus concolor lombardus* Kr.: Val-Masino, Bernina-Alpen, 25. 7. 1893 (J. Daniel). — Cima di Casinelle und Val Danerba im Val Daone, Judicarien, 6. und 7. 7. 1894 (J. Daniel). — Val Sorino, Judicarien, 10. 7. 1894 (J. Daniel). — Monte Columbino, Brescianer Berge, 2. 6. 1898 (K. Daniel).
- Bembidium tibiale* Dft., *complanatum* Heer, *Redtenbacheri* Dan. und *longipes* Dan.: Gesellschaftlich am Valepp-Bach, bayrische Alpen (Neresheimer).
- Bembidium complanatum* Heer: Valle della Stura di Demonte, oberhalb der terme di Vinadio, 27. 7. 1898 (K. Daniel).
- Bembidium giganteum* Sahlbg. (conf. p. 33): Der Name Splichal ist zu streichen.
- Bembidium Stephensi* Crotch.: München (Oettel, Daniel). — Asturien, 1879 (Getschmann), 1 Exempl. in coll. Prof. v. Heyden.
- Bembidium Milleri* Duv.: Bozen, 31. 5. 1885 (J. Daniel). — Fahrnau i./Baden (Hartmann). — Sella-Tal, Val Sugana, 16. 5. 94 (K. Daniel).
- Bembidium florentinum* Dan.: Sopra la croce bei Borzonasca im ligurischen Apennin, 5. 1893 (Dr. Flach). Berichtigung zur Angabe Col. Stud. II., 65.
- Bembidium maculatum* Dej.: Utovo blato, Herzegovina, 1901 (Leonhard).
- Bembidium prasinum* Dft.: Fahrnau in Baden (Hartmann).
- Bembidium Starki* Schm.: Nicht selten in einem Tümpel bei Unterföhring, 11. 5. 90 (K. u. J. Daniel). — Günzburg a. d. D. (Oberndorfer).
- Bembidium pyrenaicum* Dej.: Monte Legnone, Lombardei (Spurny). — Monte Columbino, Brescianer Berge, 2. 6. 1898 (K. Daniel), östlichster Fundort!
- Bembidium pindicum* Apfelb.: Taygetos (Apfelbeck det.), Coll. Cl. Müller.
- Trechus sinuatus* Schm.: Tosa-Hütte, Brenta (Röttgen).
- Brososoma baldense* Rshr.: Bocchetta di San Simone, Lombardia, 3. 8. 1899 (K. Daniel), westlichster Fundort! Cima Tombea, Judicarien, 29. 5. 1899 (K. Daniel).
- Platynus cyaneus* Dej.: Oberaudorf bei Kufstein, am Innufer (Strasser).
- Trachys reflexa* Gené: Nördliches Portugal: Sabrosa.
- Otiorrhynchus sulcatellus* Dan.: Tonale-Pass, 16. 8. 1899 (K. Daniel).
- Otiorrhynchus subcostatus* Strl.: Schafberg, Salzkammergut (v. Bodemeyer). — Valle di Seghe, Brenta, 20. 8. 1899 (K. Daniel). — Monte Grigna, oberhalb Esino, 27. 7. 1899 (K. Daniel).
- Otiorrhynchus pigrans* Strl.: Schafberg, Salzkammergut (v. Bodemeyer). — Hafelekar, Karwendelgebirge, 7. 7. 1894 (K. Daniel).
- Otiorrhynchus hadrocerus* Dan. und *chalconus* Strl.: Contrin-Hütte, Marmolada, 1900 (Röttgen).
- Otiorrhynchus lombardus* Strl.: Monte Generoso, Tessin, 1901 (Diener).
- Otiorrhynchus venustus* Strl.: Valle di Cogne, 1901 (Diener).
- Otiorrhynchus funicularis* Gyll.: Trostberg, Oberbayern (Jemüller).

- Otiorrhynchus luganensis* Strl.: San Martino di Castrozza bei Primiero (Cl. Müller). — Madonna di Campiglio, Val Rendena, 4. 6. 1895 (K. Daniel). — Monte Grigna, oberhalb Esino, 27. 7. 1899 (K. Daniel).
- Otiorrhynchus pedemontanus* Strl.: Bordighera (Prof. Schneider), sonst nur alpin im ligurischen Apennin und den Seealpen.
- Otiorrhynchus globus* Boh.: Solagna bei Bassano, Val Sugana, 6. 6. 1897 (K. Daniel).
- Otiorrhynchus (Arammichnus) villosus* Strl.: Lussin, Dalmatien (Wiener Hofmuseum). — Isola grossa, Dalmatien, 14. 5. 1901 (Dr. Flach).
- Otiorrhynchus (Tournieria) albidus* Strl.: Adrianopel, 6. 1894 (Dr. Flach).
- Otiorrhynchus (Tournieria) juglandis* Apfb.: Budapest (k. ung. Nationalmuseum). — Adrianopel, 6. 1894 (Dr. Flach).
- Otiorrhynchus (Troglorrhynchus) baldensis* Czwal.: Val Lorina, Judicarien, 14. 7. 1894 (J. Daniel).
- Polydrosus cephalotes* Desbr.: Slivno, Balkan (Haberhauer).
- Trachyploeus muralis* Bedel: Pozuelo di Calatrava, Castilia (Fuente), bisher nur aus Oran bekannt, im Cat. Col. Eur. Cauc. nachzutragen. (*subsetulosus* m. i. lit.)
- Dichotrachelus Stierlini* Gredl.: Tonale-Pass, 16. 8. 1899 (K. Daniel).
- Coeliodes zonatus* Germ.: Wasserburg am Inn, Oberbayern, an *Evonymus* (Knörzer).
- Ceuthorrhynchus Barnevillei* Gren.: München, nicht selten (Oettel, Kurz, Neresheimer).
- Ceuthorrhynchus hungaricus* Bris.: Canosio, südl. cott. Alpen, 31. 5. 1898 (J. Daniel).
- Ceuthorrhynchus baldensis* Schlze.: St. Rémy, am Südfusse des grossen St. Bernhard, 21. 8. 1895 (K. Daniel).
- Lissotarsus alboguttatus* Bris.: Bagdad (coll. Prof. Schuster).
- Anthonomus Chevrolati* Desbr.: München, 23. 3. 1889 (J. Daniel). — Kaltitsch bei Neumarkt in Südtirol, 15. 6. 1889 (K. Daniel). — Solagna bei Bassano, Val Sugana, 6. 6. 1897 (K. Daniel).
- Apion Bonvouloiri* Bris.: Mont Cenis, hochalpin, 25. 6. 1898 (J. Daniel).
- Apion gracilipes* Dietr.: Ingolstadt, 24. 5. 1891 (J. Daniel). — München, 7. 7. 1889 (K. Daniel).
- Apion elegantulum* Germ.: La Montà, Westabhang des Monte Viso, 15. 8. 1898 (K. Daniel).
- Leptura (Strangalia) nigripes* Deg.: Günzburg a. d. Donau (Oberndorfer).
- Leptura excisipes* Dan.: Akbes, Ober-Syrien (Escalera), jedenfalls = *Leptura pallens* Brull. des Pic'schen Verzeichnisses (Ann. Soc. Ent. Fr. 61., 415).
- Semiadalia rufocincta* Muls.: Julier-Pass. 3. 8. 1896 (K. Daniel).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Münchner Koleopterologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [001](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Beiträge zur Koleopteren-Geographie.
Originalmitteilungen \(5\) 258-260](#)