

## Die Käfer des Risserkogelgebietes

Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns

Von Gerhard Scherer

(Fortsetzung.)

*Atheta longiusecula* Grav.: 3. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m in der Streu- und Bodenschicht; 10. 5. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Atheta Hansseni* A. Strand: 5. 9. 1953 Röthenstein ca. 1550 m in Pilzen; 12. 6. 1955, 5. 5. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1570 m geködert; 15. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert.

*Atheta atramentaria* Gyll.: 3. 6. 1954, 10. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m geködert, 12. 7. 1955 ebenda im Angeschwemmen; 4. 6. 1954, 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m geködert, 30. 6. 1954 ebenda von der Wiese gestreift; 11. 6. 1954, 23. 6. 1954, 4. 7. 1955, 12. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert, 4. 8. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht und 11. 7. 1955 ebenda von der Wiese gestreift; 16. 6. 1955, 5. 7. 1955, 11. 7. 1955 östlicher Teil des Ableitenschneidnordhanges ca. 1570 m geködert. Sehr häufig.

*Atheta Reissi* G. Ben.: 30. 6. 1954 ca. 1570 m und 20. 10. 1954 ca. 1660 m Setzbergsüdseite an Hirschlosung.

*Atheta allocera* Epp.: 5. 9. 1953 Röthenstein ca. 1550 m in Pilzen.

*Atheta cinnamoptera* Thoms.: 5. 7. 1955, 11. 7. 1955, 12. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m geködert.

*Atheta Leonhardi* Bernh.: 6. 9. 1953, 7. 9. 1953, 8. 9. 1953, 20. 8. 1954, 8. 9. 1954, 21. 10. 1954, 22. 10. 1954, 12. 10. 1955, 13. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m in der Streu- und Bodenschicht, 6. 10. 1953 ebenda geködert; 4. 9. 1953 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen; 19. 8. 1954, 19. 10. 1954, 21. 10. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m in der Streu- und Bodenschicht, 19. 9. 1955 ebenda geködert; 20. 10. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1660 m an Hirschlosung.

*Atheta laevana* Muls. Rey: 20. 10. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1660 m an Hirschlosung.

*Atheta setigera* Shp.: 22. 10. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1540 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Atheta macrocera* Thoms.: 4. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht, 18. 8. 1955 ebenda von der Wiese gestreift.

*Atheta nigra* Kr.: 11. 7. 1955 östlicher Teil des Ableitenschneidnordhanges ca. 1570 m geködert.

*Atheta longicornis* Grav.: 10. 5. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Atheta parvula* Mannh.: 11. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert, 4. 8. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht; 22. 10. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1540 m in der Streu- und Bodenschicht, 5. 7. 1955 ebenda am östlichen Teil des Hanges ca. 1570 m geködert.

*Atheta lateralis* Mannh.: 12. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Atheta fungi* Grav.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

*Tinotus morion* Grav.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

*Oxyptoda spectabilis* Märk.: 20. 9. 1955, 22. 9. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Oxypoda umbrata* Cyl.: 5. 8. 1954, 19. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1660 m in der Streu- und Bodenschicht, 5. 8. 1954 ebenda von der Wiese gestreift und 20. 9. 1954 hier geködert; 9. 5. 1955 Freisinger-Hütte ca. 1520 m unter Steinen; 12. 7. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Bodenschicht. Häufig.

*Oxypoda sericea* Heer: 5. 7. 1955 östlicher Teil des Ableitenschneidnordhanges ca. 1560 m geködert; 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

*Oxypoda rufa* Kr.: 3. 8. 1954, 20. 8. 1954, 12. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Oxypoda haemorrhoea* Mannh.: 4. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1690 m in einem Nest von *Formica rufa*.

*Aleochara rufitarsis* Heer: 30. 3. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1700 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Aleochara hipustulata* L. 10. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m geködert; 10. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1680 m geködert; 26. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift, 12. 7. 1955 ebenda geködert. Häufig.

#### Fam. **Psellaphidae**

*Plectophloeus Fischeri* Aubé: 5. 9. 1953 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen.

#### Fam. **Cantharidae**

*Cantharis tristis* F.: 25. 6. 1954, 11. 7. 1955, 12. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

*Rhagonycha translucida* Kryn.: 3. 8. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1540 m in der Streu- und Bodenschicht. Selten.

*Rhagonycha testacea* L.: 25. 6. 1954 am Fuß der Plankensteinnordwand ca. 1500 m von der Wiese gestreift; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gekätschert; 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift; 11. 7. 1955 am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m von der Wiese gestreift.

*Rhagonycha femoralis* Br.: 2. 8. 1954, 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1670 m von der Wiese gestreift; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift; 24. 7. 1955 Grubereck ca. 1600 m.

*Rhagonycha lignosa* Müll.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift. Selten.

*Pygidia denticollis* Schumm.: 24. 7. 1955 Risserkogelgipfel 1826 m; 21. 8. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von der Wiese gestreift; 26. 8. 1955 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m.

*Malthodes hexacanthus* Kiesw.<sup>1)</sup>: 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1690 m von der Wiese gekätschert; 11. 7. 1955 am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m von der Wiese gestreift.

#### Fam. **Malachiidae**

*Charopus flavipes* Payk.: 3. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gekätschert.

*Malachius marginellus* Oliv.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

*Anthocomus bipunctatus* Harr.: 2. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1700 m in der Streu- und Bodenschicht.

<sup>1)</sup> det. W. Wittmer

Fam. **Dasytidae**

*Dasytes alpi gradus* Kiesw. a. *montanus* Gdlr.: 2. 8. 1954, 5. 8. 1954, 25. 8. 1954, 7. 9. 1954, 11. 7. 1955, 12. 7. 1955, 18. 8. 1955, 19. 8. 1955, 23. 8. 1955, 19. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m von der Wiese gestreift; 19. 9. 1955 Risserkogelgipfel ca. 1820 m.

Fam. **Elateridae**

*Adelocera fasciata* L.: 7. 6. 1955 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

*Elater aethiops* Lac.: August 1953 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

*Idolus picipennis* Bach: 25. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 m von der Wiese gestreift.

*Athous vittatus* F.: 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht, 23. 6. 1954, 10. 7. 1955, 17. 8. 1955 ebenda von der Wiese gestreift; 25. 6. 1954, 26. 6. 1954, 2. 8. 1954, 6. 6. 1955, 11. 7. 1955, 12. 7. 1955, 17. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m von der Wiese gestreift, 10. 5. 1955 ebenda aus der Streu- und Bodenschicht.

*Athous haemorrhoidalis* F.: 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 25. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

*Athous subfuscus* Müll.: 25. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

*Athous Zebei* Bach: 24. 6. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1550 m von Erlen geklopft, 8. 6. 1955 ebenda von Legföhren; 25. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 m von der Wiese gekätschert; 30. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m von der Wiese gestreift.

*Corymbites pectinicornis* L.: 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

*Corymbites cupreus* F.: 25. 6. 1954 Uferwiese Plankensteinsee ca. 1470 m; 30. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m von der Wiese gestreift; 27. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m gekätschert.

*Corymbites cupreus* F. v. *aeruginosus* F.: 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht, 23. 6. 1954 ebenda von der Wiese gestreift; 25. 6. 1954, 30. 6. 1954, 3. 8. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m (sehr zahlreich) von der Wiese gekätschert; 9. 6. 1954 am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m; 24. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1600 m; 24. 6. 1954 vom Grubereck zum Röthensteinersee herab ca. 1580 m; 25. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 m. Im Untersuchungsgebiet sehr häufig, weitaus am zahlreichsten ist die v. *aeruginosus* F.

*Corymbites aeneus* L.: 4. 6. 1954, 6. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m unter Steinen, 8. 6. 1954 ebenda von der Wiese gestreift; 4. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m unter Steinen; 26. 6. 1954 am Fuße der Plankensteinnordwand ca. 1400 m; 2. 8. 1954, 4. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m; 6. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen; 11. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von Erlen geklopft.

*Corymbites incanus* Gyll.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift; 11. 7. 1955 auf einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m.

*Agriotes obscurus* L.: 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 11. 7. 55 am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m.

*Dolopius marginatus* L.: 27. 7. 1954 Risserkogelgipfel 1826 m; 17. 8. 55 Röthenstein ca. 1630 m von der Wiese gestreift.

*Sericus brunneus* L.: 26. 6. 1954 Uferwiese Plankenstein ca. 1480 m unter Steinen.

*Denticollis linearis* L.: 18. 8. 1955 Röthenstein ca. 1550 m.

Fam. **Buprestidae**

*Buprestis rustica* L.: August 1953 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

Fam. **Dascillidae**

*Dascillus cervinus* L.: 11. 7. 1955 auf einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m.

Fam. **Helodidae**

*Cyphon Paykulli* Guer.: 27. 7. 1954 Risserkogelgipfel 1826 m.

Fam. **Dryopidae**

*Dryops Ernesti* Goz.: 12. 7. 1955 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m nach Hochwasser im Angeschwemmen.

Fam. **Dermestidae**

*Anthrenus museorum* L.: 4. 8. 1954 neben der Freisinger-Hütte circa 1520 m.

Fam. **Byrrhidae**

*Cytilus sericeus* Forst.: 9. 6. 54 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m; 3. 7. 1955 Hang zum Wallberghaus hinauf ca. 1500 m.

*Byrrhus arietinus* Stoff.: 25. 6. 54 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 m; 3. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

*Byrrhus pustulatus* Forst.: 24. 7. 1955 Röthensteinalm ca. 1400 m.

*Byrrhus luniger* Germ.: 24. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

Fam. **Nitidulidae**

*Cateretes pedicularius* L.: 7. 6. 1955, 17. 8. 1955, 18. 8. 1955, 19. 8. 1955, 22. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift; 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Meligethes solidus* Kug.:<sup>1)</sup> 6. 6. 1955, 7. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

*Meligethes aeneus* F.:<sup>1)</sup> 22. 10. 1954 Ableitenschneidordhang unter Erlen ca. 1540 m in der Streu- und Bodenschicht; 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1690 m von der Wiese gestreift; 12. 7. 1955 von einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m gekätschert.

*Meligethes difficilis* Heer:<sup>1)</sup> 7. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang circa 1680 m von der Wiese gestreift.

Fam. **Cryptophagidae**

*Ootypos globosus* Waltl: 12. 7. 1955 nach Hochwasser im Angeschwemmen des Röthensteinersees ca. 1460 m.

Fam. **Phalacridae**

*Phalacrus substriatus* Gyll.: 5. 8. 1954, 17. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

<sup>1)</sup> det. Dr. Alen M. Easton

Fam. **Lathridiidae**

*Corticaria abietum* Motsch.: 12. 5. 1954 Plankensteinsattel ca. 1680 m auf Schnee.

*Corticarina similata* Gyll.: 6. 6. 55 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

Fam. **Mycetophagidae**

*Typhaea stercorea* L.: 19. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert.

Fam. **Coccinellidae**

*Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* L.: 9. 9. 1953, 17. 9. 53, 7. 9. 54 Plankensteinsüdosthang ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

*Semiadalia notata* Laich.: August 1953 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

*Aphidecta oblitterata* L.: 8. 6. 1955, 15. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Legföhren geklopft.

*Adalia (Adaliopsis) Capra alpina* Villa: 6. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

*Anatis ocellata* L.: 12. 5. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1690 m; 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von den dort vereinzelt stehenden Fichten geklopft.

*Chilocorus renipustulatus* Scriba: 25. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

Fam. **Anobiidae**

*Ernobius abietis* F.: 12. 5. 1954 Plankensteinsattel ca. 1680 m auf Schnee; 12. 5. 1954, 13. 5. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m auf Schnee. War zu diesem Zeitpunkt sehr zahlreich.

*Ernobius mollis* L.: 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

Fam. **Ptinidae**

*Tipnus unicolor* Pill.: 2. 6. 1954, 25. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1680 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Ptinus fur* L.: 3. 7. 1955 in der Freisinger-Hütte ca. 1520 m; 21. 9. 55 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Ptinus tectus* Boield.: 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht.

Fam. **Oedemeridae**

*Chrysanthia viridissima* L.: 3. 8. 1954 neben der Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

Fam. **Tenebrionidae**

*Hypophloeus linearis* F.: 30. 7. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1700 m unter der Rinde von Legföhren in den Gängen von *Pityogenes conjunctus* Rtt.

*Cylindronotus convexus* Küst.: 27. 7. 54 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m.

Fam. **Scarabaeidae**

*Onthophagus fracticornis* Preysl.: 10. 6. 54 Ableitenalm ca. 1680 m geködert; 11. 6. 1954, 23. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert; 4. 8. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht; 23. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m geködert.

*Geotrupes stercorosus* Scriba: 15. 9. 1953 Daffnerstein ca. 1500 Meter; 23. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee geködert; 30. 6. 1954 Setzberg-

südseite ca. 1570 m an Hirschlosung; 6. 8. 1954 unterhalb des Wallberghauses ca. 1450 m; 10. 5. 1955 Freisinger-Hütte ca. 1520 m; 19. 9. 1955 Röthenstein ca. 1650 m.

*Geotrupes alpinus* Hag.: 5. 6. 54 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m; 10. 6. 54, 25. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m von der Wiese gefangen, geködert und auch unter Steinen; 23. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert; 26. 6. 1954 Ableitenschneidordhang ca. 1600 m; 5. 8. 1954 und 6. 6. 55 Grubereck ca. 1600 m; 12. 9. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert. Häufig.

*Aphodius depressus* Kug. a. *atramentarius* Er.:<sup>1)</sup> 24. 6. 1954 Ableitenschneidordhang ca. 1500 m von der Wiese gestreift; 25. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m von der Wiese gekätschert; 25. 6. 1954, 30. 6. 1954 ebenda an Rinderkot; 30. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1570 m an Hirschlosung; 27. 7. 1954 Röthenstein ca. 1600 m an Rinderkot, 28. 7. 1954 ebenda geködert, 10. 7. 1955 hier von der Wiese gestreift.

*Aphodius rufipes* L.: 2. 8. 1954, 5. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

*Aphodius mixtus* Villa: 12. 5. 1954 Röthensteinalm ca. 1400 m auf dem Schnee; 5. 6. 1955, 8. 9. 1954, 22. 10. 1954, 23. 8. 1955, 21. 9. 1955 Ableitenschneidordhang ca. 1500—1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 7. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1670 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Aphodius obscurus* F.: 11. 6. 1954, 23. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert; 24. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert, 1. 7. 1954 ebenda an Gamslosung; 21. 8. 1955 Ableitenalm ca. 1670 m von der Wiese gestreift.

*Aphodius ater* Deg.: 28. 7. 1954 Röthenstein ca. 1600 m an Rinderkot.

*Aphodius alpinus* Scop.: 2. 4. 1954 Röthenstein ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 30. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1570 m an Hirschlosung; 4. 8. 1954, 11. 7. 1955, 18. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang circa 1680 m von der Wiese gestreift; 24. 7. 1955 Risserkogelgipfel 1826 m.

*Aphodius alpinus* Scop. a. *mulsanti* Dt.: 19. 10. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1700 m in der Streu- und Bodenschicht; 23. 10. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Hoplia farinosa* L. (*argentea* Poda): 27. 7. 1954, 24. 7. 1955 Risserkogelgipfel 1826 m; 27. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m; 3. 8. 1954 Röthenstein ca. 1550 m; 22. 8. 1955 auf dem Steig vom Plankensteinsattel zum Risserkogelgipfel ca. 1730 m; 25. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

*Potosia cuprea* F.: Juli 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

#### Fam. **Lucanidae**

*Systemocerus caraboides* L.: 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m auf der Rinde von Bergahorn und Buchen.

#### Fam. **Cerambycidae**

*Rhagium bifasciatum* F.: 6. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 Meter; 12. 6. 1955 „Wallbergkircherlhang“ ca. 1550 m.

*Rhagium mordax* Deg.: 25. 6. 1954 etwas oberhalb des Plankensteinersees ca. 1500 m auf der Rinde einer alten Fichte.

*Rhagium inquisitor* L.: 6. 8. 1954 Risserkogelgipfel 1826 m.

*Toxotus cursor* L.: August 1953 Freisinger-Hütte ca. 1500 m.

*Evodinus clathratus* F.: 24. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.

<sup>1)</sup> Gattung *Aphodius* det. Dr. I. Grebensčikov

- Gaurotes virginea* L.: 24. 7. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 m.  
*Leptura rubra* L.: August 1953 Freisinger-Hütte ca. 1500 m.  
*Leptura sanguinolenta* L.: August 1953 Freisinger-Hütte 1 ♀ ca. 1520 m.  
*Strangalia melanura* L.: 10. 9. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1600 m auf  
 Blüten; 18. 8. 1955 unterhalb des Wallberghauses ca. 1450 m.  
*Callidium violaceum* L.: 20. 8. 1954 Ableitenschneid ca. 1650 m.  
*Saperda scalaris* L.: 11. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m  
 von Erlen geklopft.

### Fam. **Chrysomelidae**

- Lema Erichsoni* Suffr.: 18. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m  
 von der Wiese gekätschert.  
*Lema liehenis* Voet (*cyarella* auct.): 6. 6. 1955, 7. 6. 1955 Planken-  
 steinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.  
*Cryptocephalus sericeus* L.: 1. 8. 1954 Steig am Ostfuße des Setzberges  
 ca. 1400 m.  
*Cryptocephalus flavipes* F.: 17. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang circa  
 1680 m von der Wiese gestreift.  
*Leptinotarsa decemlineata* Say.: 4. 8. 1954 Setzberg ca. 1700 m, wahr-  
 scheinlich vom Wind hierhergetragen.  
*Chrysomela rufa* Dft. ssp. *Frieseri* Bech.:<sup>1)</sup> 3. 6. 1954 Setzbergwest-  
 seite ca. 1550 m; 25. 6. 1954 Röthenstein ca. 1570 m.  
*Chrysomela crassimargo* Germ. ssp. *bavarica* Bech.:<sup>1)</sup> 9. 6. 1954 auf  
 dem Steig am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m.  
*Chrysomela purpurascens* Germ. ssp. *Stöckleini* Bech.:<sup>1)</sup> 2. 6. 1954  
 Westseite des Setzberges ca. 1550 m.  
*Chrysomela varians* Schall. f. typ.: 26. 6. 1954 Plankensteinalm circa  
 1400 m; 21. 10. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1700 m in der Streu-  
 und Bodenschicht; 4. 6. 1955 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 Meter  
 unter Steinen; 21. 8. 1955 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca.  
 1400 m auf *Senecio Fuchsii*.  
*Chrysomela varians* Schall. a. *pratensis* Wsc.: 12. 5. 1954 Röthenstein  
 ca. 1580 m, 1. 7. 1954 ebenda unter Steinen; 24. 6. 1954 auf dem Steig  
 vom Plankensteinsattel zum Risserkogelgipfel ca. 1760 m; 11. 6. 1954,  
 20. 9. 1955, 22. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m.  
*Chrysomela varians* Schall. a. *centaura* Hrbst.: 15. 10. 1955 Bergwald  
 am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m in der Streu- und Boden-  
 schicht.  
*Chrysochloa intricata* Germ. v. *Anderschi* Duft.: 1. 6. 1954, 24. 6. 1954,  
 9. 5. 1955, 7. 6. 1955 Setzbergsüdseite ca. 1550 m auf *Rumex*-Blättern;  
 2. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m; 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m un-  
 ter Steinen; 9. 6. 1954, 25. 7. 1955, 18. 8. 1955, 21. 8. 1955, 26. 8. 1955,  
 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m auf Hochstauden;  
 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 9. 5. 1955 Freisinger-Hütte ca.  
 1520 m; 6. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese  
 gefangen; 12. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m in der Streu-  
 und Bodenschicht; 30. 7. 1954, 7. 6. 1955 „Auf der Wurz“ ca. 1600 Meter.  
 Überaus häufig.  
*Chrysochloa gloriosa* F.: 18. 8. 1954, 8. 9. 1954, 21. 8. 1954 Ableiten-  
 schneidnordhang ca. 1500 m von Weiden geklopft, 10. 7. 1955 ebenda  
 unter Steinen, 23. 8. 1955 hier in der Streu- und Bodenschicht; 20. 8. 54  
 Ableitenschneid ca. 1680 m; 25. 7. 1955 Westseite des Setzberges circa  
 1550 m; 25. 8. 1954 Plankensteinsattel ca. 1680 m; 25. 7. 1955, 18. 8. 55,  
 21. 8. 1955, 24. 8. 1955, 26. 8. 1955, 14. 9. 1955, 21. 9. 1955 Bergwald am  
 Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m auf Hochstauden. Sehr häufig.

<sup>1)</sup> det. Dr. J. Bechyne

*Chrysochloa viridis* Duft. f. typ.: 21. 8. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von *Rhododendron hirsutum* gekätschert.

*Chrysochloa viridis* Duft. a. *ignita* Com.: 6. 8. 1954 Plankensteingipfel 1763 m.

*Chrysochloa virgulata* Germ.: 9. 6. 1954 auf dem Steig am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m. Selten.

*Chrysochloa cacaliae* Schrk.: 9. 6. 1954 auf dem Steig am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m; 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 2. 8. 54, 5. 6. 1955, 7. 6. 1955, 8. 6. 1955 Setzbergsüdseite ca. 1560 m auf *Rumex*-Blättern; 8. 9. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1520 m von Weiden geklopft; 9. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m; 25. 7. 1955, 18. 8. 1955, 21. 8. 1955, 24. 8. 1955, 26. 8. 1955, 14. 9. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m auf *Senecio Fuchsii*, *Adenostyles* und anderen Hochstauden.

*Chrysochloa speciosissima* Scop.: 25. 6. 1954 Uferwiese Plankensteinee ca. 1470 m; 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 26. 6. 1954 auf dem Steig am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m; 25. 7. 1955 Setzbergwestseite ca. 1550 m; 25. 7. 1955, 18. 8. 1955, 21. 8. 1955, 24. 8. 55, 26. 8. 1955, 14. 9. 1955 Bergwald am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 Meter auf Hochstauden. Sehr häufig.

*Gastroidea polygoni* L.: 4. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m.

*Gastroidea viridula* Deg.: 5. 6. 1955 Röthensteinalm ca. 1400 m auf *Rumex alpinus* sehr zahlreich.

*Phaedon armoraciae* L.: 9. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee circa 1460 m.

*Hydrothassa glabra* Hbst. a. *aucta* F.: 12. 7. 1955 nach Hochwasser im Angeschwemmten des Röthensteinersees ca. 1460 m.

*Hydrothassa marginella* L.: 8. 9. 1953, 9. 6. 1954, 23. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen, 12. 7. 1955 ebenda im Angeschwemmten; 9. 5. 1955 Freisinger-Hütte ca. 1520 m unter Steinen.

*Phytodecta Holdhausi* Leeder f. typ.:<sup>1)</sup> 24. 6. 1954, 25. 6. 54, 30. 6. 54, 5. 7. 1955, 11. 7. 1955, 12. 7. 1955, 21. 9. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m von Weiden, Erlen, *Rhododendron hirsutum* und der Wiese gekätschert. Neu für Deutschland.

*Phytodecta Holdhausi* Leeder a. *nigrobrunnea* Leeder: 24. 6. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1580 m von Weiden geklopft.

*Phytodecta Holdhausi* Leeder a. *obscuricollis* Leeder: 24. 6. 1954 und 11. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von der Wiese gestreift.

*Phytodecta pallidus* L.: 3. 9. 1953, 6. 9. 1953, 8. 9. 1953, 9. 9. 1953, 16. 9. 1953, 18. 9. 1953, 24. 6. 1954, 30. 6. 1954, 30. 7. 1954, 18. 8. 1954, 20. 8. 1954, 8. 9. 1954, 20. 10. 1954, 22. 10. 1954, 12. 6. 1955, 5. 7. 1955, 11. 7. 1955, 21. 9. 1955, 12. 10. 1955, 13. 10. 1955, 17. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m an Erlen, Weiden, auf der Wiese wie auch in der Streu- und Bodenschicht. Sehr häufig.

*Phytodecta interpositus* Franz et Palmén: 8. 9. 1953, 16. 9. 1953, 18. 9. 53, 24. 6. 1954, 30. 6. 1954, 20. 10. 1954, 11. 7. 1955, 13. 10. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m wie *Ph. pallidus*. Neu für Deutschland.

*Phyllodecta polaris* Schneid.: 8. 9. 1953, 9. 9. 1953, 16. 9. 1953, 13. 5. 54, 9. 6. 1954, 24. 6. 1954, 30. 6. 1954, 5. 7. 1955, 11. 7. 1955, 12. 7. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1600 m wie die drei vorhergehenden Arten hauptsächlich an Weiden, aber auch von Legföhren geklopft und von der Wiese gestreift.

*Phyllodecta vitellinae* L.: 24. 6. 1954, 5. 6. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1550 m von Weiden geklopft.

<sup>1)</sup>Gattung *Phytodecta* und *Phyllodecta* det. F. Leeder



*Luperus viridipennis* Germ.: 24. 6. 1954, 30. 6. 1954, 18. 8. 1954 auf Erlen, 8. 9. 54 auf Weiden, Ableitenschneidnordhang ca. 1500—1550 m.

*Phyllotreta nemorum* L.: 2. 6. 1954, 25. 6. 1954, 26. 6. 1954, 3. 8. 1954, 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift; 24. 6. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1550 m von der Wiese gestreift, wie auch von *Rhododendron hirsutum* geklopft, 25. 6. 1954, 30. 6. 1954, 3. 8. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m von der Wiese gekätschert; 9. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m, 12. 7. 1955 ebenda im Angeschwemmten nach Hochwasser.

*Phyllotreta undulata* Kutsch.: 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1670 m von der Wiese gekätschert; 26. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

*Longitarsus succineus* Foudr.: 7. 9. 1954 Plankensteinsüdosthang circa 1620 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Longitarsus lycopi* Foudr.: 3. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Longitarsus melanocephalus* Deg.: 30. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m von der Wiese gestreift.

*Longitarsus atricillus* L.: 17. 9. 1953 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 m in Anzahl von der Wiese gekätschert.

*Longitarsus apicalis* Beck.: 9. 9. 1953, 17. 9. 1953, 14. 10. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m von der Wiese gekätschert.

*Haltica oleracea* L.: 8. 6. 1954, 3. 8. 1954, 22. 8. 1955 Ableitenalm ca. 1670 m von der Wiese gefangen; 17. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

*Crepidodera Peirolerii* Kutsch.: 8. 9. 1953, 6. 6. 1955, 7. 6. 1955, 17. 8. 1955, 23. 8. 1955, 19. 9. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 bis 1700 m von der Wiese gekätschert.

*Crepidodera melanostoma* Redtb.: 3. 9. 1953, 8. 9. 1953, 9. 9. 1953, 17. 9. 1953, 25. 6. 1954, 26. 6. 1954, 5. 8. 1954, 7. 9. 1954, 10. 5. 1955, 10. 6. 1955, 11. 7. 1955, 18. 8. 1955, 23. 8. 1955, 19. 9. 1955, 20. 9. 1955, 14. 10. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1600—1700 m von der Wiese gekätschert; 30. 6. 1954, 21. 8. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1600 m von der Wiese gestreift, 24. 8. 1954, 11. 9. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht, 17. 8. 1955, 21. 8. 1955 hier von Weiden geklopft; 10. 7. 1955, 17. 8. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gekätschert; 11. 7. 1955 auf einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m gekätschert; 26. 8. 1955 von *Senecio Fuchsii* am Nordostfuße des Setzberges ca. 1400 m geklopft. Sehr häufig.

*Chalcoides fulvicornis* F.: 7. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

*Minota obesa* Waltl.: 30. 3. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1700 m in der Streu- und Bodenschicht, 6. 6. 1955 ebenda von der Wiese gestreift; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gekätschert; 21. 8. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1500 m von der Wiese gestreift.

*Mantura Matthewsii* Curt.: 6. 6. 1955, 11. 7. 1955, 14. 10. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert; 22. 8. 1955 Ableitenalm ca. 1680 m von der Wiese gestreift.

*Chaetocnema hortensis* Geoffr. (*aridella* Payk.): 11. 7. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

*Psylliodes glabra* Dft.: 5. 8. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1660 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Cassida vibex* L.: 6. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert.

*Cassida denticollis* Suffr.: 11. 7. 1955 von einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m gestreift.

Fam. **Curculionidae**

*Apion pallipes* Kirby: 17. 9. 1953, 7. 6. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1650 m von der Wiese gekätschert; 20. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m von der Wiese gestreift.

*Apion loti* Kirby: 25. 6. 1954, 30. 6. 1954 Ableitenalm von der Wiese gestreift; 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift; 11. 7. 1955, 17. 8. 1955, 22. 8. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m von der Wiese gekätschert; 11. 7. 1955, 12. 7. 1955 von einer *Crepis-Leontodon*-Weide am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m.

*Apion Curtisi* Steph.: 5. 8. 1954, 7. 9. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

*Apion ervi* Kirby: 9. 9. 1953 Plankensteinsüdosthang ca. 1690 m und 10. 7. 1955 Röthenstein ca. 1650 m von der Wiese gestreift.

*Otiorrhynchus geniculatus* Germ.: 9. 9. 1953, 24. 6. 1954, 5. 7. 1955, 17. 8. 1955, 21. 9. 1955 Ableitenschneidnordhang ca. 1550 m von Weiden geklopft; 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Legföhren geklopft; 20. 9. 1955 Plankensteinsattel ca. 1680 m.

*Otiorrhynchus sensitivus* Scop.: 25. 6. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1650 m; 8. 6. 1955, 15. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m sehr zahlreich von Legföhren geklopft.

*Otiorrhynchus armadillo* Rossi: 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Legföhren geklopft.

*Otiorrhynchus niger* F.: 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Fichten, 8. 6. 1955, 15. 6. 1955 von Legföhren geklopft.

*Otiorrhynchus fuscipes* Ol.: 7. 10. 1953, 6. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen; 23. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m; 26. 6. 1954 Uferwiese Plankensteinsee ca. 1500 m unter Steinen; 5. 6. 1955 Setzbergsüdseite ca. 1550 m; 8. 6. 1955 Grubereck ca. 1600 m; 8. 6. 1955 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m von Fichten, 8. 6. 1955, 15. 6. 1955 von Legföhren geklopft. Häufig im ganzen Gebiet.

*Otiorrhynchus morio* F.: 11. 5. 1954 unterhalb dem Wallberghaus ca. 1450 m; 3. 6. 1954, 6. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m unter Steinen; 4. 6. 1954, 24. 6. 1954, 7. 6. 1955 Setzbergsüdseite ca. 1600 m auf *Rumer alpinus*: 5. 6. 1954, 23. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m; 6. 6. 1954, 29. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen; 6. 6. 1954 vom Grubereck zum Röthensteinersee herab ca. 1550 m unter Steinen; 9. 6. 1954 am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m; 24. 6. 1954, 25. 6. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1600 m von Weiden geklopft; 24. 6. 1954 ebenda von der Wiese gestreift und 28. 7. 1954, 3. 8. 1954, 20. 8. 1954 hier aus der Streu- und Bodenschicht gesiebt; 25. 6. 1954 Uferwiese Plankensteinsee ca. 1480 m; 26. 6. 1954 Plankensteinalm ca. 1400 m; 25. 7. 1955, 18. 8. 1955, 21. 8. 1955, 24. 8. 1955, 26. 8. 1955, 14. 9. 1955 Adenostyletum am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m, hauptsächlich von *Senecio Fuchsii*.

*Otiorrhynchus scaber* L.: 21. 8. 1955 im Adenostyletum am Nordostfuß des Setzberges ca. 1400 m von *Senecio Fuchsii* geklopft.

*Otiorrhynchus subcostatus* Stierl.: 30. 7. 1954 Ableitenschneidnordhang ca. 1530 m in der Streu- und Bodenschicht; 23. 10. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m in der Streu- und Bodenschicht.

*Otiorrhynchus uncinatus* Germ.: 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1660 m in der Streu- und Bodenschicht; 19. 8. 1954, 10. 9. 1954, 9. 5. 1955 Plankensteinsüdosthang ca. 1670 m in der Streu- und Bodenschicht.

Fortsetzung folgt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen](#)

Jahr/Year: 1959

Band/Volume: [008](#)

Autor(en)/Author(s): Scherer Gerhard

Artikel/Article: [Die Käfer des Risserkogelgebietes - Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns - Fortsetzung 55-64](#)