

Die Blattkäfer (Chrysomelidae) aus dem NSG Lange Dammwiesen und Unteres Annatal (F24) bei Strausberg (Bez. Frankfurt/O.)

Bearbeiter: U.ARNOLD, U.HEINIG

Im Zeitraum von 1982 bis 1988 wurden an 47 Sammeltagen 570 Exemplare Blattkäfer in 80 Arten nachgewiesen. Besonderen Anteil an den Aufsammlungen hatten die Bundesfreunde ARNOLD, HEINIG, HERMANN, SCHÜLKE und SCHULZE. Außerdem wurden ältere Funddaten aus den 60er Jahren aus dem NSG von Bundesfreundin WENDT mit aufgenommen. Einige Nachweise aus den dem NSG benachbarten Gebieten fanden ebenfalls Eingang in die Liste, die im folgenden komplett mit allen bisher nachgewiesenen Arten und Funddaten publiziert wird. Auf faunistisch bemerkenswerte Arten wird in der Arbeit von SCHÜLKE (im Druck) eingegangen.

A r t e n l i s t e :

Donacia clavipes F., 1792

20.V.1965, 1 Ex. (WENDT am Torfhaus).

Donacia semicuprea PANZ., 1796

13.V., 20.V.1965, je 1 Ex. (WENDT am Torfhaus); 11.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD am Stienitzsee)

Donacia antiqua KUNZE, 1818

V.1985, 1 Ex. (HERMANN "Strausberg"- etikettiert)

Plateumaris consimilis (SCHRK., 1781)

23.V.1983, 1 Ex. (FLIEGER "Postbruch"- etikettiert)

Plateumaris rustica (KUNZE, 1818)

14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG A2 gestreift an Entwässerungsgraben)

Zeugophora scutellaris SUFFR., 1840

29.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG A4 auf jungen Pappeltrieben)

Lema lichenis (VOET, 1806)

V.1985, 1 Ex. (HERMANN "Strausberg"- etikettiert); 21.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG A2/A4-A7)

Lema melanopus (L., 1758)

13 Ex. IV.-IX. der Jahre 1982, 83, 85, 86, 87 häufig nachgewiesen (ARNOLD, HEINIG, HERMANN, SCHÜLKE, SCHULZE, SEDLACZEK, JAESCHKE)

Labidostomis longimana (L., 1761)

7.VII.1985, 2 Ex. (HEINIG)

Clytra laeviuscula RATZ., 1837

Mitte VI.1963, 1 Ex. (WENDT, Torfhaus)

Cryptocephalus aureolus SUFFR., 1847

29.V.1965, 1 Ex. (WENDT, Torfhaus); 19.VI.1965, 1 Ex.
(WENDT, Torfhaus)

Cryptocephalus sericeus (L., 1758)

7.VII.1985, 2 Ex. (HEINIG)

Cryptocephalus decemmaculatus (L., 1758)

20.VII.1965, 1 Ex. (WENDT, Torfhaus)

Cryptocephalus moraei (L., 1758)

1.VII.1983, 1 Ex. (ARNOLD)

Cryptocephalus bilineatus (L., 1767)

15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG); 7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG);
21.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG, A2/A4-A7)

Cryptocephalus fulvus GOEZE, 1777

7.VII.1985, 6 Ex. (HEINIG); 29.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG, A4-6)

Cryptocephalus pusillus F., 1777

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Adoxus obscurus (L., 1758)

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Chrysolina polita L., 1758

7.VII.1985, 4 Ex. (HEINIG); 28.III.1986, 1 Ex. (SCHÜLKE);
21.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG, A2/A4-A7); 29.VI.1986, 1 Ex.
(HEINIG, A4-A6)

Chrysolina staphylea L., 1758

5.IV.1982, 1 Ex. (SCHULZE, Sandgrube); 7.VII.1985, 1 Ex.
(HEINIG)

Chrysolina oricalcia MÜLL., 1776

Mai 1985, 1 Ex. (HERMANN "Strausberg"- etikettiert)

Chrysolina diversipes BED., 1892

17.V.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE, Wegrand nahe Stienitzsee);
Mai 1985, 4 Ex. (HERMANN "Strausberg"- etikettiert)

Chrysolina sanguinolenta L., 1758

30.IV.1983, 1 Ex. (SEDLACZEK); 25.IV.1987, 1 Ex. (HERMANN)

Chrysolina gypsophilae KUEST., 1845

30.VI.1983, 1 Ex. (SEDLACZEK); 17.V.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE,
Wegrand nahe Stienitzsee)

Chrysolina varians SCHALL., 1733

2.V.1982, 1 Ex. (SCHULZE, Sandloch an der Bahn)

Dlochrysa fastuosa (SCOP., 1763)

11.V.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE, Wiese); Mai 1985, 2 Ex. (HERMANN, "Strausberg"- etikettiert); 15.VI.1985, 2 Ex. (HEINIG, Weg zum Stienitzsee); 21.VI.1986, 3 Ex. (HEINIG vid.)

Gastroidea polygoni (L., 1758)

30.IV.1983, 1 Ex. (SEDLACZEK); 11.V.1985, 1 Ex. (GRAEHN); 7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Gastroidea viridula (DEGEER, 1775)

24.V.1987, 1 Ex. (ARNOLD); 14.V.1988, häufig (HEINIG vid.)

Phaedon cochleariae (F., 1792)

34 Ex. IV.-VII. der Jahre 1984, 85, 86 und 88, häufig nachgewiesen (ARNOLD, GRAEHN, HEINIG, SCHÜLKE)

Phaedon armoraciae (L., 1758)

11.V.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE, Wiese)

Hydrothassa marginella (L., 1758)

5.IV.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE, Tümpelufer, B2); 11.V.1985, 1 Ex. (GRAEHN); 17.V.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE, Ufer)

Prasocuris junci (BRAHM, 1790)

11.V.1985, 2 Ex. (ARNOLD, feuchte Wiese)

Prasocuris phallandrii (L., 1758)

5.IV.1985, 2 Ex. (SCHÜLKE, Tümpelufer, B2); Mai 1985, 1 Ex. (HERMANN "Strausberg"- etikettiert)

Plagiodera versicolora (LAICH., 1781)

19.IX.1987, 5 Ex. (JAESCHKE, Torfhaus)

Melasoma aenea (L., 1758)

9.IV.1982, 1 Ex. (SCHULZE vid. unter Kiefernrinde, C3)

Melasoma populi (L., 1758)

21.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG, an jungen Pappeltrieben, A4); 14.V.1988, 1 Ex. (HEINIG vid.)

Phyllodecta laticollis SUFFR., 1851

25.V.1968, 1 Ex. (PREIDEL "Strausberg"- etikettiert); 9.IV.1982, 1 Ex. (ARNOLD); 29.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG, A4-A6); 17.IV.1987, 1 Ex. (HERMANN "Strausberg"- etikettiert)

Phyllodecta vitellinae (L., 1758)

24.V.1987, 33 Ex. (ARNOLD, 31 Ex. von Populus tremulae)

Galerucella nymphaeae (L., 1758)

13.V.1965, 1 Ex. (WENDT, Torfhaus)

Galerucella lineola (F., 1781)

9.X.1977, 1 Ex. (WENDT, Hennickendorf); 24.IX.1983, 1 Ex.
(SCHULZE, Bl, geklopft)

Galerucella tenella (L., 1761)

20.IV.1984, 5 Ex. (ARNOLD); 15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG);
21.VI.1986, 9 Ex. (HEINIG, A4-A6)

Pyrrhalta viburni (PAYK., 1799)

8.VIII.1976, 1 Ex. (WENDT, Torfhaus)

Galeruca tanacetii (L., 1758)

13 Ex. VII. und IX. der Jahre 1982, 83 und 87, häufig nach-
gewiesen (ARNOLD, JAESCHKE, SCHULZE)

Lochmaea capreae (L., 1758)

19.VI.1965, 1 Ex. (WENDT, Torfhaus)

Serymlassa halensis (L., 1767)

4.IX.1965, 1 Ex. (WENDT, Hennickendorf); 19.VIII.1982, 1 Ex.
(SCHULZE vid., Sandloch an Bahn); 24.IX.1983, 2 Ex. (SCHUL-
ZE vid., auf Weg am Bahndamm, A3); 14.IX.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Phyllotreta vittula (REDT., 1849)

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Phyllotreta undulata KUTSCH., 1860

20.IV.1984, 2 Ex. (ARNOLD)

Phyllotreta tetrastigma (COM., 1837)

20.IV.1984, 19 Ex. (ARNOLD); 20.IV.1984, 1 Ex. (SCHULZE,
Tümpel Bl); 15.VI.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Phyllotreta ochripes (CURT., 1837)

20.IV.1984, 1 Ex. (ARNOLD); 11.V.1985, 1 Ex. (GRAEHN)

Aphthona cyparissiae (KOCH, 1803)

3.VIII.1966, 1 Ex. (PREIDEL "Strausberg"- etikettiert);
10.VII.1982, 3 Ex. (SCHULZE, an Euphorbia); 1.VII.1983,
1 Ex. (ARNOLD); 7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Aphthona euphorbiae (SCHRK., 1781)

7.VII.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE, Bahndamm D)

Aphthona coerulea GEOFFR. in FOURCR., 1785

11.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD, von Iris pseudacorum L.)

Longitarsus succineus (FOUDR., 1860)

14.IX.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Longitarsus nigrofasciatus (GOEZE, 1777)

20.IV.1984, 1 Ex. (ARNOLD)

Longitarsus melanocephalus (DEGENER, 1775)

19.VIII.1982, 1 Ex. (SCHULZE, feuchte Wiese gestreift);

20.IV.1984, 2 Ex. (ARNOLD); 11.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD, am Stienitzsee)

Longitarsus nasturtii (F., 1792)

20.IV.1984, 1 Ex. (ARNOLD)

Longitarsus luridus (SCOP., 1763)

19.VIII.1982, 1 Ex. (SCHULZE, feuchte Wiese gestreift)

Altica brevicollis FOU DR., 1860

48 Ex. IV.-IX. der Jahre 1982, 83, 85, 86, 87, 88. Regelmäßig an Corylus, (ARNOLD, HEINIG, SCHULZE)

Altica oleracea (L., 1758)

24.V.1987, 1 Ex. (ARNOLD, gestreift)

Altica ♀♀

24.III.1985, 11.V.1985, 15.VI.1985, insges. 4 Ex. (GRAEHN, HEINIG)

Lythroria salicariae (PAYK., 1800)

15.VI.1985, 5 Ex. (HEINIG)

Crepidodera transversa (MARSH., 1802)

17 Ex. VI.-IX. der Jahre 1982, 83, 85 und 86, regelmäßig, (ARNOLD, HEINIG, SCHULZE von feuchten Wiesen)

Crepidodera ferruginea (SCOP., 1763)

50 Ex. VI.-IX. der Jahre 1982, 83, 85, 86, 87. häufig, (ARNOLD, HEINIG, JAESCHKE, SCHÜLKE, SCHULZE, WRASE oft aus Heu- und Graslagen geschüttelt oder gestreift)

Hippuriphila modeeri (L., 1761)

15 Ex. III.-VIII. der Jahre 1982 - 85, regelmäßig nachgewiesen (HEINIG, SCHÜLKE, SCHULZE feuchte Wiesen, oft an Nasturtium gesammelt)

Chalcoides fulvicornis (F., 1792)

9.IV.1982, 1 Ex. (SCHULZE, an Salix); 1.IV.1983, 1 Ex. (SCHÜLKE); 9.VII.1983, 1 Ex. (SCHULZE, an Salix, A9)

Chalcoides aurata (MARSH., 1802)

17 Ex. IV.-IX. der Jahre 1982, 83, 85, 86 und 87. Mehrfach nachgewiesen (ARNOLD, GRAEHN, JAESCHKE, HEINIG, SCHÜLKE, SCHULZE)

Mantura chrysanthemi (KOCH, 1803)

11.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD)

Chaetocnema heikertingeri LJUB., 1963

20.IV.1984, 1 Ex. (ARNOLD, am Bahndamm)

Chaetocnema aridula (GYLL., 1827)

11.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD)

Chaetocnema arida FOUDE., 1860

20.XI.1982, 1 Ex. (SCHULZE, B4)

Chaetocnema hortensis GEOFFR.in FOURCR., 1785

11.V.1985, 1 Ex. (GRAEHN); 11.V.1985, 2 Ex. (ARNOLD)

Chaetocnema sahlbergi (GYLL., 1827)

20.XI.1982, 1 Ex. (SCHULZE, B4); 28.III.1986, 1 Ex. (SCHÜLKE)

Sphaeroderma testaceum (F., 1775)

1 VII.1983, 1 Ex. (ARNOLD); 7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG);

21.VI.1986, 1 Ex. (HEINIG, A2/A4-A7)

Psylliodes affinis (PAYK., 1799)

15.VI.1985, 2 Ex. (HEINIG)

Psylliodes weberi LOHSE, 1956

142 Ex. III.-VI. der Jahre 1983, 84, 85 und 88. Häufig an Nasturtium am Tümpel u. Umgebung, B2 (ARNOLD, GRAEHN, HEINIG, SCHÜLKE, SCHULZE)

Psylliodes chalconera (ILL., 1807)

8.IX.1984, 2 Ex. (SCHULZE, A6, an Cirsium); 7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Hispella atra (L., 1767)

11.V.1985, 1 Ex. (ARNOLD); 15.VI.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Cassida viridis L., 1758

7.VII.1985, 1 Ex. (HEINIG); 14.IX.1985, 1 Ex. (HEINIG)

Cassida nebulosa L., 1758

13.V.1965, 1 Ex. (WENDT, Torfhaus); 20.V.1965, 1 Ex. (WENDT, Torfhaus); 1.VII.1983, 1 Ex. (ARNOLD)

Cassida vibex L., 1767

11.V.1985, 12 Ex. (ARNOLD, am Stienitzsee, auf Cirsium oleraceum); 21.VI.1986, 2 Ex. (HEINIG, A2/A4-A7)

Cassida rubiginosa MUELL., 1776

29.V.1965, 1 Ex. (WENDT, Torfhaus); 4.IX.1965 u. 15.IX.1965, je 1 Ex. (WENDT, Hennickendorf); 11.V.1985, 1 Ex. (SCHÜLKE); 11.V.1985, 3 Ex. (ARNOLD, am Stienitzsee, auf Cirsium oleraceum); 21.VI.1986, 2 Ex. (HEINIG, A2/A4-A7)

Anschriften der Bearbeiter:

Ulf Arnold, Suhler Strasse 52, Berlin, 1 1 5 2

Uwe Heinig, Löcknitzstrasse 39, Berlin, 1 1 6 2 .

Ordnung S a l t a t o r i a (Heuschrecken)

Alle Nachweise von Bundesfreund G.JAESCHKE, 19.IX.1987

Omocestus haemorrhoidalis (CHARP.)

1 ♀, Torfhaus, überfahren auf Asphaltchaussee

Chortippus brunneus (THBG.)

1 ♀, Torfhaus, überfahren auf Asphaltchaussee

Chortippus apricarius (L.)

3 ♀♀, Torfhaus, überfahren auf Asphaltchaussee

Conocephalus dorsalis (LATR.)

2 ♀♀, Torfhaus, überfahren auf Asphaltchaussee

Pholidoptera griseocapera (DEGEER)

1 ♀, NSG Lange Dammwiesen, zertreten auf Sandweg; 3 ♀♀, 1 ♂,

Torfhaus, überfahren auf Asphaltstraße (im ganzen Gebiet-offene Gebüschvegetation häufig)

Tettigonia cantans FUESSLY

4 ♀♀, Torfhaus, überfahren auf Asphaltstraße, 3 Ex./zertreten auf Sandweg, 1 Ex. (weitere Ex. beobachtet und verhört, überall vorhanden, offensichtlich häufiger als viridissima)

Tettigonia viridissima L.

überall im Gebiet -Lange Dammwiesen- Torfhaus ect. vorhanden

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [NOVIUS - Mitteilungsblatt der Fachgruppe Entomologie im NABU Landesverband Berlin](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Arnold Ulf, Heinig Uwe

Artikel/Article: [Die Blattkäfer \(Chrysomelidae\) aus dem NSG Lange Dammwiesen und Unteres Annatal \(F24\) bei Strausberg \(Bez. Frankfurt/O.\) 144-150](#)