

FID Biodiversitätsforschung

Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Preussischen Rheinlande und Westfalens

Die Käfer der Rheinprovinz [2. Teil]

Roettgen, C.

1912

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten Identifikator:

[urn:nbn:de:hebis:30:4-165525](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:4-165525)

Pyrochroidae.

Pyrochroa Geoffr.

1. **coccinea** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf., Nev. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Siegm. d. g., Kottenforst, Kob., Kochem (R.) — *H. W. N.* —
2. **serraticornis** Scop. = *rubens* Schall. — Siegm. d. g., Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —
3. **pectinicornis** L. — Aach. (Först. - *F.*) — H. Venn (Fred.) — Eupen (Brink) — Kottenforst [Frings], Soon (R.) — *W. N.* —

Euglenidae.

Euglenes Westw.

- **pygmaeus** Deg.
- v. **oculatus** Pz. — Col. Neerl. für Düssdf. - nicht in Samml. Hagens (Dom. Hag.) — Belg., *W. N.* —
- 1. **nigrinus** Germ. — Düssdf. - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Hubenth. vid. — Duisb. (1 - Hubenth. vid. - Urb.) — *H. N.* —

Anthicidae.

Notoxus Geoffr.

1. **monocerus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (1 - *C.*) — Hild. H. (*G.*) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
- a. **latemaculatus** Pic. — Kob.-Laubbach (1 - jetzt in Samml. Heyd. - R.) — Frankreich [Cat. Col.] —
2. **brachycerus** Fald. — Düssdf. (Hildebr. - *F.* - major Dej.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. — *W. N.* —
3. **cornutus** F. — Aach., Düssdf., Laach. See, Bopp. (*F.*) — U. Nahe, einmal in Menge an mit Aphiden besetzten Pflanzen (R.) — *W. N.* —

[**Formicomus** Laferté.

- pedestris** Rossi — *F.* für Kref. [vom Bruck] - schon nach *B. III.* 284 zweifelhaft - daher auch nicht in Samml. Bruck. — Im Süden. —]

Anthicus Pk.

1. **humilis** Germ. — Kreuzn. (v. Heyden - *F.*) - dort, Theodorshalle, unter den alten Grädierhäusern nicht selten (R.) — *H. W. N.* —

2. *floralis* L. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Hubenth. vid. — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Siegm. [Frings], Kob., Elsenborn (*R.*) — *H. W. N.* —

3. *quisquilius* Thoms. [von Gerh., Berl. E. Z. 08, wieder von *floralis* getrennt] — Kref. - 1 - Samml. Bruck unter flor. - Hubenth. vid. — *H.* —

4. *antherinus* L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

5. *bifasciatus* Rossi — Kob. - 1 - aus Genist nach Moselhochwasser (Bockl.) — nahe Vallendar in einem Garten (Gabr.) — *N.* —

6. *flavipes* Pz. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (*G.*) — Kob. (Bockl. u. Mühlf.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Bonn (1 - *R.*) — *H. N.* —

7. *bimaculatus* Ill. — Aach. (Först. - *F.*) - von *B.* nicht aufgenommen, doch sicher richtig. — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Kob., aus Moselgenist (Mühlf.) — *H., N.* [Mombacher Sand.] —

8. *sellatus* Pz. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (*G.*) — Oberwerth (Mühlf.) — Niederwerth (1 - *R.*) — Nicht *H. W. N.* - über ganz Deutschland [Schilsky II.] —

Meloidae.

Meloini.

Meloë L.

1. *proscarabaeus* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Bonn (*R.*) — *H. W. N.* —

2. *violaceus* Marsh. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

4. *decorus* Brandt — Bopp. (2 - *B.* III. 260 - *pygmaeus* Redtb.) — *N.* —

[*coriarius* Brandt — Col. Neerl. für Rhp. - nur *N.* —]

5. *variegatus* Donovan. — Kref., Düssdf., Bopp. (*B.*) — Neanderthal (1 - *C.*) — Godesberg (*G.*) — Bonn (*R.*) — *H. W. N.* —

6. *brevicollis* Pz. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn, Bopp. (*F.*) — Elbf., U. Solg. (*G.*) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

7. *rugosus* Marsh. — Bopp. (*B.* III. 259) — Wiedtal, Mitte Oktober (*R.*) — *H. N.* —

8. *scabriusculus* Brandt — Bopp. (*B.*) — Godesberg (*G.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, U. Nahe, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

Zonabrini.

Cerocoma Geoffr.

1. *Schaefferi* L. — Laach. See (vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck. — Nicht wieder aufgefunden, vielleicht infolge der Tieferlegung des Sees verschwunden. — *H. W. N.* —

Lyttini.

Lytta F.

1. *vesicatoria* L. — Kref., Düssdf., Bonn, Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Bonn, U. Ahr (R.) — *H. W. N.* —

Rhipiphoridae.

Metoecus Gerst.

1. *paradoxus* L. — Düssdf. (1 - Fuß u. *B. III.* 255) — Jülich (Eichh. - *W.* 192) — Bonn (1 - Frings), jetzt in Samml. R. — *H. W. N.* —

Mordellidae.

Mordellini.

Tomoxia Costa.

1. *biguttata* Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *bigutt.* Ziegl. u. *sericea* Ziegl.) — Aach., Bopp. (*B.* - *bigutt.* Casteln.) — Elbf. (1 - *C.*) — Belg., *W. N.* —

Mordella L.

1. *fasciata* F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrtal, Bonn (R.) — *H. W. N.* —

a. *coronata* Costa — U. Ahr (Heyd.) —

a. *villosa* Schrk. — Bopp. (*B. III.* 247) — Kreuzn. - 1 - Samml. Bruck - Hubenth. vid. — Rheinufer b. Kref. (1 - Ulbr.) jetzt in Samml. R. - Schilsky vid. — Westf., Hessen u. a. [Schilsky II.] —

2. *aculeata* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Mordellistena Costa.

1. *abdominalis* F. — Rhp. (*F.*) — Aach., Kref. (*F.* - *ventralis* F.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Siebengbg. (Urb.) — Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. *humeralis* L. — Düssdf. (Hildebr. - *F.* - *flavescens* Marsh.) — Belg., *W. N.* —

a. *axillaris* Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher nicht in Samml. Bruck. — Doch Westf. [Erchs. vid. - *W.* 191] —

3. **lateralis** Ol. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *variegata* F.) — Bopp. (*B.* III. 249. 361) — Elbf. (*C.*) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —
4. **neuwaldeggiana** Pz. — Aach., Kref. (*F.* - *brunnea* Dej.) — Aach. (Urb.) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Bonn, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —
5. **parvula** Gyll. — Bopp. (*B.* - auch *pusilla* Redtb.) — H. Venn (Fred.) — Rhens (1 - Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
6. **micans** Germ. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Kref., Kreuzn. - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — *W. N.* —
7. **pumila** Gyll. — Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) - 1 aus Samml. Corn. Schilsky vid. — Kreuzn. - Samml. Bruck — Oberstein (Heyd.) — Bonn, Laach. See, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
8. **stenidea** Muls. — Oberstein, auf Malven (Heyd.) — *N.* —

Anaspidini.

[**Cyrtanaspis** Em.]

phalerata Em. — *B.* in Ent. Kl. für Bopp. - in der Fauna III. 252 nicht für Rhp. — *N.* —]

Anaspis Geoffr. 1).

[Die An. der Samml. R. von Schilsky revidiert.]

1. **frontalis** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Schilsky vid. — Saarl. (Gabr.) — Wiedtal, Eltztal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
- a. **lateralis** F. — Ahrtal, Bopp. (*F.*) — Elbf. (2 - *C.*) — Winnigen (Bockl.) — *W. N.* —
2. **pulicaria** Costa — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — *H. N.* —
3. **thoracica** L. = *confusa* Em. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Schilsky vid. — Ahrtal (Beckers, D. E. Z. 92) — Jülich (Gabr.) — *H. W. N.* —
4. **ruficollis** F. — Aach., Ahrtal, Bopp. (*F.* - *rufic.* Stm.) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (1 - *G.*) — Moseltal (Gabr.) — St. (R.) — *H. W. N.* —
- a. **Emeryi** Rag. — St. (R.) —
5. **Regimbarti** Schilsky — Bonn, Ahrw., Kob. (R.) — Normandie. —
- [**arctica** Zett. — *F.* für Aach. [Först.] u. Düssdf. [Hildebr.] - schon nach *B.* III. 253 zweifelhaft „die untersuchten rheinischen Stücke gehörten nicht zu der Art“ - ebenso nach Schilsky, D. E. Z. 94 S. 332. — Ein Förstersches Stück von Aach. in Samml.

1) An. *clypeata* Er., in *F.* für Elbf. [Corn.], blieb ungedeutet. —

Bruck ist flava a. thoracica Em. - Schilsky vid. — Nicht *H. W. N.*, insbes. nicht *H. Venn.* — Nordeuropa u. a. [Cat. Col.] — [latipalpis Schilsky — Cat. Col. 06 für Rhp. - nur Rheinbayern u. a. [Schilsky briefl.] —]

6. **Geoffroyi** Müll. — Aach. (*F.* - auch humeralis *F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

a. **quadrifasciata** Costa — St. (*R.*) — *N.* —

7. **maculata** Geoffr. — Aach., Kref. (*F.* - auch obscura Gyll.) — Bopp., häufig (*B.* - obscura Marsh.) — Elbf., Nev. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Brohltal, Wiedtal (*R.*) — *H. W. N.* —

a. **pallida** Marsh. — Wiedtal (*R.*) — *N.* —

8. **flava** L. — Rhp. (*F.* - flava *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Eltztal (*R.*) — *H. W. N.* —

a. **thoracica** Em. — Aach. - Samml. Bruck als arctica Zett. — Belegst. Schilsky vid. — *N.* —

9. **Costae** Em. — Eltztal (*R.*) — *H. N.* —

10. **rufilabris** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - rufil. Stm.) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Schilsky vid. — *H. W. N.* —

11. **melanostoma** Costa — Wiedtal, Vallendar, Eltztal (*R.*) — Belg., *W. N.* —

12. **varians** Muls. — Hild. H. (*C.*) — Elbf. (*G.*) — Oberstein (Heyd.) — Kob., Eltztal (*R.*) — *W. N.* —

a. **collaris** Muls. — Oberstein (Heyd.) — *N.* —

13. **quadrifasciata** Gyll. — Siebengbg., Ahrtal, Brohl, Laach. See (*F.* - quadripustulata Müll.) - ob die a. quadr. Müll? — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*G.*) — Wunningen (Bockl.) — Saarburg (Gabr.) — Bonn (*R.*) — *H. W. N.* —

Melandryidae.

Tetratomini.

Tetratoma F.

1. **fungorum** F. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (*G.*) — Duisb. (Urb.) — Laach. See, Soon (*R.*) — *H. W. N.* —

2. **ancora** F. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — *N.* —

Eustrophini.

Eustrophus Latr.

1. **dermestoides** F. — Bopp. (*B. Ent. Kl.*) — Kob. (Bockl.) — *W. N.* —

Hallomenus Pz.

1. **binotatus** Quens. — Düssdf. (Braselm. - *F.* - humeralis *F.*) — *H. N.* —

[*axillaris* Ill. — *C.* für Elbf. [1 - Corn. - *fuscus* Gyll.] - Belegst. ist *Orchesia minor*, die *C.* für Elbf. nicht anführt - Heyd. vid. —]

Orchesiini.

Orchesia Latr.

1. *micans* Pz. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) - Kref. (Geilenk.) — Kob. (Bockl.) — Trier (R.) — Hierhin wohl auch *G.* mit *picea* Hbst. für U. Solg. [v. Hagens] — *H. W. N.* —

2. *minor* Walk. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. - Belegst. Heyd. vid. — Kref. - 1 - Samml. Bruck — Sayntal (1 - R.) — *H. W. N.* —

3. *undulata* Krtz. — Eupen, an Buchenschwämmen (6 - Heym.) — *N.* —

[*fasciata* Pk. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck] - in Samml. Mink fehlend (Lange) - Samml. Bruck nicht aus Rhp. — *W. N.* —]

Serropalpini.

Anisoxya Muls.

1. *fuscula* Ill. — Jülich (Eichh. - Seidl. Ins. D. V. II. 514) — Belg., *W. N.* —

Abdera Steph.

1. *affinis* Pk. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Düssdf. (Fuß) — *N.* —

2. *flexuosa* Pk. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Kref. (Geilenk.) - Düssdf. (Fuß) — Elbf. (1 - *C.*) — *H. W. N.* —

3. *triguttata* Gyll. — Nev. (1 - de Rossi - *C.*) — *H. W. N.* —

4. *quadrifasciata* Curt. — Bopp. (1 - v. Hagens, Berl. E. Z. 57) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — H. Venn (Fred.) — Siebengbg. - Samml. Bruck — Belg., *N.* —

Phloeotrya Steph.

1. *rufipes* Gyll. — Barmen (1 - von Kraatz 1853 gefunden - in Samml. Heyd.) — Aach. (Kaltenb. - Verh. Nat. Ver. 1858 S. 91) - daher in Samml. Bruck — Eupen (Heym.) — *H. W. N.* —

2. *Vaudoueri* Muls. — Düssdf. (von Braselm. - in Samml. Heyd.) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Kref. - Samml. Bruck — Kref., Düssdf. - Samml. Fuß — *H. W. N.* —

Xylita Pk.

1. *buprestoides* Pk. = *laevigata* Pz. — Aach. (Först. - *F.*) — Eupen (Heym.) — Düssdf. (*B.* III. 238) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *W. N.* —

Serropalpus Hellen.

1. *barbatus* Schall. — Elbf. (2 - Corn. - *C.*) - Belegst. noch

in Samml. Corn. — Nev. (1 - de R., Westf. Pr. 98). — Nicht *W. N.*, in *H.* [wohl eingeführt - Col. Neerl.] —

Hypulini.

Hypulus Pk.

1. **quercinus** Quens. — Aach. (Först. u. Heinem. - *F.*) — Düssdf. (Fuß, Berl. E. Z. 67) — St. (1 - R.) — *W. N.* —

Melandryini.

Melandrya F.

1. **dubia** Schall. — Horchheim (1 - Mühlf.) - Hubenth. vid. — *N.* [bei Nassau] —

2. **caraboides** L. — Rhp. (*F.* - *serrata* F.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — M.-Gladbach, Bonn, Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **barbata** F. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61 - *flavicornis* Dft.) - Belegst. Heyd. vid. — *W. N.* —

Conopalpini.

Conopalpus Gyll.

1. **testaceus** Ol. — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 1867 S. 50) — Ahrw. - Samml. Fuß — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Düssdf., Jülich (Heyd.) — *H. W. N.* —

v. **flavicollis** Gyll. — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — *N.* —
2. **brevicollis** Krtz. — Kref., Düssdf., Ahrtal (*B.* III. 242) — Kref. (Mink - nach Kraatz - Seidl., Ins. D. V. II. 658) — Kob., St. (je 1 - R.) — *W. N.* —

Osphyini.

Osphyia Ill.

1. **bipunctata** F. — Bopp. (*B.* III. 266) — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 65) — Laach. See (1 - R.) — Mittel- u. Süddeutschland u. a. [Schilsky II.] —

Lagriidae.

Lagria F.

1. **hirta** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *W. N.* —

Alleculidae.

Alleculini.

Allecula F.

1. **morio** F. — Aach., Kref. (*F.*) — Duisb. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — *H. W. N.* —

[*rhenana* Bach — Niederwald b. Bingen (1 - v. Hagens - B. III. 228) - noch nicht in Rhp. gefunden. — *N.* —]

Prionychus Sol.

1. *ater* F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Kob. (2 - Bockl.) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

2. *melanarius* Germ. — Ahrw. in Samml. Fuß - Belegst. Seidl. vid. — Ahrtal (Beckers, D. E. Z. 92 - *laevis* Küst.) — daher unzweifelhaft, nicht von Rheydt, wie Seidl. Ins. D. V. II. 69 anführt, dem Wohnort des Finders Beckers, in Samml. Schilsky. — Frankreich, Mitteldeutschl. u. a. [Seidl. I. c.] —

[*Fairmairei* Reiche — Fuß, Berl. E. Z. 65, für Ahrw. [1] - trifft wie Seidl. I. c. S. 71 vermutete, *melanarius* - Belegst. aus Samml. Fuß Seidl. vid. — Frankreich [Seidl. I. c.] —]

Hymenalia Muls.

1. *rufipes* F. — Kreuzn. - 2 - Samml. Bruck — *H. N.* —

Gonodera Muls.

1. *ceramboides* L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (B. III. 230) — Elbf. (1 - *C.*) — Kottenforst [Frings], St. (R.) — *H. W. N.* —

2. *luperus* Hbst. — Aach. (*F.* - *fulvipes* F.) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — Duisb. (Urb.) — Laach. See (Stammform - R.) — *H. W. N.* —

a. *ferruginea* F. — Laach. See (R.) — *N.* —

a. *castanea* Marsh. — Kochem, Laach. See (R.) —

3. *murina* L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Mycetochara Berthold.

1. *flavipes* F. — Kref. (*B.*) - daher u. Ahrtal in Samml. Bruck — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Bonn [1 - Frings] in Samml. R. — *W. N.* —

2. *axillaris* Pk. — Düssdf. - Samml. Fuß — Linz (1 - R.) — *W. N.* —

v. *morio* Redtb. — Kleve (Fuß) — *W. N.* —

3. *humeralis* F. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (Corn. - *C.* - *bipustulata* Ill.) — *H. W. N.* —

4. *linearis* Ill. — Rhp. (*F.* - *barbata* Latr.) — Düssdf., Bopp. (*B.* - *brevis* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Tönnisstein, Trier (R.) — *H. W. N.* —

Omophlini.

Ctenlopus Sol.

1. *sulphureus* L. = *flavus* Scop. — Bopp., Trier (*B.*) —

Kobern, Eltztal selten, Blumslay, nicht selten (Bockl.) — *H. W. N.* —

a. sulphuratus Gmel. = bicolor F. — Blumslay (Bockl.) — Belegst. Heyd. vid. — *N.* —

Omophlus Sol.

1. **lepturoides** F. — Herrstein i. Birkenfeld (*B.*) - daher (Heyd.) — Staudernheim [le Roi] in Samml. R. — Soon (v. Geyr) — St. (Heyd. vid. - R.) — Süddeutschl. u. a. —

2. **ruftarsis** Leske — Herchenbergskopf b. Burgbrohl (1 - Fuß, Berl. E. Z. 62 - pubescens L.) - Nomenkl. Ins. D. V. II. 287 — *H. N.* —

3. **lividipes** Muls. = picipes Redtb. — Kreuzn. - Samml. Bruck — dort auch (R.) - Belegst. Heyd. vid. - u. Münster a. Stein [le Roi] in Samml. R. — Saarl. (Gabr.) — *N.* —

Tenebrionidae.

Asidini.

Asida Latr.

1. **sabulosa** Goeze — Bopp., Kob., Laach. See (*B.* - grisea F.) — Brohltal (Fuß) — Hönnungen, Konder Berg b. Kochem (Bertkau - Heyd., D. E. Z. 90 S. 212) — Ruine Hammerstein [Bertkau], am Bausenberg, oberes Brohltal (Heyd. l. c.) — Blumslay (Bockl.) — Niedermendig, Illerich b. Kochem, Marienburg b. Alf. (je 1 - R.) — am Palmberg b. Bertrich (Leyd, Verh. Nat. Ver. 81) — Trier (Mühlf.). — Elsaß [Heyd. l. c.] - sonst Mittelmeer, Frankreich, Schweiz [Ins. D. V. 336] — Daß die Art zwischen Bingen u. Bonn am ganzen Rhein vorkomme, wie *B. III.* 215 mutmaßen möchte, ist nicht wahrscheinlich; sie hat sich von ihrer durch die Funde moselaufwärts bis Trier gegebenen Einwanderungsstraße „dem Moseltal“ aus im Rheintal nur im weiteren Gebiet der Moselmündung, zu dem auch Boppard zu rechnen, verbreitet. —

Blaptini.

Blaps F.

1. **lethifera** Marsh. = similis Latr. — Aach. (Först. - *F.* - fatidica Ill.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Brohltal u. Sinzig (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Trier, St. (R.) — *W. N.* —

[*Milleri* Seidl. — R. Beitr. I. für Kleve [1 - Fuß - reflexicollis Fisch.] u. als eingeschleppt bezeichnet — Belegst. ist lethifera Seidl. vid. —]

— **mortisaga** L. — *F.* für Aach. [Först], Kref. [Mink u. vom Bruck], Düssdf., Bopp. [Bach] - doch nicht Bopp. (*B.* III. 220) - nicht Rhp. in Samml. Bruck - aus neuerer Zeit nicht wieder angegeben. — Vorkommen gegenüber Ins. D. V. 323 zweifelhaft. — *N.* - für *W.* angegeben. —

2. **mucronata** Latr. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (*R.*) — *N.* —

Opatrini.

Melanimon Stev. = *Microzoum* Redtb.

1. **tibiale** F. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) - Düssdf. in Samml. Fuß — Hild. H.; U. Solg. (*G.*) — Wesel (Gabr.) — *H. W. N.* —

Opatrum F.

[**riparium** Scrib. — Schilsky II. für Rhp. - doch nur *N.* 243. - immerhin möglich. —]

1. **sabulosum** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Borbeck (Geilenk.) — Bonn, Kob., U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

Crypticini.

Crypticus Latr.

1. **quisquilius** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *glaber* L.) — Nev., Hild. H. (*C.*) — U. Nahe, Kreuzn. (*R.*) — *H. W. N.* —

Boletophagini.

Boletophagus Ill.

1. **armatus** Pz. — Düssdf. (Braselm. - *F.*) - daher (Heyd.) — Bopp. (*B.*) — *N.* —

Eledona Latr.

1. **agaricola** Hbst. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Kob. (Bockl.) — *H. W. N.* —

Diaperini.

Scaphidema Redtb.

1. **metallicum** F. — Aach., Düssdf. (*F.* - *bicolor* F.) - Düssdf. (Heyd.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Nettetal, Oberwerth (*R.*) — *H. W. N.* —

Diaperis Müll.

1. **boleti** L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Nettetal, U. Nahe (die Stammform - *R.*) — *H. W. N.* —

Platydemia Lap.

1. **violaceum** F. — Aach. (Kaltenb. - *F.*) — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Fuß — *H. W. N.* —

2. **Dejeani** Lap. — Düssdf. (Braselm. - *F.*) - daher in Samml.

Bruck u. Fuß. — Nicht *H. W. N.* - Thüringen u. im Osten [Schilsky II.] —

Pentaphyllus Latr.

1. **testaceus** Hellw. — Düssdf. (Braselm. - *F.*) — Bopp. (*B.*) - daher in Samml. Bruck u. Fuß — *W. N.* —

Ulomini.

Hypophloeus F.

1. **unicolor** Pill. = **castaneus** F. — Werden (1 - Urb.) - jetzt in Samml. R. — *H. W. N.* —

[**fraxini** Kugel. — Schilsky I. u. II. für Rhp. — Col. Neerl. für Kref., Düssdf. — Beides unzweifelhaft auf Deutung des *Margus ferrugineus* F. in *F.* als ferrug. Creutz., der früher bei *fraxini*, beruhend - Angabe in *F.* trifft aber *Tribolium navale*. — *N.* —]

2. **bicolor** Ol. — Aach. (Heinem. - *F.*) - in *B.* III. 210 ausdrücklich nicht für Rhp. - doch Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 1858 S. 91) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **fasciatus** F. — Bopp. (*B.*) — Düssdf. - Samml. Fuß — *W. N.* —

4. **linearis** F. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) - daher nicht in Samml. Bruck — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

Caenocorse Thoms. = **Palorus** Duv.

1. **depressa** F. — Bopp. (*B.* III. 209) — U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Tribolium Mac Leay.

1. **navale** F. — Kref. [vom Bruck] u. Düssdf. (*F.* - *Margus ferrugineus* F.) - in *B.* III. 206 *Tribolium* - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Hubenth. vid. — Elbf. (1 - *C.*) — Kob. (1 - Bockl.) — Soon (1 - v. Geyr) — Siegm. d. g., mehrfach [Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

v. **bifoveolatum** Dft. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H.* —

Gnathocerus Thunb.

1. **cornutus** F. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — *H. N.* —

Melasia Muls. = **Uloma** Lap.

1. **culinaris** L. — Aach. (Först. - *F.*) — Kob. (Bockl.) — *W. N.* —

Alphitobius Steph.

1. **piceus** Ol. — Bopp. (*B.* III. 206 - *diaperinus* Pz.) — *H. W.* —

Tenebrionini.

Tenebrio L.

1. **opacus** Dft. — Soon b. Ellern (1 - Heyd. vid. - R.) — *N.* —

2. **obscurus** F. — Aach., Kref., Düssf. (F.) — Elbf. (1 - Corn. - C.) — Müddersheim b. Zülpich, massenhaft (v. Geyr) - Belegst. in Samml. R. - Heyd. vid. — *H. W. N.* —

3. **molitor** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Dinslaken, Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Helopinae.

Helops F.

1. **laevioctostriatus** Goeze — Rhp. (F. - caraboides Pz.) — Elbf. (C. - striatus Fourc.) — Oberemmel, Bernkastel (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Viersen [le Roi], M.-Gladbach, Kref., Bonn (Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **quisquilius** Stm. — C. für Elbf. [Corn. - quisqu. F.] - das einzige noch vorhandene Belegst. der Samml. Corn. ist laevioctostr. - Heyd. vid. — Col. Neerl. für Kref. - in Samml. Bruck daher nur striat. Fourc. mit Allard vid. — Sonst nicht angegeben, noch in Samml. — Nach Seidl., Ins. D. V. 785, anscheinend nur im Osten. —

Cerambycidae.

Spondyliini.

Spondylis F.

1. **buprestoides** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Prionini.

Prionus Geoffr.

1. **coriarius** L. — Rhp. (F. - coriaceus F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Rengsdorf, häufig (Frings) — Bonn, Siebengbg., St. (R.) — *H. W. N.* —

Ergates Serv.

1. **faber** L. — Güls, auf der Höhe, u. Kob., im Siechhaustal (je 1 - Bockl.) — Nicht *H. W. N.* - sonst in ganz Deutschland [Schilsky II.] —

[**Aegosoma** Serv.

scabricorne Scop. — Zebe für Rhp. - ebenso Schilsky II. - nicht nachweisbar. — *N. verbr.* —]

Lepturini.

Rhagium F.

1. **sycophanta** Schrk. = mordax F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **mordax** Deg. = *inquisitor* Pz. — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Soon (R.) — *H. W. N.* —
3. **bifasciatum** F. — Kref., Duisb., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Soon (R.) — *H. W. N.* —
- a. unifasciatum** Muls. — Duisburger Wald, mehrfach (G.) —
- a. fasciatum** Pic — Duisburger Wald - 1 - Samml. Geilenk. - unter unifasciat. - Belegst. Heyd vid. — Kleve - Samml. Fuß - Belegst. - Heyd. vid. —
4. **inquisitor** L. = *indagator* F. — Rhp. (F.) — Elbf. (1 - G.) — H. Venn (Fred.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Soon (R.) — Hertenwald, *W. N.* —

Rhamnusium Latr.

1. **bicolor** Schrk. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) - Aach. (Urb.) — Elbf. (v. Hagens - G.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —
- a. glaucopterum** Schall. — St. (1 - R.) — *W. N.*

Oxymirus Muls.

1. **cursor** L. — Aach. (Först. - F.) — Elbf. (Corn. - C.) — H. Venn (Fred.) — Kob. (Bockl.) — Soon (R.) — *W. N.* —

Stenochorus F. 1) = **Toxotus** Serv.

1. **meridianus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
- **quercus** Goetz — F. für Aach. [Först. - humeralis F.] - Samml. Först. ergibt nichts — Elbf. [Corn.], wie F. angibt, in C. nicht angeführt. — *W. N.* —

[Pachyta Steph.

- quadrimaculata** L. — F. für Homberg [Pliester] - von B. - *Toxotus quadrim.* - nicht aufgenommen. — Unzweifelhaft unrichtig - nicht *H. W. N.* - in den höheren Gebirgen. —]

Acmaeops Leconte.

1. **collaris** L. — Aach., Bonn, Bopp. (F.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Gaurotes Leconte.

- 1 **virginea** L. — Jünkerath i. d. Eifel (Bockl.) — *W.* —

Pidonia Muls.

1. **lurida** F. — Elbf. (1 - Corn. - C.) - Belegst. Heyd. vid. — Haus Morsbroich b. Schlebusch (1 - Geilenk.). — Nicht *H. W. N.* - Belg. [Col. Neerl.] —

1) *Toxotus dorsalis* Stm., in F. für Homberg [Pliester], blieb ungedeutet. —

Leptura L.

1. **rufipes** Schall. — Bopp. (*B.* III. 53.) — Ahrw. (Fuß) — Löhndorf b. Sinzig (1 - Raderm.) — Wunningen (2 - Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Kochem (1 - R.) — *W. N.* —
2. **sexguttata** F. — Düssdf. (*F.*) — Elbf., Nev. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Eupen (Brink) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
 - a. **exclamationis** F. — Saarl. (Gabr.) —
3. **livida** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Soon (v. Geyr) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
4. **fulva** Deg. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - *tomentosa* F.) — Elbf. (*C.*) — Soon (v. Geyr) — Kref., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —
5. **maculicornis** Deg. — Elb. (Corn. - *C.*) — Soon (v. Geyr u. R.) — *W. N.* —
6. **rubra** L. — Elbf. (*C.*) — Löhndorf b. Sinzig (Raderm.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**cordigera** Füssl. — *F.* für Homberg [Pliester - *hastata* F.] - von *B.* nicht aufgenommen. — Nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten. —]
7. **scutellata** F. — Kref. (vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck — Trier (Schnur - *F.*) — Düssdf. (*B.* u. *G.*) - daher in Samml. Fuß — Essen (Heym.) — Kob. (1 - R) — *W. N.* —

— **virens** L. — Fred. für H. Venn - im Hertogenwald [Ann. Belg. 27 S. 138 mit „vielleicht eingeschleppt.“] — In den höheren Gebirgen. —

— **sanguinolenta** L. — *F.* für Kref. [vom Bruck] u. Trier [Schnur] - von Kref. nicht in Samml. Bruck - Trier vielleicht richtig. — *H. W. N.* —
8. **cerambyciformis** Schrk. — Rhp. (*F.* - *Pachyta octomaculata* F.) — Elbf. (*C.*) — Soon (v. Geyr) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
 - a. **quadrinaculata** Scop. — U. Ahr (Heyd.) —
 - a. **sexpunctata** Muls. — U. Ahr (Heyd.) —

[**sexmaculata** L. — *F.* für Düssdf. [Braselm. - *Pachyta sexm.*] - von *B.* nicht aufgenommen. — Nicht *H. W. N.* - Alpen, Nordeuropa [Cat. Col.] —]
9. **revestita** L. — Aach., Bonn, Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
 - a. **rufomarginata** Muls. — Wunningen, Kob. (Bockl.) —
 - a. **rubra** Geoffr. — Wunningen (Bockl.) — Löhndorf b. Sinzig (Raderm.) — Bonn (R.) — *W. N.* —

[**pubescens** F. — *F.* für Aach. [Först.] - Samml. Först.

ergibt nichts. — Von *B* nicht aufgenommen - nicht *H. W. N.* - auch nach den Verbreitungangaben in Münch. K. Z. II 364 sicher unrichtig. —]

10. *aurulenta* F. — Bopp. (1 - *B.* III. 49) — Trier (2 - Mühlf.) — *N.* —

11. *quadrifasciata* L. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R.) — H. Venn (Fred.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. *interrupta* Heyd. — U. Ahr (1 - Heyd.) — *N.* —

12. *maculata* Poda = *calcarata* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Siebengbg. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

13. *aethiops* Poda — Rhp. (*F.* - *atra* F.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

v. *Letzneri* Gabr. — Saarl., mehrfach (Gabr., D. E. Z. 95 S. 437). —

14. *melanura* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) *H. W. N.* —

15. *bifasciata* Müll. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Soon (R.) — *H. W. N.* —

16. *nigra* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Brohltal (R.) — *H. W. N.* —

17. *attenuata* L. — Trier (Mühlf.) - daher in Samml. R. — *H. W. N.*

Alosterna Muls.

1. *tabacicolor* Deg. = *laevis* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Grammoptera Serv.

1. *ustulata* Schall. — Kref. (Mink - *F.* - *praeusta* F.) — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Trier (Mühlf.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

2. *ruficornis* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. *variegata* Germ. — Aach. (Heinem. - *F.* - *analis* Pz.) — Düssdf. (Ulbr.) — Hild. H. (Geilenk.) — Trier (Mühlf.) — Kochem (1 - R.) — *W. N.* —

Necydalini.

Necydalis L. = **Molorchus** F.

1. *major* L. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn, Bopp. (*F.* - *major* L.) - Kref. in Samml. Bruck - Eendenich b. Bonn (Frings) - sonst mögen die Angaben *ulmi* Chevrr., der noch in *B.* III 26 nicht angeführt wird, mittreffen. — Elbf. (1 - Geilenk.) — Ahrw. - Samml. Fuß — *H. W. N.* —

2. **ulmi** Chevr. — Siegm. (1 - in Samml. Fuß gelangt - Frings) — Kob. (1 - Preiß) — *W. N.* —

Caenoptera Thoms.

1. **minor** L. — Aach. (Först. - *F.*) — Wesel - Samml. Fuß — St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **umbellatarum** Schreb. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - auch *pygmaea* Dej.) — Trier (Mühlf.) — Ahrw., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

[**Marmottani** Bris. — Schilsky II. für Rhp. - doch nur aus *N.* bekannt [*N.* 273] —]

Cerambycini.

Stenopterus Steph.

1. **rufus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (Geilenk. - *C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Callimus Muls.

1. **angulatus** Schrk. — Bonn (Först. - *F.* - *Stenopterus cyaneus* F.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58) — Bonn, U. Ahr (Heyd.) — Siebengbg. - Samml. Bruck, nicht Kref., wie jedenfalls nach vom Bruck in Col. Neerl. angegeben — Löhndorf b. Sinzig (Raderm.) — Königsbach b. Kob. (Preiß) — Schmittenhöhe (Mühlf.) — Bonn, am Venusberg dem Ostabhang bis Kessenich, Brohltal (R.) — *W.* [bei Witten], *N.* —

Obrium Curt.

1. **cantharinum** L. — Aach., Düssdf. (*F.* - *ferrugineum* F.) — Neuenahr - 1 - Samml. Bertkau — Remagen (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **brunneum** F. — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — Blumslay u. Kob. (Bockl.) — Bertrich [1 - Frings], St. (R.) — *H. W. N.* —

[**Leptidea** Muls.

brevipennis Muls. — Kob., in der Stadt, angefliegen (1 - Heyd. vid. - R.) - sicher eingeschleppt. — Holland vereinzelt, in Belgien stellenweise sehr häufig [Everts, D. E. Z. 07 S. 374] —]

Gracilia Serv.

1. **minuta** F. — Rhp. (*F.* - *pygmaea* F.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Cerambyx L.

1. **cerdo** L. = *heros* Scop. — Bopp. (*F.*) — Elbf. (1 - Geilenk. - *C.*) — Solingen (1 - Oberlehrer Hahne - Frings) — Winnigen

(Bockl.) — An den alten Eichen b. Warmsroth-St. (Oberförster Lösch, Stromberg) — *H. W. N.* —

2. **Scopolii** Füssl. = *cerdo* Scop. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Criocephalus Muls.

1. **rusticus** L. — *F.* für Aach., Bonn [Först.] - vor Aufstellung des *ferus* Krtz. — Nev. (1 - de R., Westf. Pr. 98) — Kref. (Ulbr.) - daher in Samml. R. — auch aus Rhp. in Samml. Klette (Gabr.) — *H. W. N.* —

2. **polonicus** Motsch. = *ferus* Krtz. — Kref. (1 - Ulbr.) — Löhdorf [1 - Raderm.], Bonn [1 - Fuß], Eendenich b. Bonn [1 - Frings] in Samml. R. — Hubenth. vid. omn. — Belg., *H.* —

Asemum Eschsch.

1. **striatum** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

a. **agreste** F. — Duisb. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *W. N.* —

Tetropium Kirb.

1. **castaneum** L. — Rhp. (*F.* - *luridum* L.) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

a. **luridum** L. — Duisb. (Heym.) — Bonn, Soon (R.) —

a. **aulicum** F. — Duisb. (Heym.) —

a. **fulcratum** F. — Duisb. (Heym.) — Laach. See, Kochem, St. (R.) —

Phymatodes Muls.

[**glabratus** Charp. — *F.* für Bopp. [Bach - Callid. *gracile* Dej.] - in *B.* III. 319 *castaneum* Redtb. nur für Österreich. —] — **pusillus** F. — Bonn (1 - vor Jahrzehnten - K. Dan. vid. - R.) - Fundart? - Einschleppung möglich. — Im Kelsterbacher Wald zwischen Frankfurt u. Mainz von Wasserbauinspektor W. Sattler mehrfach 1907 gfd. [Heyd. briefl.] - Mitteleuropa [Cat. Col.] —

1. **testaceus** L. — Rhp. (*F.* - *variabilis* F.) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — *H. W. N.* —

a. **variabilis** L. — Elbf. - Samml. Corn. u. *G.* — Bonn, Kob. (R.) — *W. N.* —

a. **fennicus** F. — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. - Samml. Corn. — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — *W. N.* —

a. **analis** Redtb. — Kref. - 1 - Samml. Bruck — Elbf. - 2 - Samml. Corn. — *W. N.* —

2. **alni** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R., Westf. Pr.

Verh. d. Nat. Ver. Jahrg. LXVIII. 1911.

16

98) — Kref. - Samml. Bruck — U. Ahr, Saarl. (Heyd.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **rufipes** F. — Bopp. (B.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — *W. N.* —

Pyrrhidium Fairm.

1. **sanguineum** L. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Kref., wofür in *F.* nach Mink u. vom Bruck angegeben, nicht in Samml. Bruck, nur von Elbf. — *H. W. N.* —

Callidium F.

[**aeneum** Deg. — Bonn, an der Holzschneidemühle in der Gronau (1 - Verhoeff) - zwar *N.*, doch nach der Fundstelle sicher eingeschleppt. —]

1. **violaceum** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. - C.) — Kob. (Bockl.) — M.-Gladbach, Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **minor** Geilenk. [*G.* 44 beschr.] — Nev. (de Rossi - *G.* - v. minor de Rossi i. litt.) —

Hylotrupes Serv.

1. **bajulus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Rhopalopus Muls.

1. **clavipes** F. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Bonn (von Förster - Heyd.) — Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 60) - Fundort Altenahr (Fuß) — Gerolstein - 1 - Samml. Bertkau. — *H. W.* —

2. **femoratus** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Duisb. (Heym.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — *W. N.* —

[**Rosalia** Serv.

alpina L. — Kob., auf dem Kirchhof an der Karthause mehrfach vom Kirchhofswärter Krott gefunden (Oberst Schultze vid. - *N.* 277) - eingeschleppt, wie auch in *N.* - mag sich aber jahrelang halten. — Alpen. —]

Aromia Serv.

1. **moschata** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C. u. - autumnalis Westh. - *G.*) — Winningen (Bockl.) — Siegm. d. G., St. (R.) — *H. W. N.* —

Purpuricenus Fisch.

1. **Kaehleri** L. — Bonn, Bopp. (F.) - Bonn, Venusberg (Verhoeff) — *F.* noch für Düssdf. [Braselm.] - wohl verschlagen — U. Ahr, häufig, Larve in Weinbergspfählen (Heyd.) — Sinzig (1 - Andr.) — Königswinter, Rhöndorf, Honnef (Frings) — Blumslay (Bockl.) — Bienhorntal b. Ehrenbreitstein (1 - Rei-

chensp.) - jetzt in Samml. R. — N. - 1 in W., wohl verschlagen. —

Clytini.

Plagionotus Muls.

1. **detritus** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (Corn. - C. - mit: ob in Elbf. einheimisch?) — H. W. N. —

2. **arcuatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

[**floralis** Pall. — G. für Nev. [1 - de Rossi, mit Fundort?] — Nicht H. W. N. - im Süden u. Osten. —]

Xylotrechus Chev.

— **rusticus** L. — F. für Trier [Schnur - hafniensis F.] — Belg., N. —

1. **arvicola** Ol. — B. III. 19 für Elbf. [Corn.] - nicht im Verz. C. — Kref. (1 - Brink) - Kref. - 1 - Samml. Ulbr. — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß — Bonn - 1 - Samml. Bertkau - Heyd. vid. — Belg., H. N. —

[**antilope** Zett. — F. [antil. Ill.] für Bopp. [Bach] u. Kref. [Mink u. vom Bruck] - in B. III. 20 nicht für Rhp. - von Kref. nicht in Samml. Bruck - in Samml. Mink 1 arvicola als antil. ohne Fundort (Lange) — N. —]

Clytus Laich.

1. **tropicus** Pz. — B. für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck — Bopp. (B.) — Jülich (5 - Eichh., Berl. E. Z. 66) — Blumslay [1 - Bockl.] in Samml. R. — Belg., N. —

2. **arietis** L. — Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (1 - Heyd. - a. femoralis de Rossi) — Bonn, Kob. (R.) — H. W. N. —

a. **gazella** F. — Aach., Düssdf., Bonn (F.) — Nord- u. Süd-deutschl. [Schilsky II.] —

[**rhamni** Germ. — F. für Elbf. [Corn.] u. Homberg [Pliester] - Elbf. nicht im Verz. C., Homb. ohnehin zweifelhaft — de R, Verh. Nat. Ver. 82, für Nev. - schon im Nachtrag dort berichtet. — Nicht H. N. - in W. vor langen Jahren einmal 1 - wohl eingeschleppt. — Im Süden. —]

Clytanthus Thoms.

1. **varius** F. — Bonn (F. - ornatus F.) - in B. III. 320 = verbasci L. — Herrstein i. Birkenfeld (B. III. 21) — Ahrtal - Samml. Fuß u. Heyd. — W. N. —

2. **glabromaculatus** Goeze — F. für Bopp. [Bach - quadri-punctatus F.] - daher nicht in B. III. 22 — Trier (B.) — Bern-

kastel (Oberförster Bauer u. 1886 von Heyden - Heyd.) — Belg., N. —

3. **sartor** F. = *massiliensis* L. — Bonn, Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Siebengbg. (Geilenk.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — W. N. —

4. **figuratus** Scop. = *plebejus* F. — Bonn, Laach. See, Bopp. (F.) — Kref. (Geilenk.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn (R.) — W. N. —

Anaglyptus Muls.

1. **mysticus** L. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Rosoy (Schneid.) — M.-Gladbach, Bonn, St. (R.) — H. W. N. —
a. **hieroglyphicus** Hbst. — Elbf. (2 - Corn. - C.) — W. —

Lamiini.

Dorcadion Dalm.

1. **fuliginator** L. — Kob. u. Winnigen (Wirtgen - F.) — St. (B.) — Blumslay b. Winnigen, Ruine Bischofstein gegenüber Burgen, Pommern nahe Kochem, stets wo sich *Sedum album* findet (Bockl.) — St. im Warmrother u. unteren Dörrebachtal, U. Nahe am Guldenbach, Kreuzn. (R.) — Belg., N. —

Lamia F.

1. **textor** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —

[**Monochamus** Curt.

sartor F. — Vohwinkel, am Bahnhof (1 - C.) - sicher, wie Corn. vermutet, eingeschleppt. — Nicht W. N., Rotterdam - 1 — Nordeuropa [Cat. Col.] —

sutor L. — ebenso wie *sartor* (1 - C.) - auch eingeschleppt. — Nicht H. W. N. — Nord- u. Mitteleuropa [Cat. Col.] —]

[**Acanthoderes** Serv.

clavipes Schrk. — Col. Neerl. für Rhp. - aber nur N. 280. — Aus Rhp. in keiner Samml. —]

Acanthocinus Steph.

1. **aedilis** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Düssdf. (G.) — Bonn, Kob., Soon (R.) — H. W. N. —

[**reticulatus** Razum. = *costatus* F. — Kob. (1 - Bockl.) - sicher eingeschleppt, da nicht H. W. N. — Mitteleuropa [Cat. Col.] —]

Liopus Serv.

1. **nebulosus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck - Dinslaken, Bonn, Vallendar, Kochem, U. Nahe (R.) — H. W. N. —

[*punctulatus* Pk. — Everts, D. E. Z. 92, für Kref. - beruhend auf Angabe von vom Bruck [Vorbemerkg. V] - die beiden Belegst. von Kref. in Sammlung Bruck sind *nebulosus* - Heyd. vid. — N. —]

Hoplosia Muls.

— *fennica* Pk. — Kob. - 1 - vor langen Jahren von einem holländischen Sammler gefunden, jetzt in Samml. Everts (Ev. briefl.) - zwar N., doch wohl ein verschlagenes Stück, da bei Kob. nicht wieder gefunden. —

Exocentrus L.

1. *lusitanus* L. — Aach. (Först. - *F.* - *balteatus* L.) - daher in Samml. Bruck, nicht auch von Kref., wie Col. Neerl. angeben. — W. N. —

Pogonochaerus Gemm.

1. *hispidulus* Pill. — Rhp. (*F.* - *hispidus* F.) — Elbf. (*C.* - *hispidus* Schrk.) — Tönnisstein - Samml. Bertkau — Trier (Mühlf.) — W. N. —

2. *hispidus* L. — Rhp. (*F.* - *pilosus* F.) — Bopp. (*B.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

3. *fasciculatus* Deg. — Kref., Bopp. (*F.* - *fascicularis* Pz.) - Düssdf. in Samml. Bruck — Elbf. (*Corn.* - *C.*) — Bonn [Frings] in Samml. R. — H. W. N. —

4. *decoratus* Fairm. — Düssdf. (1 - Ulbr.) — Bonn - 1 - Samml. Bertkau - Belegst. Heyd. vid. — H. N. —

5. *ovatus* Goeze — Kref., Bopp. (*F.* - *ovalis* Gmel.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Preiß) — Alf [de Maes aus Bonn]. St. (je 1 - R.) — W. N. —

Deroplia Rosh.

— *Genei* Arag. — Ahrw. (1 - Fuß, Berl. E. Z. 61) - wohl eingeschleppt oder verschlagen. — Nicht H. W. N. — Reutlingen [2 - Keller, Stett. E. Z. 62], Harz u. i. Süden [Schilsky II.] —

Haplocnemia Steph. = *Mesosa* Serv.

1. *curculionoides* L. — Bopp. (Bach - *F.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (1 - Bockl.) — Belg., N. —

2. *nebulosa* F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) — Kob. (Bockl.) — Dinslaken, Kochem (R.) — H. W. N. —

Anaesthetis Muls.

1. *testacea* F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Ahrw. - Samml. Fuß — Morgenbachtal b. Bingerbrück, U. Nahe (R.) — W. N. —

Agapanthia Serv.

[*Dahli* Richt. — *F.* für Rhp. [*cardui* F.] - trifft die bei Aachen

nicht seltene, in *F.* fehlende *villosoviridescens* Deg. — Dahli aus Rhp. nicht in Samml. Först., Bruck, Corn., Fuß, noch irgendwo angegeben, *B.* III. 40 zweifelhaft — doch *W. N.* —]

[*cynarae* Germ. — *F.* für Homberg [Pliester] — schon in *B.* III. 41 bezweifelt — sicher unrichtig — Südeuropa. —]

1. *villosoviridescens* Deg. — Elbf. (Corn. - *C.* - *angusticollis* Gyll.) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — H. Venn (Fred.) — Aach. — Samml. Först. — Kref. — Samml. Bruck u. Ulbr. — M.-Gladbach, Kochem (R.) — *H. W. N.* —

2. *cardui* L. — Bopp. (*B.* - *suturalis* *F.*) — Kob., Winnigen (Bockl.) — Siebengbg., Ahrw., Alf (R.) — *N.* —

3. *violacea* *F.* — Aach., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Rheydt (Geilenk.) — Bonn (Verhoeff) — Linz (Heyd.) — Kob. (Mühlf.) — U. Nahe, St. (R.) — *W. N.*

Saperda *F.*

1. *carcharias* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, am Tannenbusch (Frings) — Kob. (Bockl.) — Siegm. d. G., Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

[*similis* Laich. — *C.* für Elb. [2] — Belegst. später von Geilenk. untersucht, sind kleine *carcharias* (*G.*) — *N.* —]

2. *populnea* L. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —

3. *scalaris* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf., Nev. (*C.*) — Marxloh (Schneid.) — Kob. (Preiß) — Trier (Mühlf.) — Siegm. d. G., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

[*octopunctata* Scop. — *F.* für Rhp. [*tremulae* *F.*] — in *B.* III. 35 nicht für Rhp. — auch nicht in Samml. Först., Bruck, Corn., Fuß u. a. — *N.* —]

Tetrops Steph.

1. *praeusta* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Stenostola Muls.

1. *ferrea* Schrk. — Aach., Düssdf., Bonn (*F.* - *nigripes* *F.*!) - *alboscuteolata* Krtz. kommt nicht in Frage. — Barmen (*C.*) — H. Venn (Fred. - *nigripes* *F.*) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kob., Kochem, St. (R.) — hierhin jedenfalls *F.* mit *Phytoecia ferrea* *F.* für Aach., Bopp. — *H. W. N.* —

Phytoecia Muls.

[*rubropunctata* Goeze — Schilsky II. für Rhp. — nur Mainz [N. 284] —]

1. *pustulata* Schrk. — Aach., Düssdf. (*F.* - *lineola* *F.*) — Herrstein (Heyd.) — U. Nahe, St. (R.) — *N.* —

2. **ephippium** F. — Aach. (Först. - *F.*) — Kob. (Mühlf.) — Kob., U. Nahe (R.) — Belg., *W. N.* —

3. **cylindrica** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **nigricornis** F. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Kref. - Samml. Bruck — Siebengbg. (Urb.) — Kob. (Bockl.) — Kochem, Winnigen (R.) — *W. N.* —

a. **solidaginis** Bach — Düssdf. (*F.* - *echii* Dahl.) — Bopp. (*B.*) - vielleicht nur rechtsrheinisch, woher beschrieben nach *N.* 284 — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Winnigen (Bockl.) — *N.* —

5. **coerulescens** Scop. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (*G.*) — Ruhrort (Geilenk.) — Kref., Kreuzn. - Samml. Bruck — Rodderberg (Dorm.) — Soon (v. Geyr) — Winnigen (Bockl.) — U. Nahe, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

Oberea Muls.

1. **pupillata** Gyll. — Bonn (1 - Frings) - jetzt in Samml. Fuß — Honnef (1 - Geilenk.) — Rhöndorf (1 - Frings) - jetzt in Samml. R. — Belg., *N.* —

2. **oculata** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **linearis** L. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Stommeln (Raderm.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **erythrocephala** Schrk. — Düssdf. (Braselm. - *F.*) — U. Solg., Hild. H. (*G.*) — Kref. (Geilenk.) — Remagen, U. Nahe (R.) — *N.* —

Chrysomelidae.

Eupodae.

Donaciini.

Donacia F.

1. **crassipes** F. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Düssdf. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — M. Gladbach (R.) — *H. W. N.* —

2. **clavipes** F. — Rhp. (*F.* - *menyanthidis* F.) — Elbf. (*C.*) — Kref., Rheydt (Geilenk.) — Viersen [le Roi], Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

3. **semicuprea** Pz. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Weise vid. — Hild. H. (Geilenk.) — Kref. - Samml. Bruck — *H. W.* —

4. **dentata** Hoppe — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F.*) - daher in Samml. Bruck — *F.* für Elbf. [Corn.] - nicht in *C.* — *H. W. N.* —

5. **versicolorea** Brahm — Aach., Kref. (*F.* - *cineta* Germ.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Pulvermaar u. Wahner Haide [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

6. **sparganii** Ahr. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kleve - Samml. Fuß — Kref. - Samml. Bruck — *H. W.* —

7. **aquatica** L. — Rhp. (*F.* - *dentipes* F.) — Elbf. (*C.*) — Wahner Haide [le Roi], Bonn, Laach. See, Rheinböllen (R.) — *H. W. N.* —

— **brevicornis** Ahr. — *F.* für Aach. [Först.] - nicht *H. W. N.* Deutschl. u. a. [Cat. Col.] —

8. **impressa** Pk. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Pulvermaar [le Roi], Schalkenmehren, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

9. **marginata** Hoppe = *lemnae* F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.* u. *G.* - *limbata* Perr.) — Bonn, Mürmeswiesen [le Roi], Kochem, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

a. vittata Pz. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) - Belegst. Weise vid. (Geilenk. briefl.) —

a. unicolor Westh. — Rheydt [wie *a. vittata*] — Saarl. (Gabr.) —

10. **bicolora** Zschach. = *sagittariae* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw., Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

11. **thalassina** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Ahrtal - 1 - Samml. Bruck — Trier (Mühlf.) — Ahrw., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

12. **vulgaris** Zschach. — Kleve - Samml. Bruck — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

a. concolor Westh. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) - Belegst. Weise vid. (Geilenk. briefl.) —

13. **simplex** F. = *linearis* Hoppe — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Jünkerath (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Gillenfeld, Bonn, Ahrw., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

a. sanguinea Westh. — Trier (Mühlf.) - Belegst. Reitt. vid. —

14. **cinerea** Hbst. — Aach., Düssdf. (*F.* - *hydrocharidis* F.) - Aach. in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — Elbf. (Geilenk. - *C.*) — Kref. (Ulbr.) - daher in Samml. R. — *H. W. N.* —

15. **tomentosa** Ahr. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *toment.* Ill.) - Kref. in Samml. Bruck — *H. N.* —

Plateumaris Thoms.

1. **sericea** L. — Rhp. (*F.* u. *B.* III. 59) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Bonn (Kraatz - Weise, Ins. D. VI. 47) — H. Venn (Fred.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Bopp. (R.) — *H. W. N.* —

a. festucae F. — Rheydt (Beckers - Geilenk. u. Heyd.) — Bopp. (R.) — *W. N.* —

- a. micans** Pz. — Rheydt (Beckers - Geilenk.) — *W. N.* —
- a. armata** Pk. — Rheydt (Beckers - Geilenk. u. Heyd.) — *W. N.* —
- a. nymphaeae** F. — Rheydt (Beckers - Geilenk. u. Heyd.) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn, Bopp. (R.) — *W. N.* —
- a. g. Weise** — Rheydt (Beckers - Heyd.) — *N.* —
- 2. discolor** Pz. — *C.* für Elbf. [Corn.] - trifft wie schon im Nachtrag zu *W.* 1885 angegeben, disc. Hoppe - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — H. Venn (Fred.) — H. Venn u. Gillenfeld, zahlreich (Weise vid. - R.) — Belg., *H.* —
- [**braccata** Scop. — *F.* für Düssdf. [Braselm. - nigra F.] - zwar Belg. *H. W. N.*, doch von Düssdf. nicht wieder bekannt geworden, insbes. nicht Fuß, noch Samml. Bruck, noch v. Hagens, noch [Miss. Steyl] Hildebr. —]
- 3. consimilis** Schrk. = discolor Hoppe — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf., Nev. (de R.) - Elbf. in Samml. Corn. - Belegst. Weise vid. — Saarl. (schwarze Stücke - Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
- [**v. variabilis** Kunze — *F.* für Elbf. [Corn. - var. Dahl. = varicolor Dahl. i. litt.?] - in *C.* nicht angeführt. —]
- 4. rustica** Kunze — Elbf. (*C.* u. *G.*) — H. Venn (Fred.) — Kyllburg (Bockl.) - Belegst. Reitt. vid. — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — *H. N.* —
- 5. affinis** Kunze — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred. - auch pallipes Kunze) — Schalkenmehren [le Roi], Eltztal (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —

Orsodaenini.

Orsodaene Latr.

- 1. cerasi** L. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
- a. melanura** F. — Vallendar (R.) —
- a. limbata** Ol. — Vallendar (R.) —
- a. glabrata** Pz. — Elbf. (1 - Geilenk. - *G.*) - Weise vid. — *W. N.* —
- a. Duftschmidi** Weise — Schmittenhöhe, Vallendar (je 1 - R.) —

Zeugophora Kunze.

- 1. scutellaris** Suffr. — Aach. (Heinem. - *F.*) — Elbf. (*G.*) — Ahrw. - Samml. Fuß — Bonn (R.) — *H. W. N.* —
- a. frontalis** Suffr. — Aach. (Först. - *F.*) — *W. N.* —
- 2. subspinosa** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
- [**Turneri** Pow. — Ein Stück im Rheingenist bei Ruhrort (Geilenk., D. E. Z. 92 S. 208) - Belegst. Schilsky vid. - wurde

tot gefunden, als unzweifelhaft eingeschleppt bezeichnet. -- Mittel- u. Ostdeutschl. [Schilsky II.] --]

3. **flavicollis** Marsh. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Neuenahr (Heyd.) — U. Ahr (R.) — *H. W. N.* —

a. **australis** Weise — Neuenahr, häufig (Heyd.) — *N.* —

Criocerini.

Lema Lac.

1. **puncticollis** Curt. — Aach., Kref. (*F.* - *rugicollis* Kugel.) - Kref. in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Vallendar (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **Erichsoni** Suffr. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Kref. (Ulbr.) - Hubenth. vid. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

3. **septentrionis** Weise — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Saarl. (Gabr.) — de R., Westf. Pr. 98, für Nev. mit „Bestimmung?“ — *H.* —

4. **cyanella** L. — Rhp. (*F.* - cyan. L.) - in *B. cyan.* Suffr. — Elbf. (Corn. - *C.* - *lichenis* Voet) — Kref. - Samml. Bruck. — *H. W. N.* —

a. **obscura** Steph. — Fred. für H. Venn — *N.* —

5. **tristis** Hbst. = *flavipes* Suffr. — Trier, auf *Artemisium* (Mühlf.) - Belegst. in Samml. R. — *W. N.* —

6. **melanopus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

7. **rufocyanea** Suffr. — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. verloren — Nev. (de Rossi - *C.*) — 1 in *H.* —

Crioceris Geoffr.

1. **lilii** Scop. = *merdigera* F. — Rhp. (*F.* - *merd.* L.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **merdigera** L. = *brunnea* F. — Kref., Bopp. (*B.* - *brunn.* F.) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **duodecimpunctata** L. — Aach., Kref., Düsd. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kleve [le Roi], Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
[**quatuordecimpunctata** Scop. — *F.* für Aach. [Först.] - in *B.* nicht für Rhp. - Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 1856 S. 247, betont, vielleicht gegenüber der Angabe in *F.*, das Fehlen bei Aach. — Im Süden u. Osten. —]

4. **asparagi** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Camptosomata.

Clythrini.

Labidostomis Redtb.

[*taxicornis* F. — *F.* für Düssdf. [Braselm.] - in *B.* nicht für Rhp. - nicht *H. W. N.* - Südeuropäer. —]

— [*lusitanica* Germ. — *B.* für Bopp. [1 ♂ - *tibialis* Lac.] - vielleicht richtig, der Vergleich mit Stücken aus Südfrankreich wird betont - doch allenfalls nur irgendwie verschlagen. — Südeuropäer. —]

1. *tridentata* L. — Roertal zwischen Montjoie u. Düren, Kref., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - sonst mag die in *F.* fehlende humeralis mitgetroffen sein. — Elbf. (1 - *G.*) — Kleve - Samml. Fuß — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kochem (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

2. *humeralis* Schneid. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Ahrw. (Fuß) — Winnigen (Bockl.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Bonn, Brohltal, Kochem, St. (J. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

3. *lucida* Germ. — Blumslay, Pfaffendorf (Bockl.) — U. Nahe, Kreuzn., St. (Heyd. vid. - R.) — *W.* —

v. *axillaris* Lac. — Elbf. (1 - Corn - *C.*) — *N.* —

4. *longimana* L. — Ahrtal, Siebengbg., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (1 - *G.*) — Blumslay (Bockl.) — Ahrw., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

Lachnaea Redtb.

1. *sexpunctata* Scop. — Bopp. (*F.* - *longipes* *F.*) — U. Ahr, Laach. See (Heyd.) — Winnigen (Bockl.) — Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Clythra Laich.

1. *quadripunctata* L. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Borbeck (*G.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. *laeviuscula* Ratzb. — Aach., Düssdf. Bopp. (*F.*) — Elbf. (1 - *G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Gynandrophthalma Lac.

1. *cyanea* F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Nev. (de Rossi - *C.*) — Siebengbg., Bopp. (Geilenk.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. *flavicollis* Charp. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 65) - Belegst. aus Samml. Fuß Weise vid. — *H.*, nicht *N.* [*B.* III. 104 für Ems unrichtig - *N.* 290] —

3. *aurita* L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) - Bopp. (Geilenk.) — U. Ahr (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **affinis** Hellw. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — U. Ahr (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Coptocephala Chevr.

1. **unifasciata** Scop. — Laach. See, Bopp. (*F.* - quadrimaculata *F.*) — Ahrtal, Trier (Geilenk.) - Belegst. Hubenth. vid. — Blumslay (Bockl.) - daher in Samml. R. — *W. N.*

[**Scopolina** L. — *F.* für Bopp. [Bach] - *B.* III. 105: überall nicht selten - trifft die in *B.* noch nicht getrennte, im Gebiet von Bopp., Kob. stellenweise nicht seltene *rubicunda*, die auch allein aus den Samml. nachweisbar. — Nicht *H.* [Ev. briefl.], angeblich in *W.*, 1 in *N.* —]

2. **rubicunda** Laich. — Hierhin *F.* mit *Scopolina* für Bopp. — Bopp. (Geilenk.) — Ahrw. - Samml. Fuß als *Scopolina* — Blumslay, häufig (Bockl.) — Bonn [1 - Frings], St.-Goar, St. (R.) — Heyd. vid. omn. — *N.* —

Cryptocephalini.

Cryptocephalus Geoffr.

1. **coryli** L. — Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kochem, Trier (R.) — *H. W. N.* —

2. **cordiger** L. — Aach. (*B.*) — Winnigen (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Gerolstein (1 - R.) — *N.* —

3. **octopunctatus** Scop. — Aach., Bopp. (*F.* - *variabilis F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Rheydt (Geilenk.) — Trier (1 - Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — M.-Gladbach (1 - R.) — *H. W. N.* —

4. **sexpunctatus** L. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **signatus** Laich. — Laach. See - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — R., Beitr. I., für M.-Gladbach unrichtig. — Nicht *H. W. N.* — Mittel- u. Süddeutschl. —

6. **distinguendus** Schneid. — Bonn - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — Nicht *H. W. N.* - sonst über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

[**bimaculatus** *F.* — *F.* für Homberg [Pliester] - in *B.* nicht für Rhp. - nicht *H. W. N.* - Südeuropäer —]

7. **primarius** Harold — Blumslay, jährlich einzeln, 1908 zahlreich (Bockl.) - Belegst. Heyd. vid. — Süd- u. Ostdeutschl. [Schilsky II.] —

8. **imperialis** Laich. — Bopp. (*B.* - *bistripunctatus* Creutz.) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — *N.* —

[*trimaculatus* Rossi — *F.* [*salicis F.*] für Bopp. [Bach] u. Homberg [Pliester] - in *B.* nicht für Rhp. - nicht *H. W. N.* - Alpen, Südeuropa. —]

9. *bipunctatus* L. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrtal (Fuß, Berl. E. Z. 61, u. Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Trier (Mühlf.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

a. *sanguinolentus* Scop. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61 - lineola *F.*) — Elbf. (3 - Geilenk. - *G.*) — Eupen (Heym.) — *H. W. N.* —

a. *Thomsoni* Weise — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — *H. N.* —

10. *biguttatus* Scop. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.* - *bipustulatus F.*) — H. Venn (Fred.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 61) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

11. *Schäfferi* Schrk. — U. Nahe (1 - J. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

12. *aureolus* Suffr. — Nev. (de R.) — U. Ahr (Heyd.) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

13. *sericeus* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonu, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

a. *coeruleus* Weise — Elbf. (*G.*) — U. Nahe (R.) — *N.* —

a. *mozambanellus* Mars. — Ahrw. (3 - Fuß, Ent. Nachr. 82 S. 32 - intrusus) - Belegst., ♂♂, Hubenth. vid. — Sonst im Süden [Schilsky II.] —

14. *cristula* Duf. = *hypochoeridis* Suffr. — Elbf. (Geilenk. - *C.* u. *G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Belg., *W. N.* —

15. *violaceus* Laich. — Aach., Bopp. (*F.* - *viol. F.*) — Winnigen (Bockl.) — Bonn, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

[*marginellus* Ol. — *F.* für Bopp. [Bach - marg. Rossi] - in *B.* nicht für Rhp. - Südeuropäer. —]

— *nitidulus F.* — *F.* für Aach. [Först.] u. Bopp. [Bach] - in *B.* nicht für Rhp. - da Belg. [Col. Neerl.], wohl Aach. richtig. — *W. N.* —

16. *nitidus* L. — Aach., Kref., Kob. (*F.* - *nitens L.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

17. *punctiger* Pk. — Elbf. (*C.*) — Barmen - Samml. Bruck — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Schmittenhöhe (1 - Heyd. vid. - (R.) — *H. W. N.* —

[*janthinus* Germ. — *B.* III. 121 für Kref. [*janth. Schüpp.*] - daher nicht in Samml. Bruck - noch Samml. Mink (Lange). — Nicht *H. W. N.* - im Südosten. —]

18. *parvulus* Müll. — Kref. (*F.* - *fuleratus* Germ.) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (*B.* III. 121) — Elbf. (*C.* - *nigro-*

coeruleus Goeze) — U. Ahr (Heyd.) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —

19. *coerulescens* Sahlb. — Aach., Kref. (*F.* - *flavilabris* Pk.) - Kref. in Samml. Bruck - *flavil. Suffr.* — Bopp. (*B.* - *flavil. Pk.*) — *H. W.* —

20. *marginatus* F. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Soon (v. Geyr) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

[*quinquepunctatus* Harrer — *F.* für Düssdf. [*Braselm.* - *duodecimpunctatus* F.] - in *B.* III. 116 nicht für Rhp. - sicher mit Recht. — Nicht *H. W.*, 1 in *N.* —

a. octonotatus Schneid. — *F.* für Homberg [Pliester] - in *B.* nicht angeführt - nicht *H. W. N.* - äußerst zweifelhaft wie die Stammform. —

21. *pini* L. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — U. Solg. (*G.*) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

a. abietis Suffr. — Trier (Mühlf.) - Belegst. in Samml. R. — *N.* —

22. *decemmaculatus* L. — Aach., Kref. (*F.* - *decempunctatus* F.) - Kref. in Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — *H. W. N.* —

a. bothnicus L. — Hild. H. (Drescher u. Ostheide - *G.*) — H. Venn (Fred.) — *H. W.* —

a. barbareae L. - Hild. H. (Drescher u. Ostheide - *G.*) — — *frenatus* Laich.

a. flavescens Schneid. — Fred. für H. Venn - Fundort Heusy b. Verviers [Ann. Belg. 14. S. 59]. — Vielleicht im deutschen Teil des H. Venn noch anzufinden. —

23. *Moraei* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Soon (v. Geyr) — Bonn, Ahrw., Wiedtal (R.) — *H. W. N.* —

v. f. Weise — Kob. (*B.* III. 123) —

[*octacosmus* Bed. = *sempustulatus* Rossi — Col. Neerl. für Rhp. - nicht *H. W. N.* —]

24. *flavipes* F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Soon (v. Geyr) — Ahrtal, Kochem, Manderscheid, St.-Goar (R.) — *H. W. N.* —

25. *vittatus* F. — Aach., Kref., Ahrtal, Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Tönnisstein, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. negligens Weise — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Belg. [Col. Neerl.] —

26. *bilineatus* L. — Aach., Bopp. (*F.*) — *H.*, u. *a.* Maas-tricht, *N.* —

27. *elegantulus* Grav. — Bopp. (*B.* - *tessellatus* Germ.) - daher in Samml. Bruck — Blumslay, nicht selten (Bockl.) -

daher u. Kreuzn. [Reichensp.], Oberstein [le Roi] in Samml. R. — *W. H.* —

28. **chrysopus** Gmel. — Aach., Bopp. (*F.* - Hübneri *F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Kob., St. (R.) — *W. N.* —

29. **ocellatus** Drap. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - geminus Megl.) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — *W. N.* —

30. **querceti** Suffr. — Bopp. (*B.* - quere. Er.) — *N.* —

31. **labiatus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Schneifel [le Roi], Olbrück, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
[**exiguus** Schneid. — *F.* - Wasastjernii Gyll. - für Aach. [Först.] u. Düssdf. [Braselm.] - in *B.* III. 124 nicht für Rhp. — Nicht *H. W.*, in *N.* —]

32. **pygmaeus** F. — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — Bonn, Brohltal (R.) — *H. W. N.* —

33. **fulvus** Goeze — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - minutus *F.*) — U. Solg. (*G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

34. **macellus** Suffr. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — H. Venn (Fred.) - Finder Chapuis [Ann. Belg. 14 S. 59] — *H.* —

35. **ochroleucus** Fairm. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — *H. N.* —

36. **populi** Suffr. — Siegm. d. G., U. Nahe (Weise vid. - R.) — *W. N.* —

37. **pusillus** F. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

38. **rufipes** Goeze — Rhp. (*F.* - gracilis *F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Soon (v. Geyr) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Pachybrachis Redtb.

1. **hieroglyphicus** Laich. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — U. Solg., Benrath (*G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Siegm. d. G., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

a. **tristis** Laich. — Hierhin wohl *F.* mit *histrion* *F.* für Aach., Kref., Düssdf. — doch nicht in Samml. Bruck. — *N.* —

2. **suturalis** Weise — Oberes Ahrthal (Heyd.) — Elsaß, Bayern [Weise, Ins. D. VI. 253.] —

3. **tessellatus** Ol. — Hild. H. b. Eller (Geilenk.) - daher in Samml. R. — Kref., Kreuzn. - Samml. Bruck — *W. N.* —

4. **picus** Weise = *histrion* Redtb. — Ahrw. [Kraatz], Brohl [Habelmann] (Weise, Ins. D. VI. 265) — Col. Neerl. noch für

Aach., Kref., Düssdf. - wohl für *histrio* F. in *F.* - doch nicht in Samml. Bruck. - *N.* -

Cyclica.

Lamprosomini.

Lamprosoma Kirb.

1. **concolor** Stm. - Elbf. (1 - Corn. - *C.*) - Bonn, Elztal, Unterstes Bienhorntal b. Kob., Morgenbachtal b. Bingerbrück [le Roi] in Samml. R. - *H. N.* -

Eumolpini.

Pachnephorus Redtb.

1. **pilosus** Rossi - Bonn, Kob. (*F.* - *arenarius* F.) - Elbf. (Corn. - *C.*) - Bonn (1 - R.) - *W. N.* -

Bromius Redtb.

1. **obscurus** L. - Rhp. (*F.*) - Elbf. (*C.*) - die Stammform: Schneifel [le Roi], Laach. See, Kob. (R.) - *H. W. N.* -

a. **epilobii** Weise - H. Venn (Fred.) - Bonn (1 - R.) - *N.* -

a. **villosulus** Schrk. - Aach. (*F.* - *vitis* F.) - Bopp. (*B.*) - Überall, Weinbergsschädling (Heyd.) - U. Nahe, St. (R.) - *W. N.* -

Chrysomelini.

Colaphus Redtb.

1. **sophiae** Schall. - Aach., Bonn (Förs. - *F.*) - von Aach. (Heyd.) - Hochdahl (Geilenk. - *G.*) - *H. W. N.* -

Gastroidea Hope.

1. **viridula** Deg. - Rhens am Rheinufer, mehrfach, Aldegund a. Mosel [1 - le Roi], Trier a. d. Biewermdg. (R.) - *H. W.* -

2. **polygona** L. - Rhp. (*F.*) - Elbf. (*C.*) - Siebengbg. (Ürb.) - Kob. (Bockl.) - Bonn, St. Goar, U. Nahe (R.) - *H. W. N.* -

a. **ruficollis** F. - Saarl. (Gabr.) -

Timarcha Latr.

1. **tenebricosa** F. - Rhp. (*F.* - *laevigata* L.!) - so noch *B.* III. 78 - Elbf. (*C.*) - Kasel (Heyd.) - Bonn, Kob., Kochem, U. Nahe (R.) - *H. W. N.* -

[**montana** Fairm. - Fred. für H. Venn - Zitat nach Ann. Belg. tom. XIX p. 60 richtig, Fundort Hockay. - Cat. Col. nur Türkei - sicher Bestimmungsfehler. -]

2. **coriaria** Laich. - Rhp. (*F.*) - Elbf. (*C.* u. *G.*) - Saarl., Eifel (Gabr.) - Bonn, Kob., U. Nahe (R.) - *H. W. N.* -

a. **aerea** Fairm. - Saarl. (Gabr.) - *N.* -

3. **metallica** Laich. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — Eupen (Heym.) — Kob., nach Moselhochwasser im Genist (2 · Bockl.) — *H. W. N.* —

Chrysomela L. 1).

1. **haemoptera** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) Ahrtal, Gerolstein, St., Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

[**Rossia** Ill. — *F.* für Düssdf. [Braselm. u. Hildebr.] u. Elbf. [Corn.] - nicht im Verz. *C.* - noch von Düssdf. in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl). — Südeuropa. —]

2. **göttingensis** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **Sturmi** Westh. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — *W.* —

3. **limbata** F. — Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf., U. Solg. (*G.*) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

4. **staphylaea** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **sanguinolenta** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (2 - *C.* u. *G.*) — Rheydt, Borbeck (Geilenk.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

6. **marginalis** Dft. — Düssdf. (*F.* - marg. Megl.) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — Kyllburg, Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

7. **carnifex** F.

a. **coerulescens** Suffr. — U. Ahr b. Heimersheim (Heyd.) — *N.* — Die Art noch für Düssdf. [Hildebr.] in *F.* - doch nicht *H.* - *W.* 269 anscheinend mit Bedenken - sonst Mainz, Darmstadt u. a. [Weise, Ins. D. VI. 388] —

8. **marginata** L. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Düssdf. in Samml. Fuß — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Geilenk.) — Ahrw., Bonn (R.) — *H. W. N.* —

9. **analisis** L. — Bopp. - 1 - Samml. Bruck — *N.* —

a. **lomata** Hbst. — Kob. (1 · Bockl.) — *W. N.* —

10. **fuliginosa** Ol.

a. **galli** Weise = **molluginis** Suffr. — Bopp. (*B.* - in Ent. Kl. nigroaenea) — Elbf. (Geilenk. - *C.*) — Bonn - Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Sayntal, Schmittenhöhe, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

11. **orichalcea** Müll. — Aach., Bopp. (*F.* - lamina *F.!*) - Aach. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Kob. (3 - Bockl.) - Belegst. Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

1) *Leptinotarsa decemlineata* Say, der Coloradokäfer, wurde um 1875 eingeschleppt und hielt sich kurze Zeit auf einem Felde bei Mülheim-Rhein. Dazu Westhoff, Jahresber. zool. Sekt. Westf. Prov.-Vereins für 1877/78.

- **a. lamina** F. — Oberwerth, Eltztal (R.) —
 — **rufoaenea** Suffr. — Kob., aus Moselgenist (1 - Bockl.) -
 Belegst. Reitt. vid. — Einheimisch? - Elsaß (Schilsky II.) doch
 schon 1 bei Nassau gfd. von Buddeberg [N. 299] —
 12. **brunsvicensis** Grav. — Elbf., Nev. (C.) - Elbf. (Heyd.) —
 Kref. - Samml. Bruck — Trier (Mühlf.) — Bonn (1 - R.) — *H.*
W. —
 13. **geminata** Pk. — Aach., Düssdf. (F.) — Kob. (Bockl.) —
 Trier (Mühlf.) — Bonn [1 Frings], Laach. See, U. Nahe, St. (R.)
 — *H. W. N.* —
a. cuprina Dft. — Aach. (Först. - F.) — *N.* —
 14. **quadrigemina** Suffr. — Elbf. (Corn. - C. - v. gemellata
 Dft.) - Belegst. Suffr. vid. nach *W.* 271. — Lengsdorf b. Bonn
 (Verhoeff) - Belegst. verloren. — *W. N.* —
 15. **hyperici** Forst. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - fucata Ol.)
 — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.)
 — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
 16. **didymata** Scrib. — Elbf. (1 - Corn. - C.) — U. Ahr (Heyd.)
 — Bertrich (Ev. vid. - Col. Neerl.) — Saarl. (Gabr.) — *N.* —
 17. **cerealis** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C. u
 G.) — Wassenach u. am Bausenberg, auf vulkan. Boden (Andr.)
 — Gerolstein (Geilenk. u. R.) — Trier (Mühlf.) — i. d. Eifel
 gewöhnlich (Leyd., Verh. Nat. Ver. 81) — Kreuzn. [le Roi] in
 Samml. R. — *H. W. N.* —
a. alternans Pz. — Gerolstein (Geilenk.) —
 18. **coerulans** Scrib. — Aach., Düssdf., Bopp. (F. - violacea
 Dft.) — Elbf. (C.) — Holzmaar [le Roi], U. Ahr, U. Nahe (R.) —
H. W. N. —
 19. **fastuosa** Scop. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.)
 — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
 20. **graminis** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (Corn. u. Geilenk. - C.)
 — Ruhrtal, Bopp. - Samml. Bruck — Kref., zahlreich (Ulbr.) -
 daher in Samml. R. — *H. W. N.* —
a. fulgida F. — Kref., Düssdf. (F.) — Samml. Bruck mit
 Rhen. u. Ruhr bezettelt. —
 21. **menthastri** Suffr. — Aach., Kref., Düssdf. (F. - menthae
 Schott.) — Linz, Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Winnigen (Bockl.)
 — Laach. See [le Roi], Ahrw. (R.) — *H. W.* —
 [a. **croatica** Weise — Bockl. für Kob.-Lützel [1 - im Juli
 auf Mentha] - Belegst. Weise vid. — Danach für Schilsky II.
 angegeben von R. - das Stück dürfte doch wohl aus einer
 Tauschsendung stammen. —]
 22. **varians** Schall. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob.
 (R.) — *H. W. N.* —

- a. *centaura* Hbst. — Elbf. (Geilenk. - *G.*) — Bonn, St. (R.) —
 a. *aethiops* F. — Elbf. (Geilenk. - *G.*) —
 23. *polita* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St.
 (R.) — *H. W. N.* —

[*Chrysochloa* Hope. = *Orina* Motsch.

cacaliae Schrk. — *F.* für Homberg [Pliester] - möglich nach
 Rheinhochwasser. — Vogesen, Alpen. —

- v. *senecionis* Schumm. — Kob.-Lützel, 1880, Winnigen,
 1884, je 1, beidemale nach Moselhochwasser (Bockl.). — Vogesen. —
frigida Weise — Ardenbach a. Rhein, vor langen Jahren
 (1 - Weise vid. - Geilenk.). — Alpen. —]

Phytodecta Kirb. = **Gonioctena** Redtb.¹⁾

1. *viminalis* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Alf (R.)
 — *H. W. N.* —

a. *Baaderi* Pz. — Kob. (1 - Bockl.) - Belegst. Weise vid. —
W. —

- a. *cinctus* Weise — Kob. (1 - Bockl.) - Belegst. Weise vid. —
 2. *rufipes* Deg. — Rhp. (*F.* - ruf. Pk.) — Elbf. (Corn. - *C.*)
 — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

[*flavicornis* Suffr. — Nicht Saarl., auf welchem Fundort die
 Angabe in Ins. D. VI. 1125, verb. 1124, für Rhp. jedenfalls
 beruht - die Stücke stammten aus Schlesien [Gabr. briefl.] —
 Fred. für H. Venn [*flavicollis* Suffr.!] - Fundort Heusy b. Ver-
 viers [Ann. Belg. 14 S. 59 - *flavicorn.*] - vielleicht im deutschen
 Teil des H. Venn noch aufzufinden. — *N.* —]

3. *Linnaeanus* Schrk. — Aach., Bonn, Bopp. (*B.* - *triandrae*
 Suffr.) — H. Venn (Fred. - *Cistela triandr.*) — Trier (Mühlf.) —
H. W. N. —

a. *decastigma* Dft. — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Elztal, Alf
 (R.) — *N.* —

a. *nigricollis* Westh. — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kochem
 (R.) — *W. N.* —

a. *satanas* Westh. — U. Ahr (Heyd.) — Elbf., Kreuzn. -
 Samml. Bruck — Kreuzn. (Reichensp.) — Trier (Mühlf.) — Ahrw.
 (R.) — *W. N.* —

[*fornicatus* Brügg. — *F.* für Düssdf. [*Hildebr.* - *sexpunctatus*
F.] - schon in *B.* III. 93 nicht für Rhp. - in Samml. Hildebr.
 fehlend (Miss. Steyl). — Nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten. —]

4. *olivaceus* Forst. — Rhp. (*F.* - *litura F.*) - trifft die Art —
 Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Prüm [le Roi], Bonn (R.)
 — *H. W. N.* —

1) *Gon. nivalis* ohne Autornamen, in *B. Ent. Kl.* für Bopp.,
 blieb ungedeutet. —

a. litura F. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. [Fischer], St. (R.) — W. —

[**a. rufitarsis** Marsh. - im Cat. Col. nicht angeführt — C. für Elbf. [Corn.] - Belegst. nicht in Samml. Corn. —]

5. **quinquepunctatus** F. — Aach. (*F.* - pallidus F.!) - hierhin nach B. III. 93 - daher in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — H. Venn (Fred.) — *H. W. N.* —

a. unicolor Weise — Eupen (Heym.) —

a. nigriventris Penecke — Eupen (Heym.) —

a. flavicollis Dft. — Bonn (R.) —

6. **pallidus** L. — Aach. - Samml. Bruck — H. Venn (Fred.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

Phyllosecta Kirb. = **Phratora** Redtb.

1. **vulgatissimus** L. — Elbf. (*C.*) — Kob., U. Nahe u. a. (R.) — *H. W. N.* — Überall nicht selten, in *F.* nur übersehen. —

a. obscurus Weise — Saarl. (Gabr.) —

2. **tibialis** Suffr. — Bopp. (*B.* - tib. Stm.) — Elbf. (*C.* - vienensis Schrk.) — Kob. (1 - Bockl.) — Trier (Mühlf.) — *W. N.* —

a. Corneli Weise — Elbf. (Corn. - C.) —

3. **vitellinae** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

4. **laticollis** Suffr. — Elbf. (Corn. - C.) — U. Ahr (von Fuß - Heyd.) — *H. W. N.* —

5. **atrovirens** Corn. — Elbf. (*C.* - daher beschrieben, Stett. E. Z. 57.) — 1 in Belg. [Ev. vid. - Col. Neerl.] —

Hydrothassa Thoms.

1. **aucta** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Schneifel [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **marginella** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **hannoverana** F. — Rhp. (*F.*) — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 59 S. 220) — Hild. H. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Schalkm. Maar [le Roi] in Samml. R. — *H. W. N.* —

a. calthae Weise — Immerather Maar [le Roi] in Samml. R. —

Prasocuris Latr.

1. **phellandrii** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — H. Venn [le Roi], Kochem, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **junci** Brahm — Rhp. (*F.* - beccabungae Hellw.) — Hild. H. (Corn. - C.) — Trier (Mühlf.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

Sclerophaedon Weise.

1. **carniolicus** Germ. — Bonn (Först. - *F.* - carn. Megl.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (1 - Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Harz u. im Osten u. Süden [Schilsky II.] —

— *orbicularis* Suffr. — *F.* für Aach., Bonn [Först. - pyritosus Rossi] - nach *B.* III. 94 hierhin — *B.* für Bopp. — Für *W.* angegeben. — Scheint nach den Fundgebieten in Schilsky II. dem Süden u. Osten anzugehören. —

Phaedon Latr.

1. *pyritosus* Rossi — Aach. (*F.* - *graminicola* Ill.) — Bopp. (*B.* - *pyr.* Ol.) — Kref. - Samml. Bruck — Winnigen (1 - Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrw., Kochem (R.) — *H. W. N.* —
2. *cochleariae* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrw. (R.) — *H. W. N.* —
3. *armoraciae* L. — Elbf. (3 - *C.* u. *G.*) — Ahrw., - Samml. Bruck — Schalkm. [le Roi], Kottenforst [Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Plagiodera Er.

1. *versicolor* Laich. — Rhp. (*F.* - *armoraciae* F.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Melasoma Steph. = **Lina** Redtb.

1. *aeneum* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kochem (R.) — *H. W. N.* —
- a. *haemorrhoidale* L. — Elbf. (*C.* - *violaceum* Ol.) —
2. *cupreum* F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
3. *vigintipunctatum* Scop. — Düssdf., Rheydt (*F.*) — Aach., Bopp. (*B.*) — Elbf. (Heym.) — Nev. (1 - de Rossi - *G.*) — Kottenforst, in Menge (Frings) — Sayntal (R.) — *H. N.* —
4. *collare* L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Kob., Stadtkyll (Bockl.) — Kref. (R.) — *H. W. N.* —
5. *populi* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
6. *tremulae* F. = *longicolle* Suffr. — Bopp. (*B.* Ent. Kl.) — Elbf. (*C.*) — Aach. - Samml. Fuß — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
7. *saliceti* Weise = *tremulae* Suffr. — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe (R.) — Hierhin wohl *F.* mit *trem.* *F.* für Rhp. — *H. W. N.* —

Galerucini.

Agelastica Redtb.

1. *alni* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Phyllobrotica Redtb.

1. *quadrinaculata* L. — Aach., Kref. (*F.*) — Hild. H. (*C.*) — Kleve u. Schalkm. Maar [le Roi], Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

Luperus Geoffr.

1. **circumfusus** Marsh. — Aach., Bonn, Bopp. (*F.*) — Elbf. (2 - *C.* u. *G.*) — Saarl. (Gabr.) — Oberstein (Heyd.) — Schneifel [Reichensp.], Brohltal, Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —
2. **pinicola** Dft. — Bonn, Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Bonn (R.) — *H. W. N.* —
— **xanthopus** Schrk. — *G.* für Barmen [3 - Samml. Stachelhausen] mit „Fundortangabe wohl irrtümlich“. — 1 in *N.*, sonst im Süden u. Osten. —
3. **longicornis** F. — Rhp. (*F.* - *rufipes* F.) — in B. = *longic.* F. — Duisb. (Urb.) — Trier (Mühlf.) — Schneifel [Reichensp.] in Samml. R. — Hierhin wohl de R. mit *rufipes* Scop. für Nev. — *H. W. N.* —
4. **niger** Goeze — Elbf. (*C.* - *niger* Geoffr.) — Nev. (de R.) — Hild. H. (Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) — Vallendar, St. (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —
5. **flavipes** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*G.*) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Wanzenboden i. Eifel [le Roi], St. (R.) — *H. W. N.* —

Lochmaea Weise.

1. **capreae** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr, häufig (Heyd.) — St. (R.) — *H. W. N.* —
2. **suturalis** Thoms. — Kleve - Samml. Fuß — Kempenich (1 - Andr.) — Blumslay (1 - Bockl.) — H. Venn (R.) — *H. N.* —
3. **crataegi** Forst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *sanguinea* F.) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (1 - Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Bopp. (Geilenk.) — Bonn, Sayntal, Bertrich [Frings] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Galerucella Crotch.

1. **viburni** Pk. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Neuenahr, häufig (Heyd.) — Gummersbach [le Roi], Remagen, Rhens (R.) — *H. W. N.* —
2. **nymphaeae** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *nymph.* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Kleve (Fuß) — *H. W. N.* —
a. aquatica Geoffr. — Düssdf. (*F.* - *sagittariae* Gyll.!) — die nicht wie früher = *grisescens* Joann. — Elbf. (*C.*) — Kleve - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — Kref. [Fischer] in Samml. R. — *W. N.* —
3. **lineola** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., Trier, St. (R.) — *H. W. N.* —
— **luteola** Müll. = *xanthomelaena* Schrk. — *F.* für Jülich [Först.] u. Düssdf. [Braselm.] — Aus Rhp. nicht in Samml. Bruck - möglich da *H. N.* —

4. **calmariensis** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **tenella** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — H. Venn [le Roi], Sayntal, St. (R.) — *H. W. N.* —

Galeruca Geoffr. = **Adimonia** Laich.

1. **tanaceti** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf., häufig (*G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Gerolstein, St. (R.) — *H. W. N.* —

— 2. **interrupta** Ol. — Düssdf. (Braselm. - *F.*) — Bopp., Kob., (*B. III. 131*) — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — Belg., *W. N.* —

3. **pomonae** Scop. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *rustica* Schall.) — Elbf. (*C.*) — Wesel (Gabr.) — M.-Gladbach, Bonn (R.) — *H. W. N.* —

[**rufa** Germ. — *F.* für Aach. [Först. - *rufa* Megl.] - von *B.* zwar aufgenommen, doch fehlt in Samml. Först. der regelmäßig eingeklebte Namenszettel. — Nicht *H. W. N.* - im Südosten. —]

— **melanocephala** Ponza — Beuel b. Bonn (1 - Bertkau, Verh. Nat. Ver. 89 S. 69) - Belegst. Heyd. vid. — Ob einheimisch? - Nach der Fundstelle, Fußpfad am Rheinufer, und der Zeit, 20. April, wohl durch Frühjahrshochwasser angeschwemmt. — Nicht *H. W. N.* - Frankreich u. im Süden u. Osten. [Ins. D. VI. 659] —

Sermyla Chap.

1. **halensis** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Podagrica Foudr.

1. **fuscipes** L. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. (Geilenk.) — Elbf. (1 - *C.*) — *H. W. N.* —

— **malvae** Ill. — *F.* für Düssdf. [Hildebr.] - in Samml. Hildebr. ohne Fundort (Miss. Steyl) - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - nicht *H. W.*, in *N.* sehr vereinzelt. —

2. **fusicornis** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Derocrepis Weise.

1. **rufipes** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Gerolstein, St. (R.) — *H. W. N.* —

Crepidodera Chev.

— **femorata** Gyll. — Col. Neerl. für Aach. - nicht *H. W. N.* - Mitteleuropa [Ins. D. VI. 695]. —

1. **nigritula** Gyll. — Elbf. (*G.*) - Reitt. sah das Stück, das jetzt verloren (Geilenk.) — *N.* —

— 2. **transversa** Marsh. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Nahe, St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. *ferruginea* Scop. — Rhp. (*F.* - *exoleta* *F.*) — Elbf. (*C.*) — Moseltal (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Ochrosis Foudr.

1. *ventralis* Ill. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. (Heym.) — Elbf. (*C.*) — Nettetal (J. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

Lythraria Bed.

1. *salicariae* Pk. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. - Samml. Ulbr. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Oberwerth, Güls (*R.*) — *H. W. N.* —

Epithrix Foudr.

1. *pubescens* Koch — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (*B.* III. 140.) — Laach. See (Fuß, Berl. E. Z. 61) — Kob. (Gabr.) — Siegmdg. [Reichensp.], Nettetal (*R.*) — *H. W. N.* —

2. *atropae* Foudr. — Bopp. (*B.* III. 334. 140) — Laach. See (Fuß, Berl. E. Z. 61) — Ahrtal - Samml. Bruck — *W. N.* —

a. *quadrimaculata* Weise — Trier (Mühlf.) in Samml. *R.* —

Chalcooides Foudr.¹⁾

1. *nitidula* L. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Soon (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

2. *aurea* Geoffr. — Elbf. in Samml. Corn als *metallica* Dft. - Weise vid. - metall. Dft. in *C.* u. auch bei de Rossi, Westf. Pr. 86 S. 50, von Nev. hierhin, nicht, wie nach Cat. Col. von 1833, zu lamina Bed. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Saarl. (Gabr.) — St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

a. *cyanea* Marsh. — Nev. (de R.) — Duisb. (Urb.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. *fulvicornis* F. — Aach., Kref. (*F.* - *Crepid. fulvic.*) — Elbf. (*C.* - *Crepid. helxines* L.) — Duisb. (Urb.) — Kref. [Ulbr.] in Samml. *R.* — *H. W. N.* —

4. *aurata* Marsh. — Elbf., Nev. (*G.*) — Kref. - Samml. Ulbr. — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Nettetal, Kob. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. *pulchella* Steph. — U. Ahr, selten (Heyd.) — Eltztal, Sayntal (*R.*) — *N.* —

5. *Plutus* Latr. = *chloris* Foudr. — Elbf. (*C.*) - Belegst. Weise vid. (*G.*) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Oberwerth, St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

1) *Crepid. helxines* Ol., in *F.* für Rhp., blieb ungedeutet - Mischart. —

a. Foudrasi Weise — U. Ahr (Heyd.) — Oberwerth (J. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

[**lamina** Bed. = *metallica* Weise — in Schilsky II. für Rhp. - beruht auf *metallica* Dft. in *C.* von Elbf. u. bei de R., Westf. Pr. 86 S. 50. von Nev. entsprechend der damaligen Deutung des Namens - fehlt sicher in Rhp. wie in *H. W. N.* —]

Hippuriphila Foudr.

1. **Modeeri** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Mantura Steph.

1. **obtusata** Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) - daher, aus Samml. Fuß, J. Dan. vid. — Belg., *H. N.* —

2. **ambigua** Kutsch. — Aach. (Weise, Ins. D. VI. 745) - beruhend auf Kutscheira und Allard [Weise briefl.], bei denen näheres über den Finder nicht angegeben [Heyd. briefl.] — Belg. [Col. Neerl.] —

3. **chrysanthemi** Koch — Aach., Kref. (*F.*) — Nev. (de Rossi - *G.*) — Duisdorf - 1 - Samml. Raderm. — *H. W. N.* —

4. **rustica** L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. suturalis Weise — Saarl. (Gabr.) — Laach. See (R.) — *N.* —

Chaetocnema Steph. = **Plectroscelis** Redtb.

[**chlorophana** Dft. — Schilsky I. u. II. für Rhp. - nach *dentipes* in *F.* [Schilsky briefl.], die aber = *concinna*. — Im Süden und Osten. —]

1. **semicoerulea** Koch — Düssdf., Elbf., Ahrtal - Samml. Bruck — U. Nahe (1 - J. Dan. vid. - R.) — hierhin wohl *F.* mit *saltitans* Kirb. für Kref. [vom Bruck] - cf. Ins. D. VI. 760 — *W. N.* —

2. **concinna** Marsh. — Rhp. (*F.* - *dentipes* Ent. H.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **confusa** Boh. — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß - Belegst. J. Dan. vid. — *N.* —

4. **Mannerheimi** Gyll. — Bopp. (*B.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **subcoerulea** Kutsch. — Fred. für H. Venn. — *H.* — In den angrenzenden Gebietsteilen wohl noch aufzufinden. —

5. **aridula** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Oberwerth (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

6. *Sahlbergi* Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) — Eupen (1 - Heym.) — Bopp. (*B.*) — *H. W. N.* —

7. *hortensis* Geoffr. = *aridella* Pk. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

Psylliodes Berthold.

1. *cucullata* Ill. — Laach. See - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — Schneifel [le Roi] in Samml. *R.* — *H. W. N.* —

2. *chrysocephala* L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. Goar, U. Nahe (J. Dan. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

v. *anglica* F. — Elbf. (Corn. - *C.* - var. mit gelben Flügeld.) - Belegst., von 1868, aus Samml. Corn. Reitt. vid. — Kref. - Samml. Bruck — *N.* —

3. *napi* F. — Aach., Kref. (*F.* - *napi* Ent. H. u, rapae Ill.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Wiedtal, Trier, St. (J. Dan. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

4. *thlaspis* Foudr. — U. Nahe (1 - J. Dan. vid. - *R.*) — *N.* —

5. *obscura* Dft. — Rhp., auf Cruciferen (Weise, Ins. D. VI. 811) — Col. Neerl. für Aach. — *N.* —

6. *cuprea* Koch — *F.* für Elbf. [Corn.] - nicht in *C.* — Oberwerth (Weise vid. - Mühlf.) — *H. W.* —

[*fusiformis* Ill. — Schilsky II. für Rhp. - Ins. D. VI. 813 nur „am Rhein“ - aus Rhp. nicht bekannt. — Nicht *H. W. N.* —]

7. *instabilis* Foudr. — Brodenbachtal (1 - J. Dan. vid. - *R.*) — *N.* —

8. *affinis* Pk. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (J. Dan. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

9. *dulcamarae* Koch — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., Kochem (J. Dan. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

10. *hyoscyami* L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — U. Nahe (1 - J. Dan. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

a. *cupronitens* Först. — Aach. (daher nach 2 von Heinem. gefundenen Stücken beschrieben - *F.*) — Mitteldeutschl. [Schilsky II.] —

v. *chalconera* Ill. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Laach. See - Samml. Fuß — U. Nahe (J. Dan. vid. - *R.*) — *H. N.* —

11. *luteola* Müll. — Elbf. (Corn. *C.*) — Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Kref. - Samml. Bruck - propinqua Redtb. — Nev. (de Rossi) in Samml. *R.* - Weise vid. — *H. N.* —

12. *picina* Marsh. — Aach. (*F.* - *picca* Redtb. u. *rufilabris* Ent. H.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Wiedtal, Oberwerth, Nettetel, U. Nahe (J. Dan. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

a. *melanophthalma* Dft. — Kref. (Mink - *B.* III. 158. 353) — Saarl. (Gabr.) — *W.* —

Haltica Geoffr.

1. **quercetorum** Foudr. — Aach. (*F.* - *erucæ F.*) - *erucæ* Ol. *B.* III. 137. 332 — Kref. - Samml. Ulbr. — Nev. (1 - *de R.*) — Kleve - Samml. Fuß — Trier, häufig (Mühlf.) — *H. W. N.* —
2. **lythri** Aub. — Elbf. (2 - *C.*) — Nev. (*de R.*, Westf. Pr. 98) — Kob. (Bockl.) — U. Nahe, Kreuzn. (*J. Dan. vid.* - ♂♂ - *R.*) — *H. W. N.* —
3. **tamaricis** Schrk. — U. Nahe, St. (*J. Dan. vid.* - ♂♂ - *R.*) — Sonst im Süden u. Osten [Ins. D. VI. 840] —
4. **oleracea** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —
 - a. **nobilis** Weise — Saarl. (Gabr.) —
 - a. **lugubris** Weise — Saarl. (Gabr.) — *N.* —
5. **pusilla** Dft. — Kob., St. (*J. Dan. vid.* - *R.*) — *H. N.* —

Hermaeophaga Foudr.

1. **mercurialis** F. — Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Sayntal, St. (*R.*) — *W. N.* —

Batophila Foudr.

1. **rubi** Pk. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (*de R.*) — Bonn, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —
2. **aerata** Marsh. — Aach. - Samml. Bruck — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. *J. Dan. vid.* — Frankreich u. im Süden [Ins. D. VI. 855] —

Phyllotreta Foudr.¹⁾

1. **armoraciae** Koch = *nemorum F.* — Aach., Bonn, Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn (*R.*) — *W. N.* —
2. **exclamationis** Thunb. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *brasicae F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —
 - a. **vibex** Weise — Kob., U. Nahe (*R.*) —
3. **ochripes** Curt. — Aach. (*F.* - *excisa Redtb.*) — Bopp. (*B.* III. 142) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —
4. **tetrastigma** Com. — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Bonn, Vallendar, St. (*R.*) — *H. W. N.* —
5. **flexuosa** Jll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *flex. Ent. H.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*Corn.* - *C.*) — Nev. (*de R.*) — *H. W. N.* —
6. **sinuata** Steph. — Aach. (*F.* - *sin. Dej.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — St. (*R.*) — *H. W. N.* —
7. **undulata** Kutsch. — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — St. (*R.*) — *H. W. N.* —

1) Phyll. quadriguttata Steph., in *F.* für Kref. [Mink], blieb ungedeutet - vielleicht = *exclamationis.* —

8. *vittula* Redtb. — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

9. *nemorum* L. — Rhp. (F. - nem. F.!) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

10. *atra* F. — Elbf. (C. - aterrime Schrk.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Kob. (Gabr.) — Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* — Hierhin wohl *F.* mit *atra* Ent. H. für Rhp. —

11. *cruciferae* Goeze — Elbf. (C. u. G.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

12. *consobrina* Curt. — Rhp., vereinzelt (Weise, Ins. D. VI. 882) — *N.* —

13. *nodicornis* Marsh. — Aach., Rheinufer b. Kref., Bopp. (F. - antennata Ent. H.) - Aach. in Samml. Bruck — Elbf., Hild. H. (Reitt. vid. - G.) — *H. W. N.* —

14. *procera* Redtb. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) - Belegst. J. Dan. vid. — *N.* —

15. *nigripes* F. — Rhp. (F. - lepidii Ent. H.) — Elbf. (C.) — Kob. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Aphthona Chevr.

1. *cyparissiae* Koch — Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

2. *laevigata* F. — Walporzheim, aus Genist der Ahr (2 - J. Dan. vid. - R.) — Nicht *H. W. N.* - Grünstadt [von Scriba - Samml. Bruck], sonst im Süden. —

3. *lutescens* Gyll. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Elbf. [Corn.] - daher nicht in Samml. Bruck - nicht im Verz. C. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

4. *venustula* Kutsch. — Laach. See, Kob., St. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

5. *pygmaea* Kutsch. — Saarl. (Gabr.) — Winnigen (1 - J. Dan. vid. - R.) — Über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

6. *cyarella* Redtb. — Aach. (F.) — Elbf. (G. - atrocoerulea Steph.) - Belegst. Weise vid. — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Duisb. (Urb.) — *H. W. N.* —

7. *coerulea* Geoffr. — Aach., Kref., Bopp. (F. - coer. Pk.) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Trier (Mühlf.) — Wiedtal, Nettet. (R.) — *H. W. N.* —

8. *euphorbiae* Schrk. — Rhp. (F. - euph. F.) — Elbf. (C. - auch hilaris Steph.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Kref. - Samml. Bruck — *H. N.* —

9. *atrovirens* Först. — Vaals b. Aach. (daher beschrieben - F.) — Bopp. (B.) — Mittel- u. Süddeutschl. u. a. [Schilsky II.] —

10. *herbigrada* Curt. — Homberg (B.) — St. (J. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

Longitarsus Latr. 1).

1. **echii** Koch — Aach. (Först. - *F.*) — Ahrw. - Samml. Fuß
— St. (J. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

[**fuscoaeneus** Redtb. — Col. Neerl. für Düssdf. - in Samml.
Hagens nicht daher (Dom. Hag.) — Belg., *H.* —]

2. **anchusae** Pk. — Aach. (*F.*) — Elbf. (1 - Reitt. vid. - *G.*) —
Bonn, Tönnisstein, Sayntal, Kob. (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **absinthii** Kutsch. — *B.* III. 336. 149 für Bopp. - doch lag
nach *N.* 312 die Fundstelle rechtsrheinisch, in Nassau — Düssdf.
- 1 - Samml. Bruck - Belegst. Hubenth. vid. — *N.* —

4. **obliteratus** Rosh. — Vaals b. Aach. (daher beschrieben -
F. - *consociatus* Först.) — Bopp. (*B.*) — *H. W. N.* —

5. **niger** Koch — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — Düssdf. - Samml.
Bruck — Sayntal (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —

6. **parvulus** Pk. — Aach., Kref. (*F.* - parv. Pz.) - in *B. parv.*
Pk. - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.* - ater *F.*!) - Elbf. (Reitt.
vid. - Geilenk.) — *H. W. N.* —

7. **nigerrimus** Gyll. — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß - Belegst.
Weise vid. — Frankreich, Norddeutschl. [Ins. D. VI. 944] —

8. **holsaticus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml.
Bruck — Oberwerth (1 - Mühlf.) — Schmittenhöhe (1 - R.) —
H. W. N. —

— **quadriguttatus** Pontopp. — *B.* - quadripustulatus *F.* - für
Kreuzn. - nicht in der Samml. vom Bruck, von dem manche
der Angaben für Kreuzn. in *B.* stammen. — Nicht *H. W. N.* —

9. **apicalis** Beck — Aach. (*F.* - analis Creutz.) - daher in
Samml. Bruck — Arenberg, Remstecken b. Kob. (J. Dan. vid. -
R.) — *N.* —

10. **brunneus** Dft. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml.
Bruck — Trier (Mühlf.) — *H. N.* —

11. **luridus** Scop. — Aach., Kref. (*F.* - lur. Gyll.) — Elbf. (*C.*)
— Stammform: Saarl. (Gabr.) — Nettetal, Kob., St. (J. Dan. vid.
R.) — *H. W. N.* —

a. **nigricans** Weise — Saarl. (Gabr.) — Nettetal (R.) —

v. **cognatus** Weise — Saarl. (Gabr.) — Kref. [Ulbr.] u. Ober-
werth (J. Dan. vid. - R.) — *N.* —

12. **minusculus** Foudr. — Kreuzn. (Weise, Ins. D. VI. 961) -
Finder Paul Weise [Weise briefl.] — Frankreich, Mitteldeutschl.
u. a. [Ins. D. I. c.] —

13. **dorsalis** *F.* — Aach., Bonn (Först. - *F.*) — Kreuzn. (Heyd.)
— *H. N.* —

— 1) *L. oblongiusculus* Dft., in *F.* für Aach. [Först.], blieb
ungedeutet. —

14. **nasturtii** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
15. **suturalis** Marsh. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Sayntal, Vallendar (*J. Dan. vid. - R.*) — *H. N.* —
16. **atricillus** L. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —
17. **suturellus** Dft. — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Kob., Horchheim (*J. Dan. vid. - R.*) — *W. N.* —
18. **piciceps** Steph. — Elbf. (1 - Corn. - *C.* - *picipes* Steph.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — *H. W. N.* —
— **gracilis** Kutsch. — Kreuzn., im Anspülicht der Nahe (Weise, *Ins. D. VI.* 974) - Finder Paul Weise [Weise briefl.] - nach der Fundart nicht sicher einheimisch. — Frankreich u. a. [*Ins. D. I. c.*] —
19. **curtus** All. — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. der Samml. Corn. verloren - doch *H. N.* —
[**liliputanus** All. — Schilsky I. u. II. für Rhp. - daher nicht bekannt, nur Rheinpfalz nach Eppelsh., *D. E. Z.* 75 S. 412. — In *Ins. D. VI.* nicht als deutsche Art. —]
20. **melanocephalus** Deg. — Aach., Kref., Bopp. (*F.* - mel. Gyll.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (*J. Dan. vid. - R.*) — *H. W. N.* —
- [**longipennis** Kutsch. — *C.* für Elbf. [sehr häufig - Corn.] - unter den 5 Belegst. der Samml. Corn. kein longip. - Weise vid. — de R., *Verh. Nat. Ver.* 82, für Nev. — Osteuropäer. —]
21. **nigrofasciatus** Goeze — Elbf. (*C.* u. *G.* - je 1 - *lateralis* Ill.) - Belegst. verloren - das von Geilenk. jedenfalls von Reitt. bestimmt. — *N.* —
22. **verbasci** Pz. - [für *tabidus* F. des *Cat. Col.* wieder herzustellen - Weise briefl.] — Aach., Kref., Bopp. (*F.* - verb. Pz.) — Elbf. (*C.* - tab. *F.*) — Trier (Mühlf.) — U. Nahe, St. (Weise vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
a. **sisymbrii** F. — Elbf. (*C.* u. - Reitt. vid. - *G.*) — *N.* —
23. **lycopi** Foudr. — Elbf. (1 - Drescher u. Ostheide - Reitt. vid. - *G.*) — *H.*
24. **membranaceus** Foudr. — Kreuznach, Oberstein (von Allard bestimmt - Heyd.) — *N.* —
25. **pratensis** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - auch *pusillus* Gyll.) — Elbf. (*C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (*J. Dan. vid. - R.*) — *H. W. N.* —
a. **collaris** Steph. — Elbf. - Samml. Corn. - Hubenth. vid. — *N.* —

26. *exoletus* L. — Aach., Bopp. (daher beschrieben - B. III. 152 - boppardiensis) - Kref., Bopp. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

27. *rubiginosus* Foudr. — Elbf. (C. - flavicornis Steph.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Duisb. (Urb.) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

28. *pellucidus* Foudr. — Elbf. (C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Weise vid. — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

29. *tabidus* Pz. = *jacobaeae* Waterh. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - C.) — Trier (Mühlf.) — Nev. (de Rossi) in Samml. R. - Belegst. Weise vid. — *H. W. N.* —

30. *ochroleucus* Marsh. — Aach., Kref. (F.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — U. Ahr (Heyd.) - nicht Unteres Saartal, wie Ins. D. VI. 1013 für diesen Fund angeben. — *H. N.* —

Dibolia Latr.

1. *femorialis* Redtb.

a. *aurichalcea* Först. — Aach. (daher beschrieben - F.) — Bopp. (B.) - daher in Samml. Bruck. — Mittel- u. Süddeutschl. [Ins. D. VI. 1033] —

2. *timida* Ill. — Bopp. (daher beschrieben - B. - *eryngii* Bach) — *N.* —

3. *Försteri* Bach — Aach., Bopp. (daher beschrieben - B.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 - buglossi Kze. - u. 67) — Belg., *N.* —

4. *rugulosa* Redtb. — Aus Rhp. - 2 - Samml. Bruck - Hubenth. vid. — *N.* —

5. *cynoglossi* Koch — Aach., Kref. (F.) - nur Aach. in Samml. Bruck — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Weise vid. — Oberstein (Heyd.) — *H. N.* —

6. *occultans* Koch — Aach. (Först. - F.) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - C.) — *H. W. N.* —

7. *cryptocephala* Koch — Oberstein (Heyd.) — Col. Neerl für Kref. - die crypt. in Samml. Bruck mit „Rheinprov.“, nicht „Kref.“, bezettelt sind *rugulosa* - Hubenth. vid. — *W. N.* —

Apteropeda Chev.

1. *globosa* Ill. — Elbf. (C. u. G.) — Bonn, Wiedtal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

2. *orbiculata* Marsh. — Aach., Kref. (F. - *ciliata* Ol.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

3. *splendida* All. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. J. Dan. vid. — *N.* —

Mniophila Steph.

1. *muscorum* Koch — Bopp. (B.) — Elbf. (v. Hagens - C.) — Kref. - Samml. Bruck — *H. W. N.* —

Argopus Fisch.

1. **Ahrensi** Germ. — Aach. (Förs. - *F.*) — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — *N.* —

Sphaeroderma Steph.

1. **testaceum** F. = *cardui* Gyll. — Rhp. (*F.* - test. *F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, U. Nahe, St. (*R.*) — *H. W. N.* —
 2. **rubidum** Graëlls = *testaceum* Gyll. — Düssdf. (Hildebr. - *F.* - *cardui* Kirb.!) — Elbf. (Corn. - *C.* - *cardui* Gyll.!) — Wiedtal (1 - *R.*) — *H. W. N.* —

Cryptostomata.

Hispini.

Hispella Chap.

1. **atra** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

Cassidini.

Hypocassida Weise.

1. **subferruginea** Schrk. — Aach., Bopp. (*F.* - *ferruginea* F.) — U. Solg. (*G.*) — Kob. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

Cassida L.

1. **fastuosa** Schall. — Bopp. (*B.* - *vittata* F.) — *N.* —
 2. **canaliculata** Laich. — Bopp. u. rheinaufwärts bis Würtemberg (*B.* - *austriaca* F.) - Bopp. in Samml. Bruck — Winnigen (Bockl.) — Kob. (von Oberst A. Schultze - Dorm.) — St. (4 *R.*) — *N.* —
 3. **viridis** L. — Rhp. (*F.* - *equestris* F.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —
 4. **hemisphaerica** Hbst. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —
 5. **azurea** F. = *lucida* Suffr. — Bopp. (*B.*) — U. Ahr (Heyd.) - Ahrthal (Beckers, D. E. Z. 92) — Kob. (Bockl. u. Mühlf.) — Bonn, St. (*R.*) — *N.* —
 6. **margaritacea** Schall. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe, Kreuzn. (*R.*) — *H. W. N.* —
 7. **Murraea** L. — Rhp. (*F.*) — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 59 S. 230) — Elbf. (2 - Corn. - *C.*) — Borbeck (*G.*) — Kref. Samml. Bruck — Stommeln (Raderm.) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —
 8. **seladonia** Gyll. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. als *rufovirens* Suffr. - Belegst. Weise vid. — *H. N.* —
 9. **denticollis** Suffr. — Elbf., Nev. (Corn. - *C.*) — Ahrw. (Fuß,

Berl. E. Z. 67) — Saarl. (Gabr.) — St. (Weise vid. - R.) — *H. W. N.* —

10. **rufovirens** Suffr. — Bopp. (*B.*) — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] — nach dem Belegst. *seladonia*, die in *C.* nicht angeführt - Weise vid. — *H. W. N.* —

11. **stigmatica** Suffr. — Düssdf. (*B.*) — H. Venn (Fred.) - Fundort Hockay [Ann. Belg. 37. S. 90] — *H. W. N.* —

12. **sanguinolenta** Müll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

13. **prasina** Ill. = *chloris* Suffr. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

14. **sanguinosa** Suffr. — Aach. (Först. - *F.*) — Bopp. (*B.* - sang. Creutz.) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — hierhin *languida* Corn. von Elbf., Barmen, Wetter a. d. Ruhr [*C. u. B.*] nach der Beschreibung [Weise, Ins. D. VI. 1103] u. den noch vorhandenen Belegst. der Samml. Corn., deren 1 mit „1850 gezogen“ bezettelt ist - Weise vid. — *H. W. N.* —

15. **rubiginosa** Müll. — Rhp. (*F.* - rub. Ill.) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

16. **Panzeri** Weise = *thoracica* Pz. — Bonn, St. (Weise vid. - *R.*) — Sonst in Österreich [Schilsky II.] — Ob *thoracica* F., in *F.* für das Siebengbg. [Först.], hierhin oder zu *ferruginea* Goeze, die aber in *B.* III. 74 Nr. 13 nicht aus Rhp. angegeben, zu stellen, bleibt fraglich. —

17. **vibex** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.* - *liriophora* Kirb.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

a. discoidea Weise — St. (*R.*) —

18. **nebulosa** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Andernach, U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

19. **flaveola** Thunb. — Rhp. (*F.* - *obsoleta* Ill.) — Aach. (Kaltenb., Verb. Nat. Ver. 59 S. 254) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Nettetal, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

[**berolinensis** Suffr. — Schilsky II. für Rhp. - beruht auf *obsoleta* Hbst. statt obs. Ill. = *flaveola* - auch dem Nordosten angehörig. —]

20. **nobilis** L. — Rhp. (*F.*) — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *viridula* Pk.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

21. **vittata** Villers = *oblonga* Ill. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

Bruchidae.

Spermophagus Stev.

1. **cisti** F. = *cardui* Boh. — Aach., Kref. (*F.* - *cardui* Stev.)
— Bopp. (*B.*) — Elbf. (*G.*) — Bonn, U. Nahe, St. (*R.*) — *H.*
W. N. —

Bruchus L.

1. **loti** Pk. — Elbf. (1 - *Corn.* - *C.*) - Belegst. verloren. —
W. N. —
— **pallidicornis** Boh. — Elbf., in Linsen (*C.*) - anscheinend
als eingeführt betrachtet. — *N.* —
2. **atomarius** L. — Rhp. (*F.* - *granarius* L.) — Bopp. (*B.* II.
162 - *seminarius* L.!) — Elbf. (*C.* - *sem. L.* - u. *G.*) — Kref. -
Samml. Bruck als *sem. L.* - Belegst. Schilsky vid. — Saarl.
(Gabr.) — *H. W. N.* —
3. **rufimanus** Boh. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp.
(*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn (*R.*) —
Belegst. aus Samml. *Corn.*, Bruck, R. Schilsky vid. — *H. W.*
N. —
4. **affinis** Fröl. — Elbf. (1 - *Corn. C.*) - Belegst. verloren —
Kob. (1 - Schilsky vid. - *R.*) — *N.* —
5. **pisorum** L. — Rhp. (*F.* - *psi* L.) — Bopp. (*B.*) — Elbf.
(*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn (*R.*) — *H. W. N.* —
v. **sparsus** F. — Bonn (1 - Schilsky vid. - *R.*) —
— **ervi** Fröl. = *sertatus* Ill. } Kleve, in Linsen (Fuß) - Belegst.
— **lentis** Fröl. } Schilsky vid. - beide Arten nicht
H. W. N., wohl eingeschleppt. —
6. **luteicornis** Ill. — Elbf., Nev., Hild. H. (*G.*) — Kref. -
Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — Kob. (1 - *R.*) — Belegst. aus
Samml. Geilenk., Bruck, R. Schilsky vid. — Ganz Deutschl.
[Schilsky II.] — Hierhin, nicht wie früher zu *nubilus* Boh., *rufipes*
Hbst. von Elbf. [*C.* u. *G.*] u. Kreuzn. [Samml. Bruck] - Belegst.
aus Samml. *Corn.*, Geilenk., Bruck, Schilsky vid. - jedenfalls
auch [entsprechend *B.* III. 162] *nub. Dej.* in *F.* für Aach.
[Först.] — Damit *nub. Boh.*, nach Schilsky II. in Deutschland
weit verbreitet, für Rhp. vorläufig wegfallend. —

Bruchidius Schilsky.

1. **marginalis** F. — Laach. See, Kob., Bopp. (*B.* II. 164. 454)
— *N.* —
2. **unicolor** Ol. — Kob. (*B.* - *olivaceus* Germ.) — Kreuzn. -
Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — *W. N.* —

— **bimaculatus** Ol. — *C.* für Elbf. [nicht häufig - Corn.] - Belegst. verloren, jetzt ganz andere Art - Schilsky vid. — Nicht *H. W. N.* - doch Mittel- u. Südeuropa [Cat. Col.] —

— **imbricornis** Pz. — *B.* II. 163 für Düssdf. — Nicht *H. W. N.* - Mittel- u. Südeuropa [Cat. Col.] —

3. **dispar** Gyll. — Kreuzn. (Riehl - Bach vid. ♂♀ - *B.* II. 163) — Fuß, Berl. E. Z. 62, für Laach. See - in Samml. Fuß nur 1 aus Toskana. — Nicht *H. W. N.* - Mittel- u. Südeuropa [Cat. Col.] —

4. **varius** Ol. — Kreuzn. (vom Bruck - *B.* - tarsalis Schönh.) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Mittel- u. Südeuropa [Cat. Col.] —

[**pauper** Boh. — Zebe für Elbf. - nicht in *C.*, noch *H. W. N.* — in Schilsky II. nur Tirol. —]

[**perparvulus** Boh. — Schilsky I. u. II. für Rhp. - Quelle nicht mehr feststellbar, sicher unrichtig. —]

5. **cisti** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *cisti* F.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Bopp. (*B.* II. 164 - villosus F. - u. *F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

[**Acanthoscelides** Schilsky.

obtectus Say — Elbf. - 1 - Samml. Geilenk. - Belegst. Schilsky vid. — Durch den Handel eingeschleppt, über ganz Deutschland [Schilsky II.] —]

Anthribidae.

Urodoninae.

Urodon Schönh.

1. **suturalis** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Kob. (Bockl.) — U. Nahe (R.) — *N.* —

2. **conformis** Suff. — Aach., Kob., Bopp. (*B.* - conf. Chevr.) — U. Solg. (*G.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — *W. N.* —

— **pygmaeus** Gyll. — *B.* II. 166: „mit rufipes gesellschaftlich“, u. dieser nicht selten - schwerlich eigene Beobachtung, da rufipes vielfach, pygm. weiter nicht aus Rhp. angegeben. — In Samml. Bruck 2 pygm. [K. Dan. vid.] mit „Bor. Rh.“, = Rheinpreußen, bezettelt, doch beim Artnamen, nicht am Stück - daher, zumal nicht *H. W. N.* u. in Schilsky II. nur Thüringen u. im Süden u. Osten, bis zur sicheren Auffindung als fraglich zu führen. —

3. **rufipes** Ol. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - ruf. F.) — U. Solg.

(G.) — Ahrtal (Beckers, D. E. Z. 92) — Kob. (Bockl.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Anthribinae.

Tropiderini.

Platyrhinus Clairv.

1. **resinosus** Scop. — Rhp. (*F. - latirostris* F.) — Elbf. (C.) — Düssdf. - Samml. Fuß — Soon (v. Geyr) — Elztal (1 - R.) — *H. W. N.* —

Tropideres Schönh. [Anordnung nach Schilsky II.]

1. **sepicola** F. — Bopp. (B.) — Kleve (Fuß) — Jülich (Eichh. Berl. E. Z. 66) — Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

2. **marcius** Hbst. — *B.* für Elbf. [*cinctus* Pk.] - nicht im Verz. C. — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

3. **niveirostris** F. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (C.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Bonn, Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **albirostris** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Düssdf. - Samml. Fuß — Kob. (1 - R.) — *H. W. N.* —

Anthribini.

Platystomus Schneid.

1. **albinus** L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (C. u. G.) — Ahrw. (Fuß) — Bonn [Frings], St. (R.) — *H. W. N.* —

Anthribus Geoffr. = **Brachytarsus** Schönh.

1. **fasciatus** Forst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F. - scabrosus* F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kochem (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **nebulosus** Forst. = *variegatus* Fourc. — Düssdf. (*F. - varius* F.) — Elbf. (C.) — Horchheim (Mühlf.) — Bonn, Soon, Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

[**tessellatus** Boh. — Col. Neerl. für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck - nicht *H. W. N.* —]

Choragini.

[**Araeocerus** Schönh.

fasciculatus Deg. — Elbf., aus einem Spezereiladen (G.) — Durch den Handel eingeschleppt - in Deutschl. weit verbr. [Schilsky II.] —]

Choragus Kirb.

1. **Sheppardi** Kirb. — Düssdf. (Crumbach u. v. Hagens - B. II. 170) - daher in Samml. Bruck — Elbf. (1 - Corn. - C.) — St., an altem Efeu der Fustenburg zahlreich (R.) — *H. W. N.* —

Curculionidae.

Otiorrhynchinae.

Otiorrhynchus Germ.¹⁾.

1. **armadillo** Rossi, Apfb. = rhaeticus Stierl. — Bopp., Kob. (*B.* II. 273) - Kob.-Laubbach (A. Schultze - Samml. Heyd.) — Siebengbg. (Fuß - Beitr I. - scabripennis) — Wolkenburg, Hammerstein - Samml. Bertkau - Belegst. K. Dan. vid. — Linz (1 - K. Dan. vid. - R.) - in Beitr. I. als multipunctatus F. angeführt. — Rochusberg b. Bingen [*N.* 323] - auch in Süddeutschland. [Schilsky II.] - sonst in den Alpen. —

2. **clavipes** BOND. — Aach. (Först. - *F.* - tenebricosus Hbst.) - daher 1 in Samml. Först. von 1837 — Eifel (Gabr.) — U. Nahe (R.) — K. Dan. vid. omn. — Bopp. - Samml. Bruck — *H.*, u. a. bei Maastricht, *W.* —

3. **niger** F. — *B.* in Ent. Kl. für Bopp., in der Fauna nicht für Rhp. — Kob. im Stadtwald, Winningen auf der Höhe, Lutzerath (Bockl.) - Stammform, Reitt. vid. — *W. N.* —

[**fuscipes** Ol. — *R.* Beitr. II. für U. Nahe - trifft clavipes - K. Dan. vid. —]

[**laevigatus** F. — Schilsky I. für Rhp. - unrichtig [Schilsky briefl.] —]

4. **morio** F. — Kref., Düssdf. (*F.* - unicolor Hbst.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — H. Venn (Fred.) — Herrstein (Heyd.) — *W. N.* —

5. **raucus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Landskron i. Ahrtal (Heyd.) — Kob. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

[**conspersus** Germ. — *B.* Ent. Kl. für Bopp. [conspersus] - in der Fauna II. 473 nicht für Rhp. —]

6. **rugosostriatus** Goeze — *F.* für Kref. [vom Bruck - scabrosus Marsh.] - in Samml. Bruck nur Ostende. — Landskron i. Ahrtal (Heyd.) — Burgbrohl (1 - Andr.) - K. Dan. vid. — *H.* —

— **ligneus** Ol. — Zebe für Rhp. — In *H.*, u. a. Maastricht, Roermond - daher im angrenzenden Gebiet wohl noch aufzufinden. —

7. **scaber** L. — *F.* für Bopp. [Bach - septentrionis Hbst.] - in *B.* II. 276 nicht für Rhp. — Bonn (1 - K. Dan. vid. - R.) — Col. Neerl. für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck. — *W. N.* —

— **uncinatus** Germ. — *G.* für Elbf. [1 - Drescher und Ostheide] mit ? - nach Mittelg. Geilenk., weil die Auffälligkeit des Fundes

1) *Ot. pauper*, in *B.* Ent. Kl. für Bopp., in der Fauna fehlend, blieb ungedeutet - wenn = paup. Boh., auch nicht in Rhp., alpin. —

richtige Bestimmung bezweifeln ließ. — Moselweiß, aus Genist nach Moselhochwasser (2 - K. Dan. vid. - R.) - ob einheimisch? — Nicht *H. W. N.* — Süddeutschl. [Schilsky II.] —

8. **porcatus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Landskron (Heyd.) — Bonn, Ahrthal, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

9. **singularis** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *picipes F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R.) — mögen wohl die a. *Chevolati* mittreffen. — Landskron, Linz, Bernkastel, an Rebenwurzeln (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Brodenbachthal (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. **Chevolati** Gyll. — Olbrück, Laach. See, Kob., Alf., Bopp., St. (K. Dan. vid. - R.) — *N.* —

10. **Marquardtii** Fald. — Kob. - Samml. Schultze (K. Dan.) — Kochem, Alf, Trier (K. Dan. vid. - R.) — Bayern u. a. [Schilsky II.] —

[**impressiventris** Fairm. — Schilsky, D. E. Z. 90 S. 192, für Kob.-Laubbach [A. Schultze] - Belegst. der Samml. Schultze sind *Marquardtii* [K. Dan. briefl.] —]

11. **gemmatus** Scop. — Hild. H. (4 - Geilenk. - *C. u. G.*) — Belegst. noch in Samml. Geilenk. — Sonst Bayern u. Alpen [Schilsky II.] —

12. **sulcatus** F. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. in Samml. Bruck — U. Ahr, Linz, Mosel, Saar (Rebenwurzelzerstörer - Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — Aus der Trierer Gegend 1901 als Weinbergsschädling erhalten - daraus einige Stück einer Phasia-artigen Fliege, die in Samml. V. v. Röder übergegangen, von ihm als neu erkannt, als *Phanistoma Otiorrhynchi* n. g. n. sp. beschrieben werden sollte, wobei es verblieben zu sein scheint (R.). — *H. W. N.* —

[**tristis** Scop. — Ev., D. E. Z. 92, u. Col. Neerl. für Kref. [*nigrita F.*] — als *nigr.* auch bezettelt 2 *sulcatus*, die einzigen von Kref., in Samml. Bruck - K. Dan. vid. —]

13. **ligustici** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **Brucki** Bach — Kref. (daher nach einem Funde von vom Bruck beschrieben - *B. II.* 236 - *Liophloeus* . . .) —

14. **ovatus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Caenopsis Bach.

1. **fissirostris** Walt. — Von Aach. [Först.] und Kref. [vom Bruck] beschrieben als *Bachi* Först. i. litt. in *B. II.* 269 — Elbf. (Corn. u. v. Hagens - *C.*) — H. Venn (Fred.) — *H. W.* —

2. **Waltoni** Boh. — Kleve - Samml. Fuß — Kref. - Samml. Bruck — *H.* —

Peritelus Germ.

1. **hirticornis** Hbst. — Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. - Samml. Fuß — Bonn, Laach. See, St.-Goar (je 1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **sphaeroides** Germ. = *griseus* Ol. — Aach., Kref., Düssdf., Bonn (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Rheinfer unterhalb Beuel, Oberwerth, U. Nahe (*R.*) — Kein Weinbergsschädling, wie *B. II.* 268 angibt, oft auf Weiden [*R. Beitr. II.*] — *H. W. N.* —

Mylacus Schönh.

1. **rotundatus** F. — Aach., Düssdf. (*F.* - *Omius*) — Kref. - Samml. Ulbr. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* - *Platytarsus*) — Ahrw. - Samml. Fuß — Bonn, U. Nahe (*R.*) — *W. N.* —

Phyllobius Schönh. [Anordnung nach Schilsky II.]

1. **sinuatus** F. — Aach. (*F.*) — U. Solg., Hild. H. (*G.*) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

2. **oblongus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

a. **floricola** Gyll, — Stommeln - 1 - Samml. Raderm. — *W. N.* —

3. **viridicollis** F. — Elbf. (1 - Geilenk. - *G.*) — *W.* —

4. **sulcirostris** Boh. — Siebengbg. - mehrfach - Samml. Bruck — Duisb. [1 - Urb.] in Samml. R. — K. Dan. vid. omn. — Bisher nur im Osten u. Süden [Schilsky, Küst. Käf. Eur. 08] —

5. **viridiaeris** Laich. = *pomonae* Ol. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kob. (Preiß) — Kref. [Ulbr.], Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

6. **parvulus** Ol. = *uniformis* Steph. — Rhp. (*F.* - *uniform.* Marsh! - u. *B. II.* 260, 19) — Elbf. (sehr häufig - *C. viridiaeris* Laich.!) — Nev. (gemein - de R., Westf. Pr. 98) — Saarl. (Gabr.) — Olbrück, St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

[**pallidus** F. = *incanus* Gyll. — *C.* für Elbf. [nicht selten - Corn.] - das einzige Stück der Samml. Corn. gehört zu einer andern Art. — Nicht *H. W. N.* - im Osten [Cat. Col.] —]

7. **maculicornis** Germ. — Elbf. (*C.*) — Barmen - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Kob. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

8. **betulae** F. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr. - *trivialis* Boh.) — St. (*R.*) — *H. W. N.* —

9. **argentatus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Löhndorf (Raderm.) — Saarl. (Gabr.) — Vallendar, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

a. **viridans** Boh. — Saarl. (Gabr.) —

10. **piri** L. — Rhp. (*F. vespertinus* F.) — Aach., Kref., Bopp. (*F. - piri* L. u. *mutus* Schönh.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

11. **calcaratus** F. — Die Art: Aach., Kref. (*F. - auch carniolicus* Ol.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

a. piri F. — Kob. (1 - R.) —

a. densatus Schils. — M.-Gladbach, Bonn, St. (R.) —

12. **urticae** Deg. — Aach. (*B. - pomaceus* Schönh.) — Elbf. (*G.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) — Rheydt (Geilenk.) — Ahrw. - Samml. Fuß — Sayntal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

v. Fussi Schilsky — Ahrtal - nach Stücken der Samml. Fuß daher [große, schwarze Stücke eines Phyllob. - Fuß, Berl. E. Z. 65] u. a. beschrieben [Küst., Käf. Eur., Heft 45] — Noch Holland u. Dessau [Schilsky l. c.] —

Brachyderinae.

Polydrosus Germ.¹⁾ [Anordnung nach Schilsky II.]

1. **impar** Gozis = *mollis* Germ. — In *F.* wohl nur versehentlich nicht angeführt. — Bonn, Winnigen (R.) u. jedenfalls allg. verbr. — *H. W. N.* —

2. **atomarius** Ol. — Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bopp. (R.) — *H. W. N.* —

3. **marginatus** Steph. = *ambiguus* Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C. - iris* Ol.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

4. **mollis** Stroem = *micans* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

5. **sericeus** Schall. — Aach., Kref., Düssdf. (*F. - ser.* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Jülich (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

6. **impressifrons** Gyll. — Kref. - Samml. Bruck als *flavipes* Deg. - K. Dan. vid. — *H.* —

7. **confluens** Steph. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F. - chrysomela* Ol.!) - Belegst. aus Samml. Bruck Heyd. vid. — Bopp. (*B. - chrys.* Schönh.) — U. Solg. (*v. Hagens - G.*) — Kleve - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — *H. W. N.* —

8. **cervinus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. - Samml. Fischer — Elbf. (*C.*) — Stommeln (Raderm.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Winnigen, Sayntal (R.) — *H. W. N.* —

9. **pilosus** Gredl. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92 - *melanostictus* Chevr.) — *W. N.* —

10. **tereticollis** Deg. — Aach., Kref., Düssdf. (*F. - undatus* F.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

1) *P. rufipes* L., in *F.* für Elbf. [Corn.], blieb ungedeutet. —

— **ruficornis** Bonsd. — *C.* für Elbf. [*Corn.* - *fasciatus* Müll.] - einzige Belegst. der Samml. *Corn.* nicht *ruficorn.* - Reitt. vid. — Nicht *H. W. N.* - doch Mittel- u. Süddeutschl. [Schilsky II.] —

[**flavipes** Deg. — *F.* für Rhp. - nach *B.* II. 225 überall - *C.* für Elbf. [*Corn.*] — Aus den Samml. nicht nachweisbar - die *flav.* der Samml. Bruck sind *impressifrons*, der Samml. *Corn.* der im Verz. *C.* fehlende *coruscus* [K. Dan. vid.] - sonst in keiner Samml. — Nicht *N.* - für Westf. als überall n. sltn. angegeben *W.* 199, Angabe von Verhoeff für Soest, Verh. Nat. Ver. 90, trifft nach dem einen erhaltenen Belegst., das jetzt in Samml. R., *coruscus* [Heyd. vid.]. — *H.* - daher vielleicht im Gebiet noch aufzufinden. —]

11. **pterygomalis** Boh. — Aach. (Kaltenb. - *B.*) — Elbf. (*Corn.* - *G.*) — Saarl. (Gabr.) — Kottenforst [1 · Frings], Sayntal (R.) *H. W. N.* —

12. **coruscus** Germ. — Aach., Kref. (*F.* - *cor.* Mr.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. in Samml. *Corn.* — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Scythropus Schönh.

1. **mustela** Hbst. — Blumslay, zahlreich, April 09 (Bockl.) - daher in Samml. R. — Trier, Horchheim (Mühlf.) — *W. N.* —

Sciaphilus Steph.

1. **asperatus** Bonsd. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *muricatus* F.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) St. (R.) — *H. W. N.* —

Brachysomus Steph. = **Platytarsus** Schönh.

[**villosulus** Germ. — *B.* II. 265 für Kref. - kann nur auf vom Bruck oder Mink beruhen. — In Samml. Bruck nicht daher, Minksche Stücke in Samml. Geilenk. waren *echinatus* - Schilsky vid. — Nicht *H. W. N.* —]

[**hirtus** Boh. — Col. Neerl. für Rhp. - nur *N.* 328. —]

1. **echinatus** Bonsd. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *Omius hirsutus* F.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohlthal (Andr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Foucartia Duv.

1. **squamulata** Hbst. — Bopp. (*B.* - *Strophosomus*) — nicht auch Elbf. (*C.*) — Güls, Schmittenhöhe, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Barypithes Duv.

1. **araneiformis** Schrk. — Die Art: Aach., Düssdf. (*F.* - *brunnipes* Ol.) — Bopp. (*B.* II. 166) — Elbf. (*C.*) — Kleve (Fuß - Schilsky, D. E. Z. 89 S. 338) — *H. W. N.* —

v. setosus Form. — Kref. in Samml. Bruck — Brohltal in Samml. Andr. — Bonn, Siebengbg., Kochem, St. (K. Dan. vid. - R.) — anscheinend in Rhp. nur die var. - die zahlreichen Stücke der Samml. Fuß ohne Fundort auch hierhin. —

[**Chevolati** Boh. — *F.* für Aach. [Först. - *Omius ruficollis* F.] - hierhin entsprechend *B. II.* 266 — Col. Neerl. für Düssdf. — Nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten [Schilsky II.] —]

2. **pellucidus** Boh. — Ahrw. (von Fuß - Heyd.) — *F.* für Kref. [pell. Chevr.] u. die Angaben für die Nachbargebiete müssen wegen der Abtrennung des *duplicatus* dahingestellt bleiben. — Von Kref. nicht in Samml. Bruck. —

3. **duplicatus** Keys [Entomol. Monthly Magazine 1911] — Ahrw. (von Fuß als pelluc. - Heyd.) — Lüttich, auch Frankr. [Heyd. briefl.] —

4. **mollicomus** Ahr. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck mit Seidl. vid. — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — *W. N.* —

5. **tener** Boh. — Kleve - Samml. Fuß — Elbf. (Formánek vid. - Heyd.) — U. Solg. (v. Hagens - *G.*) — Kref., Neuenahr - Samml. Bruck mit Seidl. vid. — Kottenforst, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

Omius Schönh.

[**concinus** Boh. — *B. II.* 267 für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Düssdf. [v. Hagens] - Zebe für Kref. „bei Ameisen“ — Nicht in Samml. Bruck, noch [Lange briefl.] in Samml. Mink - Mink-sche Tauschstücke von Kref. in Samml. Geilenk. waren Baryp. tener - Schilsky vid. - von v. Hagens später nicht, bes. nicht in *G.* angegeben. — Nicht *H. W. N.* —]

1. **mollinus** Boh. — Kref. - Samml. Bruck mit Seidl. vid. - daher auch 1 von Ulbr. gfd. in Samml. R. — *N.* —

Strophosomus Steph.

1. **melanogrammus** Forst. = *coryli* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **rufipes** Steph. [= *obesus* Marsh.] — Elbf. (*C.*) — Dinslaken [le Roi], Bonn, Laach. See (R.) — *H. W. N.* —

3. **fulvicornis** Waltl = *curvipes* Thoms. — Kleve (Fuß, Berl. E. Z. 73) - Belegst. K. Dan. vid. - Fundstelle die Donsbrügger Heide (Fuß) — *H.* —

4. **faber** Hbst. — Aach., Düssdf., Kreuzn. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

5. **lateralis** Pk. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — von Elbf. [Mühlf.] in Samml. R. — *H. W.* —

6. **retusus** Marsh. — Aach. (Först. - *F.* - *oxyops* Chevr.) — Belg. u. Südlimburg! [Col. Neerl.] — *F.* noch für Kref. [vom Bruck] und Düssdf. - nicht in Samml. Bruck — *B. II.* 215 für Bopp. - doch nicht in *N.* —

Eusomus Germ.

1. **ovulum** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — St., nicht selten (R.) — *W. N.* —

Brachyderes Schönh.

1. **incanus** L. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - auch lepidopter-
us Chevr.) — Elbf. (*C.*) — Löbndorf (Radern.) — Trier (Mühlf.)
— Kleve [Reichensp.], Ahrw. (R.) — *H. W. N.* —

Sitona Germ.

[**gressorius** F. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] — *H.* u. Belg.
[*Ev.*, D. E. Z. 07 S. 375] - doch das Belegst. in Samml. Corn.
griseus - Heyd. vid. —]

1. **griseus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) —
Bonn, Ahrw. (R.) — *H. W. N.* —

2. **cambricus** Steph. — Aach. (*F.* - *cribricollis* Schönh.) —
Kref. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Rhens, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **regensteiniensis** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) —
Elbf. (*C.*) — Bonn, Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **tibialis** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Mosel
(Gabr.) — Tönnstein, Olbrück (R.) — *H. W. N.* —

a. **ambiguus** Gyll. — *F.* für Aach., Kref., Düssdf. - von Kref.
[Allard vid.] nicht in Samml. Bruck — *W. N.* —

5. **lineatus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml.
Bruck mit Allard vid. — Saarl. (Gabr.) — Kob. (K. Dan. vid. -
R.) — *H. W. N.* —

6. **suturalis** Steph. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kref. - Samml.
Bruck mit Allard vid. — Bonn (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. **elegans** Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) — Angabe in *F.* für
Elbf. [Corn.] durch Verz. *C.* nicht bestätigt. — Kref. [Ulbr.] in
Samml. R. - Reitt. vid. —

a. **lateralis** Gyll. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - die beiden jetzt
in Samml. Corn. befindlichen Belegst. zu andern Arten gehörig
- K. Dan. vid. — *W.* —

7. **sulcifrons** Thunb. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp.
(*B.* - *medicaginis* Redtb.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Hubenth. vid.
- Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (K. Dan. vid. - R.) — *H.*
W. N. —

8. **gemellatus** Gyll. — Kref. - Samml. Bruck mit Allard vid.
— *H.*, Belg. —

9. **puncticollis** Steph. — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck
mit Allard vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

10. **flavescens** Marsh. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *octopunc-*
tatus Germ.) - Kref. in Samml. Bruck mit Allard vid. — Elbf.
(*C.*) — Kob. (Preiß) — Saarl., Loef (Gabr.) — Rhens (R.) — *H.*
W. N. —

— **lineellus** BOND. — *F.* für Aach. [Först.] u. Kref. [Mink u. vom Bruck] - Belegst. in Samml. Mink sind *crinitus* (Lange) - in Samml. Bruck mit Allard vid. nicht aus Rhp. — *C.* für Elbf. [Corn.] - Belegst. sind [jetzt] *crinitus* - Hubenth. vid. — *W. N.* nicht *H.* —

a. brevicollis Gyll. — *F.* für Aach. [Först.] — nicht *H.*, in *N.* —

11. **Waterhousei** Walt. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59 - *setosus* Redtb.) — Sayntal (K. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

12. **crinitus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - auch *nanus* Bess.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe, St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

13. **hispidulus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Sayntal, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

14. **cylindricollis** Fahr. — Elbf. - 1 - Samml. Corn. unter *suturalis a. lateralis* — Tönisstein (*a. varians* Desbr. - 1 - R.) — K. Dan. vid. omn. — Belg., *H.* —

15. **humeralis** Steph. — Aach., Düssdf. (*F.* - *discoideus* Megl.) — Bopp. (*B.*) — Borbeck (Geilenk.) - Belegst. K. Dan. vid. — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Allard vid. — Saarl. (Gabr.) — Kob. (Bockl.) — Laach. See, Kob., Sayntal (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

16. **inops** Gyll. — Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *N.* —

Trachyphloeus Germ.

1. **laticollis** Boh. — Aach. (daher nach 1 Stück beschrieben - *F.* - *anoplus* Först.) — Kreuzn. - Samml. Bruck mit Seidl. vid. — Hessen u. a. [Schilsky II.] —

2. **alternans** Gyll. — Ahrw. - Samml. Fuß — Bonn (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **spinimanus** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — noch in *F.* für Kref. [vom Bruck] u. Düssdf. [Braselm.] - von Kref. nicht in Samml. Bruck. — *H. W. N.* —

4. **scabriculus** L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.* - auch *erinaceus* Redtb. u. *setarius* Schönh.) - Kref., Siebengb. in Samml. Bruck mit Seidl. vid. — Elbf. (*C.*) — Neuenahr (Heyd.) — Bonn, Andernach, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

5. **bifoveolatus** Beck — Aach., Kref., (*F.* - *squamosus* Schn.) — Elbf. (*C.*) — Ahrw., Schalkenmehren, St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. tessellatus Marsh. — Kref. (3 - Geilenk.) —

6. **aristatus** Gyll. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw., Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

7. *Olivieri* Bed. = *squamulatus* Ol. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

[**Psalidium** Ill.

maxillosum F. — *B. II.* 212 für Elbf. — nicht in Verz. *C.* - Südeuropäer. —]

Cneorrhinae.

Cneorrhinus Schönh.

1. *plagiatus* Schall. = *geminatus* F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Wesel (Gabr.) — Bonn, Kob., Trier (*R.*) — *H. W. N.* —

2. *exaratus* Marsh. — Rheydt (Beckers, *D. E. Z.* 92, u. Gabr.) - daher, aus Samml. Geilenk. Heyd. vid. — Roermond, Venlo [Col. Neerl.] —

Liophloeus Germ.

1. *tessulatus* Müll. = *nubilus* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

v. *aquisgranensis* Först. — Aach. (daher nach Funden von Först. u. Heinem. beschrieben - *F.*) — H. Venn (Fred.) — Kref. - Samml. Bruck — Immerath i. Eifel - Samml. Raderm. — Ahrw. (von Fuß - Samml. Heyd.) — Brohltal, Eltztal (Heyd. vid. - *R.*) — *N.* —

v. *maurus* Marsh. — St., einige Stück auf einer sumpfigen Wiese (*R.*) - Belegst. Schilsky vid. —

[*Schmidti* Boh. — *F.* für Aach. [Först. - *Schmidti* Schönh.] — *B. II.* 236 noch für Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Ahrtal [v. Hagens] - von Kref. nicht in Samml. Bruck, vom Ahrtal nicht in Samml. Fuß. — Nicht *H. W. N.* - im Osten [Cat. Col.] —]

[*Herbsti* Gyll. — *C.* für Elbf. [Corn.] - einzige Belegst. der Samml. Corn. ist [jetzt] *tessul.* - Heyd. vid. — Nicht *H. N.* - *W.?* - Deutschland [Cat. Col.] —]

[*Brucki* Bach — Kref. (nach einem Funde von vom Bruck beschrieben *B. II.* 236 (462) - ist *Otiorrh. ligustici* var. - Belegst. nicht in Samml. Bruck. —]

Barynotus Germ.

[*margaritaceus* Germ. — Schilsky II. für Rhp. - wohl nach Redtb., *Fauna Austr.* III. Aufl., II. 190: „am Rhein“. — Nicht *H. W. N.* - Alpen [Cat. Col.] —]

1. *obscurus* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.* - *murinus* Bonsd.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., Kochem, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

2. *moerens* F. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. Heyd. vid. — *H. W.* —

[*alternans* Boh. — Fred. für H. Venn [*squalidus* Gyll.] - die Art in den die Nachbargebiete berücksichtigenden Col. Neerl. nicht aufgenommen. — *W.* —]

Tanymecinae.

Amomphini.

[*Thylacites* Germ.

pilosus F. — *F.* für Aach. [Först.] - in Samml. Först. nicht der sonst regelmäßig eingeklebte Namenszettel. — Kraatz, D. E. Z. 76 S. 378: „1 von Kleve - Fuß“ - in Samml. Fuß nur Rußland, Fuß wohnte aber damals in Kleve. — Nicht *H. W. N.* —]

Chlorophanus Germ.

— *gibbosus* Pk. — *F.* für Düssdf. [Braselm. u. Hildebr. - *pollinosus* F.] - nicht in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl) - von Düssdf. nicht wieder angegeben - nicht *H.*, *W.* [1 Fundort], *N.* [2] —

1. *dorsiger* Faust — Andernach (dort 1 der Stücke, nach denen die Art aufgestellt, 1830 von Dr. Carové gefunden - *N.* 331) — Hild. H. - 1 - Samml. Geilenk. u. Bonn (1 - *R.*) - Belegstücke Heyd. vid. — Sonst Mainz, Straßburg [*N.* 331] —

2. *viridis* L. — Rhp. (*F.* - *vir.* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Neuenahr (Heyd.) — Rhöndorf [Reichensp.], Kob., St.-Goar, U. Nahe (Heyd. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

[*a. salicicola* Germ. — *B.* II. 223 für Bopp. - Stücke in Samml. Bruck mit „Bopp.-Bach“ bezettelt sind *a. Germari* — *G.* für Hild. H. [Geilenk.] u. Elbf. [Drescher u. Ostheide] - das einzige Belegst. aus Samml. Geilenk. ist *dorsiger* — Heyd. vid. omn. — Nach *N.* 332 nur Südeuropa. —]

3. *graminicola* Gyll.

a. Germari Faust. — Aach. (von Först. - Faust determ. - Heyd.) — Bopp. in Samml. Bruck - Belegst. Heyd. vid. — *N.* [die Art.] —

Tanymecini.

Tanymecus Schönh.

1. *palliatu*s F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

Cleoninae.

Lepyrini.

Lepyrus Germ.

1. *palustris* Scop. — Rhp. (*F.* - colon *F.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

a. canus Gyll. — Saarl. (Gabr.) —

2. *capucinus* Schall. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *binotatus* F.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

Cleonini.

Leucosomus Motsch.

1. **pedestris** Pöda — Kreuzn. (Mink - *F.* - ophthalmicus Rossi) — Bopp. (*B.*) — Laach. See - Samml. Fuß. — *H. W. N.* —

Coniocleonus Motsch.

1. **glaucus** F. — Die Art: Aach., Kref., Bopp. (*F.* - Cleonus u. Bothynoderes glaucus F.) —

a. **turbatus** Fahrs. — scheint allein vorzukommen — *B. II.* 233 kennt den echten *Cl. glaucus* F. nicht, hat *II.* 229 *turbatus* Schönh. mit den Försterschen Fundorten des *glaucus* und Düssdf. — Elbf. (*C.*) u. Hild. H. (*G.*) treffen die Abart nach dem Sammlungsbestande [Geilenk. briefl.] — Kleve, Kref. - Samml. Bruck - *turb.* Schönh. mit Chevr. vid. — Düssdf. - Samml. Fuß - die Stammform dabei, unbekannter Herkunft — Wesel (Gabr.) — Bonn (Heyd. vid. - *R.*) — Angaben in *N.* treffen die Abart [Heyd. briefl.] - wohl auch in *W.* [*turb.* Fahrs.!] —

2. **nebulosus** L. — Aach., Kref. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Kleve (von Fuß - Samml. Heyd.) — Bonn (*R.*) — *H. W. N.* —

3. **nigrosuturatus** Goeze — Kref. - 1 - Samml. Bruck - Belegst. Heyd. vid. — wohl hierhin der *Cleon. sulcicollis* Parr. [für Fahrs.?] in *F.* von Homberg. — *N.* —

— **cicatricosus** Hoppe — Bopp. (daher nach 1 beschrieben - *B. II.* 230 - *callosus* Bach) - wohl verschlagen. — Bayern u. im Süden [Cat. Col.] —

Mecaspis Schönh.

[**alternans** Hbst. — *F.* für Kref. [vom Bruck] - daher nicht in Samml. Bruck — *B. II.* 231 für Bopp. - vor Abtrennung des *caesus*, trifft diesen nach seiner anderweiten Verbreitung. — Nicht *N.*, in *W.* von *caesus* nicht getrennt - Südeuropa. —]

1. **caesus** Gyll. — Kreuzn. (Heyd., *D. E. Z.* 75 S. 391) — Gerolstein (Dr. Böttger - Heyd.) — Ahrtal, Bonn (Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) - Belegst. in Samml. R. — Linz, St. (*R.*) — Heyd. vid. omn. — *N.*, in *W.* wohl als *alternans*. —

[**striatellus** F. — Südeuropäer - zu unrecht für *caesus* von *R.* in Schilsky *II.* S. 203 berichtet. —]

Pseudocleonus Chevr.

1. **cinereus** Schrk. — Düssdf. (Hildebr. - *F.* - *costatus* F.) - daher in Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — Bopp. (*B. II.* 232) — *W. N.* —

2. **grammicus** Pz. — St. (1 - Heyd. vid. - *R.*) — *N.* —

Chromoderus Motsch.

1. **fasciatus** Müll. — Kreuzn. (Mink - *F.* - *albidus* *F.*) — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (*G.* - *affinis* Schrk.) — Kref. - Samml. Bruck — Wunningen (Bockl.) — Kreuzn. (1 - *R.*) — *H. W. N.* —

Cyphocleonus Motsch.

1. **tigrinus** Pz. = *marmoratus* *F.* — Bopp., Kreuzn. (*F.*) — Hild. H. (1 - Geilenk. - *G.*) — Kob. (Bockl.) — U. Ahr, Laach. See, U. Nahe, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

2. **trisulcatus** Hbst. — Bopp., Herrstein (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Neandertal (*G.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrtal, Alf, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

[Adosomus Faust.

roridus Pall. — *B.* II. 229 für Bopp. - nicht *H. W. N.* - Osteuropa. —]

Cleonus Schönh.

1. **piger** Scop. — Rhp. (*F.* - *sulcirostris* *L.*) — Elbf., U. Solg. (*G.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Kref. - Samml. Bruck — Wunningen (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, St.-Goar (*R.*) — *H. W. N.* —

Lixus *F.*

1. **paraplecticus** *L.* — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Mörs (Schneid.) — Soon (v. Geyr) — *H. W. N.* —

2. **iridis** *Ol.* — Bopp. (*B.* - *turbatus* *Gyll.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Kref. (Heym.) — Soon (v. Geyr) — Ahrw., Kreuzn. (*R.*) — *H. W. N.* —

3. **myagri** *Ol.* — Bopp. (daher beschrieben - *B.* - *marginemaculatus* *Bach*) — Ahrw. - Samml. Fuß — Wunningen (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Alf (*R.*) — *W. N.* —

4. **Ascanii** *L.* — Bopp., Laach. See (*F.*) - Laach. See, Kreuzn. in Samml. Bruck mit *Capiom. vid.* — Ahrw. - Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Traben (Verhoeff) — Bonn, St. (*R.*) — *N.*, in *W.?* —

5. **algirus** *L.* — Laach. See - Samml. Fuß — Trier (A. Schultze *vid.* - Mühlf.) — *N.* —

6. **elongatus** *Goeze* — Bopp. (*B.* - *filiformis* *F.*) — Ahrw. (von Fuß - *Petri vid.* - Heyd.) — *N.* —

7. **cribricollis** *Boh.* — Trier (Mühlf.) — Kochem, St. (*R.*) — *K. Dan. vid. omn.* — *N.* [bei Rüdesheim - jetzt in Samml. Heyd. - *R.*] - Bergstraße, Metz [Heyd.] —

8. **bardanae** *F.* — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck mit *Capiom. vid.* — Bopp. (*B.*) — Ahrw. (von Fuß - *Petri vid.* -

Heyd.) — Wunningen (Bockl.) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. —
H. W. N. —

Larinus Germ.

[*cynarae* F. — *F.* für Homberg [Pliester] - schon in *B.* II. 287 bezweifelt - Südeuropäer. —]

[*latus* Hbst.

v. costirostris Gyll. — Zebe für Elbf. - schon in *B.* II. 287 bezweifelt - nicht im Verz. *C.* - wie die in Schilsky II. für Elbf. angegebene *v. teretirostris* Gyll. nicht gut möglich. — Südeuropa. —]

[*flavescens* Germ. — *B.* II. 481 für das Ahrtal [Fuß] - von Fuß nicht veröffentlicht, noch sonst angegeben - in Samml. Fuß nur aus Frankreich. —]

[*obtusus* Gyll. — Ev., D. E. Z. 92, für Kref. - in Samml. Bruck, die dafür in Betracht kommt [Vorbemerkg. V], nicht aus Rhp. —]

1. *turbinatus* Gyll. — U. Nahe, St. (je 1 - Heyd. vid. - R.) —
N. —

2. *sturnus* Schall. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Capiom. vid. — Ahrw. (von Fuß - Petri vid. - Heyd.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Kob., St.-Goar (Reitt. vid. - R.) —
W. N. —

3. *planus* F. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*v. Hagens - G.*) — Ahrw. (von Fuß - Petri vid. - Heyd.) — Trier (Mühlf.) — Kreuzn. - Samml. Bruck mit Capiom. vid. — Bonn, St. (*R.*) —
H. W. N. —

4. *jaceae* F. — Düssdf. (*F.*) — Kref. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (von Fuß - Petri vid. - Heyd.) — Kob. (Bockl.) — W. N. —

Rhinocyllus Germ.

1. *conicus* Fröl. — Bopp. (*B.* - *latirostris* Latr.) — Elbf. (1 - *C.*) — Kref., Ahr - Samml. Bruck — Aach. (Urb.) — Ahrw., Kreuzn. (je 1 - K. Dan. vid. - R.) — H. W. N. —

v. Olivieri Gyll. — Aach. (Först. - *F.* - Oliv. Megl.) — W. N. —

Tropiphorinae.

Tropiphorus Schönh.

1. *carinatus* Müll. — Aach., Düssdf. (*F.* - auch *mercurialis* F.) - *B.* II. 238 stellt Aach. zu seinem *carin.* Müll., der nach der aus Redtenbacher entlehnten Beschreibung = *styriacus* Bed. sein müßte; dieser, auch in Schilsky I. u. II. für Rhp., kommt aber keinesfalls da vor. — Ahrw. (Fuß) — Kref. - Samml. Bruck — Kob., St. (Heyd. vid. - R.) — H. W. N. —

Rhytirrhininae.

Rhytirrhinini.

Minyops Schönh.

1. **carinatus** L. [= *variolosus* F. - K. Dan., Münch. K. Z. III.]
— Kref., Düssdf., Trier (*F.*) — Kob. (Wirtgen - *B.*) — Hild. H.,
U. Solg. (*G.*) — Deutz, am Altwasser - Samml. Bertkau — Trier
(1 - Mühlf.) — Belg., *W.* —

Gronops Schönh.

1. **lunatus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Düssdf. in Samml.
Fuß u. Geilenk. — Elbf. (Stachelhausen u. Geilenk. - *C.*) — *H.*
W. N. —

Alophini.

Alophus Schönh.

1. **triguttatus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) —
Saarl. (Gabr.) — Bonn, Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W.*
N. —

Hylobiinae.

Hylobius Schönh.

1. **abietis** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.)
— *H. W. N.* —

2. **pinastri** Gyll. — Elbf. (2 - Stachelhausen - *G.*) - jetzt in
Samml. Geilenk., Fundstelle Marpetal b. Barmen (Geilenk. briefl.)
— *N.* —

3. **fatuus** Rossi — Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Düssdf. -
Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Viersen [le Roi], Bonn (R.) —
H. W. N. —

Liparus Ol.¹⁾ = **Molytes** Schönh.

— **glabrirostris** Küst. — *F.* für Aach. [Först. - *carinaerostris*
Megl.] - auch Aach. in *B.* II. 242 bei *carin.* Schönh., der in *B.* =
glabrirostr. — Nicht *H.*, in *W.* 208. —

1. **germanus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Bopp.,
Rheinböllen u. Ellern b. St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **coronatus** Goeze — Aach., Kref., Bopp. (*F.* - *coron.* Latr.)
— U. Solg. (*G.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Ahrw., Kob., St. (R.)
— *H. W. N.* —

[Plinthus Germ. = **Meleus** Lac.

Tischeri Germ. — Kob. - 1 - nach Moselhochwasser (Bockl.) -
Heyd. vid. — Baden, in Mitteldeutschland u. im Osten [Schilsky II.] -
in den Vogesen Megerlei Pz. —]

1) *Mol. laevigatus* Stev., in *F.* für Düssdf. [Hildebr.], blieb
ungedeutet - wenn = *laevig.* Schönh. [Gyll.], wie in Zebe für
Rhp., unrichtig - Südrußland. —

Epipolaeus Weise = **Plinthus** Reitt.

1. **caliginosus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - calig. Germ.) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. - Samml. Fuß — H. Acht (Heyd.) — Schmittenhöhe (Bockl.) — Eupen (Brink) — H. Venn u. Schneifel [le Roi], Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Liosoma Steph.

1. **deflexum** Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - ovatum Clairv.) - Aach. (Urb.) — Elbf. (*C.*) - daher (Heyd.) — Bonn, Sayntal, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **oblongulum** Boh. — Soon (1 - Hubenth. vid. - R.) — Hertogenwald [1 - Heym.] - sonst im Südosten [Schilsky II.] —

— **cribrum** Gyll. — *F.* für Aach. [Först.] - Samml. Först. ergibt nichts. — Nicht *H.*, in *W.* 208. —

Trachodes Germ.

1. **hispidus** L. — Elbf. (v. Hagens - *C.*) — Kleve, Ahrw. (Fuß) — Duisb. (Urb.) — Schmittenhöhe (1 - Mühlf.) — St. (1 - R.) — *W. N.* —

Hyperinae.

Hypera Germ.

[**cyrta** Germ. — Schilsky I. u. II. für Elbf. - nicht im Verz. *C.* - Südeuropa. —]

[**oblonga** Boh. — *F.* für Homberg [Pliester - obl. Schön.] - nicht *H. W. N.* - Südeuropa. —]

1. **oxalidis** Hbst.

v. ovalis Boh. — Hild. H. (1 - Geilenk.) - nicht Stammform, wie in Hild. H. angegeben - Belegst. Heyd. vid. — Vallendar, Chaussee nach Höhr bes. auf der Bergwiese zwischen Klmtr. 2,3 und 2,4 stets im Spätherbst n. selten (Heyd. vid. - R.) — Elsaß u. a. [Schilsky II.] —

2. **intermedia** Boh. — Kref. - 2 - Samml. Bruck mit Capiom. vid. - zwar Fundort auf dem Namenszettel, doch die einzigen Stücke der Art in Samml. Bruck. — Sonst im Süden u. Osten - auch Allergebiet [Schilsky II.] —

[**palumbaria** Germ. — *F.* für Aach. [Först.] u. Kref. [vom Bruck] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - nicht *H. W. N.* - im Osten [Cat. Col.] —]

[**comata** Boh. — *B.* II. 248 für Düssdf. [v. Hagens] - von v. Hagens später, insbes. für *G.* nicht angegeben, in Samml. Hagens ganz fehlend [Dom. Hag.] — Nicht *H. W. N.* - im Osten, v. borealis Krauß i. Schwarzwald. —]

3. **tessellata** Hbst. — Elbf. (1 - *C.*) — Kref. - Samml. Fuß - nicht Kleve, wie in Beitr. I. — Königswinter - 1 - Samml. Bertkau - Heyd. vid. — U. Nahe, St. (R.) — *N.* —

[*crinita* Boh. — Zebe für Rhp. — Fuß, Berl. E. Z. 65 für Andernach [Eigenbrodt - visnagae] - in Samml. Fuß nur Frankreich - 1 Belegst. der visnagae von Fuß auch Phyt. pastinacae [Kirsch, Berl. E. Z. 71 S. 183] — Südeuropa. —]

Phytonomus Schönh.

1. *punctatus* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
2. *fasciculatus* Hbst. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Kref. - Samml. Bruck - daher auch beschrieben als *variegatus* Bach (*B. II. 257*) — U. Solg. (*G.*) — Trier (Mühlf.) — *H. W. N.* —
3. *adpersus* F. — Kref., Düssdf. (*F.* - *pollux* F.) - Kref. in Samml. Bruck — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Wiedtal, Sayntal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
4. *rumicis* L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
5. *arundinis* Pk. — Rhp. ohne näheren Fundort - 1 - Samml. Bruck mit *Capiom. vid.* — *H.*, b. Arnheim, Maastricht. —
— **Kunzei** Germ. — de R., Verh. Nat. Ver. 82 für Nev. [2] - in *C.* aufgenommen. — De R., Westf. Pr. 98, bemerkt, nach einer Mitteilung von v. Heyden werde wohl Verwechslung mit alternans Steph. vorgelegen haben - von einer Nachprüfung daraufhin verlautet nichts - kein Belegst. in Samml. Corn. (Geilenk.) — Nicht *H. W. N.* — Mitteldeutschl. u. a. —
6. *pastinacae* Rossi.
 - a. *Olivieri* Cap. — Schilsky I. u. II. für Rhp. — Quelle nicht mehr feststellbar. — Nicht *W. N.* —
 - a. *tigrinus* Boh. — Kob. (Wirtgen - *B. II. 255* - *tigr.* Schönh. mit Bestimmung nicht ganz sicher) - doch Kob. in Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — Neuenahr (2 - Heyd.) — *H. N.* —
 - a. *albicans* Cap. — Schilsky I. u. II. für Rhp. — Quelle nicht mehr feststellbar. — Nicht *W. N.* —
7. *meles* F. — Kref., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck mit *Capiom. vid.* — Elbf. (*C.*) — Kob. (K. Dan. vid. - R. — *H. W. N.* —
— a. *pallidus* Cap. — Elbf. (1 - *G.*) —
[*constans* Boh. — *F.* für Aach. [Först. - *const.* Ziegl.] - in *B. const.* Schönh. — Nicht *H. W. N.* - im Osten. —]
8. *nigrirostris* F. — Rhp. (*F.* - *nigr.* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
9. *arator* L. = *polygoni* L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Trier (Mühlf.) — Viersen [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —
10. *pedestris* Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *suspiciosus*

Hbst.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Ahrw., Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

11. **elongatus** Pk. — Kref. (F.) — Bonn (1 - Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

12. **plantaginis** Deg. — Aach., Kref. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (A. Schultze vid. - Mühlf.) — Bonn (1 - Heyd. vid. - R.) — *H. W. N.* —

13. **murinus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Düssdf. (Crumbach - B. - auch suturalis Redtb.) — Elbf. (C.) — Trier (A. Schultze vid. - Mühlf.) — *H. W. N.* —

14. **variabilis** Hbst. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

15. **viciae** Gyll. — Ahrtal - Samml. Fuß - Hubenth. vid. — *W. N.* —

16. **trilineatus** Marsh. — Düssdf., Bopp. (B. - auch plagiatus Redtb.) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 62) - Belegst. Heyd. vid. — Brohltal (Andr.) — Strotzbüsch, Kob., U. Nahe (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* — Hierhin wohl *Bradybatus trilineatus* von Bopp. in *B. Ent. Kl.* —

Limobius Schönh.

1. **borealis** Pk. = *dissimilis* Hbst. — Aach., Kref. (F.) — Düssdf. (B.) — U. Solg. (G.) — *H. W. N.* —

Erirrhinae.

Pissodini.

Pissodes Germ.

1. **piceae** Ill. — Forst Thronecken a. d. Mosel, einmal sehr häufig (Fuß) - Belegst. aus Samml. Fuß Heyd. vid. — Belg. [Col. Neerl.] —

2. **notatus** F. — Aach., Kref. (F. - not. Gyll.) - Aach. (Urb.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **pini** L. — Düssdf. (Hildebr. - F.) — Kref. (Ulbr.) — Bonn (1 - Fuß) — Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

[*Gyllenhali* Gyll. — F. für Aach. [Först.] - nicht *H. W. N.* - im Norden u. Osten. —]

4. **piniphilus** Hbst. — Kref. (1 von Puhlmann gfd. - Ulbr.) - jetzt in Samml. R. - Hubenth. vid. — *N.*, nicht *H. W.* —

Erirrhinini.

Procas Steph.

1. **armillatus** F. — Kref. (daher nach einem Funde von vom Bruck beschrieben - *B. II.* 296 - *moestus* Bach) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 58 - *Steveni* - u. 65) — Kleve, Goch (Fuß) — Stommeln (1 - Raderm.) — Belg. [Col. Neerl.] - Thüringen [Schilsky II.] —

Grypidius Steph.

1. **equiseti** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (1 - *C.*) — Bonn, Laach. See, Kochem, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

2. **brunneirostris** F. — Aach. (*F.*) — Kref. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Viersen [le Roi], Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

Pachytychius Jekel.

1. **sparsutus** Ol. — Kreuzn. (vom Bruck - *B.* - *Tychius*) - Belegst. aus Samml. Bruck Heyd. vid. — Oberstein, auf *Genista pilosa* (Heyd.) — Col. Neerl. für Elbf. - nicht im Verz. *C.* — *N.*, nicht *H. W.* —

Erirrhinus Schönh.

1. **festucae** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Stenden u. Weinfeld. Maar [le Roi], Laach. See, Güls, Trier (R.) — *H. W. N.* —

2. **Nereis** Pk. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) — Weinfeld. Maar [le Roi], Ahrw., Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **scirrhosus** Gyll. — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. - Samml. Fuß - Hubenth. vid. — Kref. [1 - Ulbr.] in Samml. R. - Hubenth. vid. — *H. W. N.* —

Notaris Steph.

1. **bimaculatus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Bonn, Oberwerth. (R.) — *H. N.* —

2. **scirpi** F. — Elbf. (1 - *C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Duisb. (Urb.) — Laach. See (Fuß) — Trier (Mühlf.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

3. **acridulus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., Soon (R.) — *H. W. N.* —

v. **montanus** Tourn. — Soon (1 - Hubenth. vid. - R.) — Kassel, sonst im Osten [Schilsky II.] —

Dorytomus Steph.

1. **longimanus** Forst. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - vorax *F.*) — Nev., U. Solg. (*G.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

a. **macropus** Redtb. — Aach. (*F.*) — Nev., U. Solg. (*G.*) — Kref. - Samml. Ulbr. — Bonn, U. Nahe (R.) — *W. N.*

2. **tremulae** Pk. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Bopp., Kreuzn. (*B.* - auch *variegatus* Schönh.) — Düssdf. - Samml. Fuß — Bonn, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

3. **tortrix** L. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Laach. See, Nettetal, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

4. **nebulosus** Gyll. — Ahrw. - Samml. Fuß — Laach. See, Kob., Kreuzn. (K. Dan. vid. - R.) — *H.* —

5. **validirostris** Gyll. — Elbf. (1 - *C.*) — Kref. (Ulbr.) — Ahrw. (Fuß) — Siegm. d. g., Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**hirtipennis** Bed. — *H.*, verbr. u. nicht sit., *N.*, u. über ganz Deutschland [Schilsky II.] - wohl auch in Rhp. —]

6. **flavipes** Pz. — Aach. (*F.* - *suratus* Megl.) - in *B.* II. 301 sur. Schönh. — Elbf. (Corn. - *G.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Wenck. vid. — Sayntal, Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *N.* —

7. **filirostris** Gyll. — U. Solg. (*G.*) — Ahrw. (Fuß) — Duisb. (Urb.) — Viersen [le Roi], Bonn [Frings], Laach. See, Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

8. **Dejeani** Faust = *costirostris* Gyll. — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R.) — Bonn, Siebengbg., Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

9. **taeniatus** F. = *bituberculatus* Zett. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de Rossi - *G.*) — Kref. - Samml. Bruck - taen. F. u. Silbermanni Wenck. mit Wenck. vid. — *H. W. N.* —

10. **affinis** Pk. — Aach., Kref. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Elbf. (*C.*) — Trier (A. Schultze vid. - Mühlf.) — *H. W. N.* — [occalescens Gyll. — Zebe für Rhp. - nicht *H. N.*, *W.*? - im Süden und Osten. —]

11. **melanophthalmus** Pk. — Kref. (*B.* - *punctator* Hbst.) - daher in Samml. Ulbr. - Belegst. Hubenth. vid. — Elbf. (*C.* - *punct.* Hbst. u. *agnathus* Boh.) — U. Nahe (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

a. **clitellarius** Boh. — Kref. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. - Kref. (Ulbr.) - Hubenth. vid. — Winnigen (Bockl.) - Hubenth. vid. —

12. **majalis** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - von Kref. nicht in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) - daher, aus Samml. Corn., Reitt. vid. — *W. N.* —

13. **salicis** Walt. — Kref. - 1 - Samml. Bruck - Hubenth. vid. — *N.* —

14. **salicinus** Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. - Samml. Bruck mit Wenck. vid. - daher in Samml. Fuß - K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

15. **rufulus** Bed. — Aach., Kref. (*F.* - *pectoralis* Gyll.) — Bopp. (*B.* - *pect.* Pz.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Laach. See, Eltztal (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

16. **dorsalis** L. — Aach., Kref. (*F.* - *dors.* Pk.) - Kref. in Samml. Bruck — *W. N.* —

Smicronychini.

Smicronyx Schönh.

1. **jungermanniae** Reich — Aach., Kref. (*F.* - *variegatus* Schönh.) — Bopp., Kreuzn. (*B.*) - Kref., Kreuzn. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

2. **coecus** Reich — Kref. (*B.* - *politus* Schönh.) - daher u. Siebengbg. in Samml. Bruck mit Wenck. vid. — Ahrw. (Fuß) - Belegst. K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

Tanysphyrini.

Tanysphyrus Germ.

1. **lemnae** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

Bagoini.

[Anordnung nach Schilsky II.]

Orthochaetes Germ.

1. **setiger** Beck — Aach., Kref. (*F.* - *Styphlus*) - Kref. in Samml. Bruck — Bopp. (*B.* II, 327) — *H. W. N.* —

Pseudostyphlus Tourn.

1. **pilumnus** Gyll. — *B. Ent. Kl. für Bopp.* - doch nicht in der Fauna II. 297 — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *H. W. N.* —

Hydronomus Schönh.

1. **alismaticus** Marsh. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kleve (Fuß) — Bonn (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

Bagous Schönh.

1. **cylindrus** Pk. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Trier (A. Schultze vid. - Mühlf.) — U. Nahe (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —

[**lutosus** Gyll. — *F.* für Kref. [vom Bruck], Ürdingen [Stollwerck] u. Elbf. [Corn.] - nicht in Samml. Bruck, noch im Verz. *C.* - Ürd. ohnehin zweifelhaft. — Doch *H. W.* —]

2. **glabrirostris** Hbst. — Aach., Kref. (*F.* - *lutulentus* Gyll.) - Kref. in Samml. Bruck - *collignensis* Hbst. - mit Tourn. vid. — Elbf. (1 - *G.*) — *H. W. N.* —

3. **nigritarsis** Thoms. — Kref. (Kraatz, Berl. E. Z. 71 S. 169) - daher [Ulbr.] in Samml. R. - Schilsky vid. — Ahrw. (Fuß) — *H. N.* —

4. **diglyptus** Boh. — Aach. (Först. - *F.*) — Belg. [Col. Neerl.] — *N.*, b. Niederlahnstein [Schilsky vid. - R.] —

5. **limosus** Gyll. — Oberwerth (1 - Schilsky vid. - R.) — *H.* —

6. **frit** Hbst. — Elbf. (1 - C.) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Schilsky vid. — Trier (A. Schultze vid. - Mühlf.) — U. Nahe (Schilsky vid. - R.) — *H. N.* —

7. **lutulosus** Gyll. — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — *H. W. N.* —

8. **tempestivus** Hbst. — Aach. (Först. - F. - daher auch beschrieben tessellatus Först. u. adpersus Först.) — nicht Elbf., wie F. angibt, nicht in C. — *H. W. N.* —

Cossoninae.

Dryophthorus Schönh.

1. **corticalis** Pk. — Bopp. (*B. lymexylon* F.) — Kref. - Samml. Bruck — Ernster Wald b. Kochem (1 - R.) — *W. N.* —

Cossonus Clairv.

1. **parallelepipedus** Hbst. = ferruginens Clairv. — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

2. **linearis** F. — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, Laach. See, Oberwerth, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

3. **cylindricus** Sahlb. — Aach. (F. - cyl. Dej.) — Bopp., in F. angegeben, doch nicht in B. II. 388 — Kref. - Samml. Bruck — Elbf., in Mehrzahl (Geilenk.) — *H. N.*, u. Soest [Verhoeff.] —

Eremotes Wollast.

[**ater** L. = chloropus F. — F. für Düssdf. [Braselm.] u. Homberg² [Pliester] - war von Düssdf. nach B. II. 390 Rhync. truncorum; Homberg ohnehin zweifelhaft - daher, wenn auch in *W. N.*, noch des Nachweises bedürftig. —]

1. **punctatulus** Boh. — Kob. - Samml. Fuß — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. N.* —

2. **reflexus** Boh. — Bopp. (B. II. 391) — *N.* —

— **porcatus** Germ. — F. für Homberg [Pliester] - von B. II. 390 aufgenommen entgegen dem sonstigen Übergehen von Homb. - ob Untersuchung, wie bei ater, stattgefunden? — *N.*, nicht *H. W.* —

Rhyncolus Germ.

1. **truncorum** Germ. — Düssdf., Bopp. (*B. - trunc.* Gyll.) — U. Solg. (G.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

2. **lignarius** Marsh. — Bopp. (*B. - cylindrirostris* Ol.) — U. Solg. (G.) — Bonn, Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

— **turbatus** Schönh. — B. II. 490 für Bopp., Düssdf. - Fuß, Berl. E. Z. 59 für Düssdf. [nicht selten] - fehlt in Samml. u. Sammlungsverzeichnis Fuß u. auch in Samml. v. Hagens [Dom. Hag.], von dem die Angabe Düssdf. in B. herrührt - deshalb, zumal nicht in *H. W. N.*, zweifelhaft. —

Cryptorrhynchinae.

Gasterocercus Lap.

— **depressirostris** F. — Aus Eichenrinde von Neuhäusel b. Ehrenbreitstein, jenseits der Gebietsgrenze, erzogen von Bockl. - wohl auch im Gebiet. — *N.* —

Cryptorrhynchus Ill.

1. **lapathi** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

Acalles Schönh.

1. **camelus** F. — Siebengbg. - 1 - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Schmittenhöhe (Mühlf.) — *N.* —

2. **ptinoides** Marsh. — Aach., Kref. (*F.* - nocturnus Schönh.) - Kref. in Samml. Bruck u. Fuß — *H. W. N.* —

3. **roboris** Curt. — Kref. (*B.* - abstersus Schönh.) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. - Samml. Fuß — Laach. See, Kob., Horchheim (K. Dan. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

4. **hypocrita** Boh. — Barmen (Stachelhausen - *C.*) — Oberwerth, mehrfach (Mühlf. u. *R.*) — *N.* —

5. **turbatus** Boh. — Aach., Kref. (*F.* - turbatus Schönh. u. a., nudiusculus Först.) — Kob. (K. Dan. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

a. **echinatus** Boh. — Kob. (K. Dan. vid. - *R.*) — *W. N.* —

Ceutorrhynchinae.

Ceutorrhynchini.

[Die Ceutorrhynchini der Samml. R. sind, meist auch für alle Fundorte, von A. Schultze, nach ihm von Dr. K. Daniel revidiert.]

Mononychus Germ.

1. **punctum-album** Hbst. — Kref., Duisb. (*F.* - pseudacori F.) - Kref. (Heym.) — Elbf. (*C.*) — M.-Gladbach (1 - *R.*) — *H. W. N.* —

Coeliodes Schönh.

1. **ruber** Marsh. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß) - daher in Samml. Schultze (K. Dan.) — Löhndorf - Samml. Radern. — *H. W. N.* —

2. **erythroleucus** Gmel. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - subrufus Hbst.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Löhndorf (Radern.) — Brohltal, Laach. See, Nettetel (*R.*) — *H. W. N.* —

3. **dryados** Gmel. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - quercus F.) — Elbf. (*C.*) — Kob., Brodenbach, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

4. **trifasciatus** Bach — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — Ahrw. (Fuß) — Breyeller See [le Roi], Nettetel, Kob., St. (*R.*) — *H. N.* —

5. **rubicundus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - rub Pk.) —

Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Ahrw. (Fuß) — Vallendar, Kob. (R.) —
H. W. N. —

Stenocarus Thoms.

1. **cardui** Hbst. — Aach., Kref. (*F.* - *guttula* F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — H. W. N. —
2. **fuliginosus** Marsh. — Aach. (Först. - *F.*) — Saarl. (Gabr.) — Löhndorf - Samml. Raderm. — U. Nahe, St. (R.) — H. W. N. —

Craponius Leconte.

1. **epilobii** Pk. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. - C.) - Belegst. aus Samml. Corn. K. Dan. vid. — H. W. N. —

Cidnorrhinus Thoms.

1. **quadrinaculatus** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *didymus* F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Nettetal, Kob. (R.) — H. W. N. —
- a. **immaculatus** Gyll. — Kob. (1 · R.) — N. —

Coeliastes Weise.

1. **lamii** F. — Aach. (daher beschrieben - *F.* - *congener* Först.) — Bopp. (B.) — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — Kref. - Samml. Bruck — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Tönnisstein, Nettetal (R.) — W. N. — Hierhin *punctulum* Hbst., in *F.* für Aach., Kref., der im Cat. Col. nicht mehr angeführt. —

Allodactylus Weise

1. **exiguus** Ol. — Ahrtal (v. Hagens - B.) - daher auffallenderweise nicht in Samml. Fuß - doch H. W. N. —
2. **affinis** Pk. — Aach. (*F.* - *geranii* Pk.) — Bopp. (B.) — Ahrtal (Fuß) — Eltzthal, St. Goar, St. (R.) — H. W. N. —
[*asperatus* Gyll. — C. für Elbf. [1 - Corn. - *Coeliodes* asp.] - Osteuropäer - Belegst. der Samml. Corn. ein *Rhinoncus asperatus* Gyll. = *bruchoides* Hbst. - K. Dan. vid. —]

Rhytidossoma Steph.

1. **globulus** Hbst. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. - C.) — Kref. - Samml. Bruck — St. (R.) — H. W. N. —
2. **fallax** Otto — Schmittenhöhe, im Hochwald nördlich vom Wirtshaus (1 Anfang Sept. 07, 1, jetzt in Samml. Dan., Anfang Juli 09 - R.) — Bisher aus den Ostalpen bekannt, Zwischenfundorte, außer Vorarlberg [Schilsky II.], fehlen. —

Amalus Schönh.

1. **haemorrhous** F. = *scortillum* Hbst. — Aach. (*F.*) — Kref. (B.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Laach. See, Kob., Kreuzn. (R.) — H. W. N. —

Rhinoncus Steph.

1. **castor** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Düssdf. (von A. Schultze - R.) — *H. W. N.* —
2. **bruchoides** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Vallendar (R.) — *H. W. N.* —
3. **gramineus** F. = *inconspetus* Hbst. [im Cat. Col. fehlend] — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Sayntal, Nettetel, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —
4. **pericarpus** L. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —
5. **perpendicularis** Reich — Aach., Kref. (*F.* - *guttalis* Grav. u. *subfasciatus* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Vallendar, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
6. **albicinctus** Gyll. — Kref. (vom Bruck - *F.*) — Kleve, sehr häufig (Fuß) - Belegst. aus Samml. Fuß K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

Phytobius Schönh.

1. **canaliculatus** Fahrs. — Ahrw. (Fuß) — Nettetel (R.) — *H.* —
2. **Waltoni** Boh. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Ahrw. (Fuß) — *H. W. N.* —
3. **comari** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Werden in Samml. Schultze (K. Dan.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Bonn, Sayntal, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
4. **quadrituberculatus** F. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Wiedtal, St. (R.) — *H. W. N.* —
5. **quadrinodosus** Gyll. — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß) — Saarl. (Gabr.) — Kob. [1 - Bockl.] in Samml. R. — *H. W. N.* —
6. **quadricornis** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Düssdf. in Samml. Schultze (K. Dan.) — *H. W. N.* —
7. **leucogaster** Marsh. — U. Solg. (v. Hagens - G.) — Kleve (Fuß) — Düssdf. (von A. Schultze - R.) — *H. W. N.* —
8. **velatus** Beck — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Kob. [1 - Bockl.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Phrydiuchus Gozis.

1. **topiarius** Germ. — Bonn (1 - R.) - nicht St., wie Beitr. II. — *N.* —

Centorrhynchidius Duv.

1. **horridus** Pz. — Ürdingen (Stollwerck - *F.*) — Kob. (Fuß) — *W. N.* —
2. **troglodytes** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **rufulus** Duf. — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — Elsaß [Schilsky II.], *H. N.* —

Micrelus Thoms.

1. **ericae** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, H. Venn, Schneifel [Reichensp.], Kob. (R.) — *H. W. N.* —

[**ferrugatus** Perris — *C.* für Nev. [1 - de Roi] — Südeuropäer - Angabe schon von A. Schultze, D. E. Z. 98 S. 267, bezweifelt - das in Samml. Corn. gelangte Belegst. ist *ericae*, unreif, rot - K. Dan. vid. —]

Ceutorrhynchus Germ.¹⁾

1. **terminatus** Hbst. — Elbf. (2 - Corn. - *C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (1 - R.) — *H. W. N.* —

2. **apicalis** Gyll. — Kob. (2 - R.) — *H. N.* —

3. **quercicola** Pk. — Aach. (*F.* - auch *depressicollis* Gyll.) — Kref. (Mink - Kraatz, Berl. E. Z. 67 S. 386 - *versicolor* Bris. n. sp. ined.) — Elbf. (*C.*) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Kob., Elztal (je 1 - R.) — *H. W. N.* —

4. **nigrinus** Marsh. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Arenberg b. Kob. (R.) — *H. N.* —

5. **floralis** Pk. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Laach. See, Kob., Trier, St., Kreuzn. (R.) — *H. W. N.* —

6. **pyrrhorhynchus** Marsh. — Kref. (*B.* II 357) — Elbf. (*C.*) — Wiedtal (1 - R.) — *H. W. N.* —

7. **pulvinatus** Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) - in Rhp. nicht wieder aufgefunden, doch *H. W. N.* —

8. **rhenanus** Schultze — Kob. (1 ♂ - Schultze, D. E. Z. 95 S. 424) — Frankreich u. a. [Cat. Col.] —

9. **posthumus** Germ. — Aach., Kref. (*F.* - *pumilio* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

10. **melanarius** Steph. — Aach., Kref. (*F.* - *convexicollis* Schönh.) — Elbf. - Samml. Corn. - K. Dan. vid. — Kleve in Samml. Schultze (K. Dan.) — *H. W.* —

11. **viduatus** Gyll. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. (Ulbr.) - Hubenth. vid. — Elbf. (*C.*) — Kob. (Mühlf. u. R.) — *H. W. N.* —

12. **abbreviatulus** F. — Kref. (1 - Ulbr.) - in Samml. R. — Sayntal, U. Nahe (je 1 - R.) — *W. N.* —

13. **geographicus** Goeze — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *echii*

1) Ceuth. congener Schüpp., in *F.* für Elbf. [Corn.], blieb ungedeutet, ebenso *C. crenatulus* Bach, *B.* II. 489 von Kref. nach einem Funde von vom Bruck beschrieben [nicht in Samml. Bruck]. —

F.) - Düssdf. in Samml. Schultze (K. Dan.) — Elbf. (C) — Mosel (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

14. **crucifer** Ol. — Aach. (Först. - F.) — Bopp. (B. II. 366) — *H. W. N.* —

15. **larvatus** Schultze — Kreuzn., im Geisenheynerschen Garten auf *Pulmonaria obscura* Dumort., Bienhorntal b. Kob. (R.) — Bayern u. a. [Schilsky II.] —

16. **litura** F. — Aach., Kref. (F.) - Kref. (Ulbr.) - Belegst. Hubenth. vid. — Elbf. (C.) - daher [Mühlf.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

17. **trimaculatus** F. — Aach. (Först. - F.) — Elbf. (Stachelhausen - C.) — *H. W. N.* —

18. **asperifoliarum** Gyll. — Aach., Kref. (F. - asp. Kirb.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

19. **pallidicornis** Bris. — Arenberg b. Kob. (1 - R.) — Mitteleuropa [Cat. Col.] —

20. **albosignatus** Gyll. — Kref. (Mink - Kraatz, Berl. E. Z. 97 S. 386) - daher in Samml. Bruck - K. Dan. vid. — St. (1 - R.) — *H. N.* —

[*urticae* Boh. — für Schilsky II. als in Rhp. vorkommend auf Grund Bestimmungsfehlers angegeben von R. - scheint auch dem Osten u. Süden anzugehören. —]

21. **euphorbiae** Bris. — Kref. [1 - Ulbr.] in Samml. R. — *N.* —

22. **symphyti** Bed. — Aach., Kref. (F. - raphani F.!) — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. Mühlf.) — Kreuzn., Sobernheim (R.) — *H. W. N.* —

23. **angulosus** Boh. — Kref. (1 - Fuß) — H. Venn (Fred.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Vallendar, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

24. **suturalis** F. — Aach., Düssdf. (F.) — Elbf. (C.) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

25. **arquatus** Hbst. — Aach. (F.) — Elbf. (C.) - Belegst. aus Samml. Corn. K. Dan. vid. — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Kob. (1 - R.) — *H. W.* —

26. **campestris** Gyll. — Bopp. (B.) — Nev. (G.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

27. **millefolii** Schultze — Barmen [Kraatz] u. Köln (Schultze, D. E. Z. 96 S. 271) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. — Mitteldeutschl. [Schilsky II.] —

28. **chrysanthemi** Germ. — Aach., Kref. (F. - chrys. Müll.) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Elbf. (C.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — *H. W.* —

[**figuratus** Gyll. — C. für Elbf. [1 - Corn.] - das Belegst.

der Samml. Corn. ist der im Verz. *C.* nicht angeführte triangulum - K. Dan. vid. — Im Norden u. Osten [Cat. Col.] —

29. **triangulum** Boh. — Elbf. (2 - Reitt. vid. - *G.*) - daher auch in Samml. Corn. — Bopp. (Schultze - *N.* 349) — Kob., St. (R.) — *H. W.* u. Mainz [in Samml. Schultze - K. Dan.] —

30. **rugulosus** Hbst. — Aach. (*F.*) — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. - Kref. (Ulbr.) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

31. **melanostictus** Marsh. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —

32. **denticulatus** Schrk. — Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

33. **macula-alba** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. (1 - Geilenk.) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de Rossi - *G.*) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

34. **marginatus** Pk. — Aach. (*F.* - marg. Schönh.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

— **distinctus** Bris. — Cat. Col. für „Rhenan.“ - schwerlich in Rhp. - beschrieben aus den Pyrenäen u. England - Cat. Col. noch Südrußland - sonst nicht in Deutschl. [Schilsky II.] —

35. **Mölleri** Thoms.

a. rotundatus Bris. — Trier (1 - R.) — *H.* [die Art], Frankr. u. a. [Cat. Col.] —

36. **punctiger** Gyll. — Aach., Kref. (*F.* - punct. Megl.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) - Belegst. Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, Nettetal, Kob. (R.) — *H. N.* —

37. **pilosellus** Gyll. — Kleve (1 - Fuß) - Belegst. Schultze vid. — *H.* [anscheinend mit Bedenken], Frankr. u. im Osten [Cat. Col.] —

— **resedae** Marsh. — *F.* für Aach. [Först.] u. Düssdf. [Braselm.] - von *B.* aufgenommen. — Nicht *W. N.*, in *H.*, daher wohl richtig. —

38. **pollinarius** Forst. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R., Westf. Pr. 98, II. Nachtr. - glaucinus Boh.) — Kob. (Gabr.) — Bonn, Nettetal (R.) — *H. W. N.* —

39. **pleurostigma** Marsh. — Bopp. (*B.* - sulcicollis Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Kref. (Ulbr.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., nicht selten (R.) — *H. W. N.* —

40. **Roberti** Gyll. — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — *H.*, Frankreich u. a. [Cat. Col.] —

a. alliariae Bris. — Kref. (Ulbr.) — Schmittenhöhe, Laubach b. Kob., Rhens (R.) — *H.* —

41. **puncticollis** Boh. — Kob. (Fuß) — Kob., St. (R.) — Sachsen u. im Osten [Schilsky II.] —

42. **griseus** Bris. — Saarl. (Gerh. vid. - Gabr.) — R., Beitr. II., für St. unrichtig. — Frankreich u. a. [Cat. Col.] —

43. **obsoletus** Germ. — Kref. (Mink - *F.*) - daher nicht in Samml. Bruck — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. verloren. — Doch *W. N.* u. über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

44. **rapae** Gyll. — Kref. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — *H. W. N.* —

45. **napi** Gyll. — Kref. (*F.* - napi Koch) — Elbf. (*C.*) — Kleve, Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Saynthal, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

[**borraginis** *F.* — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck] - so auch *B. III.* 361 - in Samml. Bruck nur Südfrankreich - in Samml. Mink fehlend (Lange). — Nicht *H. N.* - für *W.* angegeben. —]

46. **syrites** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. verloren. — Aus Rhp. nicht in Samml. Bruck - doch *H. W. N.* —

[**arator** Gyll. — R., Beitr. I, für Ahrw., Kleve [Fuß] - nach den Belegst. der Samml. Fuß napi - K. Dan. vid. — Östliche Art (Schultze, *D. E. Z.* 93) —]

47. **assimilis** Pk. — Aach., Kref. (*F.*) — Kref. in Samml. Ulbr. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Laach. See, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

48. **constrictus** Marsh. — Kref. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. — Rhens (1 - *R.*) — *H. N.* —

49. **cochleariae** Gyll. — Aach., Kref. (*F.* - auch atratulus Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Bopp. in Samml. Schultze (K. Dan.) — Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

50. **nanus** Gyll. — Kref. (*F.* - nan. Bess.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Laach. See (Fuß) - Belegst. Schultze vid. — R., Beitr., II. für St. unrichtig. — *W. N.* —

51. **atomus** Boh. — Aach. (*F.* - setosus Märk.) — Bopp. (*B.* - set. Schönh.) — Elbf. (*C.*) — Laach. See, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

[**sophiae** Stev. — *C.* für Elbf. [Corn.] - die 2 Belegst. der Samml. Corn. sind melanarius, der in *C.* für Elbf. nicht angeführt ist - K. Dan. vid. — Auch nicht *H. W. N.* —]

52. **querceti** Gyll. — Kref. (Ulbr.) - Belegst. Hubenth. vid. — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — alboscuteellatus Gyll. von Düssdf. [Fuß] in Beitr. I. von R. unrichtig hierhin gestellt. — *H.* —

53. **insoptus** Germ. — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Düssdf. - Samml. Fuß - alboscuteellatus Gyll. - Belegst. Schultze vid. — Vallendar (*R.*) — Über ganz Deutschland (Schilsky II.) —

54. **quadridens** Pz. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Brohltal, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

55. **picitarsis** Gyll. — Ahrw., Kob. (Fuß, Berl. E. Z. 65) - Belegst. aus Samml. Fuß Schultze vid. — Kref. (1 - Geilenk.) — *H. N.* —

56. **sulcicollis** Pk. — Aach. (*F.* - cyanipennis Ill.) — Elbf. (*C.*) — Düssdf. in Samml. Schultze (K. Dan.) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —

57. **carinatus** Gyll. — St. (1 - R.) — *N.* —

58. **scapularis** Gyll. — Aach. (*F.* - obscurecyaneus Schönh.) — Elbf. (1 - Reitt. vid. - *G.*) — Duisb. (Urb.) - Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — Kob. [Bockl.] in Samml. R. — *H. N.* —

59. **pervicax** Weise [= suturellus Gyll.] — Vallendar, Kob., Soon (R.) — *W. N.* —

60. **erysimi** F. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) - Reitt. vid. — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

a. cyaneus Weise — Kref. - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. —

61. **contractus** Marsh. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) - Reitt. vid. — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — St. Goar, St. (R.) — *H. W. N.* —

62. **hirtulus** Germ. — Aach. (Först. - *F.* - hirt. Schüpp.) - nicht auch Elbf. [Corn.], wie *F.* angibt, nicht in *C.* — Trier (Schultze vid. - Mühlf.) — *H. W. N.* —

63. **chalybaeus** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — Ahrthal - Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — *H. W. N.* —

64. **Leprieuri** Bris. = Rübsaameni Kolbe — U. Nahe, aus Gallen erzogen (Rübsaamen, Ent. Nachr. 1900 S. 230) - nach mündl. Mitteilung des Entdeckers rheinabwärts, woher er viele Gallen erhielt, weit verbreitet. — Mitteleuropa [Cat. Col.] —

65. **moguntiacus** Schultze — Kob. (1 - R.) — *H. N.* —

[**laetus** Rosh. — Schilsky II. für Rhp. - irrtümlich angegeben [Schilsky briefl.] —]

66. **nasturtii** Germ. — Kref. (Mink, Stett. E. Z. 53 - Poophagus) - daher in Samml. Schultze (K. Dan.) — Benrath (Ulbr., Verh. Nat. Ver. 09 E. 115) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

Poophagus Schönh.

1. **sisymbrii** F. — Düssdf. (*F.*) — Kref. (*B.*) — U. Solg. (*G.*) — Kob. (Bockl.) — Oberwerth, Trier (R.) — *H. W. N.* —

Tapinotus Schönh.

1. **sellatus** F. — Kref., Bonn (*F.*) — Laach. See (*B.*) - daher in Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Siegmdg. [Frings], St. (R.) — *H. W. N.* —

Orobitis Germ.

1. **cyaneus** L. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 59) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

Coryssomerini.

Coryssomerus Schönh.

1. **capucinus** Beck — Aach. (*F.*) — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck — Brohlthal (2 - Andr.) — Oberwerth (1 - K. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —

Barini.

Baris Germ.

1. **atricolor** Boh. — Düssdf., Köln (A. Schultze - Schilsky, D. E. Z. 92 S. 204) - Köln in Samml. Schultze (K. Dan.). — Sonst nur im Südosten [Cat. Col.] —

2. **artemisiae** Hbst. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Bonn, Kob. (R.) — *W. N.* —

3. **morio** Boh. — Aach. [Kaltenbach], Ahrtal [Fuß], Kob. [Eigenbrodt], Bopp. (*B.* II. 485 = *resedae* Bach) - Ahrtal in Samml. Fuß u. Bruck. — *W. N.* —

4. **laticollis** Marsh. = *picina* Germ. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* - *glabra* Hbst.) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

- [**timida** Rossi = *nitens* F. — *F.* für Aach. [Först.], Bopp. [Bach], Düssdf. [Braselm.] - in *B.* II. 328 nicht für Bopp., 485 Vorkommen in Rhp. bezweifelt. — Nicht *H. W. N.* - im Süden u. Osten [Schilsky II.] —]

- [**angusta** Brull. — *F.* für Düssdf. [Hildebr. - *violacea* Schönh.] - *B.* nicht für Deutschl. - in Samml. Hildebr. fehlend (Miss. Steyl). — Nicht *H. W. N.* - Osteuropa. —]

5. **cuprirostris** F. — Bopp., sehr häufig (*B.*) - daher in Samml. Fuß — Hild. H. (Geilenk.) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

6. **lepidii** Germ. — Kref., Düssdf. (*F.* - *lep.* Müll.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

7. **coerulescens** Scop. — Elbf. (1 - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß) — Köln in Samml. Schultze (K. Dan.) — U. Nahe, St. (R.) — *W. N.* —

- a. **chloris** F. — Bopp. (*B.* II. 329) — *W. N.* —

8. **picicornis** Marsh. — Kref., Düssdf., Bopp. (*B.* - *punctatus* Schönh.) — U. Solg. (*G.*) — Bonn, Ahrw., Tönnisstein, Kob. (R.) — *H. N.* —

9. **chlorizans** Germ. — Aach. (*F.*) — Kref., Bopp. (*B.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — St. (R.) — *H. W. N.* —

Limnobaris Bed.

1. **T-album** L. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

Calandrinae.

Sphenophorus Schönh.

1. **striatopunctatus** Goeze = *mutilatus* Laich. — Aach., Bopp., Kreuzn. (*F.* - *abbreviatus* F.!) - die älteren Angaben des abbr. *F.* hierhin, so *B.* II. 387, mit den Fundorten wie *F.*, erkennbar nach der Beschreibung - cf. noch *N.* 354 — Ahrtal (Fuß u. Heyd.) — Winnigen, Kob. (Bockl.) — Bonn, u. nicht selten U. Nahe, St. (R.) — *N.* —

Calandra Clairv.

1. **granaria** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

[**oryzae** L. — Rhp. (*F.*) — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 62 S. 44) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* - durch den Handel überallhin verschleppt [*N.* 355] —]

Tychiinae.

Tychiini.

Balaninus Sam.

1. **elephas** Gyll. — Elbf. (*C.* u. *G.*) — *W. N.* —
 2. **venosus** Grav. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.* glandium Marsh.) — Elbf. (*C.* - gland. Marsh.) — Bonn, Nettetal (R.) — *H. W. N.* —
 3. **villosus** F. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
 4. **nucum** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Linz, St. (R.) — *H. W. N.* —
 5. **glandium** Marsh. = *turbatus* Gyll. — Aach. (*F.*) — Kref., Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.* - *tessellatus* Fourc.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
 6. **cerasorum** Hbst. — Kref. (*B.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — U. Nahe (zahlreich - R.) — R., Beitr. I, für Bonn trifft *rubidus*. — *H. W. N.* —
 7. **rubidus** Gyll. — Aach. (*F.* - *rub. Dej.*) — Elbf. (*C.* - *betulae* Steph.) — Kref. - Samml. Brink — Bonn (Fuß) — *H. W. N.* —

Balanobius Jekel.

1. **crux** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
 2. **salicivorus** Pk. — Rhp. (*F.* - *brassicae* F.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

3. **pyrrhoceras** Marsh. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Anthonomus Germ.¹⁾

1. **variens** Pk. — Aach. (*F.* - *melanocephalus F.*) — Elbf. (1 - *C.*) — Nev. (1 - *G.*) — Kref. (Ulbr.) — Winnigen (Bockl.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

a. **perforator** Hbst. — Elbf. (1 - *G.*) —

2. **rubi** Hbst. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Linz, St. (R.) — *H. W. N.* —

3. **sorbi** Germ. — Eupen (Reitt. vid. - Heym.) — Norddeutschland u. a. [Cat. Col.] —

4. **pubescens** Pk. — Kob. (1 - Bockl.) - Hubenth. vid. — *N.* —

5. **cinctus** Kollar — Elbf. (*C.*) — Nev. (*G.*) — Kob. (Bockl.) — Wiedtal, Kob., St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

6. **inversus** Bed. — Aach., Kref. (*F.* - *ulmi Deg.!*) — Elbf. (*C.*) — Oberwerth, U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

7. **pedicularius** L. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Kob. (1 - Mühlf.) — Montjoie (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

8. **rufus** Gyll. — Ruine Olbrück i. Brohltal (K. Dan. vid. - R.) — *N.* —

9. **pomorum** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

10. **humeralis** Pz. — Bopp. (*B.* - *incurvus Pz.*) - daher in Samml. Bruck — Nev. (de Rossi - *C.*) — Eltztal, Kob. [Bockl.], Soon u., jenseits der Gebietsgrenze, Niederlahnstein (K. Dan. vid. - R.) — *H. W.* —

11. **rectirostris** L. — Rhp. (*F.* - *druparum L.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Bradybatus Germ.²⁾

1. **Creutzeri** Germ. — Bopp. (*B.* II. 306) — *N.* —

Brachonyx Schönh.

1. **pineti** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *indigena Hbst.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Mühlf.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Acalyptus Schönh.

1. **carpini** Hbst. — Aach. (Först. - *F.*) — *H. W. N.* —

a. **alpinus** Villa — Elbf. (1 - Drescher u. Ostheide - Reitt. vid. - *G.*) — *H. W. N.* —

1) *Anth. dorsalis* Stm., in *F.* für Kref. [Mink], blieb ungedeutet. —

2) *Brad. trilineatus*, in *B.* Ent. Kl. für Bopp., wohl = *Phytonomus tril.* —

Elleschus Steph.

1. **scanicus** Pk. — Aach. (*F.*) — Kref., Kob., Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Oberwerth (Mühlf.) - daher in Samml. R. - K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

2. **bipunctatus** L. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) — Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

3. **infirmus** Hbst. — Aach., Kref. (*F.* - *Dorytomus*) - Kref. in Samml. Bruck — Oberwerth (Mühlf.) - Belegst. K. Dan. vid. — *H. W.* —

Lignyodes Schönh.

1. **enucleator** Pz. — Düssdf. (Hildebr. - *B.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. N.* —

Tychius Germ.

1. **quinquepunctatus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

2. **lineatulus** Steph. — Laach. See, Kob. (K. Dan. vid. - *R.*) — *H. N.* —

3. **Schneideri** Hbst. — Kref., Kreuzn. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — *H. W.* — Ob hierhin *T. Schneideri* Hbst. in *F.* für Aach. [Fürst.] u. in *B.* II. 314 für Düssdf. [jedenfalls nach v. Hagens, wie *T. Schneideri* Hbst. in *G.* für U. Solg.], oder zu *lineat.* Steph. = *Schneideri* Gyll., wohin in Col. Neerl. die Angabe von Düssdf. gestellt ist, bleibt ungewiß. —

4. **venustus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

[**striatulus** Gyll. — Zebe für Rhp. - jedenfalls nach *F.* mit striat. Dej. für Kref. [Mink] - fehlt in Samml. Mink ganz (Lange briefl.) — Nicht *H. W. N.* —]

5. **crassirostris** Kirsch — Kob. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. - daher auch in Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Sonst im Süden u. Osten [Schilsky II.] —

6. **aureolus** Ksw.

v. **medicaginis** Bris. — Kreuzn. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Über Mitteldeutschl. [Schilsky II.] —

7. **junceus** Reich — Bopp. (*B.* Ent. Kl.) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck - *flavicollis* Boh. - mit Tourn. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

8. **meliloti** Steph. — Bopp. (*B.*) - daher in Samml. Bruck u. Fuß — Kob. (Gabr.) - Kob. in Samml. Mink (Lange) — Sayntal, St. (K. Dan. vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

9. **pusillus** Germ. — Ahrw. (Kraatz, Berl. E. Z. 67 S. 385 - *pygmaeus* Bris.) — *H. N.* —

10. **tomentosus** Hbst. — Rhp. (*F.*) — Nev. (*C.*) — Elbf. (*G.*) — Sayntal, St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

11. **picrostris** F. — Aach., Kref., (*F.*) — Elbf. (*C.* - auch *posticus* Gyll.) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Sibinia Germ.

1. **sodalis** Germ. — Kreuzn. - Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Sonst im Süden und Osten [Schilsky II.] —

2. **signata** Gyll. — Aach., Kref. (*F.* - *primita* Hbst.) - Kref. in Samml. Bruck mit Tourn. vid. — Düssdf. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

— **variata** Gyll. — *F.* für Aach. [Först. - var. Chevr.] - in *B. II.* 318. [var. Schön.] zweifelhaft - doch *H. N.* —

[**attalica** Gyll.

v. **tibiella** Gyll. — *F.* für Aach. [Först. - tib. Schön.] - in *B. II.* 318 anscheinend angezweifelt. — Nicht *H. W. N.* - Süd-europa.—]

3 **cana** Hbst. — Elbf. (1 - *C.* - *pellucens* Scop.) — Ahrw. (Fuß) — Kob., U. Nahe (R.) — *W. N.* —

4. **viscaria** L. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Ahrtal - Samml. Bruck — Kob., U. Nahe (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

5. **potentillae** Germ. — Kref. (Mink - *B.*) daher in Samml. Bruck - Belegst. Reitt. vid. — Nev. (de Rossi - *C.*) — St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Orchestini.

Anoplus Schönh.

1. **plantaris** Naezen — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *plant.* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Kref. [Ulbr.], Kob. (R.) — *H. W. N.* —

2. **roboris** Suffr. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck mit Wenck. vid. — nicht Elbf., wie in *F.*, nicht in *C.* — Kob., St. (R.) — *H. N.* —

Orchestes Ill.

1. **quercus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kref. - Samml. Fischer — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **rufus** Schrk. — Kref. (*B.* - *ruf.* Ol.) - daher in Samml. Bruck — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **alni** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Saarl. (Gabr.) — Oberwerth (R.) — *H. N.* —

4. **pilosus** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *ilicis* F.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.* u. *G.*) — *H. W. N.* —

5. **erythropus** Germ. — Aach., Kref. (*F.* - *erythr.* Müll.) - Kref. in Samml. Bruck - Kref. (Ulbr.) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

6. **jota** F. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

7. **fagi** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

8. **testaceus** Müll. — Aach., Kref. (*F.* - *scutellaris* F.) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — *H. W. N.* —

a. **carnifex** Germ. — *F.* für Aach. [Först.], Kref. [Mink u. vom Bruck] u. Elbf. [Corn.] — in Samml. Bruck nicht aus Rhp., auch nicht in *C.* — doch *H. W.* —

a. **semirufus** Gyll. — *F.* für Kref. [Mink u. vom Bruck] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - nicht *H. W. N.* - Elsaß, Bayern u. a. [Schilsky II.] —

a. **pubescens** Stev. — *F.* für Kref. [vom Bruck] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. — Elbf. (Corn. - *C.*) — *W.* —

9. **lonicerae** Hbst. — Bopp. (*B.*) — Kref. - Samml. Bruck — *W. N.* —

10. **rusci** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

11. **avellanae** Donov. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *signifer* Creutz.) — Elbf. (*C.*) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

[**pratensis** Germ. — *G.* für Elbf. [3 aus Samml. Stachelhausen] - das übersandte Belegst. war *fagi* - Schilsky vid. — Doch *H.*, daher wohl im Grenzgebiet. —]

12. **decoratus** Germ. — Aach. (*F.* - *dec.* Schüpp.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Kref. (Ulbr.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

13. **rufitarsis** Germ. — Kref. [1 - Brink] in Samml. R. - K. Dan. vid. — Brüggen b. Kempen (3 - Heym.) — *W. N.* —

14. **salicis** L. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

15. **stigma** Germ. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. (Ulbr.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

16. **populi** F. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (de R.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

17. **foliorum** Müll. — Aach., Kref. (*F.* - *saliceti* F.) — Elbf. (*C.*) — Winnigen, Vallendar (R.) — *H. W. N.* —

Rhamphus Clairv.

1. **pulicarius** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *flavicornis* Clairv.) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —

2. **subaeneus** Ill. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 63) - Belegst. aus Samml. Fuß K. Dan. vid. — Metz, Rheinbayern u. a. [Schilsky II.] —

Mecinini.

Mecinus Germ.

1. **janthinus** Germ. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
2. **pyraster** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Laach. See, Kob., U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —
[**circulatus** Marsh. — Schilsky II. für Westdeutshl. nicht auf Rhp. auszudehnen, nur Elsaß u. Rheinbayern [Schilsky briefl.] —]

Gymnetron Schönh.

1. **labile** Hbst. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Nev. (*C.*) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Bonn, Kob. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
[**ictericum** Gyll. — *F.* für Kref. [vom Bruck - ict. Schönh.] - in Samml. Bruck nicht aus Rhp. - nicht *H. W. N.* - im Osten. —]
2. **pascuorum** Gyll. — Bopp. (*B.*) — Kob., Rhens (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
3. **rostellum** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. - Samml. Corn. als **melanarium** - Belegst. K. Dan. vid. — *H. W. N.* —
[**melanarium** Germ. — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - das Belegst. in Samml. Corn. ist das in *C.* für Elbf. nicht angeführte **rostellum** - K. Dan. vid. —]
4. **villosulum** Gyll. — Bopp. [Bach] u. Siebengbg. - Samml. Bruck — *H. W. N.* —
5. **beccabungae** L. — Kref. (Mink - *F.*) — Elbf. (1 - *C.*) — *H. W. N.* —
6. **veronicae** Germ. — Aach., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
[**asellus** Grav. = **cylindrirostre** Gyll. — *F.* [asellus] für Aach., Kref. [vom Bruck] u. Duisb. - ebenso *B. II.* 380 - cylindr. in *B. II.* 381 ausdrücklich nicht für Rhp. — In Samml. Bruck nicht aus Rhp. - nicht *H. W. N.* - Mittel- u. Südeuropa [Cat. Col.] —]
7. **tetrum** F. — Elbf. (*C.* u. *G.*) — Ahrw. (Fuß) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) - Reitt. vid. — St. Goar, St. (K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
- v. **subrotundatum** Reitt. = **antirrhini** Germ. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (2 - Samml. Stachelhausen - *G.*) — St. (K. Dan. vid. - R.) — *W. N.* —
8. **antirrhini** Pk. = **noctis auct.** — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 62 S. 83) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid. — Tönnisstein (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
9. **hispidum** Brull. = **pilosum** Gyll. — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 62 S. 84) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*G.*) — Nev. (de R.,

Westf. Pr. 98) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan. vid.
— *H. N.* —

10. **melas** Boh. — Kleve, Ahrw., je 1 unter anderen Arten in
Samml. Fuß - K. Dan. vid. — Nord- u. Mitteleuropa [Cat. Col.] —

11. **netum** Germ. — Aach., Ahrtal (*F.* - *ellipticum* Hbst.) -
Ahrw. in Samml. Fuß - K. Dan. vid. — Bopp., erzogen (Bach,
Berl. E. Z. 58 S. 370) — *F.* für Elbf. [Corn.] - in *C.* nicht an-
gegeben. — *H. N.* —

12. **thapsicola** Germ. — Bopp., Kirn (*B.*) — Köln in Samml.
Schultze (K. Dan.) — Deutschl., Frankr. [Cat. Col.] —

13. **collinum** Gyll. — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck -
Belegst. Reitt. vid. — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. K. Dan.
vid. — *H. N.* —

14. **bipustulatum** Rossi = *spilotum* Germ. — Rhens, U. Nahe
(K. Dan. vid. - *R.*) — *N.* —

15. **linariae** Pz. — Aach. (Kaltenb., Verh. Nat. Ver. 62 S. 84)
— Bopp. (*B.*) - daher, nicht Kref., wie *F.* angibt, in Samml.
Bruck — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

Miarus Steph.

[**longirostris** Gyll. — *B.* für Bopp. - nicht *W. N.*, *H.* bei
Breda - sonst im Süden u. Osten [Schilsky II.] —]

1. **graminis** Gyll. — Düssdf., Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. -
Samml. Bruck — Mosel (Gabr.) — Kob., St. (K. Dan. vid. - *R.*)
— *H. W. N.* —

2. **micros** Germ. — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. verloren. --
— *H. W. N.* —

3. **plantarum** Germ. — Aach. (*F.* - *plant. Dej.*) — Elbf. (Corn. -
C.) - Belegst. verloren. — *H. W. N.* —

4. **campanulae** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml.
Bruck — Bonn, St. Goar, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

Cionini.

Cionus Clairv.

1. **tuberculosis** Scop. — Rhp. (*F.* - *verbasci F.*) — Elbf. (*C.*)
— Bonn, Kob. (*R.*) — *H. W. N.* —

2. **scrophulariae** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.)
— Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

3. **hortulanus** Geoffr. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (1 - *G.*) — Saarl.
(Gabr.) — Bonn, Wiedtal, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

4. **thapsi** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.* -
similis Müll.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Laach. See, St. (*R.*) —
W. N. —

5. **Olivieri** Rosensch. — Aach. (Först. - *F.*) — Bopp. (*B.*) —
Col. Neerl. für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck. — *W. N.* —

6. **olens** F. — Bopp. (*B*) — Ahrtal - Samml. Bruck — Trier, zahlreich (Mühlf.) — *H. W. N.* —
7. **alauda** Hbst. = *blattariae* F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F*) — Elbf., Nev. (*C*) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —
8. **pulchellus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F*) - Kref. in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — Elbf. (*G*) — U. Ahr (Heyd.) — Tönnisstein, St. (R.) — *H. W. N.* —
9. **solani** F. — Elbf. (*C* u. *G*) — Tönnisstein (R.) — *H. W. N.* —
10. **fraxini** Deg. — Aach., Kref. (*F*) — Elbf. (*C*) — Kob., Kochem, St. (R.) — *H. W. N.* —

Nanophyini.

Nanophyes Schönh.

1. **globulus** Germ. — Kref. (Mink u. vom Bruck - *F*) - daher in Samml. Bruck — *H. W. N.* —
2. **flavidus** Aub. — Ahrw. in Samml. Fuß - K. Dan. vid. - Belegst. für die Angabe von *gracilis* Redtb. in Berl. E. Z. 58 für Ahrw. — Elsaß [Schilsky II.] —
3. **marmoratus** Goeze — Rbp. (*F* - *lythri* F.) — Kref., Bopp. (*B*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe, St. (R.) — *H. W. N.* —
- a. **ruficollis** Rey — U. Nahe (R.) — Soden i. Taunus [Heyd.] —

Magdalinini.

Magdalis Germ.

1. **memnonia** Gyll. — Duisb. (Heym.) — Kref. - 1 - Samml. Fischer — Kref. [1 - Ulbr.] in Samml. R. - K. Dan. vid. — *W. N.* —
2. **phlegmatica** Hbst. — Aach. (*F*) — Kref. (*B*) - daher in Samml. Bruck u. [von Brink] in Samml. R. — Bonn (Geilenk.) - K. Dan. vid. — *H. W. N.* —
3. **nitida** Gyll. — Duisb. (2 - Heym.) — Bonn (1 - Fuß) jetzt in Samml. R. - K. Dan. vid. — *W. N.* —
4. **violacea** L. — Aach., Kref. (*F*) - Kref. in Samml. Bruck - K. Dan. vid. — Elbf., Nev. (*G*) - Nev. in Samml. Geilenk. - K. Dan. vid. — *H. W. N.* —
5. **frontalis** Gyll. — Kref. - Samml. Bruck — Elbf. - Samml. Geilenk. — St. - Samml. R. — K. Dan. vid. omn. — *H. W. N.* —
6. **duplicata** Germ. — Kref., Bopp. (*B*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*G*) — Duisb. (Urb.) — Bopp. (1 - K. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
7. **armigera** Geoffr. — Aach. (*F* - *stygia* F.) — Elbf. (*C* - *aterrima* F.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Wiedtal, Oberwerth (R.) — *H. W. N.* —

8. **carbonaria** L. — Aach. (*F.* - *atramentaria* Germ.) — Kref., Bopp. (*B.*) - Kref. nicht in Samml. Bruck. — *H. W. N.* —
9. **cerasi** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Trier (*R.*) — *H. W. N.* —
10. **barbicornis** Latr. — Aach. (*F.* - auch *rhina* Gyll.) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (*R.*) — *H. W. N.* —
11. **nitidipennis** Boh. — Ahrw. - Samml. Fuß — Soon (1 - *R.*) — *H. N.* —
12. **ruficornis** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *pruni* L.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Duisb. [Urb.], Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —
13. **flavicornis** Gyll. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (*B.*) - daher in Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) jetzt in Samml. R. - K. Dan. vid. — *H. W. N.* —

Apionini.

Apion Hbst.¹⁾

[Belegst. für die aus der vom Bruckschen Sammlung entnommenen Fundorte von Wencker bestimmt, soweit nicht neuere Bestimmung angegeben.]

1. **brunnipes** Hbst. — Kref. (*F.* - *laevigatum* Kirb.) - daher in Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Aach., Bopp. (*B.* II 192) — *H. N.* —
2. **confluens** Kirb. — Elbf. - I - Samml. Corn. - Belegst. Schilsky vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
3. **stolidum** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — *B.* II. 189 für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck. — *H. W. N.* —
4. **carduorum** Kirb. — Aach. (*F.* - *gibbirostre* Gyll.) — Bopp. (*B.* II. 191) — Elbf. (*C.*) — Kref., Siebengbg. - Samml. Bruck — St. (*R.*) — *H. W. N.* —
5. **onopordi** Kirb. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 190) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — St. (*R.*) — *H. W. N.* —
6. **penetrans** Germ. — Aach. (*F.*) — Kref. (*B.* II. 190) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —
7. **fuscirostre** F. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 210) — Elbf. (*C.*) — St. (*R.*) — *H. W. N.* —
- **genistae** Kirb. — *F.* u. *B.* für Kref., Homberg, Bopp., u. Fuß für Ahrw. treffen wohl sämtlich gen. auct. = *compactum* Desbr. - so wenigstens gen. Kirb. in Samml. Bruck u. Fuß - K. Dan. vid. — Entsprechend wohl auch *W.* 229. — Damit als deutsche Art - in Schilsky II. nur Rhp. angeführt - zweifelhaft. —

1) *Ap. basicorne* Ill., in *F.* für Aach. [Först.], heute zu *carduorum* Kirb., blieb ungedeutet. —

8. **compactum** Desbr. — Siebengbg., Kreuzn. in Samml. Bruck als gen. Kirb. - Ahrw. in Samml. Fuß als gen. Kirb. - K. Dan. vid. omn. — hierhin jedenfalls gen. Steph. u. Kirb. in *F.* u. *B.* von Homberg, Bopp. — *H. N.* - *W.*? [gen. Kirb.] —
9. **hungaricum** (Desbr.) Wagner — Homberg, Siebengbg. in Samml. Bruck als difficile Hbst. — Ahrw. in Samml. Fuß als difficile Hbst. — Kob. in Samml. Mühlf. — Soon in Samml. R. — K. Dan. vid. omn. — Harz u. im Osten u. Südosten von Deutschl. [Münch. K. Z. III. 29] — Ob die älteren Angaben von difficile Hbst. in *B.* für Bopp., Saarbr., in *C.* u. *G.* für Elbf., hierhin oder zu *corniculatum* Germ. = diff. auct. zu stellen - dieses in Schilsky II. für ganz Deutschl. - bleibt fraglich. —
10. **difficile** (Hbst.) Schilsky — Homberg - Samml. Bruck — Bonn (R.) - K. Dan. vid. omn. — *H. N.* —
11. **ochropus** Germ. — Bopp. (*B.* II. 189) — Elbf. (*C.* u. - Reitt. vid. - *G.*) — Bonn, St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W. N.* —
12. **pomonae** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
13. **craccae** L. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 188) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —
14. **cerdo** Gerst. — Ahrw. (*B.* II. 457) — Kref. [Ulbr.] in Samml. R. - Schilsky vid. — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — *H. W. N.* —
- [**v. consanguineum** Desbr. — Schilsky II. für Rhp. - doch in Mitteilg. der schweizerischen entom. Gesellschaft 1872 S. 187 [woher die Angabe - Schilsky briefl.] beschrieben nur aus „Bavière Rhénane“. —]
15. **opeticum** Bach — Ahrw. (Fuß) - aus Samml. Fuß Schilsky vid. — *H. W. N.* —
16. **subulatum** Kirb. — Aach., Düssdf. (*F.* - auch Marshami Steph.) — Bopp. (*B.* II. 188) — Elbf. (*C.* u. *G.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Schilsky vid. — Ahrtal - Samml. Bruck. — *H. W. N.* —
17. **aeneum** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.* u. - Reitt. vid. - *G.*) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —
18. **radiolus** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 191) — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — Oberstein (Schilsky vid. - Heyd.) — *H. W. N.* —
19. **ebeninum** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B.* II. 201) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
20. **laevigatum** Pk. — Aach., Kref. (*F.* - sorbi Hbst. u. Sahlbergi Schönh.) — Bopp. (*B.* II. 206) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —
21. **Hookeri** Kirb. — *B.* II. 190 für Kref. - daher nicht in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Kob. (Gabr.) — *H. W. N.* —
22. **dispar** Germ. — Rheinland [Kraatz] u. Kref. - Samml. Bruck — St. (Schilsky vid. - R.) — *H. W.* —

23. **urticarium** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - vernale *F.*) — Bopp. (*B. II.* 193) — Elbf. (*C.* u. - Reitt. vid. - *G.*) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

24. **flavofemoratum** Hbst. — Bopp. (*B. II.* 192) — Rhens (K. Dan. vid. - *R.*) — *W. N.* —

25. **pallipes** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) - Aach. (Geilenk.) — Bopp. (*B. II.* 193) — *H. N.* —

26. **semivittatum** Gyll. — Ahrw. (Fuß, Berl. E. Z. 63 - Germari Walt.) - Belegst. aus Samml. Fuß Schilsky vid. — *N.* —

27. **rufirostre** F. — Aach., Kref. (*F.* - rufir. Germ.) — Kob., Bopp. (*B. II.* 192) — U. Solg. (*G.*) — Oberstein (Schilsky vid. - Heyd.) — *H. W. N.* —

28. **pubescens** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

29. **seniculus** Kirb. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B. II.* 199) — Elbf. (*C.*) — Kob., St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

— **curtulum** Desbr. — Unter den Stücken des *pubescens* von Kref. 1 in Samml. Bruck - Schilsky vid. — Fundort nicht am Stück, daher vielleicht unrichtig, zumal nicht *H. W. N.* — Nordwestfrankreich [Col. Neerl.] —

30. **vicinum** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

31. **atomarium** Kirb. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B. II.* 190) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

32. **elongatum** Germ. — St. (1 - K. Dan. vid. - *R.*) — *N.* —

33. **rubens** Steph. — Bopp. (*B. II.* 194) — H. Venn [le Roi] in Samml. R. - Schilsky vid. — *H. W. N.* —

34. **sanguineum** Deg. — Aach. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — *H. W. N.* —

35. **frumentarium** Pk. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - frum. L. u. haematodes Stm.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Wiedthal, Vallendar, Nettetal, St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

36. **cruentatum** Walt. — Bopp. (*B. II.* 194) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. N.* —

37. **miniatur** Germ. — Aach., Kref. (*F.*) — Saarl. (Gabr.) — St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

38. **filirostre** Kirb. — Aach. (*F.* - morio Germ.) — Kref. (*B. II.* 201) — Elbf. (*C.*) — Ahrtal - Samml. Bruck - Belegst. Schilsky vid. — Kob. (Reitt. vid. - Bockl.) — *H. W. N.* —

39. **nigritarse** Kirb. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B. II.* 195) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

40. **flavipes** Pk. — Aach., Kref. (*F.* - flav. *F.*!) - in *B. II.* 195 und noch Cat. Col. 1877 = flav. Pk. — Elbf. (*C.* - flav. *F.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Schilsky vid. — Kref. (Ulbr.) - Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —

41. **dissimile** Germ. — Laach. See - 1 - Samml. Fuß - Belegst. Schilsky vid. — *H. W. N.* —
42. **ononicola** Bach — Aach., Kref. (*F.* - *ononidis* Gyll.) — Bopp. (*B. II.* 195) — Loef (Gabr.) — *H. N.* —
43. **assimile** Kirb. — Rhp. (*F.* - *assim* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
44. **apricans** Hbst. — Rhp. (*F.*) — Bopp. (*B. II.* 196) — Elbf. (*C.*) — Kref. Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
45. **varipes** Germ. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B. II.* 197) — Elbf. (*C.*) — Siebengbg. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
46. **aestivum** Germ. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) - in *B. II.* 196 trifolii L. — Elbf. (*C.*) — Kref. [Fischer] in Samml. R. - Schilsky vid. — *H. W. N.* —
- a. ruficus** Germ. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B. II.* 196) — *W. N.* —
47. **malvae** F. — Kref., Kob., Bopp. (*B. II.* 193) - Kob., Rhein-anlagen (Geilenk) — U. Solg. (G.) — Oberstein (Schilsky vid. - Heyd.) — Bonn (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
48. **curtirostre** Germ. — Aach. (*F.* - *humile* Germ.) — Kref., Bopp. (*B. II.* 208) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kref. [Ulbr.], U. Nahe, St. (*R.*) — *H. W. N.* —
49. **simum** Germ. — Aach. (Först. - *F.*) — Bonn (1 - *R.*) — *H. W. N.* —
50. **sedi** Germ. — Aach. (*F.*) — Oberstein (Schilsky vid. - Heyd.) — St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
51. **brevirostre** Hbst. — Aach., Kref. (*F.* - *brev.* Ol.) - Kref. in Samml. Bruck. — *N.* —
52. **affine** Kirb. — St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
53. **marchicum** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. [Brink] in Samml. R. - Reitt. vid. — *H. W. N.* —
54. **violaceum** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B. II.* 208) — Elbf. (*C.*) — Duisb (Wagner vid. - Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —
- [**hydrolapathi** Marsh. — *F.* für Kref. [vom Bruck - hydrol. Gyll.] - von *B. II.* 209 nicht aufgenommen - in Samml. Bruck der Namenszettel mit Kref., die Stücke nur mit Ostende u. a. bezeichnet. — *H.* —]
55. **minimum** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., U. Nahe (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
56. **Gyllenhali** Kirb. — Aach. (Först. - *F.*) — Kref. (*B. II.* 199) - daher nicht in Samml. Bruck. — *H. W. N.* —
57. **platalea** Germ. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

58. **Spencei** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —
59. **vorax** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B. II.* 202) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —
60. **viciae** Pk. — Aach. (*F.* - *viciae* Kirb.) — Kref., Bopp. (*B. II.* 195) — Elbf. (*C.*) — St. (*R.*) — *H. W. N.* —
- a. Griesbachi** Steph. — Nev. (de R., Westf. Pr. 98) —
61. **pisi** F. — Aach. (*F.* - *pisi* Megl.) — Kref., Bopp. (*B. II.* 206) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —
62. **punctigerum** Pk. — Aach., Kref. (*F.* - *punct.* Germ.) — Elbf. (*C.*) — Bonn (Schilsky vid. - *R.*) — *H. N.* —
63. **aethiops** Hbst. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. (Ulbr.) - Reitt. vid. — Duisb. (Wagner vid. - Urb.) — Kob. (Boekl.) - Reitt. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
64. **immune** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck und Geilenk. — Duisb. (Wagner vid. - Urb.) — Mosel (Gabr.) — St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
65. **striatum** Kirb. — Aach., Kref., Bopp. (*B. II.* 199) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Wagner vid. - Urb.) — Tönnisstein, Montjoie (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
66. **pavidum** Germ. — Aach. (*F.* - *plumbeum* Schönh.) — Kref. (*B. II.* 203.) — U. Solg., Nev. (*G.*) — Kob. (Gabr.) — *W. N.* —
67. **ervi** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B. II.* 200) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe, St. (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
68. **simile** Kirb. — Aach. (*F.* - *superciliosum* Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Wagner vid. - Urb.) — Bonn (Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
69. **melancholicum** Wenck. — Bonn, Venusberg, massenhaft auf *Lathyrus silvestris* (Fuß) - Belegst. K. Dan. vid. — Württemberg u. i Osten [Schilsky II.] —
70. **ononis** Kirb. — Aach. (*F.* - auch *glaucinum* Schönh.) — Bopp. (*B. II.* 200) — Elbf. (*C.*) — Loef (Gabr.) — *H. W. N.* —
71. **elegantulum** Germ. — Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Nahe (*i* - Schilsky vid. - *R.*) — *H. W. N.* —
72. **astragali** Pk. — Kref. (*F.*) — Kob. (*B. II.* 205) — Laach. See (Fuß, Berl. E. Z. 62) — Bonn (*R.*) — *H. W. N.* —
73. **virens** Hbst. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B. II.* 206) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Wagner vid. - Urb.) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —
74. **tenue** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

75. **meliloti** Kirb. — *B. Ent. Kl. für Bopp.* - in der Fauna II. 205 nicht wiederholt. — Elbf. (Reitt. vid. - *G.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

76. **loti** Kirb. — Aach., Kref. (*F.*) — Bopp. (*B. II.* 200) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —

77. **columbinum** Germ. — Ahrtal - Samml. Bruck, nicht Kref., wie *B. II.* 204. — Elbf. (*C.*) — Kreuzn. (Schilsky vid. - Heyd.) — Bonn (Fuß) — Kob. (*R.*) — *W. N.* —

— **punctirostre** Gyll. — Fuß, Berl. *E. Z.* 58, für das Ahrtal, zahlreich - in Samml. u. Sammlungsverzeichnis Fuß ganz fehlend — Beckers, *D. E. Z.* 92, für Rheydt [Schmidt Bach] — Nicht *H. W. N.* - in Schilsky II. nur aus Sachsen u. dem Süden u. Osten. —

78. **reflexum** Gyll. — Andernach, Bopp. (*B. II.* 205) — Elbf. (*C.*) — Ahrw. (Geilenk.) — Saarl. (Gabr.) — U. Nahe, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

Rhynchitinae.

Rhynchites Schneid.

1. **betulae** L. — Rhp. (*F.* - bet. L.) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

2. **Mannerheimi** Humm. — Aach., Kref. (*F.* - megacephalus Germ.) - Kref. u. Ahr in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Duisb. (Urb.) — Bonn, Kob. (je 1 - *R.*) — *H. W. N.* —

3. **nanus** Pk. — Aach., Kref. (*F.*) - nicht auch Elbf. [Corn.], wie *F.* angibt, nicht in *C.* — Bonn, Kob., U. Nahe (*R.*) — *H. W. N.* —

4. **tomentosus** Gyll. — Elbf. (Corn. - *C.* - uncinatus Thoms.) — Nev. (Heyd. vid. - de R., Westf. Pr. 98) — Duisb. (Urb.) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — *H. N.* —

5. **coeruleocephalus** Schall. — Herrstein (Tischbein - *B. II.* 172) — Rochusberg b. Bingen, jenseits der Gebietsgrenze [Dorm.] - Belegst. in Samml. *R.* — *N.* —

6. **olivaceus** Gyll. — Bopp. (*B. II.* 456, 176 - ophthalmicus Steph.!) — Elbf. (Corn. - *C.*) - Belegst. aus Samml. Corn. Heyd. vid. — Kleve, Düssdf. (Everts, *D. E. Z.* 92) — Kref. - Samml. Bruck — Stommeln - Samml. Raderm. — Winningen (Bockl.) — Bertrich [1 - Frings] in Samml. *R.* — *H. W. N.* —

7. **cavifrons** Gyll. = pubescens Hbst. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*G.*) — Trier (Mühlf.) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

8. **sericeus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Laach. See, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

9. **germanicus** Hbst. — Aach., Düssdf. (*F.* - minutus Hbst.!) —

— Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — U. Solg. (G. - min. Gyll.) — Kref. (Ulbr.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

10. **aenevirens** Marsh. — Aach., Kref., Bopp. (F. - obscurus Megl.) — Elbf. (C.) — U. Ahr (Heyd.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

11. **interpunctatus** Steph. — Kref. (B.) — Elbf. (1 - C. - alliariae Pk.) — Aach. (G. - all. Pk.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

12. **pauillus** Germ. — Aach., Kref. (F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Kref. [Ulbr.], Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

13. **aequatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Düssdf., Gerolstein (G.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

14. **cupreus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

15. **coeruleus** Deg. — Rhp. (F. - conicus Ill.) — U. Solg. (G.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

16. **auratus** Scop. — Bopp. (B. Ent. Kl.) — Kreuzn. - Samml. Bruck — Saffenburg a. d. Ahr [1 - Reichensp.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

17. **Bacchus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F. - auch laetus Schüpp.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Byctiscus Thoms.

1. **populi** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

2. **betulae** L. = betuleti F. — Rhp. (F. - betuleti F.) — Elbf. (C. - alni Müll.) — Nev. (de Rossi - G. - v. fastuosus de Rossi) — U. Ahr (Heyd.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **violaceus** Scop. — U. Ahr. (Heyd.) — Bonn, St. (R.) — *N.* —

Attelabus L.

1. **nitens** Scop. — Rhp. (F. - curculionoides L.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Apoderus Ol.

1. **coryli** L. — Rhp. (F.) u. Elbf. (C.) - jedenfalls nur a avellanae, die aus Rhp. allein in den Samml. — Stammform auch nicht *H. W. N.* —

a. **avellanae** L. — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Nemonychidae.

Rhinomacer F.

1. **attelaboides** F. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. (Ulbr.) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Trier (Mühlf.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

Diodyrrhynchus Schönh.

1. **austriacus** Ol. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck u. [von Ulbr.] Samml. R. — Düssdf. (*B.*) — Benrath (*G.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Trier (Mühlf.) — Bonn (1 - R.) — *H. W. N.* —

Ipidae.

Eccoptogastrini.

Eccoptogaster Hbst.

1. **scolytus** F. = destructor Ol. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kref., Kempen, Hamborn (Borgers in Krefeld, Verh. Nat. Ver. 09 E. S. 34 - mit Reitt. vid.) — St. (R.) — *H. W. N.* —

— **Ratzburgi** Janson — destructor Ol., in *F.* für Aach., Kref., Düssdf., Elbf., nach der damaligen Nomenklatur und *B. II.* 140. 452 hierhin zu stellen - trifft gleichwohl sicher den *scolytus* F. - Ratzb. Jans. auch nicht von Kref. in Samml. Bruck, von Elbf. nicht in Verz. *C.* — Sonst nicht angegeben, doch *H. N.* —

2. **pygmaeus** F. — Düssdf. (Braselm. - *F.*) — Elbf. (Corn. - *C.*) — *H. W. N.* —

3. **mali** Bechst. = *pruni* Ratzb. — Aach., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

v. **piri** Ratzb. — Aach. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — *H. W. N.* —

a. **castaneus** Ratzb. — Kref., Bopp. (*B.* - cast. Koch) — *H. W. N.* —

— **carpini** Ratzb. — Col Neerl. für Rhp. - Quelle? — *W. N.* —

4. **intricatus** Ratzb. — Aach. (*F.* - inur. Koch) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*G.*) — Kref. - Samml. Bruck — Löhndorf (1 - Radern.) — Kob. (1 - R.) — *H. W. N.* —

5. **rugulosus** Ratzb. — Aach., Kref. (*F.* - rug. Koch) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —

6. **multistriatus** Marsh. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. (Borgers in Krefeld, Verh. Nat. Ver. 09 E. S. 34 - mit Reitt. vid.) — Saarl. (Gabr.) — Kob. (1 ♂ - Bockl.) — St. (1 ♂ - R.) — *H. N.* —

v. ulmi Redtb. — *B.* II. 452 für Aach. — Nicht *H. W. N.* - in Schilsky II. sonst nur Österreich. —

Hylesinini.

Phloeophthorus Wollast.

1. *rhododactylus* Marsh. — Aach. (daher nach einem Stück beschrieben - *F.* - *Polygr. tarsalis* Först.) — Bopp. (*B.* II. 145) — Laach. See - Samml. Bruck — Montjoie (R.) — *H. W. N.* —

Phthorophloeus Rey.

1. *spinulosus* Rey = *rhododactylus* Chap. et auct. — Aach. (Först. - *F.* - *rhododact.* Marsh.!) — *H.* —

Phloeosinus Chap.

1. *thujae* Perr. — Kreuzn., in Gärtnereien in alten Thuja-Stämmen von Paul Weise gfd. (Weise briefl.) — *N.* —

Hylesinus F.

1. *crenatus* F. — Aach., Kref. (*F.*) - Kref. in Samml. Fuß — Elbf. (*C. u. G.*) — Duisb. (Urb.) — Kochem (R.) — *H. W. N.* —

2. *oleiperda* F. — Saarl. (von Degenhardt - Heyd.) — Laach. See (1 - Heyd. vid. - R.) — *H. N.* —

3. *fraxini* Pz. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Myelophilus Eichh.

1. *piniperda* L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

2. *minor* Hartig — Aach. (Först. - *F.*) — *H. N.* —

Dendroctonus Er.

1. *micans* Kugel. — Hertogenwald b. Eupen (Brink) — Soon (R.) — Nach Zeitungsangaben um 1894 im Gebiet des Maifelds schädlich. — *W. N.* —

Hylastinus Bed.

1. *obscurus* Marsh. = *trifolii* Müll. — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Sayntal, Laach. See, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Kissophagus Chap.

1. *hederae* Schmidt — Bopp. (*B.*) — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — *N.* —

— *pilosus* Ratzb. — *F.* für Aach. [Först. - *pilos.* Knoch] — *W.*, nicht *H. N.* —

Carpoborus Eichh.

1. *minimus* F. — Aach. (Först. - *F.*) — Düssdf. (Hildebr. - *F.*) — *H. N.*, *W.*? —

Polygraphus Er.

1. **pubescens** F. — Bopp. (*B.* II. 452) — Elbf. (*Corn.* - *C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Soon (*R.*) — *W. N.* —

Hylurgus Latr.

1. **ligniperda** F. — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Kottenforst [Frings] in Samml. *R.* — *H. W. N.* —

Hylastini.

Hylastes Er.

1. **ater** Pk. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, St. (*R.*) — *H. W. N.* —

2. **cunicularius** Er. — Elbf. (*C.*) — Soon (*R.*) — *H. W. N.* —

3. **linearis** Er. — Elbf. (1 - Geilenk. - *C.*) - Belegst. aus Samml. *Corn.* Heyd. vid. — *H. N.* —

4. **angustatus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Bonn, Soon (*R.*) — *H. W. N.* —

v. **attenuatus** Er. — Düssdf. (*F.*) — Saarbr. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Duisb. (*Urb.*) — Kref. (*Ulbr.*) — Bonn, Soon (*R.*) — *H. W. N.* —

5. **opacus** Er. — Aach. (*F.* - op. III.) — Saarbr. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck. — *H. W. N.* —

— **glabratus** Zett. — Elbf. (1 - Eppelsh. vid. - *G.*) - ob eingeschleppt? - nicht *H. W. N.* - sonst über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

6. **palliatu**s Gyll. — Elbf. (*C.*) — Duisb. (*Urb.*) — Düssdf. (*Hens.*) — Kob. (Bockl.) — H. Venn [le Roi], Soon (*R.*) — *H. W. N.* —

Crypturgus Er.

1. **pusillus** Gyll. — *G.* für Elbf., in Staubpilzen, sehr häufig [Drescher u. Ostheide] - die Aufenthaltsangabe macht die Bestimmung zweifelhaft — Brohltal (*Andr.*) - Belegst. Reitt. vid. — *H. W. N.* —

[**cinereus** Hbst. — Col. Neerl. für Rhp. — Nicht *H. W. N.* - sonst über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —]

Thamnurgus Eichh.

1. **Kaltenbachi** Bach — Bopp. (*B. Ent. Kl.*) - vielleicht nur rechtsrheinisch [nach *N.* 379] — Aach. (Kaltenb., *Verh. Nat. Ver.* 62 S. 73) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Pfaffendorf b. Kob. (Bockl.) — *N.* —

Ipini¹⁾.**Cryphalus** Er.

1. **abietis** Ratzb. — *F.* für Bopp. [Bach] - in *B.* nicht für

1) *Bostr. carinatus* Waltl., in *F.* für Homberg [Pliester], blieb ungedeutet. —

Rhp. — Nev. (de Rossi - *G.* - *tiliae* Gyll.) — Löhndorf [Raderm.] in Samml. R. - Reitt. vid. — *H. W. N.* —

2. **fagi** F. — Bopp. (*B.* II. 133 - *fagi* Nördl.) - daher (Heyd.) — Elbf. in Samml. Corn. unter anderer Art - Hubenth. vid. — *H. W. N.* —

3. **tiliae** Pz. — Elbf. (*C.*) — Jülich (von Eichhoff - Heyd.) — *H. W. N.* —

[**granulatus** Ratzb. — *F.* für Düssdf. [Hildebr.] - in Samml. Hildebr. fehlend (Miss. Steyl) - nicht *H. W. N.* - im Norden u. Osten [Schilsky II.] —]

4. **asperatus** Gyll. — Rhp. (Zebe) — Rhp. (Letzner - Samml. Gabr.) — Rheinland (Hagedorn, Münch. Kol. Z. II. 231) - wie Anfrage ergab, daher in Samml. Koltze durch Rechnungsrat Degenhardt gelangt - Fundort wohl, wie bei *Agrilus* Guerini, Saarl. — *H. W. N.* —

Pityophthorus Eichh.

1. **Lichtensteini** Ratzb. — Ahrw. (Hubenth. vid. - Geilenk.) — *N.* —

2. **ramulorum** Perr. — Pyrmont i. oberen Eltztal (Everts - Col. Neerl.) — *H.* —

3. **micrographus** L. — Aach. (*F.* - *pityogr.* Ratzb.) — Elbf. (*C.*) — Borbeck, Kref. (Hubenth. vid. - Geilenk.) — *W. N.* —
— **exsculptus** Ratzb. — Trédl, Entomol. Blätter 1907 S. 42, für Rheinland - weiteres nicht bekannt. — *N.* —

Pityogenes Bed.

1. **chalcographus** L. — Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Horchheim (Mühlf.) — Brohltal (♂♀ - Andr.) — Soon (in Menge - Reitt. vid. - R.) — *W. N.* —

2. **bidentatus** Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.* - *bidens* F.) — Kref. - 1 ♂ - Samml. Ulbr. — Elbf. (*C.*) - daher im Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — U. Ahr. (Heyd.) — Horchheim [1 ♂ - Mühlf.] in Samml. R. — *H. W. N.* —

Ips Deg. = **Bostrychus** F.

1. **sexdentatus** Boerner — Aach., Kref. (*F.* - *stenographus* Dft.) - Kref. in Samml. Bruck — Hild. H. (Geilenk.) — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —

[**amitinus** Eichh. — Schilsky II. für Rhp. - Quelle? - nicht *W. N.*, in *H.* —]

2. **typographus** L. — Elbf. (1 - Corn. - *C.*) — Kob. (1 - Bockl.) — *W. N.* —

— **acuminatus** Gyll. — *F.* für Aach. [Först.] — *C.* für Elbf. [1 - Corn.] - Belegst. aus Samml. Corn. verloren. — Nicht *H. N.* -

W. 239 anscheinend mit Bedenken - sonst über ganz Deutschl. [Schilsky II.] -

3. **laricis** F. - Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Elbf. (C.) - Bonn, St. (Reitt. vid. - R.) - *H. W. N.* -

4. **suturalis** Gyll. - Kref. (F. - sut. Dej.) - Elbf. (C.) - Belegst. aus Samml. Corn. Reitt. vid. - Nev. (G.) - Duisb. (Urb.) - *H. W. N.* -

5. **curvidens** Germ. - Elbf. (1 - C.) - Nev. (G.) - Kob. (Bockl.) - *W. N.* -

Taphrorychus Eichh.

1. **bicolor** Hbst. - Aach., Düssdf. (F.) - *W. N.* -

Xylocleptes Ferr.

1. **bispinus** Dft. - Aach. (F.) - Bopp. (B.) - daher u. Düssdf. in Samml. Bruck - Elbf. (G.) - Bonn, Kob., St. (R.) - *H. W. N.* -

Dryocoetes Eichh.

1. **autographus** Ratzb. - Elbf. (C. u. Geilenk.) - Duisb. (Urb.) - Brohlthal (Andr.) - Bonn [Frings], St. Goar (R.) - *H. W. N.*

2. **alni** Georg - Eupen (2 - Heym.) - Deutschl., Frankreich [Cat. Col.] -

3. **villosus** F. - Kref., Düssdf. (F.) - Elbf. (C.) - Jülich (Eichh., Berl. E. Z. 66) - Duisb. (Urb.) - Bonn [Frings], Düssdf. [Hens.] in Samml. R. - *H. W. N.* -

4. **coryli** Perris - Elbf. (1 - Eichh. det. - C. - u. Eichh., Berl. E. Z. 64) - Brohlthal (1 - Reitt. vid. - R.) - *W. N.* -

[**Coccotrypes** Eichh.

dactyliperda F. - Aach. (F.) - Bopp. (B. II. 135) - *W.* - u. durch den Handel über Europa verschleppt [Cat. Col.] -]

Xyleborus Eichh.

[**cryptographus** Ratzb. - Col. Neerl. für Rhp. - doch nur *N.* -]

1. **Saxeseni** Ratzb. - Aach., Düssdf., Bopp. (F.) - Aach. in Samml. Bruck - Elbf. (C.) - Sayntal, Kob., Soon (R.) - *H. W. N.* -

2. **dryographus** Ratzb. - Bopp. (B.) - daher in Samml. Bruck - Elbf. (C.) - Laach. See (R.) - *W. N.* -

3. **monographus** F. - Bopp. (B.) - Kob. (Bockl.) - Col. Neerl. für Düssdf. - *W. N.* -

4. **dispar** F. - Aach., Kref., Düssdf. (F. - disp. Hellw.) - Elbf. (C.) - Horchheim (B.) - Bonn, Kob., St. (R.) - *H. W. N.* -

Xyloterus Er.

1. **domesticus** L. — Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C. u. G.*) — St. (*R.*) — *H. W. N.* —
 2. **signatus** F. — Elbf. (*C. u. G.*) — Düssdf. (von Crumbach zahlreich gfd. - Fuß, Berl. E. Z. 65 - quercus Eichh.) — *W.* —
 3. **lineatus** Ol. — Aach. (*F.* - lin. Gyll.) — Elbf. (*C.*) — Soon (*R.*) — *H. W. N.* —

Platypini.

Platypus Hbst.

1. **cylindrus** F. — Bopp. (*B.*) — Soon (v. Geyr) — Kob. (1 - *R.*) — *W. N.* —

Lucanidae.

Lucanini.

Lucanus L.

1. **cervus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hamborn (Schneid.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., Soon (*R.*) — *H. W. N.* —
 v. **capreolus** Füssl. — Elbf. (*G.*) — Ahrtal (Heyd., Societ. entomol. 97) — Kob. (Bockl.) — Bonn (*R.*) — *H. W. N.* —
 v. **pentaphyllus** Reiche — Ahrtal (Übergangsstücké zur Stammform - Fuß, Berl. E. Z. 65) — Hessen u. a. [Schilsky II.] —

Dorcus Mac Leay.

1. **parallelepipedus** L. — Aach, Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Nev., U. Solg. (*G.*) — Marxloh (Schneid.) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —

Systemocerus Weise = **Platycerus** auct.

1. **caraboides** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Nev. (*G.*) — Mörs (Schneid.) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. W. N.* —
 v. ♀ **rufipes** Hbst. — Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — St. (*R.*) — *H. W. N.* —

Sinodendrini.

Sinodendron Hellw.

1. **cylindricum** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohlthal, Kob., Soon (*R.*) — *H. W. N.* —

Scarabaeidae.

Troginæ.

Trox F.

1. **perlatus** Goeze — Düssdf., Bopp., Kreuzn. (*F.*) — Landskron (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (*R.*) — *H. N.* —

2. **sabulosus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Trier (Mühlf.) — Siegm. [Frings], Bonn, Trier (R.) — *H. W. N.* —
3. **hispidus** Laichart. — Kob. (1 - Bockl.) — *H. W. N.* —
4. **scaber** L. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kreuzn. (Heyd.) — Bonn, St. (R.) — *H. W. N.* —
5. **Perrisi** Fairm. — U. Ahr (1 - Heyd. - nicicola Bonn.) — Nicht *H. W. N.* - Aschaffenburg [Flach, D. E. Z. 79 - Haroldi n. sp.] u. Frankreich [Cat. Col.]
- [Eversmanni Kryn. — Col. Neerl. für Rhp. - doch nur *N.* —]

Coprophagi.

Aphodiini.

Psammobius Heer.

[*porcicollis* Ill. — *F.* für Düssdf. [Braselm.] - von *B.* nicht aufgenommen - nicht *H. W. N.* - Südeuropäer. —]

1. **sulcicollis** Ill. — Kref., Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — U. Solg. (*G.*) — Duisb. (Heym.) — Bonn (1 - J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Rhysemus Muls.

1. **asper** F. — Aach., Kref. (*F.* - *germanus* L.) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn (2 - J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —

Diastictus Muls.

— **vulneratus** Stm. — *W. N.*, in *H.* bei Roermond an der Gebietsgrenze - wohl in Rhp. noch aufzufinden. —

Pleurophorus Muls.

1. **caesus** Pz. — Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Bonn (1 - J. Dan. vid. - R.) — *H. N.* —

Oxyomus Lap.

1. **silvestris** Scop. — Rhp. (*F.* - *porcatus* F) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Aphodius Ill.

1. **erraticus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (R.) — *H. W. N.* —
2. **subterraneus** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — St. (R.) — *H. W. N.* —
- a. **fuscipennis** Muls. — Saarl. (Gabr.) — *N.* —
3. **fossor** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Sayntal, Manderscheid, Daun, St. (R.) — *H. W. N.* —
- a. **silvaticus** Ahr. — Elbf. (1 - *G.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — *W. N.* —

4. **haemorrhoidalis** L. — Rhp. (F.) — Elbf., U. Solg. (G.) — H. W. N. —
5. **brevis** Er. — Walporzheim (Fuß) — Trier (2 - Mühlf.) — H. W. —
6. **foetens** F. — Kref., Düssdf., Bonn, Bopp. (F.) — U. Solg. (G.) — H. W. N. —
7. **fimetarius** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —
8. **scybalarius** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Duisb. (Urb.) — H. W. N. —
- a. **conflagratus** Ol. — Rheydt (Beckers, D. E. Z. 92) — Saarl. (Gabr) —
9. **granarius** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — H. W. N. —
- a. **Ragusanus** Reitt. — Kreuzn., U. Nahe (Reitt. vid. - R.) — [hydrochoeris F. — Erichs., Ins. D. III. 821 für Rheinl. u. Westf. - F. für Elbf. [Corn.] - so auch B. I. 354 — Angaben schon in W. 147 berichtet, doch in C. noch für Elbf. — Was jetzt an Belegst. in Samml. Corn. sich befindet, ist sordidus. — Nicht H. W. N. - Südeuropäer. —]
10. **sordidus** F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — St. (Reitt. vid. - R.) — H. W. N. —
- v. **quadripunctatus** Pz. — U. Nahe (Reitt. vid. - R.) — N. —
11. **rufus** Moll. — Düssdf., Bopp. (F. - rufescens F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — H. W. N. —
12. **lugens** Creutz. — Strotzbüsch i. Eifel (1 - Schilsky vid. - R.) — Belgisch Luxemburg [Col. Neerl.] u. W. —
13. **nitidulus** F. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — Nev. (C.) — Gerolstein (R.) — H. W. N. —
14. **ater** Deg. — Kref. (F. - terrestris F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — H. W. N. —
- v. **convexus** Er. — Nev. (de Rossi - G.) — H. —
15. **corvinus** Er. — Duisb. (1 - Urb.) - jetzt in Samml. R. — Bonn (1 - J. Dan. vid. - R.) — Laach. See (1 - R.) — Nicht H. W. N. - im Süden u. Osten [Schilsky II.] —
16. **varians** Dft. — Düssdf. (Braselm. u. Hildebr. - F. - bima- culatus F.) - in B. I. 356 das Fehlen in Rhp. betont, doch Düssdf. sicher richtig, da bei Kref. die a. ambiguus. — H. W. N. —
- a. **ambiguus** Muls. — Kref. - 1 - Samml. Bruck als niger Stm. - Belegst. Reitt. vid. —
17. **plagiatus** L. — Aach. (Först. - F.) — H. W. —
18. **niger** Pz. — Elbf. (1 - C.) — Kob., U. Nahe, St. (J. Dan. vid. - R.) — H. N. —

19. *rhododactylus* Marsh. — U. Nahe (1 - J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
20. *merdarius* F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Wesel (Gabr.) — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Bonn (J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
21. *scrofa* F. — Aach., Kref., Bopp. (*F.*) - Kref. in Samml. Bruck — Elbf., U. Solg. (*G.*) — Kob. (Bockl.) — Trier (Schnur) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
22. *tristis* Pz. — Aach., Kref. (*F.* - trist. Zenk.) - Kref. in Samml. Bruck — U. Solg. (*G.*) — Ahrw. - Samml. Fuß - Belegst. Heyd. vid. — *H. W. N.* —
23. *pusillus* Hbst. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — *H. W. N.* —
- v. rufulus* Muls. — Elbf. - Samml. Corn. - Belegst. Heyd. vid. —
24. *quadrinaculatus* L. — Aach. (*F.*) — Nev. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Brohltal (Andr.) — Kob. (Bockl.) — Strotzbüsch i. Eifel (1 - J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* —
25. *biguttatus* Germ.
- a. similis* Schilsky — Bonn (1 - J. Dan. vid. - R.) — Belg., *N.* — [*obscurus* F. — *F.* für Kref. [vom Bruck] - daher nicht in Samml. Bruck - nicht *H. W. N.* —]
26. *porcus* F. — Kref. (*F.*) - daher in Samml. Bruck — Bopp. (*B. I.* 361) — Elbf. (*C.*) — *H. W. N.* —
27. *pictus* Stm. — Elbf. (1 - *G.*) - Belegst. aus Samml. Geilenk. Heyd. vid. — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —
28. *sticticus* Pz. — Aach., Kref. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Brohltal (Andr.) — Laach. See, Kob. (je 1 - J. Dan. vid. - R.) — *H. W. N.* — [*conspureatus* L. — *F.* für Kref. (Mink u. vom Bruck) - schon von *B. I.* 359 nicht aufgenommen - in Samml. Bruck u. [Lange briefl.] Samml. Mink nicht aus Rhp. — *N.* —]
29. *melanostictus* Schmidt — Ahrw. (Fuß) - Belegst. Heyd. vid. — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl.) — *H. W. N.* —
30. *inquinatus* Hbst. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —
- a. nubilus* Pz. — Saarl. (Gabr.) —
31. *tessulatus* Pk. — Düssdf. (*F.*) — Bopp. (*B.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Bockl.) — Trier (Mühlf.) — Saarl. (Gabr.) — Laach. See, St. (R.) — *H. W. N.* —
32. *obliteratus* Pz. — Kref. - Samml. Bruck — Ahrw. (Fuß) - Belegst. Heyd. vid. — *H. W. N.* —
33. *contaminatus* Hbst. — Aach., Kref., Düssdf. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kob. (Preiß) — Viersen [le Roi], Bonn (R.) — *H. W. N.* —
34. *prodromus* Brahm — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

— **pubescens** Stm. — *G.* für Elbf. [1 - Drescher u. Ostheide] mit? — Nicht *H. N.* - für *W.* angegeben - anscheinend mehr im Süden. —

35. **punctatosulcatus** Stm. — Nach *B. I.* 363 überall gemein — Elbf. (*C.*) — Saarl. (Gabr.) — *H. W. N.* —

a. **marginalis** Steph. — Saarl. (Gabr.) — *N.* —

— **consputus** Creutz. — *F.* für Düssdf. [Braselm. u. Hildebr.] u. Elbf. [Corn.] - nicht in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl) - von Elbf. nicht in Verz. *C.* — *G.* für Elbf. [Drescher u. Ostheide] — Nicht *H. N.*, *W.* 146 anscheinend mit Vorbehalt - sonst über ganz Deutschl. [Schilsky II.] —

[**bimaculatus** Laxm. — *F.* für Düssdf. [Braselm. u. Hildebr. - bipunctatus *F.*] - in *B. I.* 356, vielleicht gegenüber *F.*, das Fehlen in Rhp. betont - nicht in Samml. Hildebr. (Miss. Steyl). — Nicht *H. W. N.* — im Süden u. Osten [Schilsky II.] —]

36. **rufipes** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn, Schneifel [le Roi], Nettetal (R.) — *H. W. N.* —

37. **luridus** F. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Kref. - Samml. Bruck — Kob. (Bockl. u. R.) — *H. W. N.* —

a. **nigripes** F. — Brohltal (1 - Andr.) - Belegst. Hubenth. vid. — *N.* —

38. **depressus** Kugel. — Aach., Bopp. (*F.* - depr. *F.*) — *F.* für Kref. [vom Bruck] u. Elbf. [Corn.] - nach Samml. Bruck und Verz. *C.* unrichtig. — *H. W. N.* —

a. **atramentarius** Er. — St. (R.) —

Heptaulacus Muls.

1. **testudinarius** F. — Düssdf. (*F.*) — U. Solg. (*G.*) — Trier (Mühlf. u. R.) — *H. W. N.* —

Aegialiini.

Aegialia Latr.

1. **rufa** F. — Kref. (vom Bruck - *F.*) - Fundstelle Rheinufer [Erichs., *Ins. D.* III. 919] — Düssdf., Rheinufer (Braselm. - Fuß) - daher in Samml. Fuß — Hild. H. (1 - Geilenk.) — *H., W.* [1 Stück], *N.* [Mainz, Schierstein] —

[**sabuleti** Pk. — Schilsky I. u. II. für Rhp. - auch in die *Fauna Germanica* übergegangen - Quelle? — Vorkommen nicht nachweisbar, sicher auch unrichtig - nicht *H. W. N.* —]

Geotrupini.

Odontaeus Klug.

1. **armiger** Scop. — Rhp. (*F.* - mobilicornis *F.*) — Elbf. (*C.*) — Aach. (Urb) — Soon (v. Geyr) — M.-Gladbach, Bonn, Siegm. d. g. [Frings u. le Roi], Eltztal (R.) — *H. W. N.* —

Ceratophyus Fisch.

1. **Typhoeus** L. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Marxloh (Schneid.) — Duisb. (Urb.) — Siegburg (Voigt) — Brohltal (Andr.) — Kottenforst (R.) — *H. W. N.* —

Geotrupes Latr.

1. **mutator** Marsh. — Aach. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Mülheim a. Rhein (Geilenk. - v. chlorophanus Westh.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

2. **spiniger** Marsh. — Aach. (*F.* - putridarius Eschh.) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

3. **stercorarius** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Hild. H. (Geilenk.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —

- v. **foveatus** Marsh. — Elbf. (1 - *C.*) — Nev. (de Rossi - *G.*) — Kleve - Samml. Fuß. — *W.* —

4. **niger** Marsh. = hypocrita Serv. — Ohligs (Geilenk. - *C.*) — Hild. H., häufig (*G.*) - daher in Samml. R. - J. Dan. vid. — Belg. u. *H. W.* verbr. — In Rhp., wie auch in *W.* nach *W. XIV*, erst in neuerer Zeit aus dem Norden eingewandert, noch nicht in *B.* —

5. **stercorosus** Scrib. = silvaticus Pz. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — Angabe der v. nigrinus Muls. in *G.* für Elbf. nach Mitteilg. Geilenk. unrichtig. — *H. W. N.* —

6. **vernalis** L. — Aach., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Hild. H., U. Solg. (*G.*) — Kob. (Bockl.) — Wahner Heide, Bertrich [Frings], Strotzbüsch (R.) — *H. W. N.* —

Coprini.

Gymnopleurus Ill.

- [**Mopsus** Pall. — Schnur für Trier [pilularius Hbst.] - in Süden u. Osten [Schilsky II.] —]

- **cantharus** Er. — B. I. 341 für Bingen - vielleicht Fund von Bach, den *F.* für seinen hierhin gehörigen Mopsus Pall. von Bingen als Gewährsmann anführt. — *N.* [Mainz] - an der U. Nahe vielleicht noch aufzufinden. —

Sisyphus Latr.

1. **Schäfferi** L. — Hunsrück (B. I. 342) — Gerolstein, 1888 (1 - Geilenk.) - dort, 1878 (1 - R.) — Belg. [Col. Neerl.], *N.* —

Onitocellus Serv.

1. **fulvus** Goeze — Saarbr. (*B.* - flavipes *F.*) — Trier (Schnur) — Belg. [Col. Neerl.], *N.* —

Onthophagus Latr.

1. **Amyntas** Ol. — *F.* für Homberg [Pliester-Hübneri *F.*] — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß — Bertrich (Leyd., Verh. Nat. Ver. 81) — *N.* [1] —

2. **taurus** Schreb. — Mörs, Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — U. Solg. (G. - rugosus Poda) — Hild. H. (Geilenk.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

3. **ovatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

4. **semicornis** Pz. — Ahrw. - 1 - Samml. Fuß — *N.* —

5. **verticicornis** Laich. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F. - nutans F.) — U. Solg. (G.) — Soon (v. Geyr u. R.) — *W. N.* —

6. **fracticornis** Preysl. — Rhp. (F. - fract. F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, Kochem (R.) — *H. W. N.* —

7. **coenobita** Hbst. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kref. - Samml. Bruck — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

8. **lemur** F. — Laach. See (Fuß) — Kob. (Bockl. u. Preiß) — *W. N.* —

9. **vacca** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — *H. W. N.* —

v. **medius** Pz. — Elbf. (C.) — Kleve - Samml. Fuß — *W.* —

10. **nuchicornis** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Caccobius Thoms.

1. **Schreberi** L. — Bonn (Förs. - F.) - in Samml. Förs. ohne Fundort - von Bonn auch nicht weiter bekannt geworden - doch wohl richtig, da *H. W. N.* — Trier (Schnur) —

Copris Geoffr.

1. **lunaris** L. — Rhp. (F.) — Düssdf. (B.) — Kleve, Düssdf. (Fuß) — Wesel (Geilenk.) — Trier (Schnur) — vor Jahrzehnten auch auf dem Rodderberg (de Maes, Bonn) — *H. W. N.* —

Sericinae.

Serica Mac Leay.

1. **brunnea** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Trier (Mühlf.) — Bonn, Kob., U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Maladera Muls.

1. **holosericea** Scop. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Brohltal (Andr.) — Bonn, U. Nahe (R.) — *H. W. N.* —

Homaloplia Steph.

— **ruricola** F. — Schnur für Trier — Elsaß [Schilsky II. - die v. atrata Geoffr.] - daher wohl richtig. — *W. N.* —

Melolonthinae.

Rhizotrogus Latr.

1. **marginipes** Muls. — Duisb. (häufig - Heym.) — *N.* —

v. **foveolatus** Bach — Kob., Bopp. (B. I. 334) - daher beschrieben, Stett. E. Z. 50, unter Betonung des Unterschieds von

der in die Fauna aufgenommenen Stammform · nur auf den Höhen des Rheintals u. dem Hunsrück (Berl. E. Z. 58. S. 269) Bopp. in Samml. Bruck — Kob. in Samml. Fuß — Duisb. (Heym.) —

2. *aestivus* Ol. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — U. Ahr b. Heimersheim, häufig (Heyd.) — Brohltal (Andr.) — Trier (Mühlf.) — W. N. —

Amphimallus Latr.

1. *solstitialis* L. — Aach., Kref., Bopp., Düssdf. (F.) - Kref. in Samml. Bruck — Ruhrort, U. Solg. (G.) — U. Ahr (Heyd.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

v. *ochraceus* Knoch — Kob.-Lützel (1 - Bockl.) - Belegst. Heyd. vid. — N. —

2. *ater* Hbst. — Aach. (F.) — Bopp. (B.) — U. Ahr, auf dem Gipfel der Landskron, Ende Juni frühmorgens (Heyd.) — Gerolstein (Geilenk.) — Kaisersesch (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Strotzbüsch u. Brockscheid i. Eifel (R.) — H. N. —

3. *ruficornis* F. — Kref. (F.) — Aach., Kob., Bopp., Sobernheim (B.) — Wesel - Samml. Fuß — U. Ahr (1 - b. Heimersheim-Heyd.) — Brohl (Frings) — Laach. See - Samml. Bertkau — U. Nahe (R.) — H. W. N. —

4. *assimilis* Hbst. — Karthause b. Kob. (von Wirtgen - Heyd.) — Melbtal b. Bonn (1 - Heyd. vid. - R.) — Nicht H. W. N. - Elsaß, —

Melolontha F.

1. *hippocastani* F. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) - Kref., Kleve in Samml. Bruck — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Finken-berg b. Beuel u. Tannenbusch b. Bonn (Frings) — Kob. (Bockl.) — Bonn (R.) — H. W. N. —

v. *nigripes* Com. — Kleve - Samml. Bruck. — H. N. —

2. *vulgaris* F. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

a. *albida* Redtb. — Saarl. (Gabr.) — Elbf. (Geilenk.) — W. N. —

a. *pulcherrima* D'Torre — Saarl. (Gabr.) — W. —

a. *lugubris* Muls. — Elbf. (3 - G.) — Kob., Jünkerath (Bockl.) — W. N. —

a. *discicollis* Muls. — Kob. (Bockl.) —

a. *ruficollis* Muls. — Kob. (Bockl.) — W. N. —

3. *pectoralis* Germ. — Kob. bis über die Gebietsgrenze rheinaufwärts, bei Bopp. ziemlich häufig (B. - albida Dej. - Verh. Nat. Ver. II. 19 - rhenana Bach) — Ahrw. [Fuß] u. Kreuzn. (Heyd.) — Laach See (Fuß, Berl. E. Z. 59, u. R.) — Kob. (Bockl.) — N. —

Polyphylla Harr.

fullo L. — In H. N. verbr., nicht in W., fehlt in Rhp. —

Soll bei Düssdf. vorkommen, was Fuß verneint; auch Geilenk. in Hild. H. kennt ihn nicht aus Rhp. —]

[**Anoxia** Lap.

villosa F. — Col. Neerl. für Rhp. - Irrtum, beruhend auf Fund bei Mainz [Ev. briefl.] --]

Hopliinae.

Hoplia Ill.

1. **praticola** Dft. — Trier (Schnur) - dort zahlreich (Mühlf.) - Belegst. in Samml. R. - Heyd. vid. — N. —

2. **philanthus** Füll. — Aach., Kref., Bopp. (F.) — Elbf. (C.) — Kob. (Bockl.) — Trier (Schnur-argentea F.) — Saarl. (Heyd. - ripicola Muls.) — Gerolstein, U. Nahe (R.) — H. W. N. —

3. **farinosa** L. — H. Venn (Fred.) — U. Ahr b. Heimersheim (1 - Heyd.) — Rheinland ohne näheren Fundort - Samml. Bertkau - Belegst. Heyd. vid. — N. —

— **graminicola** F. — Schnur für Trier — W. N., u. über ganz Deutschl. [Schilsky II.] - daher wohl möglich. —

Rutelinae.

Anomala Sam.

1. **aenea** Deg. — Kref., Düssdf. (F. - Frischi F.) — Bopp. (B.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (G.) — Borbeck (Geilenk.) — Kob. (Bockl.) — Kordel b. Trier [le Roi], Bonn (R.) — H. W. N. —

a. tricolor D'Torre — Saarl. (Gabr.) — Bonn, U. Nahe (R.) — [vitis F. — F. für Düssdf. [Braselm.] - schon in B. I. 411 bezweifelt - nicht H. W. N. - im Süden. —]

Phyllopertha Kirb.

1. **horticola** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — M.-Gladbach, Bonn, Kob., St. (R.) — H. W. N. —

a. ustulatipennis Villa — Duisb. (1 - Reitt. vid. - Heym.) —

Anisoplia Serv.

1. **segetum** Hbst. — Kref., Düssdf. (F. - fruticola F.) - Kref. nicht in Samml. Bruck — U. Solg. (v. Hagens - G.) — H. W. N. —

2. **agricola** Poda — Kleve, Laach. See (Fuß) — Wahner Haide (Frings) — Winingen (Bockl.) — Kreuznach - Samml. Bruck — U. Nahe (R.) — H. W. N. —

[Dynastinae.]

[**Oryctes** Ill.

nasicornis L. — H. W. N. — für Rhp. nicht nachweisbar u., wie schon B. I. 323 bemerkt, wohl fehlend - nicht Aach. [Frings], Ahrw. [Fuß], St. [R.], Orten mit viel Gerbereibetrieb. —]

Valginae.

Valgus Scriba.

1. **hemipterus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Bonn, Kob., St. (R.) — W. N. —

Trichiinae.

Osmoderma Serv.

1. **eremita** Scop. — Aach., Kref., Düssdf., Bopp. (F.) — U. Solg. (G.) — Orsoy, Marxloh (Schneid.) — Elsenborn, Kob. (Bockl.) — Bonn, im Hofgarten (Bertkau u. Frings) — Sinzig (Andr.) — Trier (Schnur) — H. W. N. —

Gnorimus Serv.

1. **variabilis** L. — Aach., Kref., Düssdf. (F.) — Bopp. (B.) — Mörs (Schneid.) — Borbeck, Rheydt (Geilenk.) — Bonn (Frings) — Kob. (Bockl.) — Trier (Schnur) — W. N. —
 v. **Heydeni** Beckers — Rheydt (daher beschrieben - Beckers, D. E. Z. 88) - dort an der Niers, verbr. (Geilenk.) —
 2. **nobilis** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Hild. H. (Geilenk.) — Mörs (Schneid.) — Kob. (Bockl.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, St. (R.) — H. W. N. —

Trichius F.

1. **fasciatus** L. — Rhp. (F.) — Elbf. (C.) — Nev., U. Ahr (Stammform - Heyd.) — H. W. N. —
 a. **dubius** Muls. — Nev. (von de Rossi - Heyd.) —
 a. **commutatus** de Rossi — Nev. (daher beschrieben - d. R., Verh. Nat. Ver. 82) — N. —
 a. **abbreviatus** Muls. — Nev. (daher beschrieben - de R., Verh. Nat. Ver. 82 - Erichsoni) - daher (Heyd.) —
 a. **pulchellus** de Rossi — Nev. [wie abbreviatus] — Bonn (Heyd. vid. - R.) —
 a. **vulgaris** de Rossi — Nev. [wie abbrev.] — Hohe Acht (Heyd.) — Bonn, Kob. (Heyd. vid. - R.) — N. —
 a. **Fabricii** de Rossi — Nev. [wie abbrev.] — N. —
 a. **abruptus** de Rossi — Nev. [wie abbrev.] —
 a. **succinctus** F. — Nev. (de R., Verh. Nat. Ver. 82) — Kochem (Heyd. vid. - R.) —
 a. **Linnei** de Rossi — Nev. [wie abbrev.] —
 a. **divisus** Muls. [= confluens de Rossi nach Mittelg. Heyd.] — Nev. [wie abbrev.] —
 a. **Beckersi** Geilenk. — Elbf. (daher beschrieben - Geilenk. [nec Schilsky], D. E. Z. 92 S. 207, u. G.) —
 2. **zonatus** Germ. — die Art [Stammform nur im Süden]: Bopp. (B. - abdominalis Mén.!) — Elbf. (C.) — Duisb. (Urb.) — H. W. N. —

v. gallicus Heer — Rheydt (Geilenk.) — Linz, Neuenahr (Heyd.) — Bonn (R.) —

3. **sexualis** Bed. — Kob. (3 ♀ - Bockl.) - Belegst. Heyd. vid. — St. Goar (1 in Samml. Everts - Ev. briefl.) — Frankfurt [Heyd.] — Odenwald, Darmstadt [Ent. Blätter 1909 Nr. 9] - sonst im Osten. —

Cetoniinae.

Tropinota Muls. = **Epicometis** Burm.

1. **hirta** Poda — Bopp. (*F.* - *hirtella* L.) — Laach. See - Samml. Fuß — Kob. (Bockl.) — Finkenberg b. Beuel (R.) — *N.* —

Oxythyrea Muls.

1. **funesta** Poda — Rhp. (*F.* - *stictica* L.) — Elbf. (*C.*) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

Cetonia F.

1. **aurata** L. — Rhp. (*F.*) — Elbf. (*C.*) — U. Ahr (Heyd.) — Saarl. (Gabr.) — Bonn, Kob., St. (R.) — *H. W. N.* —

a. **piligera** Muls. — Kob. (1 - Preiß) - Belegst. Heyd. vid. —

a. **purpurata** Heer — Elbf. (*G.* - *cuprifulgens* Muls.) — *N.* —

Liocala Thoms.

1. **marmorata** F. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F.*) — Neandertal (*G.*) — Bonn, Kob. (R.) — *H. W. N.* —

Potosia Muls.

1. **aeruginosa** Drury = *speciosissima* Scop. — Bopp. (*B.*) — Kob. u. Niederlahnstein, Gebietsgrenze (Bockl.) — Trier (Schnur - *fastuosa* F.) — Horchheim (von einem Koblenzer Sammler - R.) — *N.* —

2. **affinis** Andersch — Meisenheim i. Nahegebiet, Saarbr. (*B.*) - nicht auch Bopp., wie *F.* angibt. — *N.* —

3. **cuprea** F.

v. metallica Hbst. = *floricola* Hbst. — Kref., Düssdf., Bopp. (*F.* - *metallica* F.) — Elbf., Nev. (*C.* u. *G.* - *floricola* Hbst.) — Bonn, Kob. (Reitt. vid. - R.) — *H. W. N.* —

v. Fieberi Krtz. — Düssdf. - 1 - Samml. Fuß - Heyd. vid. — Sonst im Süden u. Osten [Schilsky II.] —

Nachtrag.

- S. 18. Die Eichhoffsche Sammlung ist nach N. Amerika verkauft worden bis auf die Bostrychiden, die noch von Eichhoff für eine wissenschaftliche Arbeit nach Frankreich verschickt waren und dort verschollen sind [Mitteilung des Hauptlehrers Kratz zu Vallendar, Sammelgefährten von Eichhoff in seiner Hambach-Jülicher Zeit.]
- S. 29. 30. *C cancellatus* v. *carinatus* Charp. — daß eine bisher als *car.* Charp. betrachtete Form in der Rheinprovinz bes. um Koblenz verbreitet sei, wird von Born, Entomol. Bl. 1911 S. 138, beiläufig angegeben. —
- S. 41. *Ophonus* 4a. *cordatus* Dft. — Kreuzn. [1 - Reichensp.] in Samml. R. - K. Dan. vid. — *W. N.* —
- S. 51. *Pterost.* 19a. *aethiops* Pz. — Eupen (Heym.) - damit, wie vermüthet, in Rhp. —
- S. 62. *Agab. melanarius* — Hertogenwald [Heym.] —
- S. 73. *Trogophl. punctatellus* Er. — inzwischen noch bei Erpel (1 - Reichensp.) —
- S. 97. *Bryocharis* 3. *inclinans* Grav. — Elbf. (Corn. - *C.*) — Kleve - Samml. Fuß — Brohlthal (Andr.) — Bonn (R.) — *H. W. N.* —
- S. 111. *Ath.* 69a. *myrmecobia* Krtz. — Oberwinter [2- Reichensp.] in Samml. R. - Bernh. vid. — *W. N.* —
- S. 112. *Ath. triangulum* — noch Laach. See (1 - Heym.) —
- S. 114. *Ath.* 101a. *macrocera* Thoms. — Brüggén b. Kempen (1 - Heym.) — Nord- und Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —
- S. 120. *Oxyp.* 5a. *lateralis* Mannh. — Eupen (1 - Heym.) — Nord- u. Mitteleuropa [Ganglb. Käf. M.] —
- S. 135. *Ecanus glaber* F. — der angebliche Fund von Corn. schon von Westhoff [*W.* 109] zu *Agyrtes bicolor* gestellt, doch in *C.* 27 wieder als *Hadrambe glabra*. —
- S. 174. *Monotoma* 4a. *brevipennis* Kunze — Eupen (Heym.) — *N.* verbr. —
- S. 179. *Atomaria* 5a. *diluta* Er. — Eupen (Heym.) — Österreich, Deutschl. u. a. [Ganglb. Käf. M.] —
- S. 222. *Ischnom. sanguinicollis* — Petersberg i. Siebengbg. (Heym.). —
- S. 291. *Liosoma oblongulum* — Fundangabe Hertogenwald zu löschen. —

Verzeichnis der Gattungen.

Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.

- | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| Abax 49. | Amauronyx 126. | Astilbus 117. |
| Abdera 230. | Amphicyllis 138. | Astrapacus 95. |
| Ablattaria 135. | Amphimallus 334. | Atemeles 118. |
| Abraeus 147. | Amphotis 167. | Atheta 106, 338. |
| Absidia 157. | Anacaena 151. | Athous 211. |
| Acalles 298. | Anaesthetis 245. | Atomaria 179, 338. |
| Acalyptus 308. | Anaglyptus 244. | Attagenus 202. |
| Acanthocinus 244. | Anaspis 228. | Attalus 160. |
| Acanthoderes 244. | Anatis 195. | Attelabus 321. |
| Acanthoscelides 275. | Ancylochira 213. | Autalia 104. |
| Achenium 84. | Ancyrophorus 72. | Axinotarsus 160. |
| Acidota 71. | Anisodactylus 46. | |
| Acilius 65. | Anisoplia 335. | Badister 41. |
| Acmaeops 237. | Anisosticta 192. | Bagous 296. |
| Acritus 147. | Anisotoma 137. | Balaninus 307. |
| Acrognathus 72. | Anisoxya 230. | Balanobius 307. |
| Aerolocha 69. | Anobium 220. | Baptolinus 86, 345. |
| Acrotrichis 142. | Anomala 335. | Baris 306 |
| Acrulia 68. | Anommatus 189. | Barynotus 285. |
| Actobius 86. | Anoncodes 222. | Barypithes 281. |
| Acupalpus 44. | Anoplus 310. | Batophila 267. |
| Adalia 192. | Anoxia 335. | Batrisodes 126. |
| Adelocera 205. | Anthaxia 214. | Batrisus 126. |
| Adimonia 263. | Antherophagus 178. | Bembidion 33. |
| Adonia 192. | Anthicus 225. | Berosus 150. |
| Adosomus 288. | Anthobium 68. | Betarmon 210. |
| Adrastus 208. | Anthocomus 161. | Biblioplectus 126. |
| Aegialia 331. | Anthonomus 308. | Bibloporus 126. |
| Aegosoma 236. | Anthophagus 72. | Bidessus 58. |
| Agabus 61, 338. | Anthracus 45. | Blaps 233. |
| Agapanthia 245. | Anthrenus 203. | Blechrus 54. |
| Agaricophagus 137. | Anthribus 276. | Bledius 75. |
| Agathidium 138. | Apate 217. | Blethisa 32. |
| Agelastica 261. | Aphanisticus 216. | Blitophaga 134. |
| Aglenus 188. | Aphidecta 192. | Boletophagus 234. |
| Agonum 52. | Aphodius 328. | Bolitobius 97. |
| Agrilus 215. | Aphthona 268. | Bolitochara 104. |
| Agriotes 207. | Apion 315. | Borboropora 105. |
| Agyrtes 135. | Apistus 189. | Bostrychus F. 325. |
| Aleochara 123. | Apoderus 321. | Bostrychus Geoff. 217. |
| Aleuonota 106. | Apteropeda 271. | Brachida 102. |
| Alexia 190. | Araeocerus 276. | Brachonyx 308. |
| Allecula 231. | Argopus 272. | Brachyderes 283. |
| Allodactylus 299. | Aromia 242. | Brachygluta 126. |
| Allonyx 164. | Arpedium 71. | Brachynus 56. |
| Alophus 290. | Arthrolips 139. | Brachypterus 166. |
| Allosterna 239. | Asaphidion 33. | Brachysomus 281. |
| Alphitobius 235. | Asemum 241. | Brachytarsus 276. |
| Amalus 299. | Asida 233. | Brachyusa 106. |
| Amara 46. | Aspidiphorus 187. | Bradybatus 308. |
| Amarochara 119. | Astenus 81. | Bradycellus 45. |

- Bromius 256.
 Brontes 174.
 Broscus 33.
 Bruchidius 274.
 Bruchus Lin. 274.
 Bryaxis 127.
 Brychius 56.
 Bryocharis 97, 338.
 Bryoporus 96.
 Buprestis 213.
 Bytiscus 321.
 Byrrhus 204.
 Bythinus 127.
 Byturus 165.
- Caccobius 333.
 Caenocara 222.
 Caenocorse 235.
 Caenopsis 278.
 Caenoptera 240.
 Caenoscelis 178.
 Calandra 307.
 Calathus 51.
 Callicerus 116.
 Callidium 242.
 Callimus 240.
 Callistus 40.
 Calodera 119.
 Calosoma 28.
 Calvia 195.
 Calyptomerus 138.
 Campylus 212.
 Cantharis 156.
 Carabus 28, 338.
 Cardiophorus 209.
 Carphoborus 323.
 Carpophilus 166.
 Cartodere 184.
 Cassida 272.
 Cateretes 166.
 Catops 131.
 Cephennium 129.
 Cerambyx 240.
 Cerapheles 161.
 Ceratophyus 332.
 Cercus 166.
 Cercyon 153.
 Cerocoma 227.
 Cerophytum 212.
 Cerylon 190.
 Cetonia 337.
 Ceuthorrhynchidius 300.
 Ceuthorrhynchus 301.
 Chaetarthritis 153.
- Chaetocnema 265.
 Chalcoides 264.
 Chalcophora 213.
 Charopus 160.
 Chennium 128.
 Chilocorus 196.
 Chilopora 119.
 Chlaenius 40.
 Chlorophanus 286.
 Choleva 130.
 Choragus 276.
 Chromoderus 288.
 Chrysanthia 223.
 Chrysobothris 214.
 Chrysochloa 259.
 Chrysomela 257.
 Cicindela 27.
 Cicones 189.
 Cidnorrhinus 299.
 Cionus 313.
 Cis 187.
 Clambus 139.
 Claviger 128.
 Cleonus 288.
 Clerus 164.
 Clitostethus 197.
 Clivina 32.
 Clytanthus 243.
 Clytra 251.
 Clytus 243.
 Cnemidotus 57.
 Cneorrhinus 285.
 Coccidula 198.
 Coccinella 193.
 Coccotrypes 326.
 Coelambus 58.
 Coeliastes 299.
 Coeliodes 298.
 Coelostoma 153.
 Colaphus 256.
 Colenis 137.
 Colobicus 188.
 Colon 132.
 Colydium 188.
 Colymbetes 64.
 Combocerus 182.
 Coniocleonus 287.
 Conopalpus 231.
 Conosoma 97.
 Copelatus 63.
 Copris 333.
 Coprophilus 72.
 Coptocephala 252.
 Coraebus 214.
 Corticaria 184.
- Corylophus 139.
 Corymbites 205.
 Corynetes 164.
 Coryphium 72.
 Coryssomerus 306.
 Cossonus 297.
 Craponius 299.
 Crataraea 122.
 Crenitis 151.
 Creophilus 93.
 Crepidodera 263.
 Crioccephalus 241.
 Crioceris 250.
 Cryphalus 324.
 Cryptarcha 173.
 Crypticus 234.
 Cryptobium 85.
 Cryptocephalus 252.
 Cryptohypnus 208.
 Cryptophagus 176.
 Cryptopleurum 154.
 Cryptorrhynchus 298.
 Crypturgus 324.
 Cteniopus 232.
 Ctesias 203.
 Cucujus 175.
 Cybister 65.
 Cybocephalus 172.
 Cychramus 172.
 Cychnus 27.
 Cylindromorphus 216.
 Cylistosoma 143.
 Cymbiodyta 152.
 Cymindis 55.
 Cynegetis 191.
 Cyphocleonus 288.
 Cyphon 198.
 Cyrtanaspis 228.
 Cyrtusa 137.
 Cytilus 204.
- Dacne 182.
 Dadobia 116.
 Danacaea 163.
 Dascillus 205.
 Dasycerus 183.
 Dasytes 161.
 Deleaster 72.
 Demetrius 55.
 Dendroctonus 323.
 Dendrophagus 175.
 Dendrophilus 145.
 Denops 163.

- Denticollis 212.
 Dermestes 202.
 Derocrepis 263.
 Deroplia 245.
 Diacanthus 206.
 Diachromus 46.
 Dianous 80.
 Diaperis 234.
 Diastictus 328.
 Dibolia 271, 345.
 Dicerca 213.
 Dictyopterus 155.
 Dinarda 123.
 Dinopsis 100.
 Diodyrrhynchus 322.
 Diplocoelus 182.
 Ditoma 188.
 Dolicaon 84.
 Dolichosoma 162.
 Dolichus 52.
 Dolopius 207.
 Domene 83.
 Donacia 247.
 Dorcadion 244.
 Dorcatoma 222.
 Doreus 327.
 Dorytomus 294.
 Drapetes 213.
 Drilus 160.
 Dromaeolus 213.
 Dromius 55.
 Dryocoetes 326.
 Dryophilus 219.
 Dryophthorus 297.
 Dryops 199.
 Drypta 56.
 Dyschirius 32.
 Dytiscus 65.

 Ebaeus 160.
 Ecanus 135, 338.
 Eccoptogaster 322.
 Elaphrus 32.
 Elater 210.
 Eledona 234.
 Elleschus 309.
 Emphylus 178.
 Emus 93.
 Encephalus 102.
 Endomychus 191.
 Enicmus 184.
 Enneathron 188.
 Enoplium 164.
 Epaphius 39.
 Ephistemus 181.

 Epicometis 337.
 Epilachna 191.
 Epipolaeus 291.
 Epithrix 264.
 Epuraea 167.
 Eremotes 297.
 Ergates 236.
 Erirrhinus 294.
 Ernobius 220.
 Esolus 200.
 Euaesthetus 80.
 Eubria 199.
 Eucnemis 213.
 Euconnus 130.
 Euglenes 225.
 Eulissus 86.
 Euplectus 125.
 Euryalea 120.
 Euryporus 96.
 Eurythyrea 214.
 Euryusa 104.
 Eusomus 283.
 Eustrophus 229.
 Euthia 129.
 Exocentrus 245.
 Exochomus 196.

 Falagria 105.
 Feronia 49.
 Formicomus 225.
 Foucartia 281.

 Galeruca 263.
 Galerucella 262.
 Gasterocercus 298.
 Gastrallus 220.
 Gastroidea 256.
 Gauropterus 86.
 Gaurotes 237.
 Geodromicus 71.
 Georyssus 201.
 Geotrupes 332.
 Gibbium 218.
 Glischrochilus 173.
 Globicornis 202.
 Gnathocerus 235.
 Gnathoncus 145.
 Gnorimus 336.
 Gnypeta 106.
 Gonodera 232.
 Goniocetena 259.
 Gracilia 240.
 Grammoptera 239.
 Graphoderes 64.
 Grobbernia 179.

 Gronops 290.
 Grypidius 294.
 Gymnetron 312.
 Gymnopleurus 332.
 Gymnusa 101.
 Gynandrophthalma 251.
 Gyrimus 65.
 Gyrophaena 102.

 Habrocerus 100.
 Habroloma 216.
 Haliplus 57.
 Hallomenus 229.
 Haltica 267.
 Halyzia 195.
 Haplocnemia 245.
 Haplocnemus 162.
 Haploderus 74.
 Harpalus 42.
 Hedobia 219.
 Helichus 200.
 Helms 201.
 Helochares 152.
 Helodes 198.
 Helophorus 147.
 Helops 236.
 Hendecatomus 187.
 Henoticus 176.
 Heptaulacus 331.
 Hermaeophaga 267.
 Hetaerius 145.
 Heterhelus 166.
 Heterocerus 201.
 Heterostomus 166.
 Heterothops 95.
 Hippodamia 191.
 Hippuriphila 265.
 Hispella 272.
 Hister 143.
 Hololepta 143.
 Holoparamecus 186.
 Homaliscus 155.
 Homaloplia 333.
 Homalota 103.
 Homoeusa 122.
 Hoplia 335.
 Hoplosia 245.
 Hydaticus 64.
 Hydriobius 136.
 Hydraena 149.
 Hydrobius 151.
 Hydrochus 148.
 Hydrocyphon 199.
 Hydronomus 296.

- Hydrophilus 150.
 Hydroporus 59.
 Hydrothassa 260.
 Hydrous 150.
 Hygrobia 57.
 Hygronoma 101.
 Hygrotus 58.
 Hylastes 324.
 Hylastinus 323.
 Hylecoetus 217.
 Hylesinus 323.
 Hylobius 290.
 Hylotrupes 242.
 Hylurgus 324.
 Hymenalia 232.
 Hypebaeus 160.
 Hypera 291.
 Hyperaspis 196.
 Hyphydrus 58.
 Hypnoidus 209.
 Hypocassida 272.
 Hypocyrtus 100.
 Hypoganus 207.
 Hypophloeus 235.
 Hypulus 231.

 Idolus 210.
 Ilybius 63.
 Ilyobates 118.
 Ipidia 167.
 Ips Deg. 325.
 Ips Fabr. 173.
 Ischnodes 210.
 Ischnomera 222, 338.
 Isorbipis 213.
 Ityocara 119.

 Kissophagus 323.

 Labidostomis 251.
 Laccophilus 61.
 Laccobius 152.
 Lachnaea 251.
 Lacon 205.
 Laemophloeus 175.
 Laemostenus 51.
 Lagria 231.
 Lamia 244.
 Lamprinus 98.
 Lamprinodes 98.
 Lamprohiza 155.
 Lamprosoma 256.
 Lampyrus 155.
 Langelandia 189.
 Laricobius 165.

 Larinus 289.
 Lasioderma 221.
 Latelmis 200.
 Lathridius 183.
 Lathrimaeum 70.
 Lathrobium 83.
 Lathropus 175.
 Lebia 54.
 Leja 33.
 Leistus 30.
 Lema 250.
 Leptacinus 85.
 Leptidea 240.
 Leptinotarsa 257.
 Leptinus 139.
 Leptura 238.
 Leptusa 104.
 Lepyrus 286.
 Lesteva 71.
 Leucoparyphus 100.
 Leucosomus 287.
 Licinus 41.
 Lignyodes 309.
 Limnebius 153.
 Limnichus 204.
 Limnius 200.
 Limnobaris 307.
 Limnoxenus 151.
 Limobius 293.
 Limonius 211.
 Lina 261.
 Liocola 337.
 Liodes 136.
 Lionychus 54.
 Liophloeus 285.
 Liopus 244.
 Liosoma 291, 338.
 Liparus 290.
 Lissodema 224.
 Litargus 186.
 Lithocharis 82.
 Lixus 288.
 Lochmaea 262.
 Lomechusa 118.
 Longitarsus 269.
 Lorocera 32.
 Lucanus 327.
 Ludius 208.
 Luperus 262.
 Lycoperdina 190.
 Lyctus 217.
 Lygistopterus 155.
 Lymexylon 217.
 Lythrarria 264.
 Lytta 227.

 Macronychus 201.
 Magdalis 314.
 Malachius 161.
 Maladera 333.
 Malthinus 158.
 Malthodes 159.
 Mantura 265.
 Masoreus 54.
 Mecaspis 287.
 Mecinus 312.
 Medon 82.
 Megapenthes 210.
 Megarthrus 67.
 Megasternum 154.
 Megatoma 202.
 Melandrya 231.
 Melanimon 234.
 Melanophthalma 185.
 Melanotus 209.
 Melasia 235.
 Melasis 212.
 Melasoma 261.
 Meleus 290.
 Meligethes 169.
 Meloë 226.
 Melolontha 334.
 Mesocoelopus 222.
 Mesosa 245.
 Metabletus 54.
 Metoecus 227.
 Metopsix 67.
 Miarus 313.
 Micrambe 176.
 Micraspis 194.
 Micrelus 301.
 Microcara 198.
 Microglossa 122.
 Microlestes 54.
 Micropeplus 66.
 Microzoum 234.
 Micrurula 168.
 Minyops 290.
 Mniophila 271.
 Molops 49.
 Molorchus 239.
 Molytes 290.
 Monochamus 244.
 Mononychus 298.
 Monotoma 174, 338.
 Mordella 227.
 Mordellistena 227.
 Morychus 204.
 Mycetaea 190.
 Mycetochara 232, 345.
 Mycetophagus 186,

- Mycetoporus 96.
 Mycterus 224.
 Myelophilus 323.
 Myllacus 279.
 Myllaena 101.
 Myrmecoxenus 189.
 Myrmedonia 117.
 Myrmetes 145.
 Myrrha 195.
 Mysia 194.

 Nanophyes 314.
 Nargus 131.
 Nebria 31.
 Necrobia 164.
 Necrodes 134.
 Necrophorus 133.
 Necydalis 299.
 Nemadus 132.
 Nemosoma 165.
 Neobisnius 86.
 Nephanes 141.
 Nephus 197.
 Neuraphes 129.
 Niptus 218.
 Nitidula 169.
 Nosodendron 203.
 Nossidium 140.
 Notaris 294.
 Noterus 61.
 Notiophilus 31.
 Notothecta 116.
 Notoxus 225.
 Novius 196.
 Nudobius 85.

 Oberea 247.
 Obrium 240.
 Ocalea 119.
 Ochina 222.
 Ochrosis 264.
 Ochthebius 149.
 Octotemnus 188.
 Oeys 38.
 Ocyusa 120.
 Ocyusida 120.
 Odacantha 56.
 Odontaeus 331.
 Oeceptoma 134.
 Oedemera 223.
 Olibrus 182.
 Oligella 141.
 Oligomerus 221.
 Oligota 102.
 Olisthopus 52.

 Olophrum 71.
 Omalium 69.
 Omias 282.
 Omoplus 233.
 Omophron 31.
 Omosiphora 168.
 Omosita 168.
 Oncomera 223.
 Oniticellus 332.
 Ontholestes 92.
 Onthophagus 332.
 Onthophilus 146.
 Oodes 41.
 Ootypus 181.
 Opatrum 234.
 Ophonus 41, 338.
 Opilo 163.
 Orchesia 230.
 Orchestes 310.
 Orectochilus 66.
 Orina 259.
 Orithales 207.
 Orobitis 306.
 Orochares 70.
 Orphilus 203.
 Orsodaene 249.
 Orthocerus 189.
 Orthochaetes 296.
 Orthoperus 140.
 Orthopleura 164.
 Oryctes 335.
 Osmoderma 336.
 Osphyra 231.
 Ostoma 165.
 Othius 86.
 Otiorrhynchus 277.
 Oxylaemus 189.
 Oxymirus 237.
 Oxyomus 328.
 Oxyopoda 120, 338.
 Oxyporus 76.
 Oxytelus 74.
 Oxythyrea 337.

 Pachnephorus 256.
 Pachybrachis 255.
 Pachyta 237.
 Pachytychius 294.
 Paederus 81.
 Palorus 235.
 Panagaeus 39.
 Paramecosoma 176.
 Parnus 199.
 Paromalus 145.
 Patrobus 39.

 Pedilophorus 204.
 Pentaphyllus 235.
 Perileptus 39.
 Peritelus 279.
 Peryphus 33.
 Phaedon 261.
 Phalacrus 182.
 Phausis 155.
 Pheletes 211.
 Philonthus 87.
 Philorinum 70.
 Philydrus 151.
 Phloeobium 67.
 Phloeocharis 67.
 Phloeodroma 118.
 Phloeonomus 70.
 Phloeophilus 163.
 Phloeophthorus 323.
 Phloeopora 118.
 Phloeosinus 323.
 Phloeostichus 175.
 Phloeotrya 230.
 Phosphoenus 155.
 Phosphuga 135.
 Phratora 260.
 Phrydiuchus 300.
 Phthorophloeus 323.
 Phyllobius 279.
 Phyllobrotica 261.
 Phylloocta 260.
 Phyllodrepa 69.
 Phyllopertha 335.
 Phyllotreta 267.
 Phymatodes 241.
 Phymatura 104.
 Phytobius 300.
 Phytodecta 259.
 Phytoecia 246.
 Phytonomus 292.
 Pidonia 237.
 Pissodes 293.
 Pityogenes 325.
 Pityophagus 173.
 Pityophthorus 325.
 Placusa 103.
 Plagiodera 261.
 Plagionotus 243.
 Planeustomus 72.
 Platambus 63.
 Plateumaris 248.
 Platycerus 327.
 Platycis 155.
 Platydema 234.
 Platynaspis 196.
 Platypus 327.

- Platyrhinus 276.
 Platysoma 143.
 Platystethus 75.
 Platystomus 276.
 Platytarsus 281.
 Plectroscelis 265.
 Plegaderus 146.
 Pleurophorus 328.
 Plinthus 290, 291.
 Pocadius 172.
 Podabrus 156.
 Podagrica 263.
 Pogonochaerus 245.
 Polydrosus 280.
 Polygraphus 324.
 Polyphylla 334.
 Polystichus 56.
 Poophagus 305.
 Porcinolus 205.
 Potamophilus 199.
 Potosia 337.
 Prasocuris 260.
 Pria 169.
 Priobium 219.
 Prionocyphon 199.
 Prionus 236.
 Prionychus 232.
 Procas 293.
 Procræus 210.
 Pronomæa 101.
 Propylæa 196.
 Prosternon 207.
 Proteinus 67.
 Psalidium 285.
 Psammobius 328.
 Psammocæus 174.
 Pselaphus 128.
 Pseudobium 84.
 Pseudocleonus 287.
 Pseudostyphlus 296.
 Psilothrix 162.
 Psylliodes 266.
 Ptenidium 140.
 Pterostichus 49, 338.
 Pteryngium 176.
 Pteryx 141.
 Ptilinus 221.
 Ptiliolum 141.
 Ptilium 141.
 Ptinella 141.
 Ptinus 218.
 Ptomaphagus 132.
 Ptosima 214.
 Pullus 196.
 Purpuricenus 242.
 Pycnomerus 189.
 Pygidia 158.
 Pyrochroa 225.
 Pyrrhidium 242.
 Pytho 223.
 Quedius 93.
 Reichenbachia 127.
 Rhagium 236.
 Rhagonycha 158.
 Rhamnusium 236.
 Rhamphus 311.
 Rhantus 63.
 Rhinocyllus 289.
 Rhinomacer 322.
 Rhinoncus 300.
 Rhinosimus 224.
 Rhizobius 198.
 Rhizophagus 173.
 Rhizotrogia 333.
 Rhopalodontus 188.
 Rhopalopus 242.
 Rhynchites 320.
 Rhyncolus 297.
 Rhysodes 66.
 Rhyssemus 328.
 Rhytidosoma 299.
 Riolus 200.
 Rosalia 242.
 Sacium 139.
 Saperda 246.
 Saprinus 145.
 Scaphidema 234.
 Scaphidium 142.
 Scaphium 142.
 Scaphosoma 142.
 Schistoglossa 116.
 Sciaphilus 281.
 Scirtes 199.
 Sclerophædon 260.
 Scopæus 82.
 Scydmaenus 130.
 Scymnus 197.
 Scythropus 281.
 Semiadalia 192.
 Serica 333.
 Sericoderus 139.
 Sericus 207.
 Sermyla 263.
 Serropalpus 230.
 Siagonium 66.
 Sibinia 310.
 Silis 158.
 Silpha 134.
 Silusa 104.
 Silvanus 174.
 Simplocaria 204.
 Sinodendron 327.
 Sipalia 116.
 Sisyphus 332.
 Sitodrepa 221.
 Sitona 283.
 Smicronyx 296.
 Soronia 167.
 Sospita 195.
 Spercheus 150.
 Spermophagus 274.
 Sphaeridium 153.
 Sphaeriesthes 224.
 Sphaerites 165.
 Sphaerius 140.
 Sphaeroderma 272.
 Sphaerosoma 190.
 Sphenophorus 307.
 Sphindus 187.
 Sphodrus 51.
 Spondylis 236.
 Staphylinus 91.
 Stenelmis 200.
 Stenichnus 129.
 Stenocæus 299.
 Stenochorus 237.
 Stenolophus 44.
 Stenopterus 240.
 Stenostola 246.
 Stenus 76.
 Stethorus 197.
 Stichoglossa 122.
 Stilicus 81.
 Stilbus 183.
 Stomis 49.
 Strophosomus 282.
 Subcoecinnella 191.
 Sunius 81.
 Symbiotes 190.
 Synaptus 208.
 Syncalypta 205.
 Synchrona 188.
 Syntomium 72.
 Synuchus 52.
 Systemocerus 327.
 Tachinus 99.
 Tachyporus 98.
 Tachypus 33.
 Tachys 38.
 Tachyta 38.
 Tachyusa 105.

- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| Tachyusida 104. | Tillus 163. | Tropinota 337. |
| Tanymecus 286. | Timarcha 256. | Tropiphorus 289. |
| Tanysphyrus 296. | Tomoglossa 116. | Trox 327. |
| Taphria 52. | Tomoxia 227. | Trypopitys 221. |
| Taphrorychus 326. | Toxotus 237. | Tychius 309. |
| Tapinotus 305. | Trachodes 291. | Tychus 128. |
| Telephorus 156. | Trachyphloeus 284. | Typhaea 186. |
| Telmatophilus 176. | Trachys 216. | Tyrus 128. |
| Tenebrio 235. | Trechus 39. | Uleiota 174. |
| Tenebroides 165. | Triarthron 136. | Uloma 235. |
| Teredus 189. | Tribolium 235. | Urodon 275. |
| Teretrius 146. | Trichius 336. | Valgus 336. |
| Tetraplatypus 45. | Trichocele 163. | Velleius 95. |
| Tetratoma 229. | Trichocellus 45. | Vibidia 195. |
| Tetropium 241. | Trichodes 164. | Xantholinus 85. |
| Tetrops 246. | Trichonyx 126. | Xestobium 220. |
| Thalassophilus 39. | Trichophya 100. | Xyleborus 326. |
| Thalycra 172. | Trichopteryx 142. | Xyletinus 221. |
| Thamiaraea 117. | Trichotichnus 44. | Xylita 230. |
| Thamnurgus 324. | Trimium 125. | Xylocleptes 326. |
| Thanasimus 164. | Trinodes 203. | Xylocrepa 134. |
| Thanatophilus 134. | Triphyllus 186. | Xyldromus 70. |
| Tharops 213. | Triplax 181. | Xylonites 217. |
| Thea 195. | Tritoma 181. | Xyloterus 326. |
| Thectura 103. | Trixagus 213. | Xylotrechus 243. |
| Thiasophila 122. | Troglops 160. | Zabrus 46. |
| Thinobius 73. | Trogoderma 203. | Zeugophora 249. |
| Throscus 213. | Trogophloeus 73, 338. | Zyras 117. |
| Thymalus 165. | Trogosita 165. | |
| Thylacites 286. | Tropideres 276. | |

Druckfehler.

- S. 86. Baptolinus Nr. 1 — statt longipes lies longiceps.
 S. 186. Mycetophagus Nr. 1 — statt quadripunctulatus lies quadri-
 pustulatus.
 S. 271. Dibolia Nr. 4 — statt rugolosa lies rugulosa.
-

Die Natur der Pflanzenwelt ist ein sehr interessantes und wichtiges Thema, das in der Biologie eine zentrale Rolle spielt. In diesem Buch werden wir uns mit den Grundlagen der Pflanzenkunde befassen, von der Zellstruktur bis zur Ökologie. Wir werden sehen, wie Pflanzen an ihre Umgebung angepasst sind und wie sie sich reproduzieren. Die Pflanzenwelt ist ein vielfältiges und komplexes System, das uns viele Erkenntnisse über die Evolution und die Lebensweise der Organismen liefert. In den folgenden Kapiteln werden wir uns mit den verschiedenen Gruppen der Pflanzenwelt befassen, von den Moosen bis zu den Blütenpflanzen. Wir werden sehen, wie diese Pflanzen sich an ihre Lebensbedingungen angepasst haben und wie sie sich über die Zeit hinweg entwickelt haben. Die Pflanzenwelt ist ein faszinierendes und vielfältiges System, das uns viele Erkenntnisse über die Natur und die Lebensweise der Organismen liefert.

Druckfehler.

- 2 22. Pflanzen Nr. 1 - sehr häufig bei den Pflanzen
- 2 188. Pflanzen Nr. 1 - sehr häufig bei den Pflanzen
- 2 271. Pflanzen Nr. 4 - sehr häufig bei den Pflanzen

