

Ergänzung des Verzeichnisses der um Boskowitz aufgefundenen Coleopteren.¹⁾

Von

Theodor Kittner.

Vorgelegt in der Sitzung vom 11. December 1867.

Diese Ergänzung besteht aus den Ergebnissen der Excursionen des Jahres 1867. Die mit * bezeichneten Arten sind neu für die Fauna Mährens.

Ich bemerke, dass Herr Ludwig Miller in Wien die Güte hatte, die mir zweifelhaften Arten zu bestimmen.

Cicindela L.

hybrida L. im Frühjahr ein Stück gefangen.

Cychnus Fabricius.

attenuatus Fabr. im Herbst unter Steinen im Bielathale.

Carabus L.

Ulrichii Germ. im Frühjahr zwei Stück gefunden.

nemoralis Ill. im Bielathale im Frühjahr ein Stück gefangen.

Preisleri Dft. auf den Feldwegen Suditz einigemale im Sommer angetroffen.

Dromius Bon.

**fenestratus* Fabr. im Frühjahr ein Stück auf Holzvorräthen.

quadrinaculatus L. ein Pärchen im Herbst gefangen.

Cymindis Latr.

Cingulata Dej. im Frühjahr unter Steinen selten.

Licinus Latr.

depressus Payk. im Bielathale unter Steinen sehr selten.

Taphria Bon.

nivalis Panz. im Frühjahr unter Steinen am Ufer der Biela.

¹⁾ Vergl. Verhandlungen des naturforschenden Vereines, V. Band, p. 114.

Pterostichus Er.

oblongopunctatus Fabr. im Bielathale ein Stück im Frühjahr gefangen.

Amara Bon.

fulva De Geer. das Vorkommen in der Gegend durch ein im Frühjahr gefangenes Stück constatirt.

bifrons Gyll. unter Steinen.

curta Dej. desgleichen.

Harpalus Latr.

obscurus Fabr. im Herbst auf den Wiesen bei Skalitz auf Schirmblumen in grosser Menge ange-
troffen.

brevicollis Dej. mit dem Vorigen seltener.

signaticornis Dftschm. blos ein Stück gefangen.

latus L. }
caspius Ster. } unter Steinen.
picipennis Dft. }

Bradycellus Er.

**collaris* Payk. im Herbst im Bielathale unter Moos gefunden.

Tachys Schaum.

nanus Gyll. an einer Erle im Bielathale gefangen.

Bembidium Latr.

punctulatum Drapicz. im Sommer am Ufer der Biela unter Steinen einige Stücke gesammelt.

Laccophilus Leach.

hyalinus De Geer. am Ufer der Biela im Melkauer Thale gefangen.

Colymbetes Clairv.

**notaticollis* Aub. ebendort ein Stück im Herbst gefangen.

Hybius Er.

uliginosus L. im Bielathale in einer Pfütze in grosser Zahl gesammelt.

Agabus Leach.

guttatus Payk. am Ufer der Zwitterawa unter Steinen.

Helophorus Fabr.

**aeneipennis* Thoms. in einer Pfütze im Bielathale im Frühjahr einige Stücke gefunden.

Falagria Steph.

obscura Curt. } im Frühjahr unter
nigra Grav. } Steinen.

Aleochara Grav.

lanuginosa Grav. im Frühjahr mehrere Stücke bei Dünger gesammelt.

moesta Grav. für die Gegend nur durch ein Stück sichergestellt.

Myrmedonia Er.

lugens Grav. ein Stück im Frühjahr unter Steinen gefunden.

Tachyusa Er.

umbratica Er. im Frühjahr am Ufer der Zwitterawa gefangen.

Oxypoda Mannh.

cuniculina Er. }
umbrata Er. } im Bielathale.

**formiceticola* Märkl. ebenda im
Frühjahre unter Steinen.

Homalota Mannh.

**granigera* Kiesw. }
**graminicola* Grav. } im
analis Grav. } Bielathale.

Gyrophæna Mannh.

**nana* Payk. } im Bielathale an
**polita* Grav. } Baumschwämmen.

Tachinus Grav.

marginellus Fabr. bei Dünger ge-
fangen.

Tachyporus Grav.

**ruficollis* Grav. } bei Dünger
pusillus Grav. } gesammelt.

brunneus Fabr. unter Steinen im
Frühjahre im Bielathale gefunden.

Conosoma Kraatz.

litoreum L. ebendort im Frühjahre.

Heterothops Steph.

**prævius* Er. mit dem Schöpfer
gefangen.

Quedius Steph.

**lateralis* Grav. } sämtlich unter
**impressus* Panz. } Steinen
fuliginosus Grav. } im Bielathale
suturalis Kiesw. } gesammelt.

Ocypus Steph.

cyaneus Payk. ein Stück im Som-
mer am Wege im Melkauerthale
gefunden.

Philonthus Curtis.

decorus Grav. } je einige Stücke
ebeninus Grav. } gefangen.

Lathrobium Grav.

**multipunctum* Grav. zeitlich im
Frühjahre unter Steinen im Biela-
thale.

Cryptobium Mannh.

fracticorne Payk. unter Steinen.

Stilicus Latr.

**affinis* Er. unter Steinen.

Scopæus Er.

**minutus* Er. unter Steinen.

Stenus Latr.

**pusillus* Er. } mit dem Schöpfer im
**excubitor* Er. } Frühjahre im rothen
circularis Grav. } Garten gesammelt.

Trogophlæus Mannh.

obesus Kiesw. mit dem Schöpfer
im Bielathale gefangen.

Anthophagus Grav.

testaceus Grav. im Herbste auf Ge-
sträuchen in Mlatkow gefangen.
plagiatus Fbr. am Ufer der Biela
im Frühjahre unter Steinen.

Lestea Latr.

bicolor Payk. ein Stück gesammelt.

Anthobium Steph.

Sorbi Gyll. im rothen Garten mit
dem Schöpfer gefangen.

Bryaxis Leach.

fossulata Reichb. im Frühjahr bei der Waldstrecke; Milanow unter Steinen.

Catops Payk.

Watsoni Spence. bei Aesern gefangen.

Silpha L.

reticulata Fbr. unter Steinen gefunden.

Anisotoma Ill.

dubia Kugel. Abends in einem Wassergraben im Frühjahr mit dem Schöpfer gefangen.

Cyrtusa Er.

**minuta* Ahr. ebenso gefangen.

Liodes Latr.

**castanea* im Bielathale an Baumschwämmen.

Scaphisoma Leach.

**boleti* Panz. ebenda.

Hister L.

carbonarius E. H. im Dünger gefunden.

Epuræa Er.

pusilla Ill. der Fundort nicht angemerkt.

Meligethes Kirby.

coracinus Sturm. im rothen Garten.
**Symphyti* Heer, auf den Skaltzer Wiesen mit dem Schöpfer gesammelt.

Atomaria Steph.

**nana* Er. an Mauern gesammelt.

Corticaria Marsh.

**formicetorum* Mannh. } an Häusern
fuscata Humm. } gefunden.

Attagenus Latr.

megatoma Fabr. bei Wohngebäuden an altem Holze.

Morychus Er.

nitens Panz. im Frühjahr unter Steinen gesammelt.

Onthophagus Latr.

lemur Fabr. in Dünger gefunden.

Limonius Eschsch.

minutus L. mit dem Schöpfer gefangen.

Cardiophorus Eschsch.

thoracicus Fbr. im Frühjahr an einer Mauer gefangen.

Lamprorhiza Dür.

splendidula L. Ende Juni am Schlossberge.

Malachius Fabr.

rubricollis Marsh. im Eichenwalde nächst Zweihof geschöpft.

Dasytes Payk.

**aeneiventris* Kust. im Bielathale auf Schirmblumen.
flavipes Feb. ebenda.

Haplocnemus Steph.

**Pini* Redtb. im Frühjahr auf Kiefern gefangen.

Dryophilus Chevr.

pusillus Gyll. in den Waldungen am Schlossberge im Frühjahr geschöpft.

Anobium Fabr.

Abietis Fabr. auf geklaffertem Holze
im Frühjahr ein Stück gefangen.

Sphindus Cheor.

**dubius* Gyll. im Sommer auf
einem Baumschwamme im Biela-
thale ein Stück gefunden.

Omophlus Solier.

Amerinæ Curt. im Frühjahr auf
Kiefern am Chrudichromer Berge
gesammelt.

Salpingus Ill.

**castaneus* Panz. zeitlich im Früh-
jahre am Schlossberge an Kiefern-
stöcken in grosser Zahl gefunden.

Anthribus Geoffr.

albinus L. ein Stück im Bielathale
auf einem Strassengeländer ge-
fangen.

Rhynchites Hbst.

Bacchus L. im Frühjahr im Biela-
thale unter Steinen bei Obstbäu-
men ein Pärchen gesammelt.

aeneovireus Marsh. auf blühendem
Weissdorn gefangen.

ophthalmicus Steph. am Chrudichro-
mer Berge im Walde geschöpft.

Apion Hbst.

Pomonæ Fabr. im Walde am Schloss-
berge auf jungen Ulmen im
Herbste,

Viciæ Payk. auf den Skalitzer
Wiesen.

miniatum Schh. auf Waldwiesen im
Melkauer Thale geschöpft.

æthiops Hbst. im rothen Garten ge-
sammelt.

**vorax* Hbst. am Schlossberge im
Herbste auf Gesträuchen in
grosser Zahl angetroffen.

Pisi Fabr. auf den Skalitzer Wiesen.
dispar Germ. ebendort.

Cleonus Schh.

obliquus Fbr. ein Stück auf dem
Feldwege gegen Suditz gefangen.

Liophlæus Germ.

nubilus Fabr. im rothen Garten im
Frühjahre im Grase gesammelt.

Minyops Schh.

variolosus Fabr. auf den Wegen am
Schlossberge im Sommer einige
Stück gefangen.

Tropiphorus Schh.

mercurialis Fabr. im Bielathale im
Frühjahre unter Steinen 3 Stück.

**carinatus* Müll. zur selben Zeit
ebendort ein Stück gefangen.

Phytonomus Schh.

**contaminatus* Hbst. im Frühjahr
auf einer Wiese in den soge-
nannten Weingärten geschöpft.

Polygoni Fabr. im rothen Garten
gefangen.

Phyllobius Schh.

Pomonæ Oliv. bloss ein Stück ge-
funden.

Trachyphlæus Germ.

squamulatus Oliv. } beide im Sommer im
aristatus Gyll. } Bielathale, im Grase
 oder auf Geländern
 gefangen.

Omius Germ.

rotundatus Fbr. } auf den Skalitzer
hirsutulus Fab. } Wiesen und im
 **villosulus* Germ. } Bielathale im
 Frühjahre.

Otiorrhynchus Germ.

perdix Germ. zeitlich im Frühjahre
 unter losen Rinden der Stütz-
 stangen von Obstbäumen neben
 den Strassen gesammelt.

Erirhinus Schh.

acridulus L. auf den Skalitzer Wie-
 sen geschöpft.

flavipes Panz. } im Frühjahre im Biela-
villosulus Schh. } thale an Geländern
 gefangen.

dorsalis Fabr. auf Weiden im Mel-
 kauer Thale gesammelt.

Anthonomus Germ.

**undulatus* Schh. im Frühjahre ein
 Stück an einem Strassengeländer
 im Bielathale gefangen.

Amalus Schh.

floralis Payk. im rothen Garten ge-
 schöpft.

Tychius Germ.

picrostris Fabr. von den Skalitzer
 Wiesen.

Baridius Schh.

T-album L. von einer Sumpfwiese
 in den sogenannten Weingärten,

Cæliodes Schh.

quadrinaculatus L. im rothen Gar-
 ten im Sommer geschöpft.

**Lamii* Herbst. desgleichen.

Ceuthorhynchus Schh.

assimilis Payk. } beide von den Ska-
 **Achilleæ* Schh. } litzer Wiesen.

**Andrææ* Germ. im Strassengra-
 ben geschöpft.

Barbarææ Suffr. im Bielathale im
 Herbst auf Geländern gesammelt.

Rhinoncus Schh.

bruchoides Hbst. im rothen Garten
 geschöpft.

Gymnetron Schh.

noctis Hbst. auf Antirrhinum im
 Herbst gesammelt.

Rhyncolus Creutzer.

**culinaris* Reich. im Herbst ein
 Stück auf geschichtetem Buchen-
 holze gefunden.

Hylurgus Latr.

ligniperda Fabr. im Frühjahre an
 Kiefernholz gefangen.

Scolytus Geoffr.

Pruni Ratzb. im Frühjahre im rothen
 Garten in einem alten Pflaumen-
 baum in grosser Zahl gefunden.

Bostrychus Fabr.

autographus Ratzeb. im Herbst an
 geklaffertem Tannenholze ge-
 sammelt.

dryographus Er. im Frühjahr ein Stück im Eichenwalde bei Zweihof gefangen.

Callidium Fabr.

dilatatum Payk. ein Stück im Frühjahr an einer Mauer gefangen.

Clytus Fabr.

plebejus Fabr. auf Schirmblumen.

Liopus Sero.

**fennicus* Payk. im Juli ein Stück an dem Stamme einer alten Linde gefangen.

Pogonocherus Ltr.

hispidus L. auf Reisig im Frühjahr im Bielathale.

Stenostola Rdtb.

nigripes Fabr. im rothen Garten auf jungen Pappeln im Frühjahr gefangen.

Chrysomela L.

geminata Payk. im Bielathale im Strassengraben auf verschiedenen Blüten gefunden.

Gonioctena Redtb.

quinquepunctata Fabr. im rothen Garten.

Phædon Latr.

Cochleania Fabr. auf den Wiesen bei Skalitz geschöpft.

Adimonia Laich.

**Villa* Küst. im Sommer auf der Wiese nächst Pastwisko geschöpft.

Haltica Geoffr.

rufipes L. } beide von den Wiesen bei Skalitz.
**rustica* L. }

Longitarsus Latr.

Echü E. H. am Schlossberge.

**lævis* Dft. auf den Skalitzer Wiesen mit dem Schöpfer gefangen.

Cassida L.

obsoleta Ill. im Frühjahr unter Steinen gefunden.

Hippodomia Muls.

tredecimpunctata L. auf Weiden gefangen.

Chilocorus Leach.

renipustulatus Scrib. im Herbste auf Geländern im Bielathale.

Scymnus Kugel.

hæmorrhoidalis Hbst. } mit dem Schöpfer gefangen.
**capitatus* Fbr. }
minimus Payk. }

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [06](#)

Autor(en)/Author(s): Kittner Theodor

Artikel/Article: [Ergänzung des Verzeichnisses der um Boskowiiz aufgefundenen Coleopteren 146-152](#)