

Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1909.

Von **J. Gerhardt.**

Gb. = Gabriel, Generalmajor z. D., Neisse. G. = Gerhardt, Oberlehrer a. D.,
Liegnitz. a. = Aberration. v. = Varietät.

Carabus auronitens a. *perviridis* Rtrr. Riesengeb. (G.). —
C. nitens a. *subnitens* Rtrr. Aufstieg zum Gröditzberge (G.).
— *C. cancellatus* v. *carinatus* Charp. Liegnitz 1 Stck. (G.).

1. *Notiophilus hypocrita* Putz., *laticollis* Petri. Rtrr.
Riesengeb. (G.), S. O.-Sudeten (Gb.).

Bembidion striatum a. *nigrescens* Schilsky. Liegnitz (G.). —
B. lampros a. *coeruleotinctum* Rtrr. Schön blau. Ziendl. s. —
B. lampros a. *nigroaeneum* Gerh. Häufiger als vorige a. —
B. punctulatum a. *Lutzi* Rtrr., n. s. mit der Stammform. —
B. bipunctatum a. *obscurum* Gerh. Dunkelbraun, dunkelblau
o. ganz schwarz n. s.

2. *Bembidium viridimicans* K. Dan. In Paskau von
Reitter an dunklen Orten gef.

3. *Tachys sexstriatus* Duft. Als sp. pr. von *4-signatus*
zu trennen und Fundorte genauer festzustellen. Nach Reitter
in Schlesien an Flußufeln zwischen Steingerölle n. s.

4. *Trechus bescidicus* Rtrr. An kleinen Wasser-
rieseln und unter Moos. Beskiden (Fauna germ. Rtrr. 130).

5. *Patrobis septentrionis* Dej. In Schlesien (Fauna
germ. Rtrr. 133).

6. *Chlaenius festivus* Fbr. Nach Reitter (Fauna germ. 187) in Ostschlesien.

Acupalpus dorsalis a. *maculatus* Schaum. Liegnitz s. (G.).

7. *Amara Schimperii* Wencker. In Schlesien (Rtrr. Fauna germ. 161).

8. *Aptinus bombardaria* Illig. In den mährisch-schlesischen Beskiden und Sudeten. (Rtrr. Fauna germ. 200).

Hydroporus unistriatus a. *subrufulus* O. Schneider. Ich zähle dahin Liegnitzer Stücke mit oberseits feiner und dichter Punktierung und düster rötlicher Färbung. s. — *H. geminus* a. *dorsalis* Gerh. Basis der Decken schmal dunkel, eine große Dorsalmakel, die nach keiner Richtung sich zackig erweitert, ebenfalls dunkel. Liegnitz. s. — *H. planus* v. *pallescens* Seidl. Liegnitz s.

Rhantus notatus v. ♀ *vermicularis* Fauv. Liegnitz n. s. — *Rh. exoletus* v. *insolutus* Aubé. Liegnitz ss. (G.).

Anthobium primulae a. *rufipenne* Gerh. Schwarz, nur die Decken einfarbig rotgelb. Kaltwasser Kr. Lüben. 1 Stck.

9. *Porrhodites fenestralis* Zett. An der Wölfel in 2 Ex. gefunden (Gb.).

10. *Deliphrum algidum* Er. Ebenfalls an der Wölfel. 1 Stck. (Gb.).

Planeustomus palpalis v. *alutaceus* Gerh. Die Decken der ganzen Länge nach deutlich chagriniert. Gewöhnliche Stücke nur hinten mit deutlichem Chagrin. Schwarzwasserbruch bei Liegnitz. ss.

Thinobius longipennis v. *pusillimus* Heer. Fast ebenso hfg. als die Stammform. Liegnitz, besonders im Katzbachanspülicht.

Oxyporus maxillosus a. *signatus* Gerh. Hinterrand des 5. und 6. Dorsalsegments mit einem schmalen Saum regelmäßig senkrecht gestellter zierlicher schwarzer deutlich durchscheinender kurzer Striche. Bei der Stammform sind diese Striche gelb. Liegnitz s.

Stenus impressus v. *insulcatus* Gerh. Halsschild ohne Mittelfurche. ss. Vorgebirge (G.).

Medon brunneus a. *nigricans* Gerh. Kopf und Halsschild fast schwarz. Heßberge, 10. 1 Stck. Hierher auch *M. piceus* der Letznernschen Coll.

Philonthus concinnus a. *ochripennis* Gerh. Decken fahlgelb. ss. Liegnitz (G.). — *Ph. sanguinolentus* a. *contaminatus* Grav. Liegnitz (G.). — *Ph. discoideus* a. *rufipennis* Gerh. Flügeldecken einfarbig gelb. 2 Stck. Liegnitz (G.). — *Ph. quisquilius* m. *opacus* Gerh. Decken matt. Liegnitz ss. (G.).

11. *Hypocypthus apicalis* Bris. Neisse. 1 Stck. 9. (Gb.).

Bryaxis longicornis a. *nigripennis* Gerh. Decken schwarz. 1 Stck. Liegnitz (G.).

Stenichnus collaris a. *rufescens* Gerh. Der ganze Käfer rot, aber erhärtet, nur 2 Stck. Liegnitz (G.). — *St. collaris* a. *tomentosus* Gerh. Hinterbrust eines ♂ sehr dicht weiß behaart. Liegnitz (G.).

Liodes dubia a. *rufipennis* Payk., v. *consobrina* Sahlb., a. *longipes* Schmidt, a. *bicolor* Schmidt. Alle 4 Aberr. bei Liegnitz u. a. O. n. s.

Ochtebius marinus v. *pallidipennis* Lap. In der Klette-schen Sammlung 1 schles. Stück. — *O. marinus* a. *deletus* Rey. 3 Stck. a. d. Katzbach bei Liegnitz (G.).

Cercyon flavipes v. *marginellus* Payk. Wie die Stammform hfg.

Atomaria ruficornis v. *nigricornis* Fabr. ss. Neisse (Gb.), Liegnitz (G.). — *A. ruficornis* m. *opaca* Gerh. Decken matt. Liegnitz s.

Aphidecta obliteratus a. *suturalis* Fabr. Die Aberr. hat breiten schwarzen Natstreifen, normale Stücke haben entweder keinen oder einen nur schwach angedeuteten.

12. *Scymnus rufipes* F. Bei Vorderheide in 1 Stck. (G.).

Coccidula rufa a. *plagiata* Gerh. Das Dorsum jeder Decke mit einem $\frac{3}{4}$ der Länge einnehmenden dunklen Streifen. Jakobsdorfer See. 1 Stck.

Attagenus piceus a. *sordidus* Heer. 2 Stck. von Liegnitz. Der Catalog von 1906 zieht diese Aberr. zur Stammform, hat dagegen eine Var. *megatoma*, deren Beschreibung ich nicht kenne. Bose zieht seinen *piceus* mit *megatoma* zusammen.

Anthrenus verbasci v. *nebulosus* Rtrr. In Liegnitz an der Promenade auf blühender Tamariske s. (G.).

Leptura rubra v. *maculiceps* Fabr. Scheitel mit zwei roten Fleckenpunkten. Fast häufiger als die Stammform. (Gb. G.) —

L. attenuata v. *brunnescens* Balbi ss., v. *imperfecta* Gerh. Die schwarzen Querbinden erreichen weder Nat noch Außenrand. Nicht s. — *L. attenuata* a. *maculicollis* Gabr. Vorderdecken des Halsschildes mit einer roten Makel, die bei v. *brunnescens* verlängert ist. Nicht s.

Clyanthus sartor v. *griseus* Gabr. Die weiße Behaarung der Decken ist so dicht, daß unter ihr die weiße Bindenzeichnung nur wenig hervortritt. 1 Stck. Neisse (Gb.).

Melasoma aenea a. *discolor* Gerh. Ein schles. Stück aus der Sammlung des verstorbenen Selinke. Unterseite metallisch gelbgrün, Kopf, Halsschild und das vordere Drittel der Decken gesättigt grün, ein sehr schmaler Hinterrand des Halsschildes, das Schildchen und die hinteren $\frac{2}{3}$ der Decken kupferig metallisch, einzelne Flecken dazwischen grün, Fühler schwarz, ihre ersten Glieder rotbraun, Taster schwarz, Hinterschenkel gräulich, sonst die Beine schwarz metallisch.

Phytonomus punctatus v. *lineellus* Gerh. Die Nat und zwei Interstitien jeder Flügeldecke weißlich beschuppt. Liegnitz 1 Stck.

Apion loti a. *brunneirostre* Gerh. s. Rüssel braun. Liegnitz (G.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [JH_3](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1909 1-4](#)