

Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1910.

Von **J. Gerhardt.**

Gb. = Gabriel, Generalmajor z. D., Neisse. G. = Gerhardt, Oberlehrer, Liegnitz.

Hydraena gracilis var. ♀ *excisa* Ksw. und var. *subintegra* Ganglb. Beide mehrfach unter der Stammform. Vorgebirge (G.).

Atomaria ruficornis var. *nigricornis* Gerh. Fühler ganz schwarz. 1 Stck. bei Liegnitz (G.). 1 Stck. brachte Gb. aus Gastein mit.

Cis alni var. *reticulata* Abeille. 1 Stck. Oderwald bei Maltsch (G.).

Bromius obscurus a. *epilobii* Ws. Selten, mit der Stammform. Riesengebirge (G.).

Chrysomela rufa var. *sulcicollis* Gerh. 1 Stck. mit hinten und vorn abgekürzter und 1 Ex. mit durchgehender Mittelfurche des Halsschildes (G.).

Epithrix a. *nigritula* Ws. und *4-maculata* Ws. Beide n. s. mit der Stammform im Vorgebirge (Heßberge). G.

Phyllobius oblongus var. *mandibularis* Gerh. 1 Ex. Mandibeln stark vorragend, jede in der Mitte des Innenrandes stark gezähnt, der Zahn grade nach innen gerichtet, jede Mandibel stark nach innen gekrümmt und scharf zugespitzt. (G.)

Rhytidostoma globulus var. *ferrugineus* Gerh. Ganz rotgelb und erhärtet. 1 Stck. Liegnitz.

1. *Ceuthorrhynchidius hassicus* Schze. Neisse mehrfach (Gb.). Liegnitz 1 Stck. (G.).

Ceuthorrhynchus nigrinus Marsh. var. *foveolatus* Gerh. 1 Stck. Auf Bauchsegment 5 ein kleines Grübchen wie beim ♂. *C. floralis* var. ♀ *foveolatus* Gerh. Wie bei *nigrinus*. Liegnitz ss. (G.).

C. inaeffectatus a. *rufipes* Gerh. Ein ♀ mit roten Beinen. Liegnitz.

2. *Tychius pumilus* Bris. Bisher nur bei Neisse auf *Trifolium arvense*. Zahlreich. (Gb.)

Mecinus pyrastrer Hbst. Ein ♂ mit aufgerichteten Haaren auf den Decken, an *M. setosus* erinnernd, ist wohl nur als Zufallsprodukt anzusehen.

Nanophyes circumscriptus a. *flavescens* Gerh. Nur die Basis der Deckenangedunkelt und die Keule der Fühler schwarz. Liegnitz ss.

Apion dissimile a. ♂ *nigricorne* Gb. Neisse 1 Ex. Fühlerbasis auch schwarz.

3. *A. compactum* Desbr. Tritt an Stelle unseres bisherigen *A. genistae* Kirby. (Nach Schilskys „Apionen“.)

4. *A. corniculatum* Germ. Nicht selten unter *difficile*, mit dem er vermennt wurde. Vorgebirge: Heßberge, Bremberg, Berghäuser, Lähn.

5. *A. elongatulum* Desbr. Von Schilsky bei Altheide auf *Genista pilosa*, namentlich an den Früchten, zahlreich gefunden.

Eccoptogaster mulistriatus var. *triornatus* Eichh. und var. *ulmi* Redt. Mit der Stammform b. Liegnitz (G.).

Nachtrag.

Bledius longulus var. *nigripennis* Bernh. Wahrscheinlich von Gastein (Gb.). Könnte vielleicht auch in Schlesien gefunden werden. 1 Stck. mit ganz schwarzen Decken.

Liodes calcarata a. *nigrescens* Fleischer 1 Stck. Glatz (Gb.).

6. *Lathridius campicola* Gerh. n. sp. (s. die Beschreibung).

Longitarsus tabidus a. *vulgaris* Ws. hfg. und var. *elongatus* Ws. n. s. Neisse (Gb.).

Sitona sulcifrons var. *rasilis* Hochh. und *a. serietosus* Fahrh.
Liegnitz (G.), Neisse (Gb.).

Apion ervi var. ♂ *Schilskyi* Gerh. Fühlerglied 1 oder 1
und 2 gelb, die übrigen dunkel. Liegnitz je 1 Stck.

A. ervi var. ♂ *nigroclavatum* Gerh. Wölfelsgrund (Gb.),
Liegnitz (G.). Nur die Keule schwarz.

Neue Fundorte schlesischer Käfer

sind nur durch Herrn Generalmajor z. D. Gabriel—Neisse
bekannt gegeben.

Dromius nigriventris Thoms. Neisse.

Cryptophagus validus Kr. Wölfelufer.

Exochomus flavipes Thunb. Neisse.

Cryptocephalus frontalis Marsh. Neisse.

Otiorrhynchus equestris Richt. Schweinsdorf.

Gymnetron melas Bohem. Schweinsdorf, Hochwald bei Brieg.

Auch von mir bei Liegnitz gef.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [JH_4](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1910 1-3](#)