

Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1905.

Von **J. Gerhardt**—Liegnitz.

Finder: Gabriel, Generalmajor—Neisse (Gb.), Gerhardt, Oberlehrer (G.), Kolbe, Rektor—Liegnitz (K.), Schubert, Dr. med.—Hirschberg (Sch.), Schreiber, Lehrer—Neusalz (Schr.), Scholz, Richard, Lehrer—Liegnitz (Sz.), von Varendorff, Amtsrichter—Guhrau (V.).

Notiophilus bigeminus Thoms. Neisse (Gb.).

Bembidium Stephensii Crotch. Riesegeb. (G.). *B. Mannerheimii* Sahlb. Quanzendorf, aus Laub (Gb.).

Ophonus signaticornis Dft. Neisse (Gb.).

Amara municipalis Dft. Kl.-Reichen Kr. Lüben, unter Steinen (Sz.).

Pterostichus aterrimus Payk. Riesegeb. (Klettesche Sammlung).

Agonum gracilipes Dft. Quanzendorf Kr. Nimptsch 4. (Gb.).

Helophorus crenatus Rey und *pumilio* Er. Neisse (Gb.).

Euryusa sinuata Er. Hochwald b. Brieg unter feuchtem Stroh in einem Kartoffelkeller 5. (Gb.).

Microglossa suturalis Mnh. Schweinsdorf, an faulen Kartoffeln (Gb.).

Aleochara brevipennis Gr. Guhrau (V.), *A. diversa* J. Sahlb. Guhrau (V.), Quanzendorf, unter faulendem Keller-

stroh (Gb.); *A. cuniculorum* Kr. Liegnitz: Dann vor Weißenrode, 5. (G.). *A. inconspicua* Aub. Wölfelsgrund (Gb.). *A. spadicea* Er. Neisse (Gb.).

Homoeusa acuminata Märk. Quanzendorf (Gb.).

Homalota sulcifrons Steph. Hirschberg (Sch.). *H. complana* Mnh. Quanzendorf (Gb.). *H. luridipennis* Mnh. ibid. (Gb.); *H. vicina* Steph. Guhrau (V.), Hirschberg (Sch.); *H. hypnorum* Ksw. Guhrau (V.); *H. montivagans* Epp. Glatzer Geb. (Gb.); *H. brunnea* F. Endlich 1 Ex. mit einem Höckerchen auf dem vorletzten Dorsalsegment: Buchwald i. Rsg. (G.); *H. hepatica* Er. Liegnitz und Damm vor Weißenrode ss. 5. (G.); *H. cinnamoptera* Thoms. Spindelmühl (G.); *H. coriaria* Kr. Quanzendorf aus Mistverpackung (Gb.); *H. cadaverina* Bris. Ein mikrocephales Ex. Glatzer Schneeberg (Gb.); *H. procera* Kr. Wölfelsgrund in ganz vermorschten Wildresten (Gb.); *H. cauta* Er. kommt zuweilen mit ohrförmig eingedrücktem letzten Fühlergliede vor. Wahrscheinlich durch Eintrocknen entstanden. — Die Geschlechtsunterschiede von *H. subtilis* Scriba und *amicula* Steph. stellt Gb. wie folgt fest: *H. subtilis* ♂: Dorsalsegment 8 flach abgeschnitten, mit verrundeten Ecken und ohne Verdickung und Crenulierung des Hinterrandes; ♀: Ventralsegment 6 in der Mitte kurz dreieckig ausgeschnitten, Hinterrand kurz bewimpert. *H. amicula* ♂: Dorsalsegment 8 grade abgeschnitten, mit spitzen Ecken und schwach, aber deutlich crenuliert; ♀: Ventralsegment 6 flach gerundet, mit einzelnen langen Borsten. — *H. pulchra* Kr. Liegnitz: 1 Stck. an den Planken der Bahn beim Töpferberge; 1 Stck. aus dem Waldenburger Geb. (G.).

Placusa infima Er. Quanzendorf (Gb.).

Phloeopora corticalis Gr. Hirschberg (Sch.).

Oxypoda annularis Sahlb. Quanzendorf (Gb.); *O. bicolor* Muls. et Rey. Mittelberg im Glatz. Geb. (Gb.); *O. soror* Thoms. Gipfel des Schneeberges in Graspölstern (Gb.).

Ocyusa maura Er. Guhrau (V.).

Gyrophana pulchella Heer. Mittelberg (Gb.).

- Oligota flavicornis* Laccord. Quanzendorf (Gb.).
Habrocerus capillaricornis Gr. *ibid.* (Gb.).
Tachinus bipustulatus F. und *rufipennis* Gyll. Oderwald (V.).
Bolitobius pulchellus Mnh. Guhrau (V.).
Megacronus analis F. Oderwald (V.); *M. rufus* Er. (Sokolowsky).
Euryporus picipes Payk. Oderwald (V.).
Heterothops praevia Er. Feuchtes Stroh in einem Kartoffelkeller. Quanzendorf (Gb.).
Quedius scitus Gr. Guhrau (V.).
Quedius alpestris Heer. Weder Kraatz noch Ganglbauer machen auf die Verschiedenheit in der Länge der Flügel und ihrer Decken aufmerksam. Bei den ♂♂ sind die Decken länger und die Flügel reichen bis zum 5. oder 6. Dorsalsegment. Beim ♀ sind die Decken kürzer und die Flügel reichen nur bis zum 3. Dorsalsegment. Bei allen Stücken sind zur Seite der Dorsalsegmente Flecken etwas hellerer Haare oft undeutlich zu sehen. Haberfeldneri Epp. scheint auf solche mit deutlicherer Färbung der Flecken beschrieben zu sein. (Gb.)
Actobius procerulus Gr. Hirschberg (Sch.).
Philonthus intermedius Lac. Hirschberg, im Grünbusch (Sch.). *P. addendus* Rossi *ibid.* (Sch.). *P. cephalotes* Gr. Hochwald b. Brieg aus feuchtem Stroh (Gb.). *P. frigidus* Ksw. Riesengeb., am Ziegenrücken (Sch.). *P. thermarum* Aub. Schneeberg, aus verrottetem Dünger (Gb.). *P. exiguus* Nordm. Beskiden, unter Laub (Gb.). *P. varius* Gyll. Ein makrocephales Stck. in Quanzendorf (Gb.). *P. longicornis* Steph. mit schwarzem 1. Fühlergliede *ibid.* (Gb.).
Leptacinus parumpunctatus Gyll. Schneeberg, aus verrottetem Dünger (Gb.).
Xantholinus glaber Nordm. Hirschberg (Sch.).
Lathrobium rufipenne Gyl. Liegnitz: Jakobsdorfer See, aus Rohr mehrfach (K.).
Scopaeus cognatus Rey. Schweinsdorf, aus Jäte (Gb.).

- Stenus lustrator* Er. Guhrau (V.). *S. melanarius* Steph. Hirschberg (Sch.). *S. crassus* Steph. Neisse, unter Mistbeetverpackung (Gb.). *S. fornicatus* Steph. Oderwald (V.). *S. coarcticollis* Epp. Hirschberg (Sch.).
Bledius subterraneus Er. Lähn (Sokolowsky).
Oxytelus fulvipes Er. Neisse, unter Mistbeetverpackung (Gb.). *O. fuliginosus* Gr. dto. (Gb.).
Thinobius brevipennis Ksw. Guhrau (V.).
Homalium excavatum Steph. Quanzendorf, unter feuchtem Kellerstroh (Gb.). *H. amabile* Heer. Mittelberg im Glatzer Geb., aus einem Pilze (Gb.).
Batrisus formicarius Aub., *B. Delaportei* Aub. und *B. venustus* Reichb. Lüben: Kl.-Reichen, in einem einzigen Ameisenhaufen (Sz.).
Bythinus validus Aub. Oderwald (V.).
Euplectus sanguineus Denny. Neusalz (Schr.).
Trichonyx sulcicollis Rchb. Quanzendorf (Gb.).
Cephennium Reitteri Bris. Guhrau (V.).
 Zu *Neuraphes parallellus* Chaud. gehört als ♀ *N. Antoniae* Rtrr. (Nach Mitteilung von Reitter.) *N. angulatus* Müll. Guhrau (V.).
Catops fuscus Panz. Hochwald b. Brieg (Gb.). *C. morio* F. Oderwald (V.).
Anisotoma (Liodes) orbicularis Hbst. Quanzendorf (Gb.).
Agathidium mandibulare St. Neisse, aus Grasfauden (Gb.).
A. varians Beck. Hochwald b. Brieg, aus Reisig geklopft (Gb.).
Ptenidium turgidum Thoms. Lüben: Kl.-Reichen (Sz.)
P. laevigatum Gillm. Wölfelsgrund, aus Pilzen (Gb.).
Ptilium affine Er. Guhrau (V.).
Nephanes Titan Newm. Schneeberg, aus verrottetem Dünger (Gb.).
Trichopteryx Montandoni Allib. Guhrau (V.). *T. thoracia* Waltl. Schneeberg, mit *Nephanes* (Gb.).
Phalacrus substriatus Gyl. Wölfelsgrund (Gb.).
Myrmecoxenus vaporariorum Guér. Schneeberg, mit *Nephanes* (Gb.).

- Atomaria umbrina* Gyl. Hochwald b. Brieg, aus Reisig (Gb.).
A. mesomelaena Hbst. Var. *guttula* Mnh. Neisse, im Stadtpark (Gb.). *A. peltata* Kr. ibid. aus Reisig und Stroh geklopft (Gb.).
- Lathridius lardarius* Deg. und *Coninomus nodifer* Westw. Guhrau (V.).
- Corticaria Eppelsheimii* Reitt. Wölfelsgrund 1 Stck., 2tes schlesisches (Gb.). *C. longicollis* Hbst. 1 Stck. Riesengeb.: Melzergrund (Gb.). *C. lapponica* Zett. Guhrau (V.).
C. obscura Bris. ibid. (V.). *C. Pietschi* Ganglb. Das zweite schlesische Stück: Brechelshof b. Jauer (G.).
- Eपुरaea variegata* Hbst. Var. *monochroa* Rtt. Mit der Stammform ss. (G., Gb.).
- Micruria melanocephala* Marsh. Wölfelsgrund (Gb.).
- Cicones pictus* Er. Guhrau, von Eichenzweigen (V.).
- Laemophloeus castaneus* Er. Guhrau, w. v., nicht selten (V.).
- Monotoma spinicollis* Aub. Kottwitz, aus alter Jäte (10.). Hirschberg (Gb.).
- Attagenus marginicollis* Küst. ist nach Ganglb. nur Var. von *piceus*. — *A. pantherinus* Ahr. Neusalz (Schr.).
- Trogoderma versicolor* Creutz. Neusalz (Schr.).
- Agrilus betuleti* Ratzeb. Quanzendorf, im Busch (Gb.).
- Drapedes mordelloides* Hbst. Neusalz, an einer Rüsterklatfer (Schr.).
- Hypocoelus procerulus* Mnh. Breslau, in einer alten Pappel (V.).
- Elater Megerlei* Lac. Guhrau, in einer anbrüchigen Linde 1 Stck. (V.).
- Athous undulatus* Deg. Var. *bifasciatus* Gyl. Spindelmühl (Sch.).
- Cantharis tristis* F. Riesengeb.: Wiesenbaude (Sch.). *C. pulicaria* F. Liegnitz: Damm vor Weißenrode 5. (G.).
- Xylopertha sinuata* F. Neusalz, an dürren Eichenästen (Schr.).
- Cis dentatus* Mill. Wölfelsgrund (Gb.).
- Opatrum riparium* Klingelhöfer. Guhrau (V.).
- Pseudocistela ceramboides* L. Neusalz, an einem Eichenstumpf (Schr.).

Mycetocharis linearis Ill. Neusalz, in einer alten Pappel (Schr.).

Orchesia fasciata Payk. Heuberg i. d. Grafschaft Glatz unter Ahornrinde (Gb.).

Anisoxya fuscata Ill. Guhrau (V.).

Anthicus sellatus Pz. Schlawa, Sandbank am See (Schr.).

Mordellistena inaequalis Muls. Quanzendorf, im Busch geköschert (Gb.).

Meloë sugosus Marsh. Seidorf i. Rsgb. (Sch.). *M. scabriculus* Brandt. Herischdorf b. Warmbrunn (Sch.).

Nacerda ustulata Scop. Schlawa, auf Blumen am See (Schr.).

Barypithes pellucidus Boh. Mehrere Stücke bei Liegnitz am Damme von Weißenrode. 5. 6. (G.). Von Gras.

Gronops lunatus F. Guhrau (V.).

Limobius borealis Payk. Neusalz (Schr.).

Magdalis nitida Gyll. Schweinsdorf (Gb.).

In der Letzner'schen Sammlung befinden sich nur Stücke von *Nanophyes circumscriptus* Aubé. (Gb.)

Formen von *Orchestes alni* L.: Normalfärbung: nur mit einem schwarzen Discalfleck (hfg.). Var. 1: Decken mit je 2 schwarzen Flecken, der vordere Fleck oft nur angedeutet (hfg.) und wenn deutlich ausgebildet, stets viel kleiner als der hintere (seltener). Var. *quadrifasciatus* m. Var. 2: Der Discalfleck verbindet sich breit mit dem Basalfleck, auch erweitert er sich bis an den Nathsaum. Selten ist noch die ganze Naht, fast das ganze Halsschild, sind noch die Beine mit Einschluß der Tarsen und die ganzen Fühler schwarz, so daß zur gänzlich schwarzen Färbung nicht allzuviel fehlt. Var. *connatus* m. Var. 3 Decken einfarbig rostgelb: Var. *ferrugineus* Marsh. (G.)

Marmaropus Besseri Gyll. Guhrau (V.).

Ceuthorrhynchus parvulus Bris. An der Ostrawitzka bei Paskau geköschert (Gb.).

Tropideres pudens Gyll, Guhrau, 1 Ex. (V.). Das Stück zeichnet sich durch vollständige Randung der Halsschildseiten und durch deutliche weiße Haarflecken auf den

Decken aus. Übergänge zur Normalform befinden sich in meiner Sammlung. (G.)

Scolytes Ratzeburgi Janson. Neusalz, an Birkenklaftern (Schr.).

Crypturgus cinereus Hbst. Neusalz, zahlreich unter Kieferrinde (Schr.).

Clytus tropicus Pz. Guhrau (V.).

Monochammus galloprovincialis Oliv. Primkenau (Schr.).

Donacia fennica Payk. Guhrau (V.).

Zeugophora Turneri Power. Liegnitz: Schützenhaus, 1 Ex. (G. 5.).

Cryptocephalus cordiger L. Liegnitz: Panten (G.).

Phyllodecta laticollis Suffr. Quanzendorf (Gb.).

Rhizobius litura F. Neusalz (Schr.).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [NF_31](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1905 1-7](#)