

# Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1906.

Von **J. Gerhardt**—Liegnitz.

---

**Abkürzungen:** Gb. = Gabriel, Generalmajor z. D.—Neisse. G. = Gerhardt, Oberlehrer a. D.—Liegnitz. R. = Reitter, Paskau. S. = Sokolowsky, Rentner—Liegnitz. Sch. = Schubert, Dr. med.—Hirschberg. Schr. = Schreiber, Lehrer—Neusalz. Sz. = Richard Scholz, Lehrer—Liegnitz. T. = Tischler, Lehrer—Rodeland, Kr. Ohlau. V. = v. Varendorff, Amtsrichter—Guhrau.

---

- Tachypus pallipes* Dft. Neisse (Gb).  
*Trechus micros* Hbst. Kottwitz (Gb).  
*Amara nitida* St. Neisse (Gb).  
*Agonum livens* Gyll. *ibid.*  
*Masoreus Wetterhali* Gyll. Rodeland unter Stöcken von  
*Sarothamnus* n. s. (T).  
*Cymindis cingulata* Dej. Ullersdorf im Rabengeb. (G).  
*C. macularis* Dej. Rodeland n. s. in Eanggräben (T).  
*Dromius longiceps* Dej. Oderwald b. Neusalz und *D. nigri-*  
*ventris* Thoms. Neusalz unter Nadelstreu (Schr).  
*Haliplus fulvicollis* Er. Neisse (Gb).  
*Deronectes latus* Steph. Rodeland (T). *D. elegans* St. *ibid.*  
*Hydroporus pubescens* Gyll. Quanzendorf mehrfach (Gb).  
*H. elongatulus* St. Hochwald b. Brieg (Gb). *H. dor-*  
*salis* F. Neisse, Quanzendorf, Hochwald b. Br. (Gb).

- Agabus didymus* Ol. Rodeland, in klaren Gräben (T).  
*A. nebulosus* Forster. Neisse und melanarius Aub.  
 Riesengeb. (Gb.).  
*Rhantus notaticollis* Aub. Rodeland, im Winter unter  
 Moos (T.). *R. consputus* St. Neusalz (Schr.).  
*Dyticus circumflexus* F. Riesengeb. (Klette).  
*Gyrinus marinus* Var. *opacus* Sahlb. Riesengeb. 2 Stck.  
 (Klette).  
*Orectochilus villosus* Müll. Neisse z. hfg. (Gb.).  
*Limnichus sericeus* Dft. Neisse (Gb.).  
*Latelmis opaca* Müll. Paskau a. d. Ostrawitza (Reitter).  
*Heterocerus fossor* Ksw. Am Neisseufer hfg. (Gb.).  
*Autalia rivularis* Gr. Beskiden (Gb.).  
*Bolitochara obliqua* Er. Altvater und Beskiden (Gb.).  
*B. brevicollis* Kr. Beskiden (Gb.).  
*Leptusa puellaris* Hamp. Altvatergipfel hfg., Gl. Schnee-  
 berg seltener, Wiesenberg i. Rsg. 1 Stck. (Gb.). *L. haemorrhoidalis* Heer. Zuckmantel (Gb.). *L. ruficollis* Er.  
 Altvater unter Ahornrinde hfg. (Gb.).  
*Ischnoglossa prolixa* Var. *rufopicea* Kr. Hochwald Kr.  
 Brieg (Gb.).  
*Thamiaraea hospita* Märk. Zwischen Erdmannsdorf und  
 Hirschberg an Pappelsaft, mit *T. cinnamomea* (G.).  
*Microglossa pulla* Gyll. Neisse und Kottwitz (Gb.).  
*Aleochara brevipennis* Gr. Neisse (Gb.). *A. morion* Gr.  
 Neisse und Schweinsdorf (Gb.). *A. lygaea* Kr. Wölfels-  
 grund (Gb.). *A. sanguinea* L. Wölfelsgrund und Schweins-  
 dorf (Gb.). *A. moerens* Gyll. Riesengeb. (Klette). *A. bi-*  
*lineata* Gyll. und *verna* Say. Wölfelsgrund (Gb.).  
*Dinarda dentata* Gr. Quanzendorf (Gb.).  
*Lomechusa strumosa* Gr. Quanzendorf (Gb.).  
*Atemeles emarginatus* Var. *nigricollis* Kr. Quanzen-  
 dorf (Gb.).  
*Myrmedonia Haworthi* Steph. Quanzendorf (Gb.). *M. simi-*  
*lis* Märk. Rodeland (T.).  
*Ocalea badia* Er. Ellguth b. Steinau i. O/S. und *O. rivu-*  
*laris* Mill. Schweinsdorf (Gb.).

- Calodera umbrosa* Er. Jannowitz (Sch.). *C. uliginosa* Er. Kottwitz, *C. riparia* Er. *ibid.* (Gb.). *C. aethiops* Gr. Neisse und Kottwitz (Gb.).
- Falagria nigra* Gr. Neisse (Gb.), Riesengeb. (Klette).
- Tachyusa scitula* Er. Neisse (Gb.). *T. umbratica* Er. Wildgrund am Fuße der Bischofskoppe (Gb.). *T. atra* Gr. Ostrawitza, Altvatergeb., Neisse (Gb.).
- Gnypeta carbonaria* Aub. Wölfelsgrund, Neisse, und *G. ripicola* Ksw. Kottwitz und Neisse (Gb.).
- Atheta languida* Er. Altvatergeb. (Gb.). *A. insecta* Th. und *A. complana* Mnnh. Neisse (Gb.). *A. hygropora* Kr. Kottwitz und Wölfelsgrund aus Wassermoos an Steinen (Gb.). *A. luridipennis* Mannh. (Gb.). *A. alpestris* Heer. Altvatergeb. (Gb.). *A. oblonga* Er. Neisse und Schweinsdorf (Gb.). *A. pagana* Er. Glatzer Geb. (Gb.). *A. microptera* Th. Altvater, Zuckmantel, Quanzendorf (Gb.). *A. hypnorum* Ks. Quanzendorf (Gb.). *A. melanocephala* Heer. Hochwald Kr. Brieg (Gb.). *A. incognita* Sharp. Ellguth b. Steinau O/S. (Gb.). *A. Pertyi* Heer. Glatzer Geb. (Gb.). *A. pilicornis* Th. Altvatergeb. (Gb.). *A. nitidicollis* Fairm. Neisse und Quanzendorf (Gb.). *A. pallidicornis* Th. Neisse, Schweinsdorf und Hochwald Kr. Brieg (Gb.). *A. coriaria* Kr. *ibid.* (Gb.). *A. cinnamoptera* Th. Glatzer Geb. (Gb.). *A. picipennis* Mnnh. und *atramentaria* Gyll. Neisse (Gb.). *A. cada-verina* Bris. Beskiden und Ziegenhals (Gb.). *A. macrocera* Th. und *nigricornis* Th. Altvatergeb. (Gb.). *A. picipes* Th. Ziegenhals (Gb.). *A. indubia* Sharp. Neisse, Schweinsdorf (Gb.). *A. hodierna* Sharp. Kottwitz und Hochwald Kr. Brieg (Gb.). *A. subtilis* Scriba. Neisse, Schweinsdorf, Beskiden (Gb.). *A. liliputana* Bris. Ellguth (Gb.). *A. mortuorum* Th. Weißenrode b. Liegnitz unter Jäte von *Cirsium arvense* mehrfach (G.). *A. palleola* Er. Neisse, Ziegenhals, Quanzendorf (Gb.). *A. indocilis* Heer. Neisse (Gb.). *A. orphana* Er. Quanzendorf, Kottwitz, Neisse, Hochwald Kr. Brieg (Gb.). *A. subsinuata* Er. Wölfelsgrund 1 Ex. (Gb.).

- Placusa atrata* Sahlb. Beskiden (Gb.).  
*Thectura cuspidata* Er. Altvatergeb., Neisse (Gb.).  
*Phloeopora corticalis* Gr. Hochwald Kr. Brieg (Gb.).  
*Oxypoda vittata* Märk. Plümkenau O/S. in morscher Eiche (Schr.).  
*O. rugulosa* Kr. Hochwald b. Brieg (Gb.).  
*O. testacea* Er. Beskiden unter Ahornlaub (Gb.).  
*O. rufescens* Kr. Hochwald b. Brieg (Gb.).  
*Ocyusa incrassata* Rey. Beskiden (R.).  
*O. maura* Er. Neisse, Reisigbündel (Gb.).  
*Gyrophana fasciata* Marsh. Neisse und Hochwald b. Brieg (Gb.).  
*Myllaena infuscata* Kr. Neisse (Gb.).  
*Tachinus bipustulatus* T. Rodeland an Pappelsaft (T.).  
*T. pallipes* Gr. Quanzendorf (Gb.).  
*T. rufipennis* Gyll. Paskau (R.).  
*Conurus immaculatus* Steph. Quanzendorf (Gb.).  
*C. pedicularius* v. *lividus* Er. Neisse (Gb.).  
*C. bipunctatus* Grav. Rodeland, in Fichtenmulm (T.).  
*Bolitobius trimaculatus* v. *discophorus* Rey Wölfelsgrund, unter faulem Heu (Gb.).  
*Megacronus analis* E. Ohlau, im Oderwalde unter Laub (T.), Quanzendorf (Gb.).  
*Mycetoporus punctus* Gyll. Beskiden.  
*M. corpulentus* Luze *ibid.* (Gb.).  
*M. clavicornis* Steph. Riesengeb., Schweinsdorf (Gb.).  
*Velleius dilatatus* F. Riesengeb., Nimptsch (Gb.).  
*Quedius ochropterus* Er. Quanzendorf (Gb.).  
*Q. cintillans* Grav. Glatzer Geb. (Gb.).  
*Staphylinus stercorarius* Oliv. Neisse (Gb.).  
*Philonthus nitidus* F. Aupagrund (Sch.).  
*P. coruscus* Grav. Glatzer Geb., Quanzendorf (Gb.).  
*P. quisquiliarius* v. *inquinatus* Steph. Riesengeb. (Gb.).  
*P. rubripennis* Ksw. Glatzer Geb. (Gb.).  
*P. agilis* Gr. Unter Jäte von *Cirsium arvense* b. Liegnitz (G.).  
*P. fumarius* Grav. Kottwitz (Gb.).  
*P. nigrita* Grav. Neisse und Kottwitz (Gb.).  
*Othius laeviusculus* Steph. Neisse (Gb.).  
*Baptolinus pilicornis* Payk. Beskiden (Gb.).

- Xantholinus distans* Rey: Altvater- und Glatzer Geb. (Gb.).  
*Achenium depressum* Grav. Jeltsch bei Hochwasser (T.).  
*Lathrobium castaneipenne* Kol. Beskiden (Gb.). *L. pallidum* Nordm. Kottwitz (Gb.). *L. multipunctatum* Gr. Kottwitz, Quanzendorf (Gb.). *L. picipes* Er. Paskau (R.).  
*Medon obscurellus* Er. Glatzer Geb. (Gb.). *M. ripicola* Kr. Neisse (Gb.).  
*Sunius immaculatus* Steph. Hochwald b. Brieg (Gb.).  
*Paederus limnophilus* Er. Neisse (Dr. Marx).  
*Stenus fossulatus* Er. Glatzer Geb. (Gb.). *S. pusillus* Steph. Neisse (Gb.). *S. bimaculatus* Gyll. Kottwitz, Hochwald b. Brieg (Gb.). *S. silvester* Er. Kottwitz (Gb.).  
*S. melanarius* Steph. Hirschberg (Schn.). *S. cautus* Er. Kottwitz (Gb.). *S. brunnipes* Steph. Altvatergeb. (Gb.).  
*S. geniculatus* Grav. Glatzer Geb., Neisse (Gb.).  
*Euaesthetus laeviusculus* Mannh. Kottwitz (Gb.).  
*Platystetus nitens* Sahlb. Kottwitz (Gb.).  
*Oxytelus rugifrons* Hochh. Neisse u. O. *fulvipes* Er. *ibid.* in Mistbeetverpackung (Gb.).  
*Lesteva longelytrata* v. *maura* Er. Quanzendorf (Gb.).  
*Olophrum piceum* Gyll. Rodeland, unter *Calluna* im Winter n. s. (T.).  
*Acidota crenata* F. Rodeland unter *Calluna* (T.).  
*Arpedium quadrum* Grav. Riesengeb. (Klette).  
*Homalium oxyacanthae* Grav. Unter Jäte von *Cirsium arvense* b. Liegnitz auf einem Fahrwege s. hfg. (G. 6).  
*H. elegans* Kr. Beskiden (Gb.). *H. nigrum* Grav. Hochwald b. Brieg, Altvater- und Glatzer Geb. (Gb.).  
*H. striatum* Gr. Neisse (Gb.).  
*Acrulia inflata* Gyll. Beskiden (Gb.).  
*Megarthus nitidulus* Kr. Quanzendorf (Gb.).  
*Batrisus Delaportei* Aub. und *venustus* Rchb. Hochwald b. Brieg (Gb.).  
*Bryaxis juncorum* Leach. Quanzendorf und Hochwald Kr. Brieg (Gb.).  
*Bythynus clavicornis* Pz. Hochwald Kr. Brieg. *B. distinctus* Chaud. Quanzendorf. *B. securiger* Rchb.

- Kottwitz, Quanzendorf. *B. puncticollis* Denny Beskiden (Gb.).
- Euplectus signatus* Rchb. Patschkau, Neisse, Quanzendorf (Gb.).
- Euthia scydmaenoides* Steph. Patschkau, in Mistbeetverpackung (Gb.).
- Scydmaenus denticornis* Müll. Quanzendorf (Gb.).
- Ptomaphagus picipes* F. Beskiden (Gb.). *P. fuscus* Pz. Riesengeb. (Klette). *P. neglectus* Kr. Beskiden. *P. anisotomoides* Spence. Ellguth, Kl.-Schnellendorf (Gb.).
- Colon clavigerum* Hbst. Quanzendorf. *C. affine* St. *ibid.* (Gb.). *C. latum* Kr. Beskiden.
- Parasilpha tristis* Illig. Zuckmantel (Marx).
- Liodes obesa* Schm. Altvatergeb. *L. dubia* Kug. Patschkau (Gb.). *L. pallens* St. Beskiden (Rtt.). *L. hybrida* Er. Riesengeb. (Klette).
- Agathidium varians* Beck. Ellguth. *A. discoideum* Er. Beskiden. *A. marginatum* St. Quanzendorf (Gb.).
- Millidium minutissimum* Web. Kl.-Schnellendorf (Gb.).
- Oligella foveolatum* Allib. Grafsch. Glatz. *P. Spencei* Allib. *ibid.* (Gb.).
- Micrus filicornis* Fairm. Neisser und Glatzer Geb. (Gb.).
- Orthoperus coriaceus* Muls. Kottwitz, Hochwald b. Brieg, Quanzendorf (Gb.).
- Mycetina cruciata* Schall. Sprottauer Forst (Schr.).
- Cryptophagus Schmidtii* Strm. Neisse (Gb.).
- Coenoscelis ferruginea* Sahlb. Waldenburg a. Altv. (Gb.).
- Atomaria alpina* Heer. Grafsch. Glatz (Gb.).
- Carpophilus sexpustulatus* F. Rodeland, unter Eichenrinde (T. 5).
- Nitidula bipunctata* L. Riesengeb. (Klette).
- Meligethes corvinus* Er. Schweinsdorf und Quanzendorf (Gb.). *M. obscurus* Er. Oberf. Panten und Pantener Höhen je 1 Stck. (G.). Erste Fundorte für prß. Schlesien. *M. Kunzei* Er. 3 Stck. im Glatzer Geb. (Gb.).
- Cryptarcha imperialis* F. Neisse (Gb.).
- Rhizoglyphus perforatus* Er. Neisse, Glatzer Geb. (Gb.).

- Nemosoma elongatum* L. Rodeland, zuweilen hfg. (T).  
*Monotoma spinicollis* Aub. Glatzer Geb. (Gb).  
*Dermestes vulpinus* F. Neusalz, in einem aus S.-W.-Afrika stammenden Büffelschädel 2 Stck. (Schr.). *D. bicolor* F. Neisse (Gb).  
*Platysoma oblongum* F. und *lineare* Er. Rodeland (T).  
*Gnathoneus rotundatus* Kug. Ellguth, Kottwitz (Gb).  
*Aphodius plagiatus* L. Rodeland (T). *A. testudinarius* F. Liegnitz, vor Weißenrode (G.).  
*Hoplia graminicola* F. Rodeland (T).  
*Gnorimus variabilis* L. Sprottauer Forst (Schr.).  
*Buprestis haemorrhoidalis* Hbst. Petersdorf bei Primkenau (Schr.).  
*Chrysobotrys affinis* F. Sprottauer Forst (Schr.).  
*Agrilus betuleti* Ratzb. Neusalz (Schr.). *A. pratensis* Ratzb. *ibid.* *A. graminis* Lap. *ibid.*  
*Elater Megerlei* Lac. Neusalz (Schr.).  
*Melanotus punctolineatus* Pel. Neusalz, von Birkenholz (Schr.).  
*Athous rufus* Deg. Rodeland, n. s. (T).  
*Eucinetus haemorrhoidalis* Germ. Rodeland, unter Besenginster n. s. (T).  
*Anthonomus sanguinolentus* F. Rodeland (T. 9).  
*Necrobia rufipes* Deg. An einem afrikanischen Büffelschädel. Neusalz (Schr.).  
*Hylecoetus dermestoides* L. Rodeland (T).  
*Gastrallus immarginatus* Müll. Rodeland (T).  
*Xyletinus ater* Pz. Rodeland (T).  
*Pseudocistela ceramboides* L. und *v. serrata* Chev. an einem Eichenstumpf. Neusalz (Schr.).  
*Orchesia minor* Walk. Sattler b. Hirschberg (Sch.), Primkenau, an einer Eiche (Schr.). *O. fasciata* Payk. *ibid.*  
*Abdera flexuosa* Payk. Im Oderwalde bei Neusalz an einem Weißbuchenschwamme (Schr.).  
*Xylita laevigata* Hellen. Smortave b. Brieg (T.), Beskiden (Pietsch).  
*Euglenes pygmaeus* Deg. Hirschberger Tal (Sch.).

- Pyrochroa pectinicornis* L. Peisterwitz b. Ohlau auf jungen Birken n. s. (T.), Stonsdorf (Sch.).
- Pelecotoma fennica* Payk. Kraika, an Ritzen von Scheunentbalken und -Türen, an alten Bienenstöcken n. s. (T.).
- Meloe coriarius* Br. Rodeland (T.). Var. *rufiventris* Germ. Quanzendorf (Gb.).
- Cleonus segnis* Germ. Guhrau, in einer Sandgrube (Varend.).
- Orthochaetes setiger* Beck. Beskiden (Gb.).
- Trachodes hispidus* L. Sprottauer Forst (Schr.).
- Phytobius granatus* Gyll. Paskau (R.).
- Phloeosinus thujae* Perris. Freistadt (Schr.).
- Pityophthorus Lichtensteini* Ratzb. Beskiden, von trockenen Ästen geklopft (Gb.).
- Xyleborus cryptophagus* Ratzb. Peisterwitz b. Ohlau im Oderwalde unter Lindenrinde zahlreich (T. 8).
- Callidium angustum* Kriechb. Petersdorf bei Primkenau an einem dünnen Fichtenaste (Schr.).
- Clytus arvicola* Oliv. Neusalz, mehrere Stck. an einer Weißbuche (Schr.).
- Donacia fennica* Payk. Kraika (T. 6).
- Cryptocephalus distinguendus* Schneid. Rodeland auf Birken (T.). *C. janthinus* Germ. Zinnoberteich bei Garsuche (T.).
- Chrysomela analis* L. Rodeland n. s. auf Brachen (T.).
- Melosoma collaris* L. Rodeland, auf Pappeln und Weiden n. s. (T.).
- Sermyla halensis* L. Guhrau (V.).
- Aphthona ovata* Foudr. Beskiden (R.).
- Semiadalia 11-notata* Schnd. Quanzendorf und Neisse auf Dolden (Gb.).
- Hyperaspis campestris* Hbst. Riesengeb., Neisse, Schweinsdorf, Quanzendorf, Hochwald Kr. Brieg, Kottwitz (Gb.).
- H. reppensis* Hbst. Neisse (Gb.).
- Scymnus suturalis* var. *limbatus* Steph. Kottwitz (Gb.).
- S. frontalis* var. *4-pustulatus* Hbst. Neisse, Quanzendorf, Riesengeb. (Gb.). *S. Redtenbacheri* Muls. Kottwitz (Gb.).



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Zeitschrift für Entomologie Breslau](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [NF\\_32](#)

Autor(en)/Author(s): Gerhardt Julius

Artikel/Article: [Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1906 1-8](#)