

## Die nachgelassenen Käfer von HANS-PETER GEISSEN in der Rheinlandsammlung im Museum Koenig

NILS HENATSCH, EVA PLATH & THOMAS WAGNER

**Kurzfassung:** Im Nachlass von HANS-PETER GEISSEN fanden sich Käfer, die im Naturraum Mittelrheintal zwischen Koblenz-Wallersheim und Boppard zwischen 1993 und 2002 gesammelt wurden. Von elf Fundorten ergaben sich 421 Käfernachweise in 274 Arten, von denen 340 Belege angefertigt und in die Rheinlandsammlung des Museum Koenig in Bonn eingegliedert wurden.


**Abstract:** HANS-PETER GEISSEN passed away in October 2013. In his insect collection, stored in alcohol, also beetles from the Mid-Rhine area between Koblenz-Wallersheim and Boppard, collected from 1993 to 2002 have been found. From eleven localities, 421 specimens in 274 species could be recorded, and 340 reference objects are incorporated in the Rhineland collection of beetles in Museum Koenig, Bonn.

### Einleitung

HANS-PETER GEISSEN (Abb. 1) hatte seinen Lebensmittelpunkt in seinem Haus direkt am Rhein in Koblenz-Stolzenfels. Er zog hier als Kleinkind ein und verstarb dort am 26. Oktober 2013 im 57. Lebensjahr. Das Interesse an bzw. die Begeisterung für Biologie waren ihm „in die Wiege gelegt“. Seine Publikationen zeugen von einem beeindruckend breiten Wissen und es gibt kaum jemand in der heutigen Zeit, der ein derartiges „Allroundwissen“ von Makrozoobenthos, terrestrischen Schnecken- und Insektengruppen bis zu den Vögeln und Säugetieren aufweisen kann. Sein Interessensschwerpunkt lag im limnologischen Bereich, sicherlich beeinflusst vom Leben am Ufer des Stromes vor seiner Haustür und forciert durch einige Jahre freiberuflicher Beschäftigung für die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) in Koblenz. Dabei hat er sich seine limnologischen und faunistischen Kenntnisse weitgehend selbst erarbeitet. Intensive Literaturrecherchen wurden vor allem über die Rheinische Landesbibliothek in Koblenz betrieben und er stand mit vielen Spezialisten in regem Kontakt. Aufgrund dieser thematischen Breite wurde sein Nachruf in „Fauna & Flora von Rheinland-Pfalz“ publiziert (WAGNER 2019) wodurch er einer breiteren Leserschaft zugänglich gemacht werden konnte.



**Abb. 1:** HANS-PETER GEISSEN im Juli 1996 auf einer Exkursion im Koblenzer Stadtwald am Remstecken (Foto: MANFRED BRAUN).



**Abb. 2:** Beispiel für einen Fundort- und Bestimmungszettel von H.-P. GEISSEN

Im Kreise der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen war er weitgehend unbekannt. Mit FRANK KÖHLER hatte er einige Male zu rheinischen Neufunden bei Koblenz korrespondiert und hierzu kleinere Manuskripte für die Mitteilungen eingereicht. Ich (THOMAS WAGNER) kann mich, aufgefrischt durch Erinnerungen HORST-DIETER MATERNS („dem hast du schon die Hand gegeben“), nur vage an eine Begegnung während einer Gemeinschaftsexkursion Ende Mai 2002 am Bopparder Hamm erinnern. Käfer, die HANS-PETER GEISSEN anlässlich dieser Exkursion gesammelt hatte, sind nun neben vielen anderen, in unsere Hände geraten.

Aufmerksam auf seine Sammeltätigkeit wurde ich (THOMAS WAGNER) während der Bearbeitung des nachgelassenen Manuskriptes über die rheinischen Aphodien von HEINZ BAUMANN, in dem H.-P. GEISSEN öfters als „Gewährsmann“ erwähnt wird. Eine Nachfrage bei seinem Bruder THOMAS GEISSEN ergab, dass sich noch einiges Insektenmaterial in Sammlungsgläsern auf der Terrasse des Hauses in Koblenz-Stolzenfels befand. Allerdings war das nur ein Teilbestand.

Ein weiterer Teil war zwischenzeitig „entsorgt“ worden. Gemäß der üblichen Aufbewahrung limnologischer Proben, waren alle Insekten in Gläschen mit Wattestopfen in großen Sammelgläsern, nach Großgruppen getrennt, untergebracht. Die zugehörigen Fundortzettel waren sorgfältig mit Bleistift oder Tusche beschriftet, und erhielten zu 98 % einen Artnamen, Fundort, Nr. der TK25 und zugehörigem Minutenfeld, Datum und dem Zusatz leg. GEISSEN (Abb. 2).

Insgesamt lagen sechs gut gefüllte ein bzw. eineinhalb Liter Gläser mit Käferproben vor. Diese wurden im Rahmen von Forschungspraktika von NILS HENATSCH und EVA PLATH aufgeklebt oder genadelt und die Bestimmung überprüft. Die Determination konnte dabei bis auf wenige Ausnahmen bestätigt werden, was einmal mehr die sehr sorgfältige Bearbeitung von Proben durch HANS-PETER GEISSEN belegt – auch für Gruppen die nicht in seinem Fokus standen. Bei den Präparaten wurden die Originaletiketten erhalten und für den am häufigsten vorkommenden Fundort, der Brunnenstraße 34 in Koblenz-Stolzenfels, zusätzlich ein neu gedrucktes Etikett angebracht. Von elf Fundorten (vgl. Tab. 1) ergaben sich 421 Käfernachweise in 274 Arten, von denen 340 Belege angefertigt und in die Rheinlandsammlung des Museum Koenig in Bonn eingegliedert wurden.

**Tab. 1:** Fundorte der von HANS-PETER GEISSEN nachgelassen Käfer.

	<b>Fundort</b>	<b>MTK25/ Minutenfeld</b>	<b>Datum</b>
A	Koblenz-Stolzenfels (Süd)	5711/06	IV.1993, VII.1994, X.1996, III.1997, V.1997, VII.1997, I.2001, V.2001, VII.2002, VIII.2002
B	Koblenz, Remstecken	5611/53	IV.1995, VI.1996, VII.1996, IX.1999, VI.2002
C	Koblenz, Schwanenteich, Siechhaustal	5611/36; 46	II.1997, V.2000, VII.2000, VII.2002
D	Koblenz-Wallersheim, Kesselheim	5611/06	V.1999, V.2000, VI.2000
E	Boppard, Hamm	5711/27	V.2002, VI.2002, VII.2000, IX.2002
F	Boppard, Vierseenblick, Mühlthal	5711/34; 35	V.2002
G	Brey, Christkopf	5711/18; 28	VII.1996, X.1996, V.1999, V.2002, VI.2002, VII.2002
H	Osterspai, NSG Schottel	5711/37	V.2000, VI.2000, V.2001, VI.2001, VI.2002
I	Rhens, Kieselberg, Tauberbachtal	5711/16; 17	VI.1997, VII.1997
J	Rhens, Rheinufer, Brunnen	5711/07	VII.1996, V.1999, VI.2000, VII.2002
K	Spay	5711/27; 29	VII.1996, V.1997, VII.1997, V.2002, VI.2002



R	S	CODE	NAME	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		01-.0632.001-	<i>Paranchus albipes</i> (F., 1796)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		01-.065-.021-	<i>Amara aenea</i> (DEGEER, 1774)	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.
		01-.079-.012-	<i>Dromius quadrimaculatus</i> (L., 1758)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		04-.000-.000-	<b>DYTISCIDAE - Schwimmkäfer</b>											
		04-.001-.001-	<i>Hyphydrus ovatus</i> (L., 1761)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		04-.023-.007-	<i>Agabus guttatus</i> (PAYK., 1798)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		09-.000-.000-	<b>HYDROPHILIDAE - Wasserfr.</b>											
		09-.003-.023-	<i>Cercyon analis</i> (PAYK., 1798)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		09-.008-.001-	<i>Hydrobius fuscipes</i> (L., 1758)	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		09-.011-.009-	<i>Laccobius minutus</i> (L., 1758)	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
		10-.000-.000-	<b>HISTERIDAE - Stutzkäfer</b>											
		10-.018-.001-	<i>Carcinops pumilio</i> (ER., 1834)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
s		10-.020-.002-	<i>Paromalus parallelepipedus</i> (HBST., 1792)	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		10-.029-.003-	<i>Margarinotus purpurascens</i> (HBST., 1792)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		12-.000-.000-	<b>SILPHIDAE - Aaskäfer</b>											
		12-.001-.002-	<i>Necrophorus humator</i> (GLED., 1767)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		12-.001-.006-	<i>Necrophorus vespilloides</i> HBST., 1783	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		12-.003-.002-	<i>Thanatophilus sinuatus</i> (F., 1775)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
		12-.006-.001-	<i>Xylodrepa quadrimaculata</i> (SCOP., 1772)	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		12-.007-.005-	<i>Silpha tristis</i> L., 1798	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		12-.009-.001-	<i>Phosphuga atrata</i> (L., 1758)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		14-.000-.000-	<b>CHOLEVIDAE - Nestkäfer</b>											
		14-.011-.020-	<i>Catops picipes</i> (F., 1792)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		23-.000-.000-	<b>STAPHYLINIDAE - Kurzflügler</b>											
		23-.010-.022-	<i>Eusphalerum luteum</i> (MARSH., 1802)	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		23-.032-.013-	<i>Lesteva pubescens</i> MANNH., 1830	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		23-.035-.006-	<i>Anthophagus bicornis</i> (BLOCK, 1799)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		23-.0481.003-	<i>Anotylus rugosus</i> (F., 1775)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		23-.061-.006-	<i>Rugilus orbiculatus</i> (PAYK., 1789)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		23-.088-.016-	<i>Philonthus coruscus</i> (GRAV., 1802)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		23-.088-.025-	<i>Philonthus politus</i> (L., 1758)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
r		23-.088-.030-	<i>Philonthus nitidus</i> (F., 1787)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		23-.091-.001-	<i>Creophilus maxillosus</i> (L., 1758)	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
		23-.095-.005-	<i>Platydracus stercorarius</i> (OL., 1795)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		23-.099-.004-	<i>Ocyopus ophthalmicus</i> (SCOP., 1763)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		23-.104-.005-	<i>Quedius lateralis</i> (GRAV., 1802)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		23-.104-.022-	<i>Quedius cinctus</i> (PAYK., 1790)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		23-.117-.013-	<i>Tachinus signatus</i> GRAV., 1802	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		24-.000-.000-	<b>PSELAPHIDAE - Palpenkäfer</b>											
2	r	24-.015-.005-	<i>Batrisodes buqueti</i> (AUBE, 1833)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.

R S CODE	NAME	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	25-.000-.000-. <b>LYCIDAE - Rotdeckenkäfer</b>											
r	25-.004-.001-. <i>Platycis minutus</i> (F., 1787)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	251.000-.000-. <b>OMALISIDAE - Rotdeckenk.</b>											
	251.001-.001-. <i>Omalisus fontisbellaquaei</i> GEOFFR. 1785	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	26-.000-.000-. <b>LAMPYRIDAE - Leuchtkäfer</b>											
	26-.001-.001-. <i>Lampyris noctiluca</i> (L., 1758)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	26-.002-.001-. <i>Lamprohiza splendidula</i> (L., 1767)	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	26-.003-.001-. <i>Phosphaenus hemipterus</i> (GOEZE, 1777)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27-.000-.000-. <b>CANTHARIDAE - Weichkäfer</b>											
	27-.002-.008-. <i>Cantharis pellucida</i> F., 1792	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
	27-.002-.014-. <i>Cantharis obscura</i> L., 1758	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
	27-.002-.026-. <i>Cantharis livida</i> L., 1758	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27-.002-.027-. <i>Cantharis rufa</i> L., 1758	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27-.005-.002-. <i>Rhagonycha fulva</i> (SCOP., 1763)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27-.005-.014-. <i>Rhagonycha gallica</i> PIC, 1923	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
	27-.008-.001-. <i>Malthinus punctatus</i> (GEOFFR., 1785)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	27-.008-.001-. <i>Malthinus punctatus</i> (GEOFFR., 1785)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	28-.000-.000-. <b>DRILIDAE - Schneckenhausk.</b>											
	28-.001-.002-. <i>Drilus flavescens</i> OL., 1790	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	29-.000-.000-. <b>MALACHIIDAE - Zipfelkäfer</b>											
3	29-.001-.001-. <i>Troglops albicans</i> (L., 1767)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	29-.0063.006-. <i>Clanoptilus elegans</i> (OL., 1790)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	29-.014-.002-. <i>Axinotarsus pulicarius</i> (F., 1775)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	30-.000-.000-. <b>MELYRIDAE - Wollhaarkäfer</b>											
2	30-.002-.003-. <i>Aplocnemus virens</i> (SUFFR., 1843)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	30-.005-.008-. <i>Dasytes plumbeus</i> (MÜLL., 1776)	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
r	30-.007-.001-. <i>Dolichosoma lineare</i> (ROSSI, 1794)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
	30-.008-.002-. <i>Danacea pallipes</i> (PANZ., 1793)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	30-.008-.007-. <i>Danacea nigritarsis</i> (KÜST., 1850)	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
	31-.000-.000-. <b>CLERIDAE - Buntkäfer</b>											
3	31-.002-.001-. <i>Tillus elongatus</i> (L., 1758)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 r	31-.003-.001-. <i>Tilloidea unifasciata</i> (F., 1787)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
	31-.006-.002-. <i>Opilo mollis</i> (L., 1758)	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
	34-.000-.000-. <b>ELATERIDAE - Schnellkäfer</b>											
3	34-.001-.0201. <i>Ampedus quercicola</i> (BUYSS., 1887)	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
3	34-.001-.022-. <i>Ampedus elongatulus</i> (F., 1787)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	34-.010-.002-. <i>Agriotes pallidulus</i> (ILL., 1807)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
	34-.010-.005-. <i>Agriotes ustulatus</i> (SCHALL., 1783)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	34-.010-.007-. <i>Agriotes pilosellus</i> (SCHÖNH., 1817)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	34-.013-.001-. <i>Synaptus filiformis</i> (F., 1781)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	34-.019-.001-. <i>Agrypnus murina</i> (L., 1758)	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.







R	S	CODE	NAME	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		73-000-000-	<b>SCRAPTIIDAE - Seidenkäfer</b>											
3	r	73-001-003-	<i>Scraptia fuscula</i> MÜLL., 1821	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		73-004-009-	<i>Anaspis frontalis</i> (L., 1758)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		73-004-010-	<i>Anaspis maculata</i> (GEOFFR., 1785)	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3		73-004-014-	<i>Anaspis pulicaria</i> COSTA, 1854	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
		73-004-022-	<i>Anaspis flava</i> (L., 1758)	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
		79-000-000-	<b>MORDELLIDAE - Stachelkäfer</b>											
		79-001-001-	<i>Tomoxia bucephala</i> COSTA, 1854	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	r	79-003-004-	<i>Mordella leucaspis</i> KÜST., 1849	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
3		79-003-006-	<i>Mordella aculeata</i> L., 1758	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
		79-011-036-	<i>Mordellistena micantoides</i> ERM., 1954	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.
		79-012-001-	<i>Mordellochroa abdominalis</i> (F., 1775)	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
		80-000-000-	<b>MELANDRYIDAE - Dusterkäfer</b>											
2	r	80-016-002-	<i>Melandrya barbata</i> (F., 1792)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		81-000-000-	<b>LAGRIIDAE - Wollkäfer</b>											
		81-001-001-	<i>Lagria hirta</i> (L., 1758)	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		82-000-000-	<b>ALLECULIDAE - Pflanzenkäfer</b>											
2	r	82-001-003-	<i>Allecula rhenana</i> BACH, 1856	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2		82-005-001-	<i>Pseudocistela ceramboides</i> (L., 1761)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		83-000-000-	<b>TENEBRIONIDAE - Schwarzk.</b>											
		83-033-003-	<i>Tenebrio molitor</i> L., 1758	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
		841.000-000-	<b>TROGIDAE - Knochenkäfer</b>											
		841.001-004-	<i>Trox scaber</i> (L., 1767)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		85-000-000-	<b>SCARABAEIDAE - Blatthornk.</b>											
		85-014-008-	<i>Onthophagus ovatus</i> (L., 1767)	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
		85-014-019-	<i>Onthophagus coenobita</i> (HBST., 1783)	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
		85-019-012-	<i>Aphodius rufipes</i> (L., 1758)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		85-019-031-	<i>Aphodius sticticus</i> (PANZ., 1798)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		85-019-044-	<i>Aphodius prodromus</i> (BRAHM, 1790)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		85-019-066-	<i>Aphodius ater</i> (DEGEER, 1774)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		85-025-001-	<i>Serica brunna</i> (L., 1758)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		85-030-001-	<i>Amphimallon solstitiale</i> (L., 1758)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		85-045-001-	<i>Cetonia aurata</i> (L., 1761)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		85-051-001-	<i>Trichius fasciatus</i> (L., 1758)	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		87-000-000-	<b>CERAMBYCIDAE - Bockkäfer</b>											
		87-004-001-	<i>Prionus coriarius</i> (L., 1758)	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		87-006-001-	<i>Spondylis buprestoides</i> (L., 1758)	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
		87-011-003-	<i>Rhagium mordax</i> (DEGEER, 1775)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		87-015-001-	<i>Stenocorus meridianus</i> (L., 1758)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		87-0201.001-	<i>Dinoptera collaris</i> (L., 1758)	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.

R	S	CODE	NAME	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		87-.023-.002-	<i>Grammoptera ruficornis</i> (F., 1781)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
		87-.024-.001-	<i>Alosterna tabacicolor</i> (DEGEER, 1775)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
2	r	87-.027-.0021.	<i>Leptura aurulenta</i> (F., 1792)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3		87-.0271.002-	<i>Anoplodera sexguttata</i> (F., 1775)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
		87-.0272.001-	<i>Pseudovadonia livida</i> (F., 1776)	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.
		87-.0274.006-	<i>Corymbia rubra</i> (L., 1758)	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3		87-.0274.009-	<i>Corymbia scutellata</i> (F., 1781)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		87-.0293.001-	<i>Stenurella melanura</i> (L., 1758)	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		87-.0293.002-	<i>Stenurella bifasciata</i> (MÜLL., 1776)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
3		87-.032-.003-	<i>Cerambyx scopolii</i> FUSSL., 1775	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.
		87-.039-.001-	<i>Molorchus minor</i> (L., 1758)	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
		87-.045-.001-	<i>Aromia moschata</i> (L., 1758)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		87-.048-.001-	<i>Hylotrupes bajulus</i> (L., 1758)	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		87-.054-.001-	<i>Pyrrhidium sanguineum</i> (L., 1758)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		87-.055-.001-	<i>Phymatodes testaceus</i> (L., 1758)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
r		87-.057-.004-	<i>Xylotrechus antilope</i> (SCHÖNH., 1817)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
		87-.063-.001-	<i>Anaglyptus mysticus</i> (L., 1758)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3		87-.071-.002-	<i>Mesosa nebulosa</i> (F., 1781)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		87-.075-.002-	<i>Pogonocherus hispidus</i> (L., 1758)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
r		87-.076-.001-	<i>Calamobius filum</i> (ROSSI, 1790)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.
		87-.078-.001-	<i>Leiopus nebulosus</i> (L., 1758)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		87-.081-.003-	<i>Agapanthia villosiviridescens</i> (DEGEER, 17	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.
		87-.085-.001-	<i>Stenostola dubia</i> (LAICH., 1784)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		87-.086-.008-	<i>Phytoecia cylindrica</i> (L., 1758)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		87-.087-.001-	<i>Tetrops praeustus</i> (L., 1758)	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		88-.000-.000-	<b>CHRYSOMELIDAE - Blattkäfer</b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		88-.003-.004-	<i>Platymaris consimilis</i> (SCHRK., 1781)	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
		88-.004-.001-	<i>Orsodacne cerasi</i> (L., 1758)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		88-.005-.002-	<i>Zeugophora subspinoso</i> (F., 1781)	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.
		88-.012-.001-	<i>Clytra quadripunctata</i> (L., 1758)	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
		88-.012-.003-	<i>Clytra laeviuscula</i> RATZ., 1837	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		88-.013-.004-	<i>Smaragdina aurita</i> (L., 1767)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		88-.017-.025-	<i>Cryptocephalus aureolus</i> SUFFR., 1847	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		88-.017-.026-	<i>Cryptocephalus sericeus</i> (L., 1758)	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
		88-.017-.027-	<i>Cryptocephalus hypochaeridis</i> (L., 1758)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		88-.017-.044-	<i>Cryptocephalus moraei</i> (L., 1758)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.
r		88-.023-.004-	<i>Chrysolina herbacea</i> (DUFT., 1825)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		88-.023-.005-	<i>Chrysolina coerulans</i> (SCRIBA, 1791)	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
		88-.023-.0061.	<i>Chrysolina fastuosa</i> (SCOP., 1763)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		88-.023-.023-	<i>Chrysolina oricalcia</i> (MÜLL., 1776)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
		88-.023-.028-	<i>Chrysolina sturmi</i> (BEDEL, 1892)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
		88-.023-.040-	<i>Chrysolina geminata</i> (PAYK., 1799)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
		88-.028-.002-	<i>Gastrophysa viridula</i> (DEGEER, 1775)	2	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.
		88-.029-.002-	<i>Phaedon cochleariae</i> (F., 1792)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		88-.033-.001-	<i>Plagioderia versicolora</i> (LAICH., 1781)	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.
		88-.034-.002-	<i>Chrysolina cuprea</i> F., 1775	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
3		88-.037-.001-	<i>Timarcha tenebricosa</i> (F., 1775)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		88-.037-.002-	<i>Timarcha goettingensis</i> (L., 1758)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.



## Koleopterologische Publikationen

Das Literaturverzeichnis von HANS-PETER GEISSEN umfasst 46 Titel, davon nur sechs in Ko-Autorenschaft. Es wird vollständig mit Nachruf publiziert (WAGNER 2019). Nachfolgend sind nur die elf Arbeiten mit koleopterologischem Bezug verzeichnet.

- GEISSEN, H.-P. (1996): *Lygistoropterus sanguineus* (L.) – Wiederfund für die Rheinprovinz (Col., Lycidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **6**: 83–84.
- GEISSEN, H.-P. (1996): Anmerkungen zu einigen waldbewohnenden Käferarten aus dem Rhein-Mosel-Hunsrück (Col.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **6**: 187–196.
- GEISSEN, H.-P. (1997): Seltene Käfer und andere landlebende Insekten vom oberen Mittelrhein bei Koblenz (Insecta: Coleoptera, Heteroptera, Planipennia, Lepidoptera, Auchenorrhyncha, Archaeognatha). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz (Landau) **8**: 787–831.
- GEISSEN, H.-P. (1998): Nachtrag zu „Seltene Käfer und andere landlebende Insekten vom oberen Mittelrhein bei Koblenz“ (Insecta: Archaeognatha, Lepidoptera, Coleoptera, Planipennia, Hymenoptera). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz (Landau) **8**: 1053–1060.
- GEISSEN, H.-P. (1998): Beiträge zur Fauna der Wasserkäfer im Gebiet der ehemaligen preussischen Rheinprovinz in den „Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen“ Band 1, 1991 bis Band 7, 1997 unter Einschluß der „Rundschreiben“ 1988–1990. – Lauterbornia (Dinkelscherben) **33**: 129–134.
- GEISSEN, H.-P. (1999): Faunistische Mitteilungen für den Regierungsbezirk Koblenz, Beobachtungsjahre 1997 und 1998. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz (Landau), Beiheft **25**: 123–176.
- GEISSEN, H.-P. (2000): Streufunde von uferbewohnenden Laufkäfern der Roten Listen am Mittelrhein 1999 und 2000 (Col., Car.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **10**: 7–10.
- GEISSEN, H.-P. (2000): Schlaglichter zur Insektenfauna am Mittelrhein. – Beiträge zur Rheinkunde (Koblenz) **52**: 19–28.
- GEISSEN, H.-P. (2002): Faunistische Beobachtungen 1999 und 2000 aus dem Bereich des ehemaligen Regierungsbezirks Koblenz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz (Landau) Beiheft **27**: 155–213.
- GEISSEN, H.-P. (2002): Erste Nachweise von *Dryophilus rugicollis* (Col., Anobiidae) in der Rheinprovinz. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **12**: 35–38.
- GEISSEN, H.-P. (2003): *Symbiotes gibberosus* (Col., Endomychidae) auch im Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **13**: 43–44.

**Literatur**

- GEISER, R. (1998): Rote Liste der Käfer (Coleoptera). In: BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTTKER & P. PRETSCHER (Bearb.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **55**: 168-230. Bonn-Bad Godesberg.
- KOCH, K. (1968): Käferfauna der Rheinprovinz. – Decheniana, Beiheft **13**: I-VIII, 1-382. Bonn.
- KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft **4**: 1–185. Dresden.
- TRAUTNER, J., MÜLLER-MOTZFELD, G. & BRÄUNICKE, M. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Deutschlands (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae) (Bearbeitungsstand: 1996). – 159-167. In: BINOT, M., BLESS, R., BOYE, P., GRUTTKER, H. & PRETSCHER, P. (Bearb.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe Landschaftspflege und Naturschutz **55**: 434 S., Bonn-Bad Godesberg.
- WAGNER, TH. (2019): In Memoriam Hans-Peter GEISSEN (\*6. Dezember 1956 – †26. Oktober 2013). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **14**: 297–304 (im Druck).

NILS HENATSCH, EVA PLATH & THOMAS WAGNER,  
Universität Koblenz-Landau, Institut für Integrierte Naturwissenschaften  
– Biologie, Universitätsstr. 1, 56070 Koblenz  
E-Mail: thwagner@uni-koblenz.de