

*phoenicurus*, kehrt zum selben Nestort zurück, G.-R. MOUNTFORT, L'Oiseau 5, 3/4, S. 570. — Englisches Rotkehlchen, *Erethacus rubecula melophilus*, dasselbe Tier fängt sich innerhalb von 7 Tagen 31 mal in derselben Falle, D. LACK, Brit. Birds 29, 9, S. 288—289. — Rauchschnalbe, *Hirundo rustica*, Funde in Hessen beringter, (W. SUNKEL), Vogelring 7, 1/2, S. 22 und S. 32; Wiederfänge am Beringungsort; eine Beringte mindestens 5 Jahre alt, J. F. THOMAS, Brit. Birds 29, 8, S. 245.

Bird Banding 6, 4, bringt eine Wiederfundstatistik dreier Vogelarten von W. P. WHARTON. Es wurden als überlebend festgestellt

|                                   | nach 1 | 2     | 3      | 4     | 5 Jahren |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|-------|----------|
| <i>Zonotrichia albicollis</i>     | 17,86% | 8,14% | 4,101% | 1,43% | 0,437%   |
| <i>Spizella p. passerina</i>      | 13,987 | 7,014 | 3,165  | 1,34  | 0,295    |
| <i>Pipilo e. erythrophthalmus</i> | 16,79  | 8,12  | 2,72   | 0,306 |          |

Den starken Abfall im ersten Jahr glaubt Verf. weniger einer hohen Sterblichkeit als einem Abwandern der erstmalig geschlechtsreif werdenden Jungvögel zuschreiben zu müssen. — R. D. MANWELL und C. M. HERMAN untersuchten zahlreiche Vögel auf Blutparasiten, mit denen sie sich auf dem Zuge oder im Winterquartier infiziert hatten und weisen auf mögliche Zusammenarbeit zwischen Parasitologie und Vogelzugsforschung hin, insbesondere auf die Möglichkeit, gelegentlich der Beringung Blutproben zu nehmen. — L. O. SHELLEY beobachtete dasselbe beringte Paar von *Dryobates pubescens medianus* fünf Jahre lang im selben Brutgebiet. — S. E. PERKINS traf einen beringten *Sayornis phoebe* mit Mindestalter von 9 Jahren brütend an. — Ferner wird berichtet über Wiederfunde von *Agelaius p. phoeniceus*, *Certhia familiaris americana*, *Melospiza m. melodia*, *Parus atricapillus*, *Passerina cyanea*, *Spizella monticola*, *Sialia s. sialis* und *Turdus m. migratorius*. — In der Schriftenschau interessieren die nordamerikanischen Beringungszahlen. In den letzten 15 Jahren wurden beringt 1906455, die 117685 Rückmeldungen brachten. Beringung des letzten Jahres 249829. Zahl der Mitarbeiter 1900—2000. — Durch Beringung wurden folgende Altersbestimmungen amerikanischer Vögel erzielt: *Nyroca americana* mindestens 12 Jahre, *Nycticorax n. hoactli* mindestens 10, *Larus argentatus* ca. 11, *Melanerpes erythrocephalus* 11, *Sturnella magna* 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, *Cyanocitta cristata* mindestens 9, *Junco hyemalis* 8.

In Bird Banding 7, 1, ferner Beringungsergebnisse mit *Agelaius p. phoeniceus* (Linn.) und *Zonotrichia albicollis* (Gmel.). Ein *Sayornis phoebe* (Lath.) erreichte ein Mindestalter von 5 Jahren.

## Nachrichten.

Vogelwarte Rossitten. Am 17. Februar 1936 entschlief in Königsberg (Pr.), beinahe 66 Jahre alt, Landforstmeister ALBRECHT PFLANZ. Die Vogelwarte betrauert in ihm einen verdienten Förderer, der sich als 2. Vorsitzender des Vereins der Freunde der Vogelwarte Rossitten und als Mitglied des Verwaltungsrats betätigte. Der Präsident der Kaiser Wilhelm - Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften ernannte Dr. OSKAR HEINROTH in Berlin, bisher Leiter, zum Auswärtigen wissenschaftlichen Mitglied der Vogelwarte und zum Mitglied ihres Beratenden Ausschusses, und zum 1. April 1936 den bisherigen Stellvertretenden Leiter, Dr. ERNSTSCHÜZ in Rossitten, zum Leiter der Vogelwarte Rossitten.