

LEPIDOPTERORUM BRASILIAE
SPECIES NOVAE
ICONIBUS ILLUSTRATAE

A U C T O R E

V. K O L L A R.

(*Mense Januario 1839.*)

Original Download from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/>; www.biologiezentrum.at

PAPILIO STILBON Tab. 12. Fig. 1.

P. alis nigris; superioribus macula media suborbiculari, utrinque conspicua, flava; posticis obtuse dentatis, macula media coccinea tripartita, certo situ versicolore, subtus dilute rosea, accendentibus maculis minoribus tribus: una ad angulum externum, duabus ad angulum analem; pectore abdomineque rubro maculatis.

Longit. corporis 1 pott. 4 lin.; alarum expansio 3 3/4 poll. parisiensem.

Papilioni Serapi Boisd. et *P. Dardano* Fabr. affinis, sed omnino ab utroque differt. *Totus niger, capite, pectore abdomineque subtus rubro maculatis.*

Alae anteriores supra macula media suborbiculari, ramo primo nervi medii in partes duas inaequales divisa, flavicante, fimbriis parce obsoleteque albo maculatis. *Subtus* alarum color magis fuliginoso niger, macula media eandem formam refert ex supra, sed magis albicans appetet.

Alae posteriores obtuse dentatae, dente medio reliquis paulo longiore, margine interno reflexo, seu plicato et in hacce plica pilis albis tecto, fimbriis in sinubus marginis externi albis, macula supra fere media coccinea, certo situ violaceo splendente, in partes tres divisa, quarum externa minima. *Subtus* color alarum sicuti in anterioribus magis fuliginoso niger, macula supra memorata pariter ter divisa, albicanti rubra, accendentibus maculis duabus versus angulum internum seu analem, tertia a reliquis remotiore ad angulum superiore externum.

Habitat in Brasilia.

CASTNIA ACTINOPHORUS Tab. 12. Fig. 2.

C. alis superioribus nigris, radiis plurimis viridi fuscis, basi fasciaque apicis abbreviata dilute flavis; posticis luride rufbris, radiis limboque nigris, hoc flavo-maculato.

Longit. corporis 9 lin. — 1 pott.; alarum expansio 2 poll. 3 lin. — 2 poll. 9 lin.

Antennae dimidiam corporis longitudinem fere aequantes, nigrae.

Caput nigro squamosum, puncto pone oculos utrinque albido.

Palpi margine superiore flavidii, inferiore nigri.

Prothorax (collare) niger, squamis ad latera subtus aliquot flavis.

Meso- et Metathorax niger, petaglis (scapulis) flavis.

Abdomen supra nigrum, subtus flavum, nigro annulatum.

Pedes nigri, coxis anteriorum flavo squamosi.

Alae superiores margine interiore subsinuato, postico convexo, supra nigrae, viridifusco radiatae, radiis versus apicem bifidis, cum venis alarum nigris alternantibus, macula baseos obsoleta, fascia versus apicem sat lata, abbreviata flavis.

Alae inferiores supra ex flavido rubrae, radiis decem limboque nigris, illis basi angustioribus, in eorum decursu sensim sensimque latioribus, hoc flavo maculato, maculis septem intramarginalibus, in interstitiis radiorum nigrorum scribantur digestis.

Subtus: *Alae superiores* nigrae, macula basens, fasciaque apicis magis conspicuae, illa ex flavido rubra, haec flava, versus angulum posticum interruptim protracta; in *alarum posticarum* limbo nigro maculae supra memoratae majores, quandoque divisae, ita ut duplarem seriem formare videantur.

Habitat in Brasilia ad Rio Janeiro; Joan. Natterer et Schott legerunt.

CASTNIA SATRAPES Tab. 12. Fig. 3.

C. alis superioribus supra viridi fuscis, fasciis duabus latis flavidis fusco adspersis, altera ad marginem internum, altera versus apicem; inferioribus flavo rubris, radiis limboque nigro, hoc flavo maculato; subtus omnibus ejusdem coloris sed magis dilutis, basi costae superiorum rubra.

Longit. corporis 1 poll. 3 lin.; alarum expansio 3 poll. 6 lin.

Species haec et antecedens peculiarem *Castniarum* familiam, alis posticis radiatis formare merentur et tum ob alarum formam tum ob picturam magnam similitudinem cum speciebus. *Acreae* Fabr., *Papillionum* generis, praecipue cum *Acrea Thalia* Cr. habent, ob characteres tamen essentiales, *Castniis* proprios, ab his separari non possunt.

Antennae dimidiam corporis longitudinem aliquantulum superantes, nigrae.

Caput, thorax et truncas supra viridi fuscis, subtus cum *abdomine* flavida, cuius tamen segmentum ultimum fuscum penicillatum.

Palpi flavo squamosi, *pedes* rubri.

Alae superiores margine interno sinuato, postico convexo, supra obscure viridifuseae, fascia versus apicem transversa lata abbreviata flava fusco adspersa, alteraque ejusdem coloris longitudinali ad marginem internum, in medio alae ramulo cum fascia transversa juncta, maculaque viridi-fusca in medio marginis interni notata.

Alae inferiores supra ex flavo rubrae, radiis decem limboque lato nigris, hoc flavo maculato, maculis intramarginalibus sex.

Subtus: *Alae superiores* fascias supra memoratas offerunt flavas absque atomis fuscis, praeterea maculas ad marginem posticum quatuor flavidas costaeque basim rubram; *inferiorum* color arecae dilutius flavido-ruber, maculae limbi flavae majores, quam in pagina superiori, accedunt maculae ad angulum aualem tres caerulecentes, quarum interior reliquis major.

Habitat in Brasilia, in Mato grosso; J. Natterer pro Museo legit.

CASTNIA STERNBERGII Tab. 12. Fig. 4.

C. alis superioribus supra fuso brunneis, fasciis duabus albis, anteriori longiori subcontigua, posteriori venis alarum interrupta; posterioribus basi limboque rubris, disco nigro albo maculato.

Longit. corporis 7—10 lin.; alarum expansio 2 poll. — 2 poll. 4 lin.

Castniae Euphydryas Party forma et magnitudine valde affinis, sed colore et plectura omnino diversa species.

Caput et Prothorax fuscus, squamulis ferrugineis intermixtis.

Palpi albidi.

Antennae fuscae, clava subtus ferruginea.

Thorax utrinque, *Abdomen* supra fuscum, lateribus ferrugineum subtus flavidum.

Pedes fuso ferrugineoque squamosi.

Alae superiores supra fuso brunneae, violaceo micantes, fasciis duabus albis, anteriori longiore in medio costae incipiente et oblique versus angulum posticum decurrente, posteriore abbreviata, venis alae in maculas 7 divisa extusque areu nigro cincta.

Alae inferiores supra basi fasciaque intramarginali e maculis 8 rubro-ferrugineis, disco nigro, fascia areuata e maculis 7 albis instructo, margine interno fuso.

Subtus: *Alae* omnes rubro-ferrugineae, ceteroquin paginae superiori conformes, nervis versus limbum nigris, fimbriis omnium griseis, antecedente lineola nigra.

Habitat in Brasilia, in Ypanemá; a J. Natterer pro Museo lecta.

CASTNIA GERON Tab. 13. Fig. 1.

C. alis fusco griseis, certo situ violaceo viridique nitentibus, superioribus supra fasciis duabus albis, subtus medio pilis longis barbatis; inferioribus supra basi discoque barbatis, margine postico flavido maculatis, subtus dense squamosis, duplii serie e maculis albis obsoletis.

Longit. corporis 2 poll. et ultra; alarum expansio 5 poll. 4 lin.

Species perquam singularis ad maximas in hoc genere pertinet et rarissima esse videtur, cum unicum tantum specimen absque antennis indefessus naturae scrutator J. Natterer attulerit.

Caput fuso olivaceum, lineola pone oculos utrinque alba, *palpis* fuso griseis.

Thorax supra fuso olivaceus, vittis in medio albido griseis, antice posticeque coaltis.

Abdomen undique, thorax subtus pedesque fuso grisei.

Alae superiores supra fuso, griseo olivaceoque nebulosae, certo situ modo violacea, modo viridi nitentes, fascia media obliqua subcontigua alterave apicis maculari ex flavo albidis, serie macularum ejusdem coloris sed magis indeterminatarum ad marginem posticum.

Alae inferiores basi discoque loco squamarum pilis longioribus vestitae, fuso griseae, limbo olivaceo, serie macularum intramarginalium flavidarum sex.

Subtus: *Alae superiores* disco pilosae, fasciae in pagina superiori memoratae transparent, maculae ad marginem posticum vero hic majores, magis determinatae; color fuso griseus; — posteriores basi discoque densissime squamosae, dilutius fuso-griseae, quam in limbo, qui duplii serie macularum obsoletarum, confluentum coloris flavo-albidi instructus adpareat. Fimbriae alarum omnium albidae.

Habitat in Brasilia, in Cyaba; a J. Natterer pro Museo, lecta.

CASTNIA HEGEMON Tab. 13. Fig. 2.

C. alis superioribus supra brunneis, basi fasciaque media, extus bipartita, obsolete saturatioribus; inferioribus supra rubris, macula baseos, striis duabus ad angulum analem nigrofusca, fascia media flava; subtus ferruginea, omnibus basi, inferioribus et margine interno albis.

Longit. corporis 1 poll. 3 lin.; alarum expansio 3 poll. et ultra.

Castniae Palatino Cram. et Dalm. magnitudine colorumque distributione quodammodo similis, habitu vero *Cast. Fonscolombe Encycl. meth.* proxima species.

Antennae, caput, thorax et truncus supra brunnea, subtus cum palpis pedumque femoribus et tibiis alba.

Abdomen utrinque album, segmento anali ferrugineo penicillato.

Alae superiores brunneae, macula baseos indeterminata, fasciaque media versus marginem externum, seu costam bipartita, saturatioribus, sed valde obsoletis; certo situ versus marginem posticum violacea adspersae adpareant.

Alae inferiores ex croceo rubrae; basi macula magna e squamis longioribus nigris, medio fascia latiore abbreviata flava versus marginem internum albicante; striis duabus intramarginalibus, versus angulum analem confluentibus nigris, anteriore breviore, posteriore magis extrosum protracta, una alterave nonnunquam fere deleta.

Subtus: *Alae superiores* coloris brunnei dilutioris, seu potius rufi, macula baseos fasciaque media hic magis distinctas et invicem confluentes; costa basi squamulis albis tecta.

Alae inferiores basi albidae, sensim sensimque versus limbum pallido rufescentes, macula ad angulum analem ferruginea.

Habitat in Brasilia ad Rio Janeiro; Schult pro Musco legit.

CASTNIA THERAPON Tab. 13. Fig. 3.

C. alis superioribus elongatis, supra flavescenti-rufis, margine interno striaque ab angulo baseos interno versus apicem oblique decurrente, macula costae punctisque duobus infraapicalibus nigro-fuscis; inferioribus rubris, margine postico nigro, serie punctorum flavorum; subtus omnibus pallide rubris, superioribus macula costae sinuata, inferioribus margine postico nigris, hoc duplii serie punctorum coerulecentium flavorumque.

Longit. corporis 1 poll.; alarum expansio 3 poll.

Ad species rariores pertinere videtur, unicum enim fuit specimen inter tantum insectorum e Brasilia allatorum numerum.

Antennae desunt. Caput inter aculos nigro squamosum, palpis albis.

Thorax truncus et abdomen supra ex flavo rubra, subtus alba.

Pedes anteriores rufo fuscii, posteriores albi.

Alae superiores haud consuetae plurimarum Castniarum formae, sed magis elongatae, margine postico convexo, supra flavescenti rufae, margine interno late fusco, linea ab angulo baseos interno oblique versus apicem decurrente, quin ipsum apieem attingat, punctis infraapicalibus duobus, maculaque costae media obsoleta, intus sinuata, nigro-fuscis.

Alae inferiores supra flavescenti rubrae, margine postico late nigro serieque punctorum sex, quorum tria interiora flava, tria exteriora ex flavo rubra.

Subtus: Alae omnes ex flavido rubrae, superiores apice fuscescentes, macula costae media intus sinuata nigra; inferiores margine postico nigro, seriebus punctorum duabus, in hocce limbo nigro, anteriore caerulecentium, posteriore flavorum.

Habitat in Brasilia ad Rio Janeiro; Schott pro Museo legit.



1.



2.



3.




4.

1. *Tupilio stollen* 2. *C. astasia* 3. *C. tetraphorus* 4. *C. latratus* 5. *C. Sternbergeri*




Original Download from The Biodiversity Heritage Library <http://www.biodiversitylibrary.org/>; www.biologiezentrum.at



2

C. castina Green

Britain: Original Download from The Biodiversity
Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



3

C. Therapen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1840

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Kollar Vinzenz

Artikel/Article: [Lepidopterorum Brasiliae species novae Iconibus illustratae. \(Tafel 12-13\) 213-218](#)