©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

Nachtrag

zu dem Riehl'schen Verzeichnis der bei Kassel in einem Umkreise von ungefähr drei Meilen aufgefundenen Koleopteren.

Von

K. Bartels.

Das von dem verstorbenen F. Riehl in den Jahren 1860—1862 für den Verein für Naturkunde zu Kassel mit grosser Sorgfalt und auf Grund langer Beobachtung zusammengestellte Käferverzeichnis*) hat sich im Laufe der Jahre nicht als ganz vollständig erwiesen. Riehl selbst hatte in einem in seinem Besitz befindlichen Exemplare des Verzeichnisses zahlreiche Nachträge vermerkt. Der Unterzeichnete kann in Folge eigener Wahrnehmung während einer fast 10 jährigen Sammelzeit in der nächsten Umgegend von Kassel noch eine Anzahl neu aufgefundener Käfer hinzufügen, welche dem eifrigen Sammler Riehl entgangen sind. Unter den nachstehend bezeichneten Käfern sind diejenigen, welche Riehl seinem Verzeichnis später hinzugefügt hatte, durch einen * hervorgehoben. Die Fundorte der letzteren sind von Riehl leider nicht angegeben worden.

*Dyschirius angustatus Ahr.
*Bembidium rufescens Guér.
* — Mannerheimii Sahlb.
*Haliplus confinis Steph.
* — fluviatilis Aubé.
*Leptusa analis Gyll.
*Aleochara bilineata Gyll.
*Homalota crassicornis Gyll.
* — castanoptera Mannerh.
* — nigricornis Steph.
* — divisa Märkel.
*Oligota granaria Erichson.
*Gyrophaena gentilis Erichson.
*Tachinus pallipes Gravenhorst.

*) cf. XIII. Bericht des Vereins f. Naturk. pag. 63—102. Kassel 1863.

©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

*Bolitobius pygmaeus Fabr.
var. intrusus Hampe.
biguttatus Steph.
*Mycetoporus brunneus Marsh.
*Quedius xanthopus Erichson.
* — tristis Grav.
*Staphylinus (Tasgius) ater Grav.
*Xantholinus (Nudobius) lentus Erichson.
*Lathrimaeum fusculum Er.
*Trichonyx sulcicollis Reichb.
*Clambus pubescens Redt.
*Abraeus globulus Creutz.
*Monosoma angusticollis Gyll.
* — spinicollis Aubé.
* — quadricollis Aubé.
*Cryptophagus umbratus Er.
*Atomaria contaminata Er.
*Ephistemus exiguus Er.
*Annomatus duodecimstriatus Müll.
Dermestes bicolor Fabr. Kassel. In Häusern, in Taubenschlägen nicht selten.
*Aphodius obscurus Fabr.
*Trox perlatus Goeze.
Chysobothris affinis Fabr. Am Stahlberge nicht selten.
*Aphanisticus pusillus Oliv.
*Cardiophorus cinereus Herbst.
*Cyphon nitidulus Thomson.
*Malthodes Maurus Lap.
*Danacaea nigritarsis Küst.
Hedobia regalis Duftschmid. Rengershausen, auf blühenden Gebüschen, selten.
*Hypophloeus linearis Fabr.
Cteniopus sulphureus Linn. Wilhelmshöhe auf Blüten, selten.
*Rhinosimus aeneus Oliv.
*Bruchus varius Oliv.
* — debilis Gyll.
* — luteicornis Ill.
*Rhynchites aeneovirens Marsh.
*Rhynchites var. Fragariae Gyll.
*Otiorrhynchus fuscipes Oliv.
*Ceuthorrhynchus terminatus Herbst.
*Cryphalus Fagi Fabr.
Clytus arvicola Oliv. Rengershausen auf Gebüsch. Sehr selten.

©Verein für Naturkunde Kassel; download www.zobodat.at

Saperda scalaris Fabr. Im Habichtswald und Tannenwäldchen. Selten.
*Oberea erythrocephala Fabr.
— linearis Linn. Am Stahlberge, auf Haselnussgebüsch. Selten.
Toxotus Quercus Götz. Am Stahlberge auf Gebüsch, ♂ häufig, ♀ selten.
Leptura scutellata Fabr. Am Stahlberge auf Gebüsch, ziemlich selten.
Cryptocephalus parvulus Müll.
— flavilabris Fabr. Wilhelmshöhe, selten.
*Haltica (Aphthona) violacea Koch.
*Longitarsus oc roleucus Marsh.

Nachweis

über

den Stand der Vereinskasse.

Kassenbestand am 1. Januar 1881	213	ℳ.	32	₰
Einnahme vom 1. Jan. 1881 bis 1. April 1882	1225	„	65	„
Summa	1438	„	97	„
Ausgabe bis 1. April 1882	1058	„	90	„
Rest	380	„	07	„
Einnahme bis 1. April 1883	768	„	25	„
Summa	1148	„	32	„
Ausgabe bis 1. April 1883	497	„	90	„
Bleibt Kassenbestand	650	„	42	„

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen und Berichte des Vereins für Naturkunde Kassel

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: 29-30

Autor(en)/Author(s): Bartels K.

Artikel/Article: Nachtrag zu dem Riehrschen Verzeichnis der bei Kassel in einem Umkreise von ungefähr drei Meilen aufgefundenen Koleopteren 101-103