

Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes

⟨Adephaga: II. Teil, Polyphaga: Staphylinoidea⟩

Von Korv.-Kapt. ⟨Ing.⟩ a. D. Fr. Peetz-Pr. Oldendorf, Westfl.

Die vorliegende Arbeit ist das Sammelergebnis eines Zeitraumes von etwa 30 Jahren (1900—1930). Sie umfaßt das Gesamtgebiet der *Coleoptera*. Infolge ihres Umfanges kann bei dem zur Verfügung stehenden Raume jährlich nur ein Abschnitt gebracht werden. Dieser erste Beitrag enthält den zweiten Teil der *Adephaga*, echte Wasserkäfer (*Dytiscidae*, *Haliplidae*, *Gyrinidae*) und aus der Abteilung der *Polyphaga* die Familienreihe der *Staphylinoidea*. Die Bearbeitung der fehlenden Familien *Cicindelae* und *Carabidae* hat Herr Hauptlehrer K. Barner, Eickum, übernommen, der sich schon seit Jahren auf das Studium dieser beiden Familien spezialisiert hat.

Das Sammelgebiet umfaßt das lippisch-westfälische Weserbergland mit etwa folgenden Begrenzungen: im Norden die Verbindungslinie zwischen Steinhuder Meer und Dümmersee, im Westen die Linie vom Dümmersee bis etwa Gütersloh, im Süden eine Linie von Gütersloh über Horn und Blomberg bis Pymont und von dort im Osten die Linie bis zum Steinhuder Meer. Dieses Gebiet wird durchzogen vom Teutoburger Wald, dem Weser- und Wiehengebirge mit seinen Ausläufern und enthält viele charakteristische Fundorte, wie z. B. das alluviale Werretal, die Herforder Liasmulde, das „Große Moor“ bei Nettelstedt, das Gebiet des Dümmersee mit der Hunte, das Steinhuder Meer, die Senne bei Bielefeld und das Hochmoor bei Hiddesen (Hiddeser Bent). Es wird von der Weser mit ihren Nebenflüssen durchflossen, von denen die Werre mit Else, die Bastau, die Osper und Aue besonders genannt seien.

Die aufgeführten Funde stützen sich in erster Linie auf die reichhaltige, mir zur Verfügung stehende Sammlung des Herrn K. Barner. Diese Sammlung wurde von Herrn Barner und den Herren Musikdirektor Schwier, seiner Zeit Petershagen und Lehrer Büsching, Eldagsen, zusammengebracht. Dem Wohnsitze dieser Herren entsprechend stammen die meisten Funde aus der Gegend von Petershagen, Mennighüffen, Löhne und Eickum bei Herford. Die in den „Beiträgen zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes von K. Barner“, welche im Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld 1922 veröffentlicht wurde, angeführten Fundorte sind auch in vorliegender Arbeit berücksichtigt. Verfasser dieses sammelte in den letzten 10 Jahren hauptsächlich in der Umgebung seines Wohnsitzes Pr. Oldendorf, Kr. Lübbecke.

Die Bestimmung der Tiere habe ich mit der größtmöglichen Genauigkeit vorgenommen bzw. nachgeprüft und nur solche Funde aufgenommen, für welche Belegexemplare in meiner Sammlung vorhanden sind. Zweifelhafte, insbesondere bei der sehr schwierigen Familie der *Aleocharinae*, habe ich zurückgestellt. Die von Herrn Pfarrer Hubental bestimmten Tiere der Sammlung Barner habe ich durch: „(Hub)“ gekennzeichnet. Die Aufführung der Familien folgt der *Fauna Germanica* von Reitter.

Für häufig wiederkehrende Fundorte benutze ich folgende Abkürzungen: Pthg = Petershagen, Mghf = Mennighüffen, Eick = Eickum bei Herford, PrOld = Pr. Oldendorf am Wiehengebirge, Kr. Lübbecke. Die aus der Sammlung Barner (Schwier, Büsching) stammenden Funde sind durch vorgesetztes „Ba:“ gekennzeichnet.

III. Familie: Haliplidae

Haliphus Latr.

<i>confinis</i> Steph.	Dümmersee b. Hüde.
<i>fulvus</i> F.	Gevinghausen b. Bünde, i. Fischteich.
<i>flavicollis</i> Strm.	Bünde, i. d. Else.
<i>fulvicollis</i> Er.	Dümmersee b. Hüde; Großes Moor b. Nettelstedt.
<i>ruficollis</i> v. Heydeni	
<i>Wehnke</i>	Bünde, Gevinghauser Fischteich.
<i>fluviatilis</i> Aubé	Bünde, i. d. Else; Nettelstedter Moor.
— <i>a. striatus</i> Sharp	Dümmersee b. Lembruch.
— <i>v. Wehnkei</i> Gerh.	Bünde, Else b. Hunnebrock.
<i>immaculatus</i> Gerh.	Dümmersee b. Lembruch.
<i>lineatocollis</i> Mrsh.	Ba: Pthg (Schwier).

Cnemidotus Illig.

<i>caesus</i> Dft.	Bünde, Gevinghauser Fischteich.
--------------------	---------------------------------

V. Familie: Dytiscidae

Hyphydrus Illig.

<i>ferrugineus</i> L.	Stift Quernheim, sumpfiger Teich; Werffen b. Bünde; Dümmersee b. Lembruch; Nettelstedter Moor, Moorteich.
-----------------------	---

Hygrotus Stephens.

<i>inaequalis</i> F.	Werffen b. Bünde; Dümmersee b. Lembruch u. Hüde; Nettelstedter Moor, Moorteich.
<i>impressopunctatus</i> Schall.	Ba: Teutob. Wald.

Hydroporus Clairville.

<i>pictus</i> F.	Bünde, Stift Quernheim, Else b. Hunnebrock.
<i>flavipes</i> Oliv.	Ba: Pthg.
<i>platynotus</i> Grm.	Ba: Brackwede b. Bielefeld.
<i>elegans</i> Panz.	Bünde, Gevinghauser Fischteich, Else b. Hunnebrock.

- duodecimpustulatus* F. Bünde, Stift Quernheim u. i. d. Else, nicht selt.
halensis F. Ba: Pthg (Schwier).
lineatus F. Ba: Pthg (Schwier); Dümmersee b. Hüde.
palustris L. überall häufig.
notatus Strm. Bünde, Stift Quernheim.
piceus Steph. Bünde, Stift Quernheim.
melanocephalus Gyll. Bünde, Stift Quernheim; Ba: Mghf.
tristis Payk. Ba: Pthg (Schwier).
elongatulus Strm. Ba: Pthg (Schwier).
obscurus Strm. Bünde, Gevinghauser Fischteich; Großes Moor b. Nettelstedt.
erythrocephalus L. Ba: Pthg (Schwier).
juscipennis Schaum. Bünde, i. d. Else; Hiddeser Bent; Großes Moor b. Nettelstedt; Ba: Mghf.
planus F. PrOld; Ba: Brackwede b. Bielefeld.
pubescens Gyll. Ba: Mghf.
ferrugineus Stephens Bünde, i. d. Else.
- Noterus** *Clav.*
crassicornis Müll. Bünde, i. d. Else; Nettelstedter Moor.
- Laccophilus** *Leach.*
obscurus Panz. Bünde, Gevinghauser Fischteich.
hyalinus Degeer Werffen u. Gevinghausen b. Bünde u. i. d. Else.
- Agabus** *Leach.*
bipustulatus L. Bünde, i. d. Else u. Gevinghauser Fischteich.
melanarius Aubé Ba: Pthg, Weser.
Sturmi Gyll. Stift Quernheim; Hiddeser Bent.
guttatus Payk. Ba: Weserkette, Schneegrund.
undulatus Schrank. Stift Quernheim; Ba: Pthg.
affinis Payk. PrOld.
unguicularis Thoms. Ba: Mghf.
paludosus F. Ba: Pthg (Schwier).
congener Payk. Ba: Pthg (Schwier).
- Platambus** *Thoms.*
maculatus L. Bünde, Spradlower Bach u. Else; Ba: Eick; Mghf.
--- v. inaequalis Ba: Mghf.
- Copelatus** *Erichs.*
ruficollis Schall. Ba: Pthg (Schwier).
- Illybius** *Erichs.*
juliginosus F. Bünde, i. d. Else u. Gevinghauser Fischteich.
guttiger Gyll. Ba: Pthg (Schwier).
ater Degeer überall nicht selten.
fenestratus F. Ba: Pthg (Schwier).
subaeneus Er. Donoper Teich b. Detmold; Bünde, i. d. Else.
- Rhantus** *Lacord.*
punctatus Geoffr. Ba: Pthg (Schwier).
bistriatus Er. Bünde, Else b. Hunnebrock.

- Colymbetes Clairville.*
fuscus L. Bünde, Else u. Gevinghauser Fischteich; PrOld;
 Dümmersee b. Hüde.
striatus L. Bünde, Spradower Bach; Ba: Eick.
- Acilius Leach.*
sulcatus L. überall häufig.
canaliculatus Nicol. Ba: Pthg (Schwier).
- Dytiscus Lin.*
latissimus L. Rietberg i. W., einmal im Jan. 1887 unter dem Eise
 der Torfstiche der Emsniederung sehr zahlreich;
 Ba: in der Düpe b. Pthg, 1898/99 u. 1900 unter dem
 Eise zahlreich, sonst selten.
punctulatus F. Bünde, Stift Quernheim, in Fischteichen; PrOld.
dimidiatus Bergst. PrOld.
marginalis L. überall häufig.
circumcinctus F. Werffen b. Bünde u. i. d. Else; PrOld.
- Cybister Curtis.*
laterimarginalis Degeer Rietberg i. W., im Gebiet im allgem. selten.

VI. Familie: Gyrinidae

- Aulogyrinus Regimb.*
concinuus Klug. Bünde, i. d. Else sehr häufig.
- Gyrinus Lin.*
marinus Gyll. Bünde, i. d. Else u. überall häufig.
 — *v. opacus* Bünde, i. d. Else.
natator L. Rödinghausen a. Wiehengeb.; Nettelstedter Moor.
- Orectochilus Lacord.*
villosus Müll. Bünde, i. d. Else; Weserufer b. Porta, unter Steinen,
 sehr zahlreich.

II. Polyphaga

1. Familienreihe: Staphylinoidea

1. Familie: Staphylinidae

1. Unterfamilie: Aleocharinae

- Ocalea Er.*
badia Er. PrOld.
picata Steph. PrOld, gesiebt.
- Illyobates Kr.*
propinquus Aubé Ba: Eick.
- Chilopora Kraatz.*
longitarsis Er. PrOld.
rubicunda Er. PrOld.

<i>Phloeopora Er.</i>	
<i>testacea Munnh.</i>	PrOld.
<i>Aleochara Grav.</i>	
<i>curtula Goeze.</i>	Ba: Polle, Weserufer; Eick; Pthg.
<i>brevipennis Grav.</i>	Hiddeser Bent.
<i>languinosa Grav.</i>	Ba: Schnathorst.
<i>spadicea Er.</i>	Hunteburg, Bachufer.
<i>Ocyusa Kraatz.</i>	
<i>incrassata Rey.</i>	Ba: Mghf, gesiebt (Hub.).
<i>Ischnoglossa Kr.</i>	
<i>prolixa Grav.</i>	Ba: Mghf. gesiebt (Hub.).
<i>Euryalia Rey.</i>	
<i>decumana Er.</i>	Doberg b. Bünde.
<i>Oxypoda Mnnh.</i>	
<i>spectabilis Maerkel</i>	PrOld, i. Maulwurfsnest; Ba: Eldagsen.
<i>lividipennis Mnnh.</i>	PrOld, i. Maulwurfsnest u. i. Compost.
<i>opaca Grav.</i>	PrOld; Ba: Mghf, Langenhagen.
<i>elongatula Aubé</i>	PrOld.
<i>sericea Heer</i>	PrOld; Doberg b. Bünde.
<i>exigua Er.</i>	PrOld.
<i>alternans Grav.</i>	PrOld, in alten Pilzen.
<i>lucens Rey.</i>	PrOld, in Pilzen.
<i>jiliformis Redtb.</i>	PrOld, gekätschert.
<i>annularis Mnnh.</i>	PrOld; Wellingholzhausen, gekätschert.
<i>Dasyglossa Kr.</i>	
<i>prospera Er.</i>	Ba: Eick.
<i>Myrmedonia Er.</i>	
<i>limbata Payk.</i>	Ba: Pthg; Umgegend v. Minden, bei Lasiusarten.
<i>Atheta Thoms.</i>	
<i>brunnea F.</i>	Bünde, Elseufer.
<i>analís Grav.</i>	PrOld, Garten.
<i>gregaria Er.</i>	PrOld.
<i>linearis Grav.</i>	Ba: Pthg, Langenhagen; Mghf, Ulenburg, unter Laub (Hub).
<i>angustula Gyll.</i>	PrOld, unter trockener Buchenrinde.
<i>aequalis Er.</i>	PrOld, unter trockener Buchenrinde.
<i>melanocera Thoms.</i>	Ba: Haeverstedt, unter Rinde.
<i>castanoptera Mnnh.</i>	Ba: Mghf, gesiebt, an Gräben.
<i>longicornis Grav.</i>	PrOld, in Pilzen.
<i>sordida Marsh.</i>	Ba: Mghf, aus Laub gesiebt (Hub).
<i>laticollis Steph.</i>	Ba: Pthg, häufig.
<i>fungi Grav.</i>	Ba: Mghf, im Frühjahr gesiebt (Hub).
<i>Falagria Mnnh.</i>	
<i>sulcata Payk.</i>	PrOld, i. Compost.
<i>sulcatula Grav.</i>	PrOld.

- Cardiola Rey.*
obscura Grav. PrOld; Ba: Eick.
- Astilbus Steph.*
canaliculatus F. Hiddeser Bent; Nettelstedter Moor; PrOld; Ba: Pthg;
Eick, nicht selten.
- Autalia Mnnh.*
impresa Ol. PrOld, in Pilzen.
- Gyrophæna Mnnh.*
nana Payk. Ba: Mghf, im Frühjahr gesiebt (Hub).
bihamata Thoma. Ba: Mghf, im Winter gesiebt (Hub).
- Gymnusa Grav.*
brevicollis Payk. Ba: Pthg, unterhalb des Hopfenberges auf sumpf.,
moorig. Boden.
- 4. Unterfamilie: Tachyporinae**
- Hypocyptus Mnnh.*
longicornis Payk. Ba: Eick, im Winter aus Laub gesiebt; Mghf; Weser-
berge.
- Conosoma Kraatz.*
bipunctatum Grav. PrOld, in Pilzen; Ba: Pthg.
litoreum L. Ba: Eick, unter Moos; Mghf; Wiehengeb. b. Schnathorst.
pubescens Grav. Ba: Pthg, unt. Moos, Anspülicht der Osper.
immaculatum Steph. PrOld.
- Tachyporus Gravenh.*
obtusus L. überall häufig.
solutus Er. überall häufig.
chrysomelinus L. gemein.
atriceps Steph. Ba: Schaumburger Wald; Bergkirchen; Mghf; Bühn
b. Möllbergen.
transversalis Grav. Wiehengeb. b. Linne, gekätschert.
hypnorum F. gemein.
pusillus Grav. Bünde, Doberg; Ba: Pthg; Mghf; Eick.
nitidulus F. häufig.
- Tachinus Grav.*
flavipes F. Ba: Pthg, häufig.
humeralis Grav. PrOld, gesiebt aus Laub.
proximus Kr. PrOld, gesiebt.
marginatus Gyll. PrOld, Garten.
pallipes Grav. Ba: Eick.
rujipes Degeer überall häufig.
subterraneus L. Ba: Eick; Süntel, Roter Stein.
-- v. *bicolor Grav.* PrOld; Ba: Eick.
fimetarius Grav. PrOld; Bünde, Doberg, gekätschert.
laticollis Grav. Ba: Pthg; Mghf. Langenhagen; Süntel, im Totental.
(Im Dung u. an Aas.)
collaris Grav. Ba: Pthg, Messlingen, Anspülicht der Osper.
elongatus Gyll. Ba: Hohenstein i. Wellengrund.

Leucoparyphus Kraatz.

silphoides L. PrOld, Garten, unter welchem Unkraut.

Habrocerus Er.

capillaricornis Grav. PrOld, gesiebt; Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.

Mycetoporus Mnnh.

splendidulus Grav. Ba: Eick.

brunneus Marsh. PrOld, Garten, im Fangeimer.

Baudueri Rey Ba: Eick.

Bolitobius Steph.

lunulatus L. Ba: Mghf, Torlak, im Winter gesiebt; Teutob. Wald, Ravensburg; Detmold (in Pilzen).

pulchellus Mnnh. Ba: Örlinghausen.

bicolor Grav. Ba: Eick.

trinitatus Er. PrOld, in Pilzen; Ba: häufig überall.

pygmaeus F. überall häufig.

Byrocharis Lac.

analys Payk. Ba: Pthg, Marsch, unter Moos.

inclinans Grav. Ba: Eick; Wiehengeb. b. Bergkirchen.

fiformosa Grav. Ba: Wiehengeb. b. Wallücke.

5. Unterfamilie: Staphylininae

Quedius Steph.

lateralis Grav. Ba: Pthg, in fauler Eiche.

scitus Grav. PrOld; Ba: Eick.

xanthopus Er. Ba: Pthg.

mesomelinus Mrsh. überall verbreitet.

ochripennis Mén. Ba: Eick.

cruentus Oliv. Ba: Eick, mehrfach.

cinctus Payk. PrOld, gesiebt; Ba: Pthg, im Winter unt. Baumrinde; Süntel; Eick.

juliginosus Grav. Bünde, Doberg; PrOld: Ba: Eick; Mghf.

tristis Grav. Bünde, Doberg; Ba: Eick.

molochinus Grav. Ba: Hiddeser Bent; Pthg, mehrfach.

umbrinus Er. PrOld.

obliteratus Er. Ba: Eick, einmal.

humeralis Steph. Ba: Süntel, i. Höllental; Mghf.

picipennis Heer Ba: Pthg, Anspüllicht der Osper, im Jan.

julvicollis Steph. Ba: Pthg, Anspüllicht der Osper.

Creophilus Mnnh.

maxillosus L. Ba: Pthg; Eick.

Ontholestes Ganglb.

tesselatus Geoffr. PrOld; Ba: Pthg; Bückeberg; Weserberge b. Häverstedt; Mghf; Eick;

murinus L. PrOld; Ba: Pthg, nicht selten.

Staphylinus L.

pubescens Degeer
fossor Scop.

fulvipes Scop.
stercorarius Oliv.
caesareus Cederh.
erythropterus L.

juscatus Grav.
aenaeocephalus Degeer
brunnipes F.
ophthalmicus Scop.

olens Müll.

similis F.
golbulifer Geoffr.

Neobisnius Ganglb.

procerulus Grav.

Philonthus Curtis.

splendens F.
intermedius Boisd.
laminatus Creutz.
chalceus Steph.
aenaeus Rossi
atratus Grav.

carbonarius Gyll.
temporalis Rey
rotundicollis Mén.
umbratilis Grav.
cephalotes Grav.
sordidus Grav.
timetarius Grav.

marginatus Ström.

juscipennis Munnh.

Mannerheimi Fauv.
varius Gyll.

immundus Gyll.

sanguinolentus Grav.

Ba: Pthg; Süntel.

Ba: Eick; Weserbergland, Ottensteiner Plateau, Velmerstot (selten i. Wäldern).

Ba: im Vogeler b. Rühle.

PrOld; Bünde, Doberg; Ba: Pthg, einmal; Dörentrup i. L. häufig.

Wiehengeb. b. Bad Essen; PrOld; Ba: Pthg; Wiehengeb. b. Schnathorst; Teutob. Wald b. Örlinghausen; Eick (nicht selten).

Ba: Eick; Teutob. Wald; Pthg.

Bünde, Doberg; Ba: Senne; Eick; Pthg; Mghf.

PrOld.

Bünde, Doberg; Ba: Eick; Pthg; Weserberge b. Rotenuffeln.

Ba: Süntel, Hohenstein; Ottensteiner Plateau; Exter; Lemgoer Mark; Eick, ein Stk. (selten, im O. des Gebietes häufiger).

überall nicht selten.

Bünde, Doberg; Ba: Mghf; Pthg; Eick; Oldentrup i. L.

Elseufer b. Bünde; Ba: Pthg, i. April unt. Eichenrinde.

Nettelstedter Moor; Ba: Pthg (nicht häufig).

Ba: Pthg; Mghf (April u. Mai).

Ba: Eick. Eldagsen b. Pthg.

Hücker Moor b. Bünde; PrOld.

überall häufig.

Weserufer b. Porta; Elseufer b. Bünde; Ba: Pthg, Weser; Polle, Weser.

überall häufig.

PrOld; Weserufer b. Porta.

PrOld, nicht selten; Ba: Eick (Hub).

PrOld.

PrOld; Ba: Eick.

Ba: Eick (Hub).

PrOld; Elseufer b. Bünde; Dümmersee b. Lehmbruch; Ba: Eick; Pthg; Mghf; Minden.

Ba: Vierenberg b. Salzuflen; Ötinghausen b. Herford, je einmal.

Ba: Umgeg. v. Herford; Pthg; Mghf; Süntel, Katzenase; Weserkette, Iberg, Schnathorst (i. Steinbruch u. Steinen März 12 sehr häufig). Eick; Enger.

Ba: Klus b. Minden (Hub).

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Eick; Pthg; Weserkette b. Schnathorst, Katzenase.

Dümmersee b. Lembruch u. Hüde; Steinhuder Meer; PrOld; Ba: Pthg, Heisterholz, Anspülicht der Osper.

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Mghf; Pthg; Wiehengeb. b. Häverstedt (aus Laub gesiebt).

- coruscus* Grav. Dümmersee b. Lembruch; Ba: Mghf; Süntel. Katzennase.
dimidiatus Sahlb. Dümmersee b. Lembruch u. Hüde.
concinus Grav. Weserufer b. Porta; Elseufer b. Bünde; Donoper Teich
 b. Detmold; Dümmersee b. Hüde; PrOld.
- a. ochropus* Grav. Dümmersee b. Hüde; PrOld.
ebenius Grav. Ba: Eick; Pthg, Eldagsen.
discoideus Grav. PrOld; Ba: Eldagsen; Löhne; Bischofshagen.
ventralis Grav. Dümmersee; Steinhuder Meer; PrOld; Elseufer b. Bünde.
quisquiliarius Gyll. Nettelstedter Moor; Ba: Blomberg i. L.
longicornis Steph. PrOld; Ba: Pthg (Hub).
varians Payk. Dümmersee b. Lembruch; Nettelstedter Moor; PrOld;
 Ba: Pthg. Anspüllicht der Osper; Wiehengeb. b.
 Häverstedt; Eick.
- a. unicolor* Steph. Ba: Weserberge.
jumarius Grav. Ba: Eick.
micans Grav. Weserufer b. Porta; Hücker Moor b. Bünde.
juvipipes F. Weserufer b. Porta; Elseufer b. Bünde; Nettelstedter
 Moor; Ba: Eick. am Mühlenbach (an fließendem
 Wasser sehr häufig).
- splendidulus* Grav. Ba: Umgegend v. Herford; Stukenberg; Pthg, u. Kiefern-
 rinde; Eick.
nigritulus Grav. PrOld; Hiddeser Bent: Nettelstedter Moor; Ba: Mghf,
 Ulenberg, Torlak; Eick, im Winter gesiebt.
rubripennis Kiesw. Bünde, Doberg; PrOld. Garten.
- Othius** *Stephens.*
punctulatus Goeze PrOld; Ba: Pthg; Weserkette, Katzennase, Totental,
 Hohenstein; Mghf; Eick; Lemgoer Mark.
melanocephalus Grav. PrOld; gesiebt; Ba: Süntel, Totental, Hohenstein; Mghf;
 Eick.
myrmecophilus Kiesw. Ba: Eick (Hub).
- Baptolinus** *Kraatz.*
affinis Payk. Ba: Pthg; Weserkette, Osterberg, Bergkirchen, Schnat-
 horst; Mghf; gesiebt; Eick.
- Xantholinus** *Serv.*
lentus Grav. Ba: Schaumburger Wald, einmal unter Rinde (Hub).
punctulatus Payk. PrOld; Hiddeser Bent; Nettelstedter Moor; Ba: Eick
 (häufig).
atratus Heer PrOld.
angustatus Steph. PrOld; Ba: Pthg, nicht selten.
glabratus Grav. PrOld; Ba: Wiehengeb. b. Schnathorst; Mghf; Eick,
 mehrfach.
linearis Ol. Weserufer b. Porta; PrOld; Doberg b. Bünde; Ba:
 Pthg; Schnathorst; Schaumb. Wald.
 — *v. longiventris* Heer Ba: Pthg; Eick; Süntel.
distans Rey PrOld, gesiebt, selten.
tricolor F. Bünde, Doberg; Ba: Pthg; Süntel; Weserkette, Jakobs-
 berg, Wittekindsberg, Oberlütbe; Eick; Blomberg
 i. L.; Teutob. Wald, Ravensburg, n. selt.

6. Unterfamilie: Paederinae

Lathrobium Grav.

multipunctatum Grav.

Ba: Pthg, Anspülicht der Weser; Ottensteiner Plateau i. Glessetal i. April; Bega i. L., i. Juli (selten).

quadratum Pzyk.

Ba: Pthg, Anspülicht der Osper.

terminatum Grav.

Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, einmal i. Mai.

fulvipenne Grav.

PrOld; Kalksteinbruch b. Hiddesen; Ba: Pthg; Eick; Vlotho.

— v. *Letzneri* Gerh.

Ba: Mghf; Eick; Pthg; Schnathorst; Süntel.

laevipenne Heer

Bünde, Doberg, einmal.

ripicola Czwalina

Ba: Velmerstot (Hub).

elongatum L.

Ba: Pthg; Mghf; Eick.

geminum Kraatz

PrOld; Ba: Pthg; Süntel.

brunnipes F.

PrOld; Ba: Pthg; Lemgoer Mark. Lattberg (meist unter Rinde).

jiliiforme Grav.

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Pthg.

spadiceum Er.

Bünde, Doberg, einmal.

Domene Fauvel.

scabricollis Er.

Ba: Weserbergland; Pyrmont (je einmal).

Medon Steph.

brunneus Er.

PrOld, einmal gesiebt.

fuscus Mnh.

PrOld, gesiebt.

dilutus Er.

Ba: Süntel, gesiebt.

Litocharis Lac.

ochracea Grav.

PrOld, Garten, unter trockenem Unkraut.

Scopaeus Kraatz.

cognatus Rey

PrOld, Garten, einmal.

Stilicus Latr.

subtilis Er.

Ba: Eick; Eldagsen, Osper; Süntel, Katzennase.

rufipes Germ.

Ba: Süntel, Katzennase; Eick.

similis Er.

Ba: Pthg.

geniculatus Er.

PrOld; Ba: Schnathorst.

orbiculatus Payk.

Ba: Eick.

Paederus Fabr.

litoralis Grav.

Ba: überall häufig.

riparius L.

Dümmersee b. Lembruch; Ba: Eick; Pthg; Mghf.

limnophilus Er.

Ba: Mghf; in der Gegend v. Löhne u. im Werretal.

gemellus Kraatz

Ba: Pthg, einmal bei Eldagsen nahe der Osper auf Sandboden i. gr. Menge; Wissingen b. Melle, einmal auf sandigem, feuchtem Boden zahlreich.

8. Unterfamilie: Steniae

Stenus Latr.

biguttatus L.

überall häufig.

bipunctatus Er.

ebenfalls häufig.

guttula Müll.

Ba: Pthg; an der Osper b. Eldagsen, i. Mai.

<i>bimaculatus</i> Gyll.	überall häufig.
<i>fossulatus</i> Er.	Ba: Süntel, Roter Stein, i. Mai (Hub).
<i>asphaltinus</i> Er.	Ba: Wesergeb., Schaumburg i. Mai (Hub).
<i>Junco</i> Payk.	überall nicht selten.
<i>ater</i> Mnnh.	Ba: Mghf.
<i>clavicornis</i> Scop.	Bünde, Doberg; PrOld; Ba: Pthg; Süntel, Osterberg, Roter Stein; Hoher Nacken, Hohenstein; Wiehengeb. b. Oberlütbe; Eick.
<i>providus</i> Er.	Bad Essen a. Wiehengeb.; Ba: Eick; Pthg, Anspülicht der Osper.
<i>pusillus</i> Steph.	PrOld.
<i>nanus</i> Steph.	Ba: Süntel, Hohenstein; Eick.
<i>carbonarius</i> Gyll.	Ba: Minden-Ravensberg (genauer Fundort unbekannt) 1915 — 3 Stk.
<i>incrassatus</i> Er.	Ba: Pthg, Weserufer (sehr selten) (Hub).
<i>buphthalmus</i> Grav.	überall häufig.
<i>melanarius</i> Steph.	PrOld.
<i>atratus</i> Er.	Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, einmal im Januar.
<i>morio</i> Grav.	Ba: Süntel, Ramsnacken (Benitz).
<i>fuscipes</i> Grav.	Ba: Pthg, häufig.
<i>argus</i> Grav.	Ba: Pthg, an der Osper.
<i>binotatus</i> Ljungh.	Hidder Bent; Ba: Pthg, an der Weser zwischen Schilf, März, April.
<i>geniculatus</i> Grav.	PrOld.
<i>opticus</i> Grav.	Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, i. Jan.
<i>crassus</i> Steph.	Bünde, Elseufer.
<i>nigritulus</i> Gyll.	Ba: bei Tengern, einmal unter Stein.
<i>brunnipes</i> Steph.	Ba: Pthg, Anspülicht der Osper (Hub).
<i>latifrons</i> Er.	Ba: Pthg; Anspülicht der Osper (Hub).
<i>tarsalis</i> Ljungh.	PrOld; Wiehengeb. b. Linne; Wellingholzhausen, gekätschert; Ba: Eick.
<i>similis</i> Hrbst.	Wiehengeb. b. Linne, gekätschert; Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.
<i>cicindeloides</i> Schall.	Ba: Anspülicht der Osper u. Weser.

9. Unterfamilie: Oxyporinae

Oxyporus Fbr.

rufus L. überall häufig, hauptsächlich an Pilzen.

11. Unterfamilie: Oxytelinae

Bledius Mnnh.

tricornis Hrbst.

Ba: Pthg, 1898 einmal, sonst Saltzter.

bicornis Germ.

PrOld, einmal, sonst Saltzter.

opacus Block.

Ba: Eick; Löhne, einmal an der Werre 3 Stk. (Hub).

Haploderus Steph.

caelatus Grav.

PrOld, gesiebt.

- Platystethus Mnnh.*
arenarius Grav. Pymont, Waldblöße, gekätschert; Wellingholzhausen.
gekätschert; Nettelstedter Moor; Ba: Eick.
cornutus Grav. Bünde, Elseufer; Ba: Weserkette, Ramsnacken; Löhne,
an der Werre; Hillentrup i. L.
alulaceus Thoms. Ba: Eick.
nitens Sahlb. Ba: Hiddeser Bent.
- Oxytelus Grav.*
rugosus F. überall gemein.
-- *a. pulcher Grav.* Bünde, Elseufer; Ba: Pthg.
laqueatus Marsh. Ba: Pthg. Anspülicht der Osper, April 99.
sculptus Grav. PrOld.
inustus Grav. PrOld, i. Maulwurfsnest u. gesiebt; Bünde, Doberg,
auf Mergel.
sculpturatus Grav. überall häufig.
nitidulus Grav. PrOld; Bünde, Doberg.
complanatus L. PrOld.
clypeonitens Pand. PrOld.
tetracarinatus Block. PrOld; Bünde, Doberg; Ba: Eick; Mghf.
pumilus Er. Hücker Moor b. Bünde; PrOld.
- Trogoploeus Mnnh.*
rivularis Motsch. PrOld, gesiebt.
- Coprophilus Latr.*
striatulus F. PrOld; Ba: Eick, Schulgarten; Pthg.
- Deleaster Er.*
dichrous Grav. Nettelstedter Moor; Ba: Gohfeld, an der Werre; Eick.
- 13. Unterfamilie: Omalinae**
- Anthophagus Grav.*
bicornis Block. Ba: Süntel, Schaumburg, im östl. Teil der Weserkette,
auf Crataegus, Mai 15 sehr häufig.
-- *a. nivalis Rey* Ba: Süntel; Hohenstein.
- Lesteva Latr.*
pubescens Mnnh. PrOld.
longelytrata Goeze PrOld; Bad Essen, Wiehengeb.
- Orochares Kraatz.*
angustata Er. PrOld., Wiehengeb., gekätschert.
- Acidota Mnnh.*
crenata F. Ba: Pthg, Anspülicht der Osper, einmal.
- Olophrum Er.*
piceum Gyll. Ba: Weserkette, Gr. Süntel.
assimile Payk. Ba: Pthg.
- Arpedium Er.*
quadrum Grav. Ba: Weserberge; Pthg, Anspülicht der Osper.

***Lathrimaenum* Er.**

melanocephalum Illig.
atrocephalum Gyll.
unicolor Marsh.

PrOld, in alten Pilzen.
PrOld, gesiebt; Ba: Eick, gesiebt.
Ba: Löhne, im Torlak; Eick (selten).

***Xylodromus* Heer.**

depressus Grav.

Ba: Schnathorst, i. August.

***Omalium* Grav.**

rivulare Payk.
septentrionis Thoms.
caesum Grav.

PrOld, gesiebt u. i. Pilzen, häufig; Ba: Eick; Pthg.
Ba: Eldasen (Büsching).
PrOld, gesiebt.

***Phyllodrepa* Thoms.**

floralis Payk.
melanocephala F.

PrOld, gesiebt; Bünde, Doberg; Ba: Löhne, i. Früh-
jahr, mehrfach.
Ba: Eldagsen (Büsching).

***Anthobium* Steph.**

abdominale Grav.

PrOld, v. Blüten gekätschert; Ba: Wesergeb. b. Schnat-
horst i. April.

signatum Märkel

Ba: Pthg, Heisterholz (Mai); Wiehengeb. b. Dehme,
auf Kirschblüte (April) (Hub).

limbatum Er.

PrOld.

minutum F.

Ba: Pthg.

torquatum Marsh.

Ba: Pthg.

sorbi Gyll.

PrOld, v. Blüten gekätschert; Ba: Weserbergland, Porta.

rectangulum Fauv.

Ba: Mghf, b. Ulenburg an Lonicera (Hub).

***Megarthus* Steph.**

sinuato-collis Laé.

PrOld, gekätschert.

denticollis Beck.

Ba: Wiehengeb. b. Häverstedt.

***Microplepus* Latr.**

porcatus F.

PrOld, gekätschert, zweimal.

3. Familie: Pselaphidae

***Euplectus* Leach.**

Fischeri Aubé
signatus Reichenb.

PrOld, im Compost.
Ba: Süntel, Hohenstein, an faulem Baumstamm.

***Amauronyx* Reitt.**

Maerkeli Aubé

Ba: Westfalen (genaue Fundortangabe fehlt).

***Byraxis* Leach.**

sanguinea Leach.

Wellingholzhausen, Teutob. Wald, gekätschert; Ba:
Pthg. Anspülicht der Osper, Mai 99, sehr häufig;
in der Marsch auf *Sium*, einmal.

***Reichenbachia* Leach.**

jossulata Reichenb.
juncorum Leach

Ba: Pthg, einmal u. großem Stein, am Waldrand.
Ba: Mghf, im Anspülicht des Mühlbaches; Eick, aus
Laub gesiebt.

Bythinus Leach.

puncticollis Denny
securiger Rchbch.

Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.
PrOld, im Compost.

Pselaphus Hrbst.

Heisei Hrbst.

Ba: Pthg (Büsching).

4. Familie: Scydmaemidae

Neuraphus Thoms.

elongatulus Müll.

Ba: Johannisberg b. Biefeld, aus Laub gesiebt.

Euconnus Thoms.

hirticollis Ill.

Ba: Eick, einmal.

Scydmaenus Latr.

larsatus Müll.

PrOld, im Compost.

6. Familie: Silphidae

Choleva Latr.

spadicea Strm.

Sturmi Bris.

oblonga Latr.

cisteloides Fröl.

Ba: Bielefeld, Johannisberg, aus Laub gesiebt.

Ba: Uchte.

Ba: Schnathorst.

PrOld, im Maulwurfsnest; Ba: Mghf; Niedermehnen;
Süntel am Süntelturm, Totental, Hohenstein; Witte-
kindsberg; Löhne; Eick.

Ba: Pthg, im Walde i. April (Hub).

agilis Ill.

Nargus Thoms.

Wilkeni Spence.

anisotomoides Spence.

Ba: Pthg, im Walde, i. April.

Ba: Süntel, Hohenstein, Totental (April u. Mai).

Catops Payk.

fumatus Spence.

Watsoni Spence.

-- *v. amoenus Reill.*

picipes Fabr.

fuliginosus Er.

chrysoloides Panz.

tristis Panz.

alpinus Gyll.

Ba: Eick, Fangbecher i. Walde.

Ba: Pthg; Eick; Mghf (an kl. Kadavern). häufig.

Ba: Mghf.

Ba: Eldagsen (Büsching).

Ba: Pthg; (Hub).

Ba: Pthg (Büsching).

Hiddesen, an Hasenfell; Ba: Eick.

Ba: Teutob. Wald, nahe der Ravensburg; Eick, Fang-
becher i. kl. Walde.

Necrophorus Fabr.

germanicus L.

humator Goeze

interruptus Steph.

vespilloides Hrbst.

vespillo L.

vestigator Herschel

Rödinghausen a. Wiehengeb., einmal; Ba: Pthg, b.
Lahde, einmal (sehr selten).

überall u. n. selten.

Ba: Pthg, einmal.

Ba: Pthg; Bergkirchen, meist an faulen Pilzen.
überall häufig.

Börninghausen a. Wiehengeb.

Necrodes Leach.

litoralis L.

Ba: Pthg; Wiehengeb.; Eick (an größeren Kadavern
n. selten).

Thanatophilus Samouelle.

- rugosus* L. Ba: Pthg; Mghf.
sinuatus F. überall häufig, an Aas.
dispar Hrbst. Ba: Mghf, einmal.

Oeceoptoma Samouelle.

- thoracica* L. Ba: Pthg; Mghf; Eick (n. selten).

Blitophaga Reitt.

- opaca* L. überall häufig.
undata Müll. häufig.

Xylodrepa Thoms.

- quadripunctata* L. bei Salzuflen, i. Buchenwäldern häufig.

Silpha L.

- tristis* Illig. PrOld; Ba: Eick.
obscura L. überall n. selten.

Phosphuga Leach.

- atrata* L. überall häufig, gern in der Nähe v. Wasser.
— *a. brunnea* Hrbst. überall häufig.

Anisotoma Ill.

- humeralis* Fabr. Ba: Weserbergland; Beverungen; Pthg.
axillaris Gyll. Ba: Schloß Holte, u. Kiefernrinde (Hub).

Agathidium Ill.

- nigripenne* F. Ba: Süntel, a. d. Südwehe, u. verpilzter Buchen- u.
Eichenrinde, zweimal i. Mai
seminulum L. PrOld, aus Laub gesiebt; Ba: Mghf, im Torlak;
Wiehengeb. b. Nettelstedt.
rotundatum Gyll. Ba: Eick.

10. Familie: Ptiliidae

Pteryx Matth.

- suturalis* Heer Ba: Mghf, aus Laub gesiebt.

Acrotrichis Motsch.

- grandicollis* Munn. PrOld, gesiebt.
intermedia Gillm. Ba: häufig, im Winter im Laube.
fascicularis Hrbst. Ba: Bielefeld, Teutob. Wald; Mghf, aus Laub gesiebt,
im Februar.

12. Familie: Scaphidiidae

Scaphidium Oliv.

- quadrimaculatum* Oliv. Ba: Pthg; Wesergeb. b. Steinbergen, unter fauler
Rinde, nicht häufig.

Scaphosoma Leach.

- agaricinum* L. Ba: Hohenstein; Löhne; Eick; Teutoburger Wald b.
Örlinghausen (häufig).

14. Familie: Histeridae

Platysoma Leach.

frontale Payk.

Ba: Pthg. unter Birkenrinde; Teutob. Wald b. Örlinghausen.

compressum Hrbst.

Ba: Pthg. unter Eichenrinde; Weserkette, Baumgarten; Süntel, Hohenstein.

angustatum Hoffm.

Ba: Schloß Holte, unter Kiefernrinde.

Hister L.

unicolor L.

Nettelstedter Moor; PrOld; Ba: Pthg.

terricola Germ.

PrOld, i. Maulwurfsnest; Nettelstedter Moor; Ba: Mghf.

merdarius Hoffm.

PrOld; Ba: Mghf.

cadaverinus Hoffm.

überall sehr häufig.

striola Sahlbg.

Ba: Pthg, Eldagsen, zweimal.

fimetarius Hrbst.

Ba: Pthg, nicht selten.

stercorarius Hoffm.

PrOld; Ba: Pthg; Wiehengeb., Limberg.

marginatus Er.

Ba: an faulen Pflanzen, selten (Hub).

rujicornis Grimm.

Ba: Pthg, selten (Hub).

purpurascens Hrbst.

PrOld; Ba: Sieker, Senne; Pthg; Mghf; Eick.

— *a. niger* Schmidt

Ba: Pthg.

ventralis Marsh.

PrOld.

neglectus Germ.

PrOld; Ba: Pthg, mehrfach; Schnathorst; Eldagsen, Eick.

carbonarius Hoffm.

PrOld; Ba: Schildesche; Pthg; Schaumburger Wald.

bimaculatus L.

Ba: Eick, einmal i. Wassertümpel; Versmold.

Paromalus Leach.

parallelepipedus Hrbst.

Ba: Pthg, unter Kiefernrinde, März 13 u. Okt. 18 (8 Stk).

Dendrophilus Leach.

punctatus Hrbst.

PrOld, im Kompost.

Gnathoncus Duval.

punctulatus Thoms.

Ba: Pthg, Eldagsen (Büsching); Gr. Süntel; Eick, am Fenster eines Viehstalles sehr zahlr.

rotundatus Kug.

Ba: Kahler Asten.

Saprinus Er.

semistriatus Scribâ

Ba: Pthg; Wesergeb.; Eick; Teutob. Wald.

aeneus Fabr.

Ba: Wald b. Südfelde, im Juni.

Plegaderus Er.

vulneratus Panz.

Ba: Pthg, unter Kiefernrinde, mehrfach, März 13 und Okt. 18.

Onthophilus Leach.

striatus Förster

überall ziemlich häufig.

sulcatus Fabr.

PrOld, im Compost; Ba: Eick (nicht selten).

Fortsetzung folgt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen aus dem Westfälischen Provinzial-Museum für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [2_1931](#)

Autor(en)/Author(s): Peetz Friedrich Karl Ludwig

Artikel/Article: [Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes 129-144](#)