

Nachtrag zu meinem Pflanzenverzeichnis.

Von H. Eggers.

(Fortsetzung aus p. 185 Nr. 11 des Jahrgangs 1902.)

Parnassia palustris L. Auf Wiesen zwischen Lüttchendorf und Aseleben, auf Wiesen am Seebecken bei Erdeborn und Ober-Röblingen, am Teiche bei dem früheren Wanslebener Bade, auf Wiesen neben dem Sülzerbach.

Gypsophila paniculata L. Im Seebecken zwischen Wansleben und der Kärner Brücke, verschleppt. — *Tunica prolifera* Scop. In Eschenhagens Steinbruch im Neckendorfer Grunde (gef. im Sommer 1900). — *Dianthus armeria* L. Am Waldesrande bei Bornstedt. — *Vaccaria parviflora* Mch. [Einzeln u. unbeständig auf Aeckern um den Salzigen See]. *Saponaria officinalis* L. Am Ringkanal neben dem Flegelsberg. — *Silene otites* Sm. An Bergabhängen zwischen der Himmelshöhe und dem Galgenberg, in der Lehmgrube bei Erdeborn, neben der Sandgrube am Wege zwischen Amsdorf und Wansleben. — *S. nutans* L. v. *glabra* Schkuhr. In den Holzmarken. — *S. dichotoma* Ehrh. An einem grasigen Abhange im Nonnenthale. — *Sagina apetala* Ard. Auf Feldern neben dem Pfarrholze bei Wolferode. — *Spergularia salina* Presl. Auf Wiesen bei Lüttchendorf, am Kärner See, am Binder See. — *S. marginata* P. M. E. Am süßen See bei Aseleben, am Mühlengraben bei Seeburg unweit der Brücke, an Gräben im Seebecken, auf Feldern neben den Dömeken, am Kärner See, am Binder See, in Graedners Schacht neben Unter-Röblingen. — *Moenchia erecta* Fl. Wett. [Zwischen Hornburg und Holzelle].

Radiola linoides Gmel. Auf Feldern neben der Neckendorfer Heide, auf Triften bei Holzelle. — *Malva moschata* L. An der Chaussee zwischen Bischofode und Rothenschirmbach unweit des Kaiserdenkmals, am Waldesrande bei Bornstedt und Sittichenbach. — *M. borealis* Waltr. An der Chaussee zwischen Unter-Rissdorf und Wormsleben neben den hohen Pappeln, auf Schutthaufen in Erdeborn. — *Althaea officinalis* L. Zahlreiche Stellen am Binder See, neben den Dömeken, am Ausflusse des Mühlgrabens.

Hypericum tetrapetrum Fr. Im Teufelsgrunde, am Bache im Kliebichgrunde gleich oberhalb Kreisfeld, am Fischteiche bei Rothenschirmbach, auf Wiesen im Walde bei Holzelle. — *H. humifusum* L. Auf Feldern im Neckendorfer Grunde hinter der Heide, auf Feldern neben dem Pfarrholze bei Wolferode.

Acer Monspessulanum L. Im Bismarckshain angepflanzt.

Geranium dissectum L. Auf Rasen am Mittelkanal im Seebecken. — *G. columbinum* L. An der Nordseite des Ober-Rissdorfer Gehölzes, unterhalb des Kesselholzes, im Kliebichthale, am Waldesrande zwischen Bornstedt und Rothenschirmbach.

Impatiens parviflora DC. In einer Ecke des Schrebergartens gesamt.

Rhus typhina L. und *Ailanthus glandulosa* Desf. sind im Stadtgraben und in anderen städtischen Anlagen angepflanzt.

Ononis repens v. *mitis* Gmel. Hier die vorherrschende Form, nur im Seebecken zwischen Wormsleben und der Pumpstation auch die Stammform. — *Medicago falcata* × *sutira* Rehb. Häufig am Eisenbahndamme vor der Hümeburg u. s. w. — *M. minima* Bart. In der Sandgrube oberhalb der Pressmühle, neben der Sandgrube am Wege von Amsdorf nach Wansleben, auf dem Galgenberg bei Hornburg, auf der Spitze des Franzosenberges bei Erdeborn. — *M. denticulata* Willd. [Bei Ober-Röblingen]. — *Melilotus dentatus* Pers. Häufig im Seebecken und an den Dömeken. — *Trifolium incarnatum* L. Im Seebecken gesamt. — *T. striatum* L. An einem Abhange im Nonnenthale unterhalb des Weges nach Ober-Rissdorf. — *Lotus corniculatus* f. *tennifolia* Rehb. Auf Wiesen, an Gräben und Wegrändern am süßen See und im Seebecken allgemein verbreitet. — *Tetragonolobus siliquosus* Rth. Am Eisenbahndamme neben der Station Erdeborn, auf Wiesen zwischen Unter-Röblingen und Amsdorf, auf Wiesen am früheren Wanslebener Bade, an Gräben unweit der Kärner Brücke, auf Wiesen am Sülzer Bach.

Oxytropis pilosa DC. In den Weinbergen bei Ober-Rissdorf, am Südbahge der Himmelshöhe, in den Seeburger Obstanlagen nördlich vom süßen

See, in den Hühnerstetter Weinbergen im Rösertthale, an Abhängen nördlich vom Kärner See. — *Astragalus crepans* L. Am Bachenberg, am Fusswege oberhalb des Kesselholzes, unweit der Himmelshöhe, an Bergabhängen zwischen der Himmelshöhe und Galgenberg, auf dem Galgenberg vor Seeburg, im Feldgrund am Galgenberg bei Erdeborn. — *A. hypoglottis* L. An Abhängen im Nonnenthale, am Schalksberg, auf der Himmelshöhe, auf dem Galgenberg bei Seeburg, an der Nordseite des Seebeckens, in den Hühnerstetter Weinbergen, an Teiche neben dem Wanslebener Bade, auf dem Galgenberg bei Hornburg. — *Coronilla varia* L. An der Pollebener Chaussee vor dem Hutberg, an grasigen Abhängen neben der Buschmühle, an der Querfurter Chaussee vor dem Neckendorfer Grunde, am Nordrande des Katharinenholzes, an Abhängen hinter der Krughütte, am östlichen Rande der Bärlicher. — *Hippocrepis comosa* L. Am Waldesrande bei Sittichenbach, an grasigen Abhängen bei Wormsleben, auf der Himmelshöhe, auf dem Galgenberge bei Seeburg, am Krähenberge und dem Pastorplan unweit des Wachbügels, im Feldgrund am Galgenberg bei Erdeborn. — *Vicia villosa* Roth. Im Roggenfelde auf dem Friedrichsberg neben dem Reservoir, auf der Vogelwiese, auf Feldern neben dem Katharinenholze. — *V. tenuifolia* Roth. Auf Feldern am Wege von Neckendorf nach Wolferode gleich oberhalb Neckendorf, im Kliebichthale, an Bergen bei Wormsleben, im Pfarrholze bei Unter-Rissdorf, am Eisenbahndamme der gewerkschaftlichen Bahn neben dem Reservoir auf dem Friedrichsberg, auf der Südseite der Himmelshöhe, am Eisenbahndamme zwischen Eisleben und Erdeborn, im Feldgrunde am Galgenberg bei Erdeborn u. s. w. — *Ervum pisiforme* Petern. Im Kesselholze, im Pfarrholze bei Unter-Rissdorf, im Gebüsch am Friedrichsberg, am Ostrand des Fichtenwaldes zwischen Neckendorf und Bischofrode, im Kliebichthale, am Nordrande des Katharinenholzes. — *Lathyrus pratensis* v. *sepium* Scop. Im Park, im Helftaer Holze. — *L. silvester* L. In den Holzmarken, im Pfarrholze bei Wolferode. — *Orobus tuberosus* L. Im Walde bei Sittichenbach. (Forts. folgt.)

Bemerkungen zu den „Cyperaceae (exclus. Carices) et Juncaceae exsiccatae.“

von A. Kneucker.

III. Lieferung 1902.

(Schluss.)

- Nr. 81. *Juncus supinus* Mch. Enum. pl. Hassiae, I, p. 167 (1777); v. Fr. Buchenau, Monogr. Juncac., p. 291 (1890) = *J. bulbosus* L. Spec. pl. ed. 1, I, p. 327 (1753) = *J. uliginosus* Roth, Tent. I, p. 155 (1788) et II, p. 405 (1789) = *J. subverticillatus* Wulf. Pl. rar. Carinth. in Jacq. Coll. III, p. 51 (1789) = *J. setifolius* Ehrh. Calamar. Dec. XII, Nr. 86 et Beitr. VI, p. 83 (1791) = *J. triandrus* Vill. Cat. jard. Strasbourg, p. 81 (1807). *f. humilis prolifera* Buchenau.

Feuchtes und sandiges Alluvium am Ufer des Longemer in den Hochvogesen unweit der deutschen Grenze (Frankreich). Begleitpflanzen: *Isöetes echinospora* Dur., *Subularia aquatica* L., *Myriophyllum alterniflorum* DC. etc.
746 m ü. d. M.; 26. August 1901. leg. A. Kneucker.

- Nr. 82. *Juncus valvatus* Link in Schrader, Journ. für Bot. II, p. 316 (1799) var. *echinuloides* Cosson et Durieu Explor. d'Algérie p. 269 (1854—67); v. Fr. Buchenau, Monogr. Juncac., p. 318 (1890) = *J. echinuloides* Brotero Fl. Lusit. I, p. 518 (1804).

Bei Coimbra in Portugal: Eiras, Tojal. Begleitpflanzen: *Brunella vulgaris* L., *Dipsacus laciniatus* L., *Hypericum tomentosum* L., *Inula viscosa* Ait., *Brachypodium mucronatum* Willk., *Galactites tomentosa* Mch., *Plantago psyllium*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [8_1902](#)

Autor(en)/Author(s): Eggers H.

Artikel/Article: [Nachtrag zu meinem Pflanzenverzeichnis. 8-9](#)