

Herrn Prof. Dr. J. H. Reichholf danke ich herzlich für die kritische Durchsicht des Manuskripts.

Literatur

- BANDORF, J. & H. LAUBENDER (1982): Die Vogelwelt zwischen Steigerwald und Rhön. Bd. 1. Landesbund f. Vogelschutz in Bayern, Hilpoltstein.
- BAUER, K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1968): Handbuch der Vögel Mitteleuropas Bd. 2, S. 46–55. Frankfurt/M.
- BEZZEL, E. (1985): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. S. 113–115. Aula-Verlag Wiesbaden.
- WÜST, W. (1980): Avifauna Bavariae. Bd. I S. 200–206. München.

Peter Erlemann, Fichtenstr. 11, 6053 Obertshausen

Silberreiher *Casmerodius albus* in Oberfranken

Am 16.11.1986 konnten A. POPP und ich zwischen 15 und 15.20 h am Nickls-Weiher (auch Igels-Weiher) bei Hornungsreuth im Landkreis Kulmbach einen Silberreiher *Casmerodius albus* beobachten. Zuerst erkannten wir aus weiter Entfernung nur einen großen, weißen Vogel, der sich etwas abseits vom Weiher in einer Wiese aufhielt. Der Vogel strich dann ab und flog in typischer Reiherhaltung zum ca. 3,6 ha großen Nickls-Weiher, der von einem Schilf- und Gebüschgürtel umgeben ist. Der Reiher landete mitten im damals abgefischten und daher trocken liegenden Weiher. Wir konnten den fast regungslos verharrenden Silberreiher auf ca. 80–100 m Entfernung mit unseren Ferngläsern gut beobachten. Nach ca. 10 Minuten entfernten wir uns vom Weiher, ohne daß der Silberreiher wegflog. Für den östlichen Teil des Regierungsbezirkes Oberfranken dürfte es sich um eine der ersten Silberreiher-Beobachtungen handeln.

Olaf Schmidt, Weinbergstraße 8, 8581 Neudrossenfeld

Brutnachweis der Beutelmeise *Remiz pendulinus* nun auch im Rotmaingebiet

Obwohl erst vor knapp 3 Jahrzehnten begonnen (Wüst 1986: Avifauna Bavariae Bd. II, Gebr. Geiselberger, Altötting), wird die Besiedlungsgeschichte der Beutelmeise in Nordbayern als weitgehend abgeschlossen

angesehen (FRANZ & THEISS 1987: Anz. orn. Ges. Bayern 26: 115–128). Die wenigen Brutvorkommen sind weit verstreut und betreffen in der Regel unsterblich auftretende Einzelpaare (ZACH 1978, HOLYNSKY & UHLICH 1978, DIEMER 1984, KRAUS & KRAUSS 1986; Anz. orn. Ges. Bayern 17: 329–330, 338–339; 23: 105–106, 25: 155–161). Lediglich am Obermain hat sich eine stabile und sogar zunehmende Population gebildet (BARNICKEL et al. 1978: Die Vogelwelt des Coburger Landes III, Jb. Cob. Ld. Stiftung 23: 165–230, KORTNER 1981: Anz. orn. Ges. Bayern 20: 73–81). Die östlichsten Vorkommen befinden sich hier bei Hochstadt Lkr. Lichtenfels. Bereits 1983 hat THEISS (mdl.) auf ein mögliches weiteres Vordringen mainaufwärts hingewiesen. Diese Erwartung hat sich nun tatsächlich erfüllt.

Am 21.3.1987 fanden die Schüler S. KURTH und M. MEINHARDT, Mitglieder des LBV, Kreisgruppe Bayreuth, ein Nest am Igelsweiher bei Neudrossenfeld, an der Südgrenze des Landkreises Kulmbach. Das Gewässer ist etwa 1 km vom Roten Main entfernt und durch eine Grabensenke (Igelsweiher-Graben) unmittelbar mit diesem verbunden; ca. 3,2 ha groß und fast gänzlich von einem durchschnittlich 10 m breiten Vegetationsgürtel, hauptsächlich aus Schwarzem Holunder und Schilf, seltener Traubenkirsche, Saalweide, Pappel und Birke, umgeben.

An einer Birke hing auch das Nest, nahe am Ufer und ca. 2 m über dem Wasserspiegel. Es war vollendet (mit Einflugröhre), noch gut erhalten (vorjährig) und wies Kotreste auf, was mit ziemlicher Sicherheit auf eine Brut schließen läßt.

Aufgrund des Nestfundes wurde das Rotmaintal nun zwischen Bayreuth und Kulmbach genauer – hauptsächlich unter Verwendung von Klangattrappen – kontrolliert. Dabei gelangen zwar keine Brutnachweise, aber folgende Beobachtungen:

17. 4. Antwortrufe bei Langenstadt, dgl. am 18. 4. bei Melkendorf (GOSSLER); 20. 4. 1 Ex. bei Heinersreuth (KURTH u. MEINHARDT), 21. 4. 2 Ex. bei Neuenreuth (GOSSLER), 2. 5. 1 Ex. am Igelsweiher (GOSSLER u. A. SCHMIDT).

Zu erwähnen ist noch eine Feststellung im Bereich des Roten Mains südlich von Bayreuth: 18. 4. 1984 3 Ex. am Craimoosweiher (VOGT).

Die vorliegenden Daten lassen vermuten, daß die Beutelmeise in den genannten Gebieten regelmäßig Durchzügler und gelegentlicher Brutvogel ist.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [26_3](#)

Autor(en)/Author(s): Gubitz Christian

Artikel/Article: [Brutnachweis der Beutelmeise *Remiz pendulinus* nun auch im Rotmaingebiet 263-264](#)