

Ufer des Teiches bei der hintersten Mühle! und im Ne-
merower Holz am Secufer! Malchin, Rothenmoor! u. s. w.
(S. 39 und 126).

31. *Equisetum limosum* L. (T. 1788) Röp. S. 149.

32. *Equisetum palustre* L. (T. 1788) Röp. S. 149.

33. *Equisetum pratense* Ehrh. (Schultz 1819 als
umbrosum) Röp. S. 147. in den Wäldern um Neu-
brandenburg nicht selten! Neustrelitz in der Bürgerhorst;
in der Wolkowschen Haide (Zabel), bei Güstrow in den
Hasenhöfen, — gewiß auch noch weiter verbreitet, aber
nicht beachtet.

34. *Equisetum silvaticum* L. (L. Sch. 1777) Röp. 146.

35. *Equisetum Telmateja* Ehr. (Röp. 1843 S. 146)
bei Klocksin und Grubenhagen am Malchiner See und
zwar die var. *serotina*; am Ufer der Trave und des
Dassower Sees; in der Rönnitz bei Rageburg. — In
M. Strelitz (namentlich bei Neubrandenburg), wo es nach
Schultz 2. Nachtrag wachsen soll, noch nicht gefunden.

36. *Equisetum arvense* L. (L. Sch. 1777). Vergl.
S. 32 und 126.

β. *serotinum* Mey. = *E. campestre* Schultz sup.
1, vergl. Milde in der Denkschrift d. Schlesischen Gesell.
u. s. w. 1853 S. 186.

IV. Musci frondosi.

(Nach Fiedler 1844, mit einigen Emendationen.)

110. Sphag-
neae.

1. *Sphagnum cymbifolium* Dill. (L. Sch. 1777).

β. *compactum* Brid.

2. *Sphagnum squarrosum* Pers. (Bland. 1804).

3. *Sph. subsecundum* N. E. (Schultz 1819).
 β. *contortum* Schultz bei Jagde unv. Friedland!
4. *Sph. acutifolium* Ehr. (T. 1788).
5. *Sph. cuspidatum* Ehr. (Crome 1803).
 β. *plumosum* Brid. (Schultz 1828) = *Sph. laxifolium* C. Müll.
6. *Splachnum ampullaceum* L. (T. 1788). 111. Splachnaceae.
7. *Physcomitrium pyriforme* Brid. (T. 1788). 112. Funariaceae.
8. *Ph. sphaericum* Schwäg. sp. (Schultz 1819) bei Neubrandenburg am fl. Zhenpohl.
9. *Ph. fasciculare* Hedw. sp. (Bl. 1804).
10. *Funaria hibernica* Hook. (Crome 1805) selten, z. B. an den Zippendorfer Anhöhen bei Schwerin.
11. *F. hygrometrica* Hedw. (L. Sch. 1777).
12. *Phascum serratum* Schreb. (T. 1788). 113. Phascaceae.
13. *Ph. muticum* Schr. (T. 1788).
14. *Ph. Floerkeanum* W. M. (Flörke nach 1816) bei Rostock.
15. *Ph. patens* Hedw. (Sch. 1806) auf feuchtem Leh- und Thonboden ziemlich selten.
16. *Ph. cuspidatum* Schr. (T. 1788).
17. *Ph. bryoides* Dick. (Sch. 1806) auf sandigem, nasstem Boden ziemlich selten.
18. *Ph. curvillum* Hedw. (Fied. 1844) in hochgelegenen Wäldern an Grabenrändern selten.
19. *Ph. nitidum* Hedw. (T. 1788).
20. *Ph. crispum* Hedw. (Sch. 1806) ziemlich selten.
21. *Ph. subulatum* L. (T. 1788).
22. *Pottia cavifolia* Ehr. (T. 1788). 114. Pottiaceae.
23. *P. minutula* Fürn. (Sch. 1806).

24. *Pottia truncata* Hedw. sp. (T. 1788).
 β. *intermedia* Schwägr. sp.
25. *Anacalypta lanceolata* Hedw. sp. (T. 1788).
 β. *aciphylla* Wahlb. (Bl. 1809).
115. Tricho-
 stomeae. 26. *Barbula unguiculata* Hedw. (T. 1788). — Hier-
 her gehören als Var.: *B. cuspidata*, *apiculata*, *micro-*
carpa, *obtusifolia* Schultz.
27. *B. fallax* Hedw. (Bl. 1804).
28. *B. brevicaulis* Schwäg. (Sch. 1823) „in prae-
 ruptis sylvestribus Duc. Megap. Starg.“, fehlt bei Fiedler.
29. *B. gracilis* Schwäg. (F. 1844) selten auf thonig-
 sandigen Feldern.
30. *B. Hornschuchiana* Schultz (1819 als *revoluta*)
 Neubrandenburg bei der Brandmühle.
31. *B. convoluta* Hedw. (T. 1788).
32. *B. muralis* L. sp. (L. Sch. 1777).
33. *B. subulata* L. sp. (T. 1788).
34. *B. laevipila* Br. Sch. (Wüst. 1844) bei Schwe-
 rin am alten Wege nach Ludwigslust an Weiden.
35. *B. latifolia* Br. Sch. (F. 1844) bei Schwerin an
 alten Bäumen in der Pappelallee am faulen See.
36. *B. ruralis* L. sp. (L. Sch. 1777).
37. *Trichostomum rigidulum* Hedw. sp. (Bl. 1809) selten.
38. *Tr. tortile* Schr. (T. 1788) nicht häufig.
39. *Tr. homomallum* Hedw. sp. (Sch. 1806) in Wäl-
 dern an Hohlwegen nicht häufig.
40. *Tr. pallidum* Hedw. (Bl. 1803) im Brodaer Holz
 bei Neubrandenburg; Malchin am Fuchsberge.
41. *Distichium capillaceum* Hedw. sp. (Sch. 1806)
 Fiedler No. 46.

42. *Gymnostomum rutilans* Hedw. (Sch. 1828) selten ^{116. Weisla-}
 an schattigen, sandigen, nackten Anhöhen und Graben=
 ccaee.
 rändern (in M. Strelitz, — nach Schulz).
43. *Hymenostomum microstomum* Hedw. sp. (Bl. 1803).
 β. *obliquum* N. H. (Sch. 1828).
44. *Weisia controversa* Hedw. (T. 1788).
45. *W. cirrhata* L. sp. (T. 1788).
46. *W. recurvirostra* Hedw. (T. 1788).
47. *Trematodon ambiguus* Horn. (G. Brück. 1818),
 nur bei Ludwigslust gefunden, wo es aber in neuerer Zeit
 vergebens gesucht ist.
48. *Ceratodon cylindricus* Hedw. sp. (Sch. 1819)
 auf sandigen Anhöhen bei Neubrandenburg.
49. *C. purpureus* L. sp. (T. 1788).
50. *Dicranum cerviculatum* Hedw. (Bl. 1804).
 β. *pusillum* Hedw. (Sch. 1806).
51. *D. pellucidum* L. sp. (T. 1788).
52. *D. strumiferum* Hedw. sp. (Sch. 1806) selten
 auf schwammigen, bewaldeten Wiesen an alten Wurzelstöcken.
53. *D. flexuosum* L. sp. (T. 1788).
54. *D. Schreberi* Sw. (Sch. 1806).
55. *D. varium* Hedw. (T. 1788).
 β. *rigidulum* Sw. (Sch. 1819).
56. *D. rufescens* Sm. (Sch. 1806) nicht häufig.
57. *D. crispum* Hedw. (F. 1844) auf feuchtem Sand=
 boden am Rande der Wege und Gräben nicht häufig.
58. *D. heteromallum* L. sp. (T. 1788).
59. *D. subulatum* Hedw. (Sch. 1819) feltener.
60. *D. longifolium* Ehr. (Bl. 1804) im Mühlenholz bei
 Neubrandenburg am Fußsteige nach der h. Mühle an Steinen.

61. *Dicranum flagellare* Timml (1791) in Wäldern auf verfaultem, an der Erde liegendem Holz: bei Malchin, Ballin (unw. Stargard), Mildenitz.

62. *D. scoparium* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. *orthophyllum* Brid. (Sch. 1819).

63. *D. majus* Sm. (Sch. 1806 als *recurvatum*, welches hierher, und nicht zur vorhergehenden Art gehört, vergl. Archiv VIII. 95); bei Neubrandenburg, Malchin, Sternberg.

64. *D. undulatum* Ehr. (T. 1788).

65. *D. Schraderi* W. M. (Bl. 1804) ziemlich selten.

66. *D. spurium* Hedw. (T. 1788) am Wege von Malchin nach Schwinkendorf auf den Hügeln in den Tannen; in den Hufentannen bei Stargard.

67. *D. glaucum* L. sp. (T. 1788).

68. *Thysanomitrium pyriforme* Schultz sp. (1819) Fiedler Nr. 45; bei Ballin unw. Stargard im Holz hinter dem Hofgarten.

417. Brya-
ceae.

69. *Mnium stygium* Sw. sp. (Bl. 1808) bei Neubrandenburg im Brüderbruch, unweit Kratzburg am Wege nach Neustrelitz, Waren, Rövershagen, Schwerin.

70. *M. punctatum* Schreb. sp. (T. 1788).

71. *M. undulatum* Hedw. (T. 1788).

72. *M. hornum* L. sp. (T. 1788).

73. *M. serratum* Brid. (Bl. 1804) Neubrandenburg am Starg. Berge.

β. *orthorrhynchum* Blandow sec. Schultz 1828.

74. *M. rostratum* Schwäg. (Bl. 1804) Neubrandenburg am hohen Ufer auf Steinen, Loitz unw. Stargard.

75. *M. cuspidatum* Schreb. sp. (T. 1788).

76. *M. affine* Blandow (1804).

77. *Mnium stellare* Dill. sp. (T. 1788) Malchin im Kalenschen Holz im ersten Hohlwege; Neubrandenburg im Mühlenholz, bei Loitz in dem Holz an der Balliner Gränze an dem Ufer eines Wasserlaufes.

78. *Bryum cernuum* Br. Sch. (Fiedl. 1860!) auf dem Kalkwerder bei Schwerin auf ausgeschütteten Kalkresten.

79. *B. lacustre* Blandow (1804) bei Waren; auch am Wentower See an der Südgränze von M. Strelitz durch Struch entdeckt.

80. *B. inclinatum* Sw. sp. (Bl. 1804) selten in Wäldern an feuchter Erde.

81. *B. strictum* Schultz (1828) an feuchten, grasigen und überflutheten Orten bei Neubrandenburg.

82. *B. Warneum* Blandow (1806) bei Waren.

83. *B. latifolium* Br. Sch. (Bland. 1809?) sehr selten, fehlt bei Fiedler!

Anm. Diese Art wurde von Bl. in Mecklenburg gefunden und ohne nähere Angabe des Standortes an Bridel mitgetheilt, der sie als *Weisia fornicata* bestimmte; vergl. C. Müller Synopsis Muscorum II. p. 571. (Mittheilung von Hrn. Struch).

84. *B. nutans* Schreb. (T. 1788).

85. *B. elongatum* Hedw. sp. (Bl. 1809) feltener.

86. *B. crudum* L. sp. (T. 1788).

87. *B. annotinum* L. sp. (T. 1791).

88. *B. carneum* L. (T. 1788) nicht häufig.

89. *B. pyriforme* L. sp. (L. Sch. 1777).

90. *B. intermedium* Brid. (Sch. 1806) nicht häufig.

91. *B. bimum* Schreb. (Schultz 1806).

92. *B. pseudo-triquetrum* Hedw. sp. (T. 1788).

93. *B. Duvalii* Voith. (Sch. 1828).

94. *Bryum roseum* Schreb. (T. 1788).
95. *B. turbinatum* Hedw. (Crome 1803) Schwerin am Ostorfer See beim Galgenberge.
96. *B. capillare* L. sp. (T. 1788).
97. *B. pallens* Sw. (Bl. 1817) bisher nur bei Neubrandenburg, Waren und Schwerin - (auf dem Kalkwerder, von Fiedler!) gefunden.
98. *B. caespiticium* L. (T. 1788).
99. *B. erythrocarpon* Schwäg. (Sch. 1806) bei Mildenitz an der Wolfshagener Gränze bei dem alten Thurme (nicht bei Stargard!).
100. *B. atropurpureum* W. M. (Bl. 1808) nicht häufig.
101. *B. argenteum* L. (T. 1788).
102. *Timmia megapolitana* Hedw. (T. 1788) nur bei Malchin am Salärberge gefunden.
103. *Aulacomnion palustre* Schreb. sp. (T. 1788).
104. *A. androgynum* L. sp. (T. 1788).
118. Meesia-
ceae. 105. *Paludella squarrosa* L. sp. (T. 1788).
106. *Meesia uliginosa* Hedw. sp. (T. 1788).
107. *M. longiseta* Hedw. sp. (T. 1788).
108. *M. Albertini* Br. Sch. (Beuthe! ap. Sch. 1828) bei Neustrelitz (nicht: Neubrandenburg!) und Schwerin.
109. *M. tristicha* Br. Sch. (Sch. 1828).
110. *Amblyodon dealbatus* Hedw. sp. (Bl. 1804).
119. Bartramieae. 111. *Bartramia ithyphylla* Brid. (Sch. 1806).
112. *B. pomiformis* L. sp. (T. 1788).
 β . *crispa* Sw. (Sch. 1806).
113. *B. marchica* Brid. (Bl. 1806 in d. N. B.) bei Wolbeck am Todtensee, bei Ludwigslust auf den Techen-
 tiner Wiesen.

114. *Bartramia fontana* L. sp. (T. 1788).
115. *Schistidium ciliatum* Hedw. sp. (T. 1788). 120. Grim-
mieae.
116. *Grimmia apocarpa* L. sp. (T. 1788).
117. *G. pulvinata* L. sp. (T. 1788).
118. *G. trichophylla* Grev. (Sch. 1819) bei Wevezin
(nicht: Neubrandenburg!) an Granitblöcken.
119. *Gümbelia crinita* Brid. sp. (Struck 1860!) bei
Wismar vor dem Alt-Wismar. Thore zwischen dem Schutt
der abgebrochenen Wassermühle.
120. *Racomitrium lanuginosum* Hedw. sp. (T. 1788)
selten an Granitblöcken.
121. *R. heterostichum* Hedw. sp. (T. 1788).
122. *R. canescens* Weis sp. (T. 1788).
123. *R. ericoides* Schrad. (Sch. 1819).
124. *Orthotrichum cupulatum* Hoffm. (Sch. 1806, 121. Ortho-
trichaceae.
Crome?).
125. *O. anomalum* Hedw. (T. 1788).
126. *O. Ludwigii* Schwäg. (Fied. 1844) Schwerin
im Steinfeld der Holz.
127. *O. obtusifolium* Schrad. (Bl. 1804).
128. *O. pumilum* Schwägr. (Bl. 1804).
129. *O. tenellum* Bruch (Fied. 1844) an Pappeln
am faulen See bei Schwerin.
130. *O. fallax* Bruch (Fied. 1844).
131. *O. affine* Schr. (Sch. 1806).
132. *O. fastigiatum* Bruch (Fied. 1844) an alten
Bäumen am faulen See bei Schwerin.
133. *O. speciosum* N. E. (Fied. 1844).
134. *O. coarctatum* P. B. (Fied. 1844).
135. *O. crispum* Hedw. (T. 1788).

136. *Orthotrichum crispulum* Horn. (Fied. 1844) selten.
 137. *O. stramineum* Horn. (Fied. 1844).
 138. *O. diaphanum* Sch. (Bl. 1803).
 139. *O. Lyellii* Hook. (Fied. 1844).
 140. *O. leiocarpum* Br. Sch. (T. 1788).
 122. *Enca-*
lyptae. 141. *Encalypta vulgaris* Hedw. (T. 1788).
 142. *E. streptocarpa* Hedw. (Sch. 1819).
 123. *Buxban-*
mieae. 143. *Diphyscium foliosum* L. sp. (T. 1788).
 144. *Buxbaumia aphylla* Hall. (T. 1788).
 124. *Tetra-*
phideae. 145. *Tetraphis pellucida* L. sp. (T. 1788).
 125. *Polytri-*
chaceae. 146. *Polytrichum undulatum* L. sp. (T. 1788).
 147. *P. tenellum* Röhl. (T. 1788 undul. β).
 148. *P. angustatum* Brid. (Sch. 1819) Neubranden-
 burg vor dem Burgholze und bei der hintersten Mühle.
 149. *P. nanum* Dill. (T. 1788).
 150. *P. aloides* Hedw. (T. 1788).
 151. *P. urnigerum* L. (T. 1788).
 152. *P. gracile* Menz. (Sch. 1806).
 153. *P. juniperinum* W. (T. 1788).
 154. *P. strictum* Menz. (Bl. 1804 junip. var. affine).
 155. *P. piliferum* Schreb. (T. 1788).
 156. *P. formosum* Hedw. (Sch. 1806).
 157. *P. commune* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 126.
 126. *Fonti-*
naleae. 158. *Fontinalis antipyretica* L. (T. 1788).
 159. *F. squamosa* L. (Sch. 1806) Neubrandenburg
 im Bach bei der Birzowschen Mühle unter der Freiarche.
 127. *Riparia-*
ceae. 160. *Cinclidotus fontinaloides* P. B. (Fied. 1844)
 an Steinen in einem Waldbach im Wahrholze bei Schwerin.
 128. *Hyp-*
neae. 161. *Leucodon sciuroides* L. sp. (T. 1788).
 162. *Leptohyemium filiforme* Timm sp. (1788).

163. *Anomodon viticulosus* L. sp. (T. 1788 p. 221).
 164. *A. curtispendus* L. sp. (T. 1788).
 165. *Neckera pennata* Hedw. (Sch. 1806).
 166. *N. crispa* L. (T. 1788).
 167. *Leskea trichomanoides* Schreb. (T. 1788).
 168. *L. complanata* L. sp. (L. Sch. 1777).
 169. *L. sericea* L. sp. (T. 1788).
 170. *L. subtilis* Hedw. (Sch. 1819) bei Stolpe unweit Stargard im Holz am See.
 171. *L. polyantha* Schreb. (T. 1789).
 172. *L. paludosa* Hedw. (Bl. 1806).
 173. *L. polycarpa* Ehr. (Bl. 1808) nicht häufig.
 174. *L. attenuata* Schreb. (T. 1788).
 175. *Climacium dendroides* L. sp. (T. 1788).
 176. *Hypnum exiguum* Blandow (1804).

Ann. — Nach Treviranus eine gute, selbstständige Art, die auch auf den Ruinen der Burg Godesberg bei Bonn wächst. Trev. sagt über dieselbe: „Dies Moos wird in Weber und Mohrs Flora Deutschlands mit *H. serpens* verbunden, von dem es sich durch den Standort sehr unterscheidet, sowie durch die lineal-pfriemenförmigen, ziemlich gedrängt stehenden Blätter, deren Nerv bis zur Spitze läuft, die kleinere, heller gefärbte Frucht, vor Allem aber durch den Deckel, der sich mit einer langen, aufwärts gebogenen Spitze endigt. Schwägrichen vereinigt dasselbe mit *H. tenellum* Dicks., aber Beschreibung und Abbildung desselben entsprechen dem Godesberger Moose so wenig, als Exemplare des *H. tenellum*, welche ich Hrn. Dr. Hooker verdanke. Dagegen stimmt dasselbe mit der Beschreibung und Abbildung des *H. exiguum* von Blandow in Sturm's Flora, so wie mit einem Ex. der auf der Stadtmauer von Neubrandenburg (hinter dem Schauspielhause!) aufgenommenen Pflanze, welches ich von Hrn. Dr. A. F. Brückner daselbst habe, aufs vollkommenste überein.“ (Verhandl. des naturhist. Ver. der preuß. Rheinlande III. S. 18 f.). Auch bei Rostock entdeckte Blandow dies Laubmoos.

177. *Hypnum serpens* L. (T. 1788).
178. *H. velutinum* L. (T. 1788).
179. *H. Starkii* Brid. (Bl. 181?) selten).
180. *H. piliferum* L. (Crome 1803).
181. *H. incurvatum* Schr. (Bl. 1806) bei der Girzow-
schen Mühle unv. Neubrandenburg vor der Freiarche.
182. *H. albicans* Neck. (Sch. 1806. Crome?)
183. *H. glareosum* Br. Sch. (Fied. 1844) bei Schwerin
nicht selten.
184. *H. salebrosum* Hoffm. (Crome 1803).
185. *H. nitens* Schreb. (T. 1788).
186. *H. lutescens* Huds. (T. 1788).
187. *H. populeum* Hedw. (Bl. 1804).
188. *H. plumosum* L. (Sch. 1806) selten.
189. *H. rutabulum* L. (T. 1788).
190. *H. cordifolium* Hedw. (Bl. 1804).
191. *H. cuspidatum* L. (T. 1788).
192. *H. Schreberi* W. (T. 1788).
193. *H. purum* L. (T. 1788).
194. *H. trifarium* W. M. (Sch. 1806) selten: bei
Wolbeck am Todten See, Jagke im Bruch an der Eich-
horster Gränze, Schwerin a. m. D.
195. *H. stramineum* Dicks. (Bl. 1808).
196. *H. myurum* Poll. (T. 1788).
197. *H. myosuroides* L. (Sch. 1828) seltener als das
vorige und mit diesem zusammen.
198. *H. alopecurum* L. (Sch. 1806) selten.
199. *H. abietinum* L. (T. 1788).
200. *H. Blandowii* W. M. (Bl. 1807 ap. W. M.).
201. *H. tamariscinum* Hedw. (L. Sch. 1777).

202. *Hypnum splendens* Hedw. (L. Sch. 1777).
203. *H. sylvaticum* L. (Crome 1803).
204. *H. denticulatum* L. (T. 1788).
205. *H. undulatum* L. (Häcker 1848 ap. Rabh.) an
d. meklenb. Gränze bei Lübeck, im Ludwigsfluster Schloß-
garten bei dem Mausoleum (Dr. H. Brückn. jun.).
206. *H. riparium* L. (T. 1788).
207. *H. ruscifolium* Neck. (Brück. 1803).
208. *H. murale* Neck. (T. 1791) selten, 3. B. an
der Neubrandenburger und Malchiner Stadtmauer.
209. *H. confertum* Dick. (Fied. 1844).
210. *H. megapolitanum* Bland. (1804).
211. *H. Schleicheri* Hedw. (Fied. 1844) um Schwerin
nicht selten.
212. *H. praelongum* L. (T. 1788).
213. *H. Stockesii* Turn. (Bl. 1808).
214. *H. strigosum* Hedw. (T. 1788).
 β. *obtusifolium*.
215. *H. longirostrum* Ehr. (T. 1788).
216. *H. brevirostre* Ehr. (Crome 1803).
217. *H. triquetrum* L. (T. 1788).
218. *H. loreum* L. (T. 1788).
219. *H. stellatum* Schreb. (T. 1788) bei Malchin
auf der Weide beim Kalärberge, bei der Brandmühle unv.
Neubrandenburg.
220. *H. chrysophyllum* Bried. (Sch. 1806).
221. *H. squarrosum* L. (T. 1788).
222. *H. cupressiforme* L. (T. 1788).
223. *H. silesiacum* P. B. (Häcker 1848) an der
meklenb. Gränze unv. Lübeck.

224. *Hypnum fluviatile* Sw. (Sch. 1806).
225. *H. filicinum* Hedw. (T. 1788).
226. *H. commutatum* Hedw. (Bl. 1808).
227. *H. Crista castrensis* L. (T. 1788).
228. *H. molluscum* Hedw. (T. 1788).
229. *H. fluitans* L. (T. 1788).
230. *H. aduncum* L. (T. 1788).
231. *H. uncinatum* Hedw. (Sch. 1806).
232. *H. lycopodioides* Schwäg. (Sch. 1806) bei Neu-
brandenburg und Eichhorst an sumpfigen Stellen.
233. *H. scorpioides* L. (T. 1788).
234. *H. palustre* L. (Bl. 1806).
129. Fissi- 235. *Fissidens incurvus* Schwäg. (Fied. 1844) an
denteae. Grabenrändern an der Westseite des Neustädtischen Kirch-
hofs bei Schwerin.
236. *F. bryoides* L. sp. (T. 1788).
237. *F. osmundoides* Hedw. (Bl. 1803).
238. *F. taxifolius* L. sp. (T. 1788).
239. *F. adiantoides* L. sp. (T. 1788).

V. Hepaticae.

(Nach Wüßnei 1854.)

130. Riccia- 1. *Riccia fluitans* L. (T. 1788).
ceae. 2. *R. crystallina* L. (T. 1788).
3. *R. natans* L. (Sch. 1819) bei Eichhorst unweit
Friedland, und von Wüßnei (briefliche Mitth.) auch bei
Schwerin gefunden.
4. *R. ciliata* Hoffm. (Sch. 1806) nur bei Neubran-
denburg auf lehmigen Brachäckern gefunden.
5. *R. glauca* L. (T. 1788).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv der Freunde des Vereins Naturgeschichte in Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [14_1860](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [IV. Musci frondosi. 330-342](#)