

woselbst sich die Knechte des muldenartigen Rückenschildes derselben zum Aufschaukeln des Getreides bedienen.

E. Boll.

4. Conchyliologisches. (Nachtrag zu S. 26 ff.) —

„Wüsteneh und ich haben in diesem Jahre schon häufige Excursionen gemacht, Neues aber nicht gefunden, außer *Clausilia orthostoma* Mke. (taeniata auctor.), aber nur in einem einzigen Exemplare, wohl aber von manchen Arten, die wir früher nur sparsam fanden, reichlich lohnende Fundorte angetroffen, so z. B. von *Linnaeus vulgaris*, *Planorbis Spirorbis* (alle mit Kalkdeckel), *Paludina similis*, *Succinea oblonga*, *Valvata cristata*, die ich früher nur verkalft gefunden u. s. w. Im Verlaufe dieses Sommers hoffen wir jedoch noch stark, daß wir noch auf Novitäten stoßen werden“.

(Briefl. Mittheilung an E. Boll.)

Schwerin den 7. August.

G. Seignitz.

*Unio Mülleri* Rossm. (zu S. 79.) — Am 21. August erhielt ich vom Herrn Baron v. Maltzan mehrere Unionen aus dem Schaalsee und aus der Schaale zur Ansicht, unter denen sich einige Exemplare befanden, welche dem *U. Mülleri* nahe stehen. Ein Ex. aus der Schaale bei der Schaalmühle gesammelt, gleicht der Varietät des *U. Mülleri*, welche Roßmägler f. 739 abgebildet hat, gar sehr, ich kann es aber für nichts anderes halten, als für eine stark comprimirte Abart des *U. tumidus*. Die Exemplare aus dem Schaalsee nähern sich gleichfalls in verschiedenen Abstufungen dem *U. Mülleri*, gehören aber, meiner Ansicht nach, zu *U. pictorum*. Wie sich in manchen Gewässern der untere

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv der Freunde des Vereins Naturgeschichte in Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [5\\_1851](#)

Autor(en)/Author(s): Segnitz B.

Artikel/Article: [4. Honchylologisches. \(Nachtrag zu S. 26 ff.\) 201](#)