

Descriptions d'espèces et variétés nouvelles de Coccinellides de la collection du Deutsches Ento- mologisches Museum de Berlin-Dahlem.

Par le Docteur Sicard.

Médecin major.

Solanophila Weisei n. sp.

Subcordata, nigra, pube griseo-lutea parce vestita; antennarum articulis intermediis brunneis; elytris nigris guttis duabus flavis ornatis; pedibus nigris.

Long: 0m 0065—0m 007.

Du groupe de lorata et bien distincte de toutes les autres espèces par sa couleur. Tête noire, à labre noir, avec les articles intermédiaires des antennes et le dernier article des palpes maxillaires d'un brun jaunâtre. Corselet transversal, un peu relevé sur les cotés, en ogive large et sinuée à la base. Elytres plus larges que le corselet à la base, avec un rebord explané partant de l'épaule, ayant vers le cinquième, antérieur sa plus grande largeur et prolongé en se rétrécissant graduellement jusqu'à l'extrémité; à ponctuation double avec les gros points très nombreux, plus profondément marqués sur le rebord externe aplani; d'un noir assez brillant avec une petite tache jaune, juxtasuturale, située aux trois quarts de la longueur. Pubescence d'un gris jaunâtre peu dense.

Dessous et pieds noirs.

Bolivie.

Solanophila pantherina n. sp.

Subcordata, griseo pubescens, quasi pruinosa. Capite rufo-brunneo, macula frontali utrinque nigra notato; thorace nigro angulis anticis (♀?) limboque anteriori (♂?) tenue luteis. Elytris brunnescentibus, limbo laterali nigro maculisque novem plerumque nigro ocellatis, (2. 3. 1. 2. 1 positis) ornatis. Subtus nigra, prosterno flavo, epipleuris rufis externe nigro limbatis. Pedibus nigris; tibiatarum apice tarsisque brunneis.

Long: 0m 0075—0m 008.

En ovale court avec les élytres cordiformes, rappelant tout à fait comme aspect général la *S. guttifera* Weise. Tête d'un brun roussâtre avec une tache foncée sur le front à la partie interne de chaque oeil; palpes roux; antennes rousses avec les derniers articles légèrement enfumés. Corselet transversal avec les angles postérieurs arrondis, la base sinuée, les cotés faiblement incurvés; d'un brun noir avec un léger liseré jaune aux angles antérieurs

(♀ ?) et au bord antérieur (♂ ?) à ponctuation très fine, à pubescence grisâtre assez fournie qui lui donne un aspect mat. Écusson foncé. Elytres cordiformes, plus larges à la base que le corselet, arrondis aux épaules, en courbe régulière jusqu'à l'extrémité avec un rebord étroit, à peu près parallèle, étendu de l'angle huméral à l'apex; ponctuation très fine, dense, simple, avec de gros points, seulement sur le rebord; pubescence courte, grisâtre, assez dense, donnant à la partie supérieure des élytres un aspect pruineux; couleur d'un brunâtre assez clair, un peu plus foncé le long de la suture, passant graduellement au noir le long du bord latéral; marqués de neuf taches flaves de même grosseur, parfois confluentes, et dont la plupart sont ocellées d'un point noir. Les taches disposées de la façon suivante: deux près de la base, l'interne près de l'écusson, l'externe juste en dehors du calus; trois en ligne légèrement concave en avant au tiers antérieur, l'interne juxtasuturale, l'externe n'atteignant pas le rebord latéral incliné; une rapprochée de la suture, au milieu de la longueur; deux en ligne oblique en avant et en dehors, l'interne plus postérieure que l'externe, située vers les deux tiers de la longueur, rapprochée de la suture; la tache externe à égale distance de la tache interne et du bord latéral; la dernière anté-apicale, également éloignée de l'extrémité et du bord latéral, un peu plus rapprochée de la suture.

Dessous noir avec le prosternum flave; épipleures des élytres rousses, bordées de noir en dehors.

Pieds noirs, avec l'extrémité des tibiae et les tarses brunâtres.

Plaques abdominales en demi-cercle, atteignant un peu au-delà des deux tiers de l'arceau, à partie interne plus inclinée que l'externe.

Cette espèce se place à côté de *S. guttifera* dont elle diffère par son corselet noir et les points ocellés de ses élytres. Elle se distingue de *kaffaensis* par l'absence de la dixième tache des élytres. Les taches sont parfois confluentes.

Ouganda britannique.

Solanophila Schenklingi n. sp.

Subelliptica, postice attenuata, pube grisea tenue vestita; fulva, elytris maculis octo nigrescentibus (3, 3, 2 positis) notatis; pedibus fuscis.

Long: 0m 0075.

En ellipse large, plus atténuée en arrière qu'en avant avec les élytres ayant vers le cinquième antérieur leur plus grande largeur. Tête rousse avec les palpes et les antennes plus pâles; extrémité des mandibules noirâtre. Corselet à côtés légèrement arrondis, angles antérieurs arrondis, les postérieurs obtus; légèrement avancé à la base au devant de l'écusson; d'un roux fauve. Elytres plus larges que le corselet à la base, arrondis aux épaules en courbe régulière jusqu'à l'extrémité, très convexes, à ponctuation très fine, entremêlée de très nombreux gros points superficiels, sans

tranche explanée, à calus huméral petit et peu saillant; d'un jaune plus pâle que le corselet, étroitement brunâtres sur le bord externe et marqués de 8 taches d'un noir brunâtre disposées sur 3 rangs: 3. 3. 2. Tache 1 en forme de triangle arrondi, située près de la base et de la suture et également éloignée des deux, d'une largeur égale environ à la moitié de son diamètre; 2 et 3 presque contiguës, 2 située en arrière du calus huméral, à peu près arrondie, 3 en dehors du calus sur la même ligne que 2, en ovale un peu oblique en dehors et en arrière; ces trois premières taches formant avec celles de l'autre élytre une bande transversale, et couvrant à peu près du dixième au cinquième de la longueur; 4, 5, 6 formant une bande anguleuse en avant: 4, juxtasuturale, au milieu de la longueur, un peu plus rapprochée de la suture que la tache 1 et à peu près de même taille qu'elle, mais de forme semicirculaire; 5 en oblique irrégulier sur le disque, plus près de la suture que du bord latéral, plus de 2 fois plus grosse que 4 et située un peu plus en avant, également éloignée de la tache 4 et de la tache 6; cette dernière arrondie, aussi grosse que la tache 5, à égale distance de cette dernière et du bord latéral, et sur la même ligne transversale que la tache 4; 7 et 8 en ligne transversale aux trois quarts de la longueur, 7, en arrière de 4 et 8 en arrière de 6, formant avec celles de l'autre élytre une ligne légèrement courbe en avant.

Dessous roux, avec les pieds de même couleur; ongles bifides.

Plaques abdominales en arc de cercle atteignant presque en arrière le bord postérieur du segment, à partie interne oblique, l'externe remontant presque verticalement en avant.

Je n'ai pu reconnaître cette espèce dans aucune description des *Solanophila* d'Afrique faites par Mr. Weise, et dont beaucoup me sont inconnues en nature. Elle rappelle par sa forme la *S. Bennigseni*, mais son dessin est bien différent.

Nyam Nyam.

Solanophila fecunda v. n. *fasciata*.

Les taches des élytres sont réunies transversalement; les élytres sont fauves avec deux bandes transversales, une à la base et une sur le disque et un point anté-apical noirs. C'est la variété indiquée par Mr. Weise sous le nom de v. a.

La var. b. qui m'est inconnue et diffère par le corselet noir semble également mériter d'être nommée (v. *Weisei*).

Solanophila nilghirica v. n. *maculicollis*.

Je ne puis distinguer spécifiquement de la *S. nilghirica* Weise quatre exemplaires de Formose qui diffèrent du type par une forme un peu plus allongée et une pubescence un peu plus fournie. Le corselet est marqué en outre sur le disque d'une tache noire. Je considère cette forme comme une variété de *S. nilghirica* que j'appelle: v. *maculicollis*.

Solanophila centralis n. sp.

Breviter ovalis, cinereo-pubescent, rufa, elytris rufis macula magna communi, notatis; metasterno et parte mediana primi segmenti abdominis nigris.

Long: 0m 004.

En ovale court, de petite taille, à pubescence d'un gris un peu jaunâtre; rousse, tachée de noir au milieu, en dessus et en dessous. Tête rousse avec les palpes et les antennes plus clairs. Corselet deux fois aussi large que long, à côtés presque droits, en angle très obtus à la base qui n'est pas sinuée. Elytres plus larges que le corselet à la base; en ligne droite jusqu'au-delà du calus, à côtés légèrement courbes, largement arrondis à l'extrémité, calus huméral bien marqué; rebord très étroit, ponctuation double, à gros points très nombreux; d'un roux fauve avec une tache noire, commune, en forme de triangle à côtés incurvés à base postérieure; cette tache partant du sixième de la longueur sur la suture, en arrière de l'écusson, s'élargissant en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes de la largeur et au-delà du milieu, tronquée à sa partie postérieure.

Dessous roux, d'un noir profond sur le métasternum (avec les épimères et les épisternes rousses) et sur le milieu du premier arceau ventral; le 2e arceau brunâtre au milieu de la base.

Plaques abdominales en ogive arrondie, dépassant un peu le milieu de l'arceau, petites.

Pieds roux, ongles bifides à dent externe beaucoup plus longue et écartée de l'interne.

Ouganda britannique.

Epilachna tripartita n. sp.

Oblonga tenue griseopubescent, rufa. Elytris antice posticeque nigro fasciatis; prosterno segmentisque primis abdominis in medio nigris. Pedibus rufis.

Long: 0m 0045.

Régulièrement ovale, de petite taille, rousse, à pubescence d'un gris jaunâtre, courte et peu dense. Tête rousse avec les palpes et les antennes de même couleur et l'extrémité des mandibules noirâtre. Corselet roux, à côtés presque droits, avec les angles, antérieurs aigus et avancés, les postérieurs obtus et bien marqués, la base non sinuée, en arc de cercle très large. Ecusson petit roux. Elytres plus larges que le corselet à la base, arrondis aux épaules, en ovale régulier jusqu'à l'extrémité, avec un rebord très étroit, parallèle de la base à l'extrémité et un calus huméral petit et peu saillant; d'un roux fauve comme le corselet, avec une grosse tache noire couvrant la base sur les trois-quarts au moins de la largeur, élargie en ligne courbe en dehors et arrondie en arrière, formant ainsi un ovale transversal, tronqué par la base à sa partie antérieure et couvrant le quart basal de la longueur; une seconde tache noire couvrant le quart apical et concave à la

partie antérieure, remontant sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, si bien que les élytres sont noirs avec une large bande fauve, oblique couvrant le milieu et remontant étroitement jusqu'à la base le long du bord externe.

Dessous roux, avec le milieu du métasternum, et les quatre premiers arceaux de l'abdomen d'un noir profond.

Pieds roux, ongles bifides et dentés à la base.

Plaques abdominales en ogive arrondie atteignant presque le bord postérieur de l'arceau.

Ouganda britannique.

Epilachna inversa n. sp.

Breviter ovalis, cinereo-pubescens, rufa; elytris nigris apice et antice rufo notatis; subtus flava, metasterno segmentique primi abdominis medio nigris. Pedibus rufis.

Long: 0m 0035—0m 004.

Semblable à *E. tripartita*, mais un peu plus courte, à pubescence plus fournie et avec les couleurs disposées dans un ordre inverse; tête antennes, et palpes roux; mandibules brunâtres. Corselet très faiblement arrondi sur les côtés sauf à la partie antérieure, à angles aigus, avancés; les postérieurs obtus, légèrement arrondis, la base à peine sinuée; un peu rétréci en avant; d'un roux fauve. Écusson roux. Elytres plus larges que le corselet à la base, arrondis aux épaules, en ovale régulier jusqu'à l'extrémité; munis d'un très étroit rebord étendu de l'épaule aux trois quarts de la longueur, à calus huméral bien marqué, à pubescence grisâtre, longue et dense, donnant aux parties noires un aspect ardoisé; noirs avec la base et l'extrémité rousses; à la base, une tache fauve partant des côtés de l'écusson, en ligne courbe postérieurement et prolongée jusqu'au cinquième antérieur du bord latéral ou un peu plus, couvrant ainsi toute l'épaule; à l'extrémité, une tache couvrant le quart postérieur du bord latéral et le cinquième de la suture, convexe en avant sur chaque élytre. Les élytres sont ainsi fauvs avec une large bande noire couvrant un peu plus du milieu, d'un bord latéral à l'autre, et prolongée sur la suture jusqu'à l'écusson en avant, jusqu'au quart postérieur en arrière.

Dessous fauve avec le métasternum (sauf les épisternes et les épimères) et le milieu du premier segment abdominal d'un noir profond.

Épipleures rousses, finement bordées de noir en dehors.

Pieds roux; ongles bifides, dentés à la base.

Cette espèce est très voisine de *E. dolosa* Weise. Elle en diffère par sa forme plus ovale, ses élytres plus allongés, son aspect moins luisant et sa pubescence plus longue.

Ouganda britannique.

Harmonia rugulosa n. sp.

Late ovalis, depressa, glabra rufobrunnea; thorace late flavo limbato; elytris rufobrunneis, lateribus tenue, apice late dilutioribus, duplopunctatis, punctis majoribus numerosis impressis; margine externo ruguloso; pedibus brunneis.

Long: 0m 0065.

En ovale large et aplati. Tête roussâtre avec les palpes et les antennes plus clairs, celles-ci à massue un peu rembrunie. Corselet brunâtre avec les côtés plus clairs sur le quart externe, la couleur claire se confondant progressivement avec celle du disque; à côtés étroitement relevés, peu arrondis, les angles postérieurs et antérieurs émoussés, plus étroit d'un quart à son sommet, qui est médiocrement échancré, qu'à sa base qui est légèrement sinuée de chaque côté; ponctuation simple, dense et assez profonde avec les points petits. Ecusson triangulaire, ponctué. Elytres un peu plus larges que le corselet à la base, ovales, arrondis aux épaules, à rebord explané assez large et transparent sur les bords; à calus huméral peu saillant; à ponctuation double avec de nombreux gros points serrés, enfoncés, confluent sur les bords qui sont comme ruguleux; d'un jaune, brunâtre, étroitement plus clair sur les côtés, cette couleur claire formant au niveau de la courbure postérieure une tache jaunâtre, ovale, mal limitée et qui n'atteint pas la suture. Dessous brun, de la couleur du dessus, mésosternum échancré; plaques abdominales en angle arrondi à l'extrémité où leur contour se bifurque en deux lignes, l'une suivant le bord postérieur du segment, l'autre remontant en avant. Ponctuation fine et très dense.

Epipleures larges, concaves, ponctué.

Pieds bruns.

Mexique.

Cette espèce est voisine de *H. ampla* Muls, dont la distinguent son dessin et sa ponctuation.

Mr. Casey a créé pour cette dernière espèce et *H. venustula* le genre *Neoharmonia* qui diffère par la forme générale déprimée et le rebord élytral plus élargi, caractères génériques insuffisants. Tout au plus pourrait-on en faire un sous-genre comprenant les espèces américaines.

Coelophora insularis sp. n.

Breviter ovalis, modice convexa, lutea. Elytris maculis 5 (3. 2. positis) ornatis; metasterno abdominisque medio nigris. Pedibus fulvis.

Long: 0m 005.

ab. a. maculis 4 + 5 connexis.

Brièvement ovale et modérément convexe, glabre luisante. Tête jaune avec le labre brunâtre; mandibules concolores; palpes et antennes d'un jaune un peu plus clair. Corselet rétréci en avant, à côtés faiblement arrondis, à angles antérieurs avancés, avec

un fin repli latéral relevé, à base non sinuée, en arc de cercle large avec les angles postérieurs presque droits et arrondis; ponctuation très fine, très superficielle et très peu dense. Ecusson petit, triangulaire, plus large que long, brunâtre. Elytres un peu plus larges que le corselet à la base, arrondis aux-épaules, avec une tranche étroite parallèle jusqu'auprès de l'extrémité où elle, disparaît avant d'atteindre l'angle sutural, à ponctuation plus grosse que celle du corselet, peu dense, simple, sauf sur le bord latéral qui est marqué de gros points enfoncés; d'un jaune d'ocre avec 5 taches noires: trois en rangée transversale au tiers, deux contiguës aux deux tiers; tache 1 en ovale irrégulier, juxtasurentale couvrant à peu près le sixième ou un peu moins de la longueur, située au tiers antérieur, éloignée de la suture d'une distance égale au tiers de son propre diamètre; tache 2 irrégulièrement ovale, légèrement plus antérieure que 1, un peu moins rapprochée de la tache 1 que celle-ci ne l'est de la suture, et plus près de la tache 3. Cette dernière petite, transversale, sur la même ligne que 2 dont elle est plus rapprochée que du bord latéral; tache 4 presque carrée, sur le disque, aux deux tiers de la longueur, présentant les mêmes dimensions que la tache 2, plus rapprochée de la suture que du bord latéral; 5 de même forme, plus petite, contiguë à la tache 4.

Dessous jaune, avec le métasternum et le milieu des arceaux ventraux d'un noir luisant.

Pieds jaunes.

Plaques abdominales atteignant le bord de l'arceau, en arc de cercle en dedans, en ligne oblique droite en dehors, anguleuses à l'extrémité.

var. a.

Taches 4 et 5 réunies, formant une grosse tache transversale, entaillée à sa partie antérieure.

Formose: Taihorinsho.

Helesius Caseyi n. sp.

Breviter ovalis, convexus, niger, luteo notatus. Capite, antennis palpisque flavis. Thorace flavo, limbo basali irregulari, ad latera rotundato, in medio biangulato, notato; scutello nigro; elytris nigris maculis sex magnis (2. 1. 2. 1 positis) ornatis; subtus nigra; epimeris pedibusque rufis.

Long: 0m 0045.

En ovale court, convexe, noir à taches jaunes. Tête palpes et antennes d'un jaune flave, plus pâle sur la tête, plus roussâtre sur les appendices. Corselet jaune avec une bande basale noire, couvrant d'un angle postérieur à l'autre le cinquième de la hauteur dans sa partie la plus étroite, renflé à ses deux extrémités en forme de tache arrondie et envoyant de chaque côté du milieu deux prolongements élargis à partir du milieu de leur hauteur à leur partie externe, et avancés presque jusqu'au bord antérieur. Elytres noirs à six taches jaunes; les deux premières

basales: la tache 1 étendue sur le tiers de la longueur, couvrant la moitié interne de la base, un peu renflée à sa partie externe, coupée obliquement d'avant en arrière et de dehors en dedans à sa partie interne; la tache 2 coupée obliquement en sens inverse à partir de la base dont elle couvre le tiers externe, occupant l'angle huméral, sa partie interne atteignant le sommet du calus, prolongée jusqu'au quart antérieur du bord latéral, coupée carrément à sa partie postérieure; tache 3 sur le disque, en parallélogramme irrégulier, deux fois plus longue que large, à peu près également éloignée de la suture et du bord latéral, sa partie antérieure commençant au niveau de la partie postérieure des taches 1 et 2, oblique en avant et en dehors, ses côtés en ligne droite, et étendue environ sur un peu moins du cinquième de la largeur, du tiers aux trois cinquièmes de la longueur; 4, en forme de triangle dont la base est contiguë à la suture et le sommet atteint le tiers de la largeur; juxtasuturale, du tiers aux trois cinquièmes de la longueur; 5, semi-circulaire, au bord latéral, des deux aux trois cinquièmes de la longueur; 6 en parallélogramme transversal, couvrant toute la partie apicale en laissant un étroit rebord noir plus large sur la suture qu'à l'extrémité, étendue jusqu'à la courbure postérieure des élytres, plus large à sa partie externe qui est coupée droit, l'interne étant plus étroite et arrondie.

Dessous noir avec les épipleures et les épimères flaves; pieds roux. Tibias antérieurs élargis en une lame courbe et denticulée sur leur tranche externe. Mr. Casey a créé pour les *Hyperaspis* présentant ce caractère le genre *Helesius*.

Cauca (Colombie).

Cleothera biguttata n. sp.

Subrotundata nigra; Prothorace limbo angulato laterali limboque angusto apicali flavis notato; elytris guttis duabus minutis, prima discali, secunda laterali, ornatis.

Pedibus flavis.

Long: 0m 0023.

Subarrondie, petite, convexe, noire à taches jaunes. Tête jaune (♂). Corselet noir avec un étroit liseré jaune au bord antérieur (♂) et une bordure latérale jaune étendue jusqu'à la sinuosité postoculaire, élargie jusqu'à la base dont elle couvre le quart externe et à peu près le tiers de la hauteur, terminée brusquement à son côté interne; élytres noirs à deux taches d'un jaune flave, la première arrondie, étendue du quart aux deux cinquièmes de la longueur, couvrant environ le cinquième de la largeur, deux fois plus rapprochée de la suture que du bord externe, la seconde en ovale transversal, au niveau de la courbure postérieure des élytres, étendue sur les trois cinquièmes externes de la largeur en laissant le rebord externe étroitement noir. Dessous noir avec les côtés du ventre plus clairs. Pieds jaunes.

L'intecte décrit est un ♂, la ♀ a probablement la tête et le bord antérieur du corselet noirs.

Voisine de *Deyrollei* Cr. dont la distinguent la petitesse et la position de sa première tache, sa taille plus petite, sa forme plus arrondie. Distincte de *albopunctata* Cr. par la forme de sa 2e tache qui n'est pas apicale ni réunie à sa pareille sur la suture. La bordure de son prothorax fortement entaillée en dedans au lieu d'être anguleuse et convexe permet aussi de la distinguer de ces deux espèces.

Santos.

Exoplectra Gorhami n. sp.

Subhaemisphaerica, convexa, pube grisea sat longe vestita; prothorace aeneo, late rubrolimbato; elytris aeneis; subtus nigra, segmentis quatuor ultimis abdominis pedibusque rubris.

Long: 0m 006.

Subhemisphérique, convexe, d'un bronzé brillant en dessus et couvert d'une pubescence grise assez longue et peu dense. Tête noire avec un léger liseré à l'épistome et le labre rouges. Prothorax d'un bronzé brillant avec une large bordure latérale d'un jaune rouge; cette bordure étendue en avant jusqu'à la sinuosité post-oculaire, légèrement entaillée au tiers antérieur par la couleure foncière du milieu, puis revenant de nouveau à sa largeur primitive et parallèle jusqu'à la base dont elle couvre le quart externe. Ponctuation du corselet très fine et très superficielle. Ecusson, bronzé. Elytres bronzés, à ponctuation très dense et beaucoup plus grosse que celle du corselet.

Dessous noir; d'un jaune rouge vif sur les quatre derniers arceaux ventraux. Pieds d'un jaune rouge.

Mexique.

Cette espèce est bien distincte par sa grande taille et la couleur des côtés du corselet. Les *Exoplectra aenea* et *stevensi* n'ont sur les côtés du prothorax qu'une bordure étroite, rétrécie d'avant en arrière; l'*Exoplectra Fryi* n'a le corselet taché de rouge qu'aux angles antérieurs et habite l'Amérique du Sud.

Chez ces trois espèces, la ponctuation des élytres est d'ailleurs beaucoup plus fine et plus superficielle.

Mexique.

Aulis guttata n. sp.

Breviter ovalis, convexa, pube grisea sparsa tenue vestita. Capite brunneo, palpis antennisque fulvis; prothorace nigro, lateribus late fulvis; elytris nigris, marginis apicali guttisque tribus (2. 1 positis) rufis, ornatis; subtus nigra, prothoracis lateribus apiceque abdominis fulvescentibus; pedibus rufis.

Long: 0m 0033.

En ovale court, convexe, à pubescence courte et rare sur l'exemplaire (d'ailleurs frotté par places) qui m'a été communiqué. Tête brunâtre avec les palpes et les antennes roux. Corselet à côtés presque droits à la base, incurvés en avant, avec les angles

antérieurs arrondis et les postérieurs droits; à ponctuation extrêmement fine et écartée, obsolète; noir avec les côtés largement bordés de roux, cette bordure étendue en avant jusqu'à la sinuosité postoculaire et parallèle jusqu'à la base. Elytres plus larges que le corselet à la base, arrondis sur les côtés avec un rebord extrêmement étroit; ponctuation simple, dense et assez forte; calus huméral très saillant, oblong; d'un noir profond avec une étroite bordure apicale étendue de la courbure postérieure de l'élytre en s'élargissant un peu jusqu'à l'angle apical où elle couvre à peu près le dixième postérieur de la suture et trois taches arrondies, petites, d'un jaune roux. La première tache située aux deux cinquièmes de la longueur, près du bord latéral qu'elle n'atteint pas, couvrant à peu près le septième de la longueur et le cinquième de la largeur; la seconde un peu plus antérieure, de même taille et de même forme, aussi rapprochée de la suture que la première du bord latéral; la troisième aux trois-quarts de la longueur des élytres, en arrière de la tache 2 et située à la même distance de la suture. Dessous noir avec les côtés du prosternum largement roux et munis d'une grosse fossette ovale; prosternum noir, fortement ponctué avec deux fines carènes longitudinales. Ventre noir avec les côtés et l'extrémité d'un fauve roussâtre.

Pieds roux; ongles dentés.

Cette espèce, voisine de *A. lineatosignata* appartient au sous-genre *Sidonis*.

Brésil (Schaum).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [78A_6](#)

Autor(en)/Author(s): Sicard

Artikel/Article: [Descriptions d'espèces et variétés nouvelles de Coccinellides de la collection du Deutsches Entomologisches Museum de Berlin-Dahlem. 129-138](#)