

[174]

Eine neue Tolna-Art (Lepid., Noctuidae).

Von

Embrik Strand.

Tolna tetrhemicycla Strand n. sp.

Ein ♀ von Namiong bei Lolodorf am Lokundjefluß in Kamerun (E. Conrad leg., Ulbrich vend.).

Mit *T. variegata* Hamps. und *sinifera* Hamps. am nächsten verwandt (cf. Hampsons Cat. Lep. Phal. XII. p. 479—480, t. 216, f. 11 bzw. f. 12), weicht aber von beiden durch u. a. das Vorhandensein einer weißen Fleckenquerreihe auf der Mitte der Vorderflügel ab. — Kopf und Thorax schwarz, Halskragen mit weißlicher Querbinde, Thoraxrücken scheint graulich gefärbt gewesen, ist aber stark abgerieben. Spitze und Vorder- bzw. Unterrand der Palpen weißlich und ebenso die inneren Augentränder. Die ganze Unterseite des Körpers sowie der Hinterleib grauschwarz, Abdomen oben hinter der Mitte mit einer dunkleren Querbinde, die aber künstlich sein kann. Vorderflügel schwarz, rostfarbige Schuppen eingestreut, und mit weißlichen Querlinien und Punkten ähnlich wie bei *T. variegata* (cf. fig. cit.) und ebenso wie bei dieser sind die Rippen teilweise heller, der Nierenfleck ist aber noch schwärzer und schärfer markiert und außerhalb dieses bzw. des Zellendes ist die schon erwähnte weiße Fleckenquerreihe; diese ist saumwärts konvex gebogen und besteht aus vier Flecken, von denen der hintere auf der Rippe 2, unweit ihrer Basis, gelegen und lang, strichförmig ist, während der vorhergehende der größte und quergestellt ist. Die Zeichnungen des Saumfeldes wie bei genannter Art, jedoch ist die entfernt viereckige, subapicale Vorderrandsfigur insbesondere hinten weniger deutlich, ein weißer Apikalsaumfleck ist ebenfalls ganz undeutlich und die Saumpunkte erscheinen mehr isoliert. Unterseite der Flügel in der Basalhälfte graulich, im Hflg. mit dunklerer Medianquerbinde und ebensolchem antemedianem Diskalfleck, im Saumfelde dunkler, aber mit hellerer Antelimb- und Limballinie; Vflg. unten mit dunkler Submedianbinde und dunklerem Sublimbalfeld, während eine wellenförmige, schmal schwarze Saumlinie beiderseits grauweißlich angelegt ist. — Flügelspannung 48 mm, Flügellänge 23,5 mm.

Type im Zoolog. Museum Berlin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [79A_7](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Eine neue Tolna-Art \(Lepid., Noctuidae\). 174](#)