

Neue Aberrationen von Grossschmetterlingen.

Von

C. M. v. Biezanko.

(Mit zwei Tafeln.)

Apatura iris ab. Strandii Biezanko ab. nova (Taf. I, Fig. 2).

Alae anticae sine sinu inter M_1 et C_2 , alae posticae cum magnis albis maculis ad marginem externum. Alarum posticarum margo internus albus atque latus. Professori Embrici Strandii dedicata.

Ein ♂ leg. Biezanko in Słowik in der Umgegend von Kielce.

Flügelänge 39 mm. (sehr großes Exemplar). Vfl. ohne Bogen zwischen den Adern M_1 und C_2 , der für die typischen (vergl. Taf. I, Fig. 1) charakteristisch ist. Am äußeren Rande der Hfl. eine Reihe weißer Flecken, größer als bei den typischen. Die letzte Zelle der Hfl. mit breitem, weißem Rande.

Vanessa polychloros ab. nigroflava Biezanko ab. nova (Taf. I, Fig. 4).

Alae anticae cum ordine nigrarum macularum ad externum marginem, ad has nigras maculas—maculae flavae; ad marginem brachialem etiam magnae flavae maculae. Alae posticae cum una magna flava macula ad maculam nigram, ad caeruleas maculas quoque ordo nigrarum macularum.

Leg. Biezanko, Kielce. Am äußeren Rande der Vfl. eine Reihe großer schwarzer, seitwärts dieser eine Reihe gelber Flecken. Die gelben Flecken am Vorderrand der Vfl. weit größer und heller als bei typischen Exemplaren. Am Vorderrand der Hfl. der gelbe Fleck fast so groß, wie die schwarzen. Am Hfl. seitwärts der Reihe der blauen Flecken eine Reihe schwarzer Flecken.

Colias palaeno europome ab. Sitowskii Biezanko ab. nova (Taf. II, Fig. 2).

Alae anticae ac posticae cum latis marginibus.

Ein ♂ leg. Biezanko in Dąbrowa in der Umgegend von Kielce.

Schwarzes Fleckchen im Mittelfeld der Vfl. ohne gelben Punkt (Kern). Die Wurzel der Flügel schwach verdunkelt, die schwarzen Säume sehr breit, am inneren Rande der Vfl. zieht er sich keilförmig bis fast zur Hälfte des Randes.

Mania maura ab. ojcoviensis Biezanko ab. nova (Taf. II, Fig. 4).

Macula pallida in angulo vertice alarum anticarum parum visa; pallidae lineae transversae prope nullae; in medio loco alarum anticarum duae partes obscurior et clarior; basis alarum posticarum obscurior.

242 C. M. v. Biezanko: Neue Aberrationen von Großschmetterlingen.

Leg. Biezanko Ojców August 1914 am Köder einige Exemplare. Der Apikalfleck am Vfl. schwach sichtbar. Dunkle Exemplare, ohne Sammetglanz. Hellere wellenartige Querstreifen am Vfl. fast unsichtbar. Im Mittelfelde der Vfl. zwei Felder, das eine dunkler, in welchem die Nierenmakel, das andere heller, in welchem die Rundmakel liegt. Die Wurzel der Hfl. dunkler als bei typischen Exemplaren.

Ematurga atomaria ab. ♀ latelineata Biezanko ab. nova (Taf. II Fig. 6).

Ambae alae cum latis lineis transversis.

Leg. Biezanko in Pakosz bei Kielce im Mai 1912. Die Grundfarbe der Flügel gelbweißlich. Die Querstreifen chokoladenfarbig; die, welche im Mittelfeld liegen, sehr breit — am Vorderrand der Vfl. und Innenrand der Hfl. sind sie ungefähr 2 mm Breite. Die Zeichnung sehr deutlich, die Fransen rein weiß, auf den Adern dunkel bestäubt. Die Unterseite fast so wie die Oberseite.


Erklärungen der Tafeln.

Tafel I.


Fig. 1. *Apatura iris* L. ♂. — Fig. 2. *Apatura iris* ab. *Strandi* Biez. ab. nova. — Fig. 3. *Vanessa polychloros* L. — Fig. 4. *Vanessa polychloros* ab. *nigroflava* Biez. ab. nova.

Tafel II.

Fig. 1. *Colias palaeno europome* Esp. — Fig. 2. *Colias palaeno europome* ab. *Sitowskii* Biez. ab. nova. — Fig. 3. *Mania maura* L. — Fig. 4. *Mania maura* ab. *ojcoviensis* Biez. ab. nova. — Fig. 5. *Ematurga atomaria* L. ♀. — Fig. 6. *Ematurga atomaria* ab. ♀ *latelineata* Biez. ab. nova.



C. M. v. Biezanko: Neue Aberrationen von Großschmetterlingen.



C. M. v. Biezanko: Neue Aberrationen von Großschmetterlingen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [90A_5](#)

Autor(en)/Author(s): Biezanko Czeslaw Marian

Artikel/Article: [Neue Aberrationen von Grossschmetterlingen 241-242](#)