

Forma sinistrorsa.

Von

D. Geyer, Stuttgart.

Ermuntert durch Herrn Lindholm, der im Archiv 1925 S. 251 sagt, es sei ihm in seiner mehr als 30-jährigen Sammeltätigkeit nur 2 mal geglückt, verkehrtgewundene Schneckenschalen zu erbeuten, verzeichne ich, was mir an Linksgewundenen im Felde in die Hände gekommen ist:

Hygromia hispida und *Vallonia pulchella* im Auswurf des Neckars bei Horb, *Xerophila candidula* am Abhang des Hohenaspergs und auf einem Weideplatz bei Neckartailfingen, *Arianta arbustorum* auf einer Wiese bei Neckartailfingen, *Helix pomatia* im Glems-tal bei Stuttgart, *Eulota fruticum* an Gebüsch bei Groß-Ingersheim, *Zebrina detrita* an Weinbergmauern bei Winnenden, *Cochlicopa lubrica* im Auswurf der Schmie bei Vaihingen-Enz, *Limnophysa palustris* im litauischen Urwald, *Valvata alpestris* im Weissensee bei Füssen (Bayern) und im Draukanal bei Sillian im Pustertal (Tirol). Endlich schließt sich an ein kegelförmig aufgewundenes Stück von *Coretus corneus* aus der Narewka in Litauen, das linksgedreht ist, während die übrigen abnorm kegelförmigen Planorbiden rechtsgewunden sind.

Druckfehler-Berichtigung.

In meine Abhandlung „Die Nacktschnecken der Palaearktischen Region“ (Band II, Heft 1 der Abhandlungen des „Archiv für Molluskenkunde“) sind leider nach erfolgter Korrektur durch die Nachlässigkeit des Druckers eine größere Anzahl Fehler hineingekommen,

von denen ich die schlimmsten z. T. sinnentstellenden nachstehend verzeichne. An die Leser richte ich die Bitte, sie zu verbessern.

Seite :	Zeile :	anstatt :	ist zu lesen :
4	9 v. u.	RAGY	GRAY
11	16 v. o.	im	am
19	13 v. o.	bestimmten	bestimmtem
20	10 v. u.	lenkoraneus	lenkoranus
26	4 v. o.	Mesomilax	Mesolimax
29	13 v. o.	Praalimax	Paralimax
38	6 v. u.	Proparmarcella	Proparmacella
41	7 v. o.	Chek-List	Check-List
44	6 v. o.	shcheint	scheint
51	3 v. u.	Drüsen	Drusen
65	11 v. o.	Anhaftungsstelle	Anheftungsstelle
68	18 v. o.	ist zu streichen und dafür zu setzen: <i>Arion</i> s. str. und <i>Ariunculus</i> durch den Besitz einer soliden	
96	13 v. o.	lencoranus	lenkoranus
131	6 v. u.	olivacens	olivaceus
135	9 v. o.	Chek-List	Check-List
144	10 v. u.	cinero-niger	cinereo-niger

P. Hesse, Venedig.

N a d r u f e.

Baron **Otto W. von Rosen**, geboren am 21. VII. 1853 a. St. in Wesenberg (Estland), erhielt seine Schulbildung in der Ritter- und Dom-Schule zu Reval und im Gymnasium zu Arensburg, bezog 1872 die Universität Dorpat, deren phys. math. und naturhist. Fakultät er im XII 1875 als Kandidat der Chemie absolvierte; machte 1877—78 den Rußischen Feldzug gegen die Türkei mit, wo er für Tapferkeit Auszeichnungen erhielt. Bis 1880 war er als Lehrer der Ma-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [58](#)

Autor(en)/Author(s): Hesse Paul

Artikel/Article: [Druckfehler-Berichtigung. 234-235](#)