

Literatur.

Thiele, J. Wissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer „Valdivia“, 1898—1899, 17₂. Gastropoda, II. Teil, S. 38—382, 31 Abb., 34 Tafeln. Jena 1925.

Nachdem bereits früher E. von Martens den ersten Teil der Gastropoden herausgegeben, liegt uns hier in einem stattlichen und trefflich ausgestatteten Bande die Schlußlieferung vor. Es ist dies eine der wichtigsten Veröffentlichungen, welche seit langer Zeit in Deutschland auf dem Gebiete der systematischen Molluskenkunde erschienen sind. Groß ist die Zahl der neu-beschriebenen, zumeist recht kleinen Arten, welche in erheblicher Größe photographiert und hervorragend gut reproduziert sind. Ist der Inhalt auch vorzugsweise conchyliogisch, so hat der Verfasser doch auch für manche Arten und Gattungen durch anatomische Untersuchungen, zumal durch Beschreibung und Abbildung der Radula unsere Kenntnis erweitert.

Die wenigen marinen Nacktschnecken der Valdivia-Expedition sind in diesem Hefte auch bearbeitet. Thiele selbst hat schon früher Beiträge über Chitonen, Proneomenia und Archäomenia veröffentlicht, sowie den anatomischen Teil in der ersten Abteilung der Gastropoden. Laiche und Larven von Gastropoden beschrieb Simroth, wogegen die Solenoconchen von L. Plate, die Pteropoden von J. Meisenheimer und die Cephalopoden von C. Chun bearbeitet worden sind; die Lamelli-branchien fehlen bis jetzt. Das Reichsamt des Inneren hat durch die glänzende Durchführung der Herausgabe dieses Monumentalwerkes sich um die deutsche Wissenschaft ein großes Verdienst erworben.

Neu beschrieben werden über 500 Arten, die natürlich nicht alle hier aufgezählt werden können, und die folgenden Gattungen und Untergattungen: *Chunula* (Cyclostrematide), Typ.: *Ch. typica* n. sp., S. 28. — *Jeffreysina*, subgen. nov. von *Rissoella*, Typ.: *R. glabra* (Brown), S. 58. — *Jeffreysilla*, subgen. nov. von *Rissoella*, Typ.: *R. zebra* n. sp., S. 58. — *Iphitella* n. nom. für *Iphitus* Jeffr. 1883 nec. Raf. 1815, S. 59. — *Fossarella* (Fossaride), Typ.: *F. pacifica* n. sp., S. 62. — *Segmentella*, subgen. n. von *Vermetus*, Typ.: *Verm. (Segmentella) agulhasensis* n. sp., S. 76. — *Lyocyclus*, aus der neuen Familie *Lyocyclidae* (verwandt mit *Pseudomalaxis*), Typ.: *L. solutus* n. sp., S. 82. — *Drupella* (Muricide), Typ.: *Ricinula siderea* Rve., S. 137. — *Pseudanachis* (Columbellide), Typ.: *Columbella duclosiana* Sow., S. 138. — *Gracilancilla* (Olivide), Typ.: *G. sumatrana* n. sp., S. 154. — *Benthomangelia*, subgen. n. von *Mangelia*, Typ.: *M. trophonoidea* (Schepm.), S. 174. — *Phychosyrinx*, (Pleurotomide), Typ.: *Drillia bisinuata* Marts., S. 176. — *Ptychobela* gen. nov. der Pleurotomidem oder subgen. n. von *Bela*, Typ.: *Bela crenularis* (Lam.), S. 181. — *Acrobela*, subgen. n. von *Bela*, Typ.: *Bela (Acrobela) optima* n. sp., S. 204. — *Pseudactaeon*, (Actaeonide), Typ.: *Actaeon albus* Sow., S. 223. — *Haminella*, subgen. n. von *Haminea*,

Typ.: *Haminea maltzani* n. sp., S. 233. — *Semiretusa*, subgen. n. von *Retusa*, Typ.: *R. borneensis* (A. Ad.), S. 234. — *Utraculastra* subgen. n. von *Retusa*, Typ.: *Retusa canaliculata* (Say), S. 235. — *Pyrunculus* subgen. von *Retusa*, n. nom. für *Sao H. u. A. Ad. 1858* nec Billb. 1820, Typ.: *R. semen* n. sp., S. 235. — *Sphaerocylichna*, subgen. n. von *Cylichna*, Typ.: *C. atyoides* n. sp., S. 242. — *Pleurobranchella* n. gen. der Pleurobranchiden oder subgen. n. von *Pleurobranchus*, Typ.: *nicobarica* n. sp., S. 249. H. v. Ihering und Haas.

Boettger, C. R. Die Weichtierfauna der Umgebung von Landsberg an der Warthe, in: *Helios, Org. Nat. Ver. Reg. Bez. Frankfurt/Oder*, 29, 1926, S. 46—54.

Es werden 103 Arten genannt, von denen die Pisidien, als zum ersten Male kritisch nachgeprüft (von Geyer), von Interesse sind, sowie die folgenden Arten von Schnecken: *Helicella itala* und *obvia*, *Candidula unifasciata*, alle 3 erst 1889 im Gebiete aufgetreten, und *Cepaea nemoralis*, die erst in den allerletzten Jahren dort eingewandert oder eingeschleppt worden zu sein scheint; *Laciniaria cana*, von Geyer (Land- u. Süßw. Moll., II.) von Landsberg a. Warthe genannt, kommt dort nicht vor, es liegt eine Verwechslung mit Landsberg a. Lech vor. Haas.

Steusloff, U. *Paludina duboisiana*. *Zeitschr. f. Geschiebeforschung* II, S. 49—56, Taf. 1.

P. duboisiana Mousson kann höchstens als geographische Rasse von *P. fasciata* Müll. aufgefaßt werden. Menzels *P. duboisiana* aus den Phöbener Schichten hat nichts damit zu tun, sondern gehört in den Kreis des *P. contecta* Mill. Sie kann daher nicht als Leitfossil gelten. Wenz.

Nomenclator Animalium Generum et Subgenerum, im Auftrage der Preuß. Akad. d. Wiss. zu Berlin herausg.

Ein Werk, dessen Wert von selbst für jeden einleuchtet, der sich mit der Nomenklatur befassen muß. Alle in der Zoologie und tierischen Paläontologie bis jetzt angewendeten generischen und subgenerischen Namen sind mit genauem Zitat in alphabetischer Reihenfolge genannt und ermöglichen dem beschreibenden Autor, sich erst davon zu überzeugen, daß ein von ihm neu gewählter Name nicht schon vergeben ist. Das ganze Werk wird rund 250 Druckbogen umfassen, die in 5 Bänden zu je 5 Lieferungen erscheinen werden, und die bis 1930 alle herauskommen sollen. Bei Subskription ist das Werk zu Rm. 15 je Lieferung erwerbbar, nach dem 31. III. 1927 wird dieser Preis auf Rm. 20 erhöht werden. Subskriptionen nimmt die Preuß. Akad. der Wiss., Berlin NW 7, Unter den Linden 38 entgegen Haas.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [59](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur. 215-216](#)