

Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck	Band 61	S. 107 - 119	Innsbruck, Okt. 1974
-------------------------------	---------	--------------	----------------------

Zweiter Beitrag zur Käferfauna (Insecta: Coleoptera) des Lechtales (Tirol: Österreich)*)

von

Alois KOFLER**)

Second contribution to the beetle-fauna (Insecta: Coleoptera) in the Lech Valley (Tyrol: Austria)

Synopsis:

From the beetle-collection of Rev. N. LECHLEITNER the second revision of various systematic groups, nearly all of which come from the Lech Valley, is submitted. To the following tribes the species with the complete habitats are published: *Adephaga* (Dytiscidae); *Palpicornia* (Hydraenidae, Hydrophilidae); *Staphylinoidae* (Silphidae, Leptinidae, Catopidae, Liodidae, Clambidae, Scydmaenidae, Orthoperidae, Scaphidiidae); *Histeroidea* (Histeridae); *Sternoxia* (Elateridae, Throscidae, Buprestidae); *Phytophaga* (Chrysomelidae: Halticinae).

Aus der Käfer-Lokalsammlung von Pfarrer N. LECHLEITNER werden weitere Revisionen vorgelegt. Auch im zweiten Teil werden alle Etikettendaten angeführt. Die Reihung der Arten erfolgte wieder meist nach HORION (1951). Der Umfang ist im Gegensatz zum ersten Teil (KOFLE, 1973) geringer, weil vielfach systematisch schwierigere Gruppen bearbeitet wurden, außerdem ist die Unterbringung des Manuskriptes dadurch erleichtert. An besonders interessanten Arten wäre der Zweitfund für Nordtirol von *Mantura matthewsi* (STEPH.) und eine *Dibolia*-Art cf. *depressuscula* LETZN., die von KNABL bei Reutte gesammelt wurde, besonders zu erwähnen. Bei den Halticinae wurden auch jene Arten angeführt, die aus anderen Gegenden Tirols stammen.

Ich habe für die Determination sehr herzlich zu danken: H. SCHAEFLEIN, Straubing (Dytiscidae); Dipl.-Ing. A.v.PEEZ, Brixen (Liodes) und K. MOHR, Halle a.d.Saale (Halticinae). Ebenso gebührt mein Dank dem Schüler F. ERNSTBRUNNER, Lienz für mehrfache Hilfe und Herrn Univ.Ass. Dr. W.SCHEDL, Institut für Zoologie Innsbruck, für die Unterbringung der Arbeit in der vorliegenden Zeitschrift.

Folgende Artengruppen wurden bearbeitet (Artenzahl aus dem Lechtal in Klammer):

Familienreihe: *Adephaga* (2.Teil): Dytiscidae (22);

Familienreihe: *Palpicornia*: Hydraenidae (4), Hydrophilidae (26);

*) Teil I erschien: Ber.nat.-med.Ver.Innsbruck 60: 131-149, 1973

**) Anschrift des Verfassers: Direktor Prof. Dr. A. Kofler, Bundeskonvikt Lienz, Maximilianstraße 15 - 17, A-9900 Lienz/Osttirol.

Familienreihe: *Staphylinoidae* (1.Teil): Silphidae (7), Leptinidae (1), Cato-
pidae (7), Liodidae (15), Clambidae (4), Scydmaenidae (3), Orthoperidae (2), Scaphi-
diidae (3);

Familienreihe: *Histeroidea*: Histeridae (6);

Familienreihe: *Sternoxia*: Elateridae (43), Throscidae (1), Buprestidae (6).

Familienreihe: *Phytophaga*: Chrysomelidae: Halticinae (48).

Familienreihe: ADEPHAGA (2.Teil)

Dytiscidae: alle Exemplare det. H. SCHAEFLEIN, Straubing, 1973.

Hyphydrus ovatus (L.) (= *ferrugineus* L.)

Reutte leg. Knabl (5)

Bidessus unistriatus (SCHRANK nec ILL.)

Reutte 26. 7. 46 (2)

Hydroporus palustris (L.)

E Steinsee 2240 m, 20. 7. 48 (17)

Hydroporus erythrocephalus (L.)

Reutte 1946 (1)

Hydroporus nigrata (F.)

E 27. 4. 46 (1)

Hydroporus foveolatus HEER

E 29. 7. 48; E Steinsee 2240 m 20. 7. 48 (27)

Hydroporus planus (F.)

E 10. 5. 41 (3); E Stablsee 2056 m 29. 7. 48 (1)

Hydroporus discretus FAIRM

E 6. 5. 41(6), 12. 5. 41(8), 26. 5. 41(1); das letzte Exemplar hat die Etikette "Ex crem. hom", was wohl nicht im Sinne einer ökologischen Angabe aufzufassen ist, sondern als besonderer Zufallsfund für diese an sich streng kaltstenotherme Art!

Potamonectes assimilis (PAYK.)

Seefeld 1911 leg. Knabl (12)

Potamonectes depressus ssp. *elegans* PANZ.

Forchach, Lechau, 29. 4. 41 leg. F.Kofler

Oreodytes rivalis (GYLL.)

E 12. 5. 41(2), 19. 5. 42(1).

Oreodytes borealis (GYLL.)

E 10. 5. 41 und 12. 5. 41 (9)

Laccophilus minutus (L.)

Tannheim leg. Rief (1)

Agabus guttatus (PAYK.)

E 8. 6. 40 aus Angeschwemmtem gesiebt (1); E 16. 5. 41 (1); E 13. 4. 47 (2); E Klimm 25. 4. 47 (1)

Agabus nitidus (F.)

E 17. 4. 42 (1 ♀); "Trog" 18. 10. 39 (4) – vielleicht Brunnentrog?

Agabus bipustulatus (L.)

3 Exemplare ohne Fundortangabe, wohl Elmen.

Agabus solieri AUBE

E Steinsee 2240 m, 20. 7. 43 (7)

Agabus paludosus (F.)

Forchach leg. F. Kofler (5)

Agabus congener (THUNB.)

Fehlt interessanterweise aus Elmen, nur Umhausen leg. Knabl (21)

Agabus undulatus (SCHRANK)

Reutte 25. 7. 46 (3); Seefeld leg. Knabl (11)

Ilybius fuliginosus (F.)

Forchach, Lechau 22. 6. 41 leg. F. Kofler (2)

Ilybus fenestratus (F.)

Tannheim 27. 7. 49 leg. Rief (1)

Familienreihe: PALPICORNIA

H y d r a e n i d a e :

Hydraena nigrata GERM.

E ohne Datum (4); E 10. 5. 38 (3)

Hydraena lapidicola KIESW.

Forchach 18. 8. 45 (1)

Ochthebius nobilis VILLA

E 6. 5. 41 (2) und 20. 10. 41 (6); Axams leg. Knabl (13)

Limnebius-truncatellus THUNB.

E, Lech, aus Angeschwemmtem; Forchach 15. 5. 40

H y d r o p h i l i d a e :

Helophorus aquaticus (L.)

E 25. 4. (Jahr unleserlich); E Martinau 13. 4. 47; Forchach Lechau 22. 6. 41.

Helophorus nivalis GIRAUD

Steinsee 20. 7./29. 7. 43 (5); E Stablsee 29. 7. 43 (2); E Hanauer Hütte 1900 m (6); Bschrabs (8); Forchach 22. 7. 41 (2); Tannheim leg. Rief, 21. 7. 41 (2).

Helophorus glacialis VILLERS

E 27. 7. 45 (1), 27. 4. 46 (2); E Stablsee 29. 7. 43 (2); E Steinsee 20. 7. 43 (7); Forchach 22. 7. 41 (3); Bschrabs (5).

Coelostoma orbiculare (F.)

E 17. 5. 41

Sphaeridium scarabaeoides L.

E 1936, 8. 7. 41, 29. 7. 43 (4), 11. 8. 43; Bschrabs.

Sphaeridium lunatum F.

E 1936 (5).

Cercyon lugubris (OL.)

E ohne Datum.

Cercyon impressus (STURM)

E ohne Datum (3); E V. 41 (2), 15. 5. 41 (1), 16. 8. 41 (5); E Steinsee 20. 7. 43; E Stablalpe 28. 9. 49; E Großkar 15. 7. 41 (2); Hinterhornbach 3. 6. 41 (4).

Cercyon haemorrhoidalis (FABR.)

E 1936 (2); E 5. 6. 39 (1); Hinterhornbach 3. 6. 41 (2).

Cercyon melanocephalus (L.)

E 1936 (2), 23. 8. 37 (1), 1. 4. 38 (1), 19. 6. 42 (4).

Cercyon lateralis (MARSH.)

E 29. 5. 38 (3).

Cercyon terminatus (MARSH.)

E 24. 5. 38 (1).

Cercyon pygmaeus (ILL.)

E 1941 (1), 17. 5. 41 (1); Bsclabs Hanau-Hütte 9. 8. 46 (1).

Cercyon unipunctatus (L.)

E 24. 5. 38, 24./26. 5. 41 (je 1).

Cercyon analis (PAYK.)

E ohne Datum (1), 24. 5. 38 (5).

Megasternum boletophagum (MARSH.)

E 1941 (5), 19. 9. 41, 20. 10. 41 (6), 16. 5. 42 (1); Bsclabs 21. 6. 39 (4); Hinterhornbach 30. 7. 37 (3).

Cryptopleurum minutum (F.)

E 1941 aus Mist, Sept. 1941, 19. 9. 41 (insgesamt 32); E V. 1941, 10. 5./24. 5. 38, 16. 6. 39 (4); Bsclabs 3. 7. 46; Lichtwalder 19. 9. 40.

Hydrobius fuscipes (L.)

E 27. 4. 46 (2).

Anacaena globulus (PAYK.)

E ohne Datum (2), 1936 (1), 21. 5. 41 (1), 8./20. 5. 42 (4+4); Forchach 5. 6. 41 (1).

Anacaena limbata (F.)

E 13. 5. 38, 26./27. 4. 46 (4).

Laccobius minutus (L.)

E 26. und 27. 4. 46 (4)

Laccobius striatulus (F.)

E 30. 5. 39, 2./6./10.14. 5. 41, 20. 10. 41, 2. 6. 42 (je 1).

Laccobius alternans MOTSCH.

E 1936, 15. 5. 41, 20. 10. 41, 25. 4. 47; Forchach 1941.

Helochares lividus FORST.

Reutte 26. 7. 46, leg. Lechleitner (4).

Enochrus ochropterus (MRSH.) (=frontalis E.)

Reutte, 1946, leg. Lechleitner (6).

Chaetarthria seminulum (HERBST)

E 10. 5. 38, 20. 10. 41, 25. 4. 51, 13. 6. 51; Forchach 5. 6. 41.

Familienreihe: STAPHYLINOIDEA (1. Teil)

Silphidae:

Necrophorus vespilloides HERBST

E Sept. 1941 (3).

Necrodes litoralis (L.)

E 12. 5. 46, an Katzenkadaver; Forchach, Lechufer 14. 8. 41.

Thanatophilus rugosus (L.)

E ohne Datum (1); E 5. 4. 48 (4).

Oeceoptoma thoracica (L.)

E Sept. 1941 aus faulen Pilzen (4).

Silpha tristis ILL.

E 14. 7. 40, im Haus (2).

Silpha tyrolensis LAICH.

Elmauer Kreuzspitze 12. 7. 39, 2000 m (3).

Phosphuga atrata (L.)

E 1936, 14. 4. 41, 25. 5. 41; E Kälberau 30. 4. 40; E Moos 9. 3. 40.

Leptinidae:

Leptinus testaceus MÜLL.

Reutte leg. Knabl (27).

Catopidae:

Sciodrepoides fumatus (SPENCE)

E 11. 6. 38 (1); E Sept. 1941 (6); Häselgehr Farnkraut-Kompost.

Catops subfuscus KELLN. (= *alpinus* auct., nec GYLL.)

E 1941, 10. 7. 46, 15. 6. 48; Reutte leg. Knabl (28).

Catops tristis (PANZ.)

E 15. 6. 49 (1).

Catops nigrita ER.

E 14. 5. 38, 3. 6. 41, 19. 9. 41; E Stabl 1. 7. 40 (3).

Catops joffrei DEV.

Tannheim 16. 8. 46 (1 ♀).

Catops fuscus (PANZ.)

E 17. 4. 49 (22); Reutte leg. Knabl (32).

Catops fuliginosus ER.

Häselgehr 20. 9. 45.

Liodidae:

Hydnobius multistriatus (GYLL.)

Reutte leg. Knabl (8)

Liodes pallens (STRM.)

E ohne Datum (5), 1936, 13. 7. 37, 26. 6. 40, 24. 7. 41, 20. 10. 41 (je 1).

Liodes rotundata (ER.)

E 2./5. 6. 40, 14. 6. 41, 20. 10. 41 (je 1).

Liodes calcarata (ER.)

E 1936, 4. 6. 37, 7./27. 6. 38 (6); Bschlabs 7. 6. 38 (1); Bschlabs 21. 6. 40 (1♂ gen.-präp., det. Peez, Brixen); Bschlabs Hanau, 2000 m, 26. 7. 45 (1♂ gen.-präp. det. Peez, Brixen).

Liodes obesa (SCHM.)

E ohne Datum (1); E angeschwemmt am Lech 20. 10. 41 (je 1, det. Peez, Brixen).

Liodes ovalis (SCHM.)

E 2. 6. 42 (1, det. Peez, Brixen).

Liodes badia (STRM.)

E 7./17. 6. 38; Hinterhornbach 19. 7. 39; Bschrabs 21. 6. 40 (je 1).

Liodes carpathica GGLB.

E ohne Datum (1); E 20. 10. 41 (1).

Colenis immunda (STRM.)

E ohne Datum (1).

Anisotoma humeralis (F.)

E Sept. 1941; (Umhausen/Ötztal, leg. Knabl, 1908, 3 Ex.).

Agathidium seminulum (L.)

E Alit 5. 10. 42 (1); E Errach 24. 7. 41.

Agathidium leavigatum ER.

E 30. 5. 41 (1).

Agathidium dentatum MULS. et REY

Hinterhornbach 6. 6. 39 und 6. 7. 40.

Agathidium badium ER.

Hinterhornbach 31. 7. 46 (2)

Agathidium varians BECK.

E 1941 (27); E 20. 10. 41, 19. 6. 42, 24. 3. 47 (7); E Stabl 1941 (1); Reutte leg. Knabl (5).

C l a m b i d a e :

Calyptomerus alpestris REDT.

E ohne Datum (2); E 1940 (1); Reutte leg. Knabl (5).

Clambus minutus STURM

E 26. 5. 37, 5. 6. 37, 8./10. 7. 37, 20. 10. 41, 24. 10. 42, 22. 7. 46; E Hohenrain 5. 6. 39.

Clambus punctulum BECK

E ohne Datum, 23. 7. 36, 11. 6. 38 (je 1).

Clambus armadillo (DE GEER)

E 24. 10. 42, 10. 7. 46 (2).

S c y d m a e n i d a e :

Stenichnus collaris (MÜLL. et KUNZE)

1. 5. 39 (3), 16. 4. 41 (1), 27. 3. 49 (2); E Stablalpe 26. 4. 46 (1); Hinterhornbach 13. 4. 42, 31. 7. 46 (2).

Euconnus carinthiacus GGLB.

E 23. 5. 42 (1); Klini (unleserlich) 3. 8. 45 (1); Bschrabs ohne Datum (1); Bschrabs 8. 9. 46 (2); Bschrabs Hanauer Hütte 2000 m 18. 8. 44 (1).

Scydmaenus tarsatus MÜLL. et KUNZE

E 24. 5. 38 (1). (Axams leg. Knabl).

Orthoperidae:

Sericoderus lateralis (GYLL.)

(Axams leg. Knabl, 7 Ex.).

Orthoperus atomus (GYLL.)

E 20. 10. 41 (1), 19. 4. 42: an altem Heu (1), 24. 8. 46: Kompost (1).

Scaphidiidae:

Scaphisoma agaricinum (L.)

E ohne Datum (12), 1936 (6).

Scaphisoma assimile ER.

E 20. 10. 41, 21. 3. 42, 10. 3. 46 (je 1), 1♂ gen.-präp.

Scaphisoma inopinatum LÖBL

E 7. 4. 37 (3); Häselgehr 29. 9. 45 (1).

Familienreihe: HISTEROIDEA

Histeridae:

Gnathoncus nanus (SCRIBA) (=rotundatus KUGEL., punctulatus THOMS.)

E 21. 5. 40 (1); Reutte leg. Knabl (15).

Myrmetes piceus (PAYK.)

Forchach 9. 4. 42 (1), 11. 4. 42 (3); Forchach Hirschbad 13. 4. 42 (2); Reutte leg. Knabl (11).

Hister unicolor L.

E ohne Datum (1); E Rindermist 9. 6. 41 (1).

Hister striola SAHLB.

E 16. 6. 33 (4); Häselgehr 22. 7. 46 (6).

Hister merdarius HOFFM.

E 15. 6. 49 an faulen Karotten (1), 14. 6. 51 an der Hausmauer (1).

Atholus duodecimstriatus (SCHRK.)

E 24. 5. und 11. 6. 38 (je 1).

Familienreihe: STERNOXIA

Elateridae:

Adelocera fasciata L.

E Rinde 28. 8. 39 (2).

Lacon murinus L.

E 1941 (3)

Elater pomonae STEPH.

Gutschau bei Häselgehr 10./19. 5. 46 (2).

Elater sanguinolentus SCHRK.

E 6. 7. 40, 15. 5. 41 (2).

Elater ferrugatus LEC. (= pomorum auct.)

E Alit 26. 5. 51.

Elater balteatus L.

E 8. 6. 35, 31. 5. 51 (je 1); E in Felsenbirnenblüte 2. 6. 39.

Elater praeustus F.

E Gstreinbachau 3. 5. 46.

Elater aethiops LAC.

E 14. 4. 38, Föhren; E 25. 4. 39 (Stanzach, ?); E Stahlweg, Rinde, 8. 7. 41.

Elater nigrinus HBST.

E Alit 26. 5. 51; Hinterhornbach 31. 3. 46.

Idolus picipennis BACH

E 7. 6. 39.

Hypnoidus riparius F.

E 14. 7. 36, 6. 5. 37, 8. 6. 40, 22. 6. 40 (je 1), z.T. mit Steno-Notizen.

Hypnoidus rivularius GYLL.

E 1941; E 26. 5. 37, 21. 6. 37, 5. 6. 40, 26. 5. 40.

Hypnoidus maritimus CURT.

E 1941 (2); E 3. 6. 40, 26. 6. 40, 17. 7. 41, 10. 7. 46.

Hypnoidus dermestoides HBST.

E 7. 6. 40, 20. 10. 41 (1+2).

Hypnoidus dermestoides HBST. (ab *tetragraphus* GERM.)

E 23. 7. 36, 20. 10. 41.

Hypnoidus flavipes AUBE

E 6. 5. 37; E Stanzach 26. 5. 51.

Hypnoidus meridionalis CAST.

E 1941 (3); E 10. 7. 46; E Stanzach 20. 10. 41 (7), 25. 5. 51 (1).

Melanotus rufipes HBST.

E 20. 6. 41; Häselgehr 18. 6. 40.

Limonius pilosus LESKE

E Martinau 23. 5. 50.

Limonius aeruginosus OL.

E 11. 6. 38, 3. 6. 40, 5. 6. 40, 24. 5. 40, 2. 6. 42 (insgesamt 10); Forchach 1941.

Athous hirtus HBST.

E 1. 7. 36, 23. 7. 36, 6. 7. 38, 13. 7. 39, 1. 8. 39, 16. 7. 46 (je 1); Bsclabs 1946 und 13. 5. 46 (je 1).

Athous haemorrhoidalis F.

E 2./25. 6. 42.

Athous subfuscus MÜLL.

E ohne Datum (5); E 1941 (1); E 29. 6. 39 (4), 9./19. 6. 42, 13. 6. 51; E Alit 14. 6. 36 (1), 5. 6. 43 (3); Bsclabs 26. 6. 46 (5); Hinterhornbach.

Athous zebei BACH

E 13. 5. 43;

Corymbites virens SCHRK.

E 17. 6. 41; E Alit 14. 6. 36; E Stablalpe (v. *inaequalis* OL.) 8. 7. 41.

Corymbites aeneus L.

f. typ: Hinterhornbach 6. 7. 38; ab. *germanus* L.: E 17. 7. 46; ab. *viridinitens* VOET.: E 31. 7. 39. (Umhausen, leg. Knabl: ab. *cyaneus* MRSH. und ab. *coeruleus* SCHILSKY)

Corymbites pectinicornis L.

E 1941 (1), 14. 6. 46 (3).

Corymbites cupreus F.

E Alit 14. 6. 36 (1 f.typ.)

Corymbites cupreus aeruginosus F.

E Alit 14. 6. 36 (2); E Mutte 24. 7. 36; E Würtemberger Haus 2300 m, 20. 7. 43; Häselgehr 18. 6. 41.

Corymbites purpureus PODA

E 3. 5. 46, 17. 5. 50; Hinterhornbach 28. 4. 43 (Weide).

Corymbites impressus F.

E 6. 5. 43, 3. 5. 46; Forchach 1941.

Corymbites rugosus GERM.

Würtemberger Hütte 20. 7. 43.

Corymbites incanus GYLL. f.typ.

E 11. 6. 38, 2. 6. 42 (1+2); Hinterhornbach 26. 5. 49.

Prosternon tessellatum L.

E Alit 14. 6. 36; E 22. 6. 38.

Agriotes obscurus L.

E ohne Datum (2); E 31. 7. 39 (3); Bschlabs 21. 6. 40.

Dolopius marginatus L.

E ohne Datum (2); E 10. 7. 46; E Alit 5. 6. 43.

Sericus brunneus L.

E ohne Datum (2); E 16./26. 6. 40; E Alit 26. 5. 51.

Sericus subaeneus REDTB.

E 22. 6. 37.

Adrastus limbatus F. (=axillaris ER.)

E 17./28. 6. 46; Hinterhornbach 39. 7. 37, 6. 7. 40; Bschlabs 27. 6. 38.

Adrastus lacertosus ER.

E ohne Fundortangaben (4); E Alit 9. 7. 42 (2).

Adrastus nitidulus MARSH. (=pallens ER.)

E 17. 7. 46 (1), weitere 11 Ex. ohne Fundort, wohl ebenfalls E.

Denticollis linearis L.

E VII.39 (19), 19. 6. 42 (1).

Denticollis linearis ab. *variabilis* DEG.

E 21. 6. 38, 21. 5. 47, 8. 7. 51.

Throscidae:

Throscus dermestoides L.

E 6. 6. 37, 5./20. 6. 39, 28. 6. 46.

Buprestidae:

Buprestis rustica L.

E 25. 7. 46; Hinterhornbach 15. 7. 37, 11./17. 8. 39.

Anthaxia quadripunctata L.

E 31. 7. 34; 17. 7. 36, 5. 6. 50.

Anthaxia helvetica STIERL.

E 5. 6. 39 (1), 9. 6. 41 (7), 24. 6. 46 (2); E Großkar 15. 7. 41.

Agrilus cyanescens RATZ (= *coeruleus* ROSSI)

Hinterhornbach 30. 7. 37.

Agrilus integerrimus RATZ

E 1941; Hinterhornbach, 6. 7. 40.

Habroloma nana HBST.

E 1947, 10. 6. 50 (je 1); Bsclabs 28. 6. 46 (11).

Familienreihe: PHYTOPHAGA

Chrysomelidae: Halticinae

alle Exemplare det. K. MOHR, Halle a. Saale, 1973.

Phyllotreta nemorum L.

E 24. 7. 36, 14. 7. 38, 11. 8. 43 und 10. 7. 46 (je 1); E angeschwemmt am Lech 20. 10. 41 (1); Bsclabs 27. 6. 38 (1).

Phyllotreta undulata KUTSCH.

E 23. 5. 31 (3), 24. 7. 36 (1); 24. 5. 38 (1); E Kreuzspitze 2500 m 16. 8. 41; Bsclabs 27. 6. 38.

Phyllotreta vittata F.

[Axams, leg. Knabl (8); E 29. 6. 39 (1)]

Phyllotreta nigripes F.

E 4.7./10.7./26. 6. 46 und 30. 6. 51 (je 1); E Stablsee 2056 m, 29. 7. 48 (1).

Aphthona pygmaea KUTSCH.

E 15. 7. 37 (2), 22. 5. 70 (1); Hinterhornbach 30. 7. 37 (1).

Aphthona venustula KUTSCH.

E vom 28. 5. bis 15. 7. (insgesamt 15); E angeschwemmt am Lech 20. 10. 41 (1); E Kratzer, 1600 m, 21. 6. 43 (4); Hinterhornbach 6. 6. 39 und 4. 9. 47 (je 1); Häselgehr 17. 9. 45 (1).

Aphthona euphorbiae SCHRK.

[Umhausen leg. Knabl (8)]

Aphthona herbigrada CURT.

E ohne Datum (1) und 13. 8. 45 (1); Stanzach 24. 8. 47 (1); Häselgehr 20. 9. 45 (3).

Longitarsus pellucidus FOU DR.

Tirol, Innsbruck — 4 Ex. ohne weitere Angaben. Bisher nur bei WÖRNDLE (1950) p. 321 von Gramais (Kn.) gemeldet!

Longitarsus succineus FOU DR.

E 6. 7. 51 (2); E Errach 11. 8. 39 (3); Bsclabs 2. 7. 46 (1).

Longitarsus melanocephalus DEG.

E 11. 7. 46 (1); E Alit 1. 9. 49 (1); E angeschwemmt am Lech 20. 10. 41 (2, davon 1 ♂ gen.-präp.); Häselgehr 20. 9. 45 (1).

Longitarsus kutscherae RYE.

E 10. 3. 41, Gröben (1). — Bei MOHR (1966) p. 229 findet sich bereits in einer Fußnote der Hinweis, daß *Longitarsus melanocephalus plantagomaritimus* DOLL. und *L.m. var.kutscherae* RYE "von einigen Autoren als eigene Art angesehen" werden. Im Material anderer Sammlungen ist die Art sicherlich ebenfalls noch zu finden.

Longitarsus scutellaris REY

E 4. 7. 46 (1); E 4. 7. 46 1♂ gen.-präp. mit ? weil frisch; E 7. 9. 45 1♂ gen.-präp. mit ? weil frisch; Bsclabs 1 Ex. 1946 mit ? weil frisch.— Für Nordtirol erstmals bei HEISS (1971) p. 321 aus der Umgebung von Innsbruck gemeldet. Bei MOHR (1966) p. 230 nur alte Funde aus Mitteleuropa. Gebirgsgegenden von Thüringen, Bayern und Schlesien. Nach HORION (1951) p. 414 in Österreich bekannt aus Nieder-, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark. Auch diese Art dürfte also in Nordtirol noch weiter verbreitet sein und in älteren Sammlungen unerkannt stecken.

Longitarsus suturellus DFT.

E vom 22. 4. bis 20. 10. (insgesamt 17).

Longitarsus nasturtii F.

E ohne Datum (1).

Longitarsus apicalis BECK.

E 5. 6. 39 (2); E Errach 11. 8. 39 (2); Hinterhornbach 4. 9. 47 (1); Häselgehr 29. 9. 45 (1); Stanzach 24. 8. 47 (1).

Longitarsus luridus SCOP.

E 20. 10. 41 aus Angeschwemmtem gesiebt (7 davon 1♂ gen.-präp.); E Alit 7. 6. 50 (1); Häselgehr (2♂♂ gen.-präp.); Umhausen, Ötztal leg. Knabl (24).

Longitarsus brunneus DFT.

E 5. 6. 42 (1); E Rauwand, gestreift 5. 6. 39 (2 davon 1♂ gen.-präp.).

Longitarsus nigerrimus GYLL.

[Axams leg. Knabl 1911 (5)]

Longitarsus parvulus PAYK.

Umhausen im Ötztal, leg. Knabl (10).

Haltica lythri AUBE sensu FOU DRAS non HEIKERTINGER 1912

E 13. 7. 46 (1♂ gen.-präp., aber fraglich, da frisch).

Haltica tamaricis SCHRK.

E 1942 (2 davon 1♂ gen.-präp.; E ohne Datum (2 davon 1♂ gen.-präp.); Hinterhornbach 11. 7. 40 (1♂ gen.-präp.).

Haltica oleracea L.

E 8. 6. 40 (1♂ gen.-präp.); Häselgehr (3) + 20. 9. 45 (1♂ gen.-präp.); Bsclabs (2 davon 1♂ gen.-präp.); Axams leg. Knabl (2♂♂ gen.-präp.).

Haltica pusilla DFT.

[Axams leg. Knabl (2♂♂ gen.-präp.)]

Batophila rubi PAYK.

E 15. 7. 32, 11. 6./17. 6. 37 (je 1); E Rauwand 5. 6. 39 (2♂♂ gen.-präp.); Bsclabs 1. 6. 38 (3) + ohne Datum 1♂ gen.-präp.

Crepidodera transversa (MARSH.)

E 1939 (1); E Errach 11. 8. 39 (1); E Alit 8. 7. 38 (4).

Crepidodera ferruginea SCOP.

E 14. 7. 36 (3), 21. 6. 38 (2), 28. 6. 48 (1); E Alit 8. 7. 38 (4).

Crepidodera peirolerii (KUTSCH.)

E 1940, 31. 7. 39 und ohne Datum (je 1); E Alit 8. 7. 40; Hinterhornbach 11. 7. 40 (2).

Crepidodera fermorata (GYLL.)

[Axams leg. Knabl (3)]

Crepidodera rhaetica (KUTSCH.)

E 29. 6. 39 (1); E in Kompost 27. 8. 46 (1); Reutte leg. Knabl (27).

Crepidodera melanostoma (REDT.)

Reutte leg. Knabl (1); Axams leg. Knabl (8).

Crepidodera frigida WS.

E 19. 7. 37 (1), 31. 7. 39 (1), 11. 8. 43 (2) und ohne Datum (2); E Alit 8. 3. 38 (4), 14. 6. 36 (1); E Alit, 1400 m, in Heu 26. 10. 42 (1); E 16. 10. 40 in 1900 m (4); E angeschwemmt 20. 10. 41 (1); E Alit 14. 6. 36 (1), 8. 3. 38 (4); E Kratzer, 1600 m, 21. 6. 43 (4); E Hanau 26. 7. 42, 1920 m (2); Bschrabs Hanauer Hütte, 1900 m, 9. 8. 46 (1) ebendort aus Moos gesiebt in 2000 m (1).

Hippuriphila modeeri (L.)

E 7. 8. 39 (2), 27. 5. 40 und 26. 5. 50 (1); Hinterhornbach 11. 7. 40 (4); Bschrabs 21. 6. 40 (1).

Chalcoides aurata (MARSH.)

E vom 28. 5. bis 20. 10. (insgesamt 21).

Epithrix atropae (FOUD.)

[Axams leg. Knabl (23)]

Minota obesa (WALTL.)

E 22. 6. 32 und 5. 6. 39 (je 1); E Alit 14. 6. 36 (1); Bschrabs 1. 6. 38 (4); Reutte leg. Knabl (2♂♂ gen.-präp.).

Mantura matthewsi (STEPH.)

E 11. 7. 46 (1). Bisher für Nordtirol nur bei HEISS (1971) p. 139 von der Höttinger Alm bei Innsbruck gemeldet. Nach MOHR (1966) p. 252 ist die Art in West- und Südeuropa, östlich bis Südbayern, Thüringen und Harz verbreitet und lebt an *Helianthemum*-Arten.

Chaetocnema semicoerulea (KOCH)

E 19. 6. 39 (1), 1940 (1); E Edelbach an Weiden 14. 6. 39 (1); Häselgehr 20. 7. 45 (1); Forchach 1941 (1).

Chaetocnema hortensis (GEOFFR.) (= *aridella* (PAYK.))

17. 6. 38, 5. 6. 39, 1941 (je 1); E 25. 4. 51, aus Moos (1); E Stabialpe 19. 6. 36 (1); Bschrabs 21. 6. 39 (1).

Chaetocnema sahlbergi (GYLL.)

E VII. 39, 1942 (1); E Errach 11. 8. 39 (1); E angeschwemmt am Lech 20. 10. 41 (3); Bschrabs 2. 7. 46 (1).

Sphaeroderma testaceum (F.) WS.

E 23. 6. 42 und 5. 6. 50 (je 1); Bschrabs 2. 7. 46 (3).

Sphaeroderma rubidum (GRAELLS.)

E 1941, 6. 6. 46 und 10. 6. 50 (je 1).

Apteropeda splendida ALL.

Reutte leg. Knabl (7 davon 2♂♂ gen.-präp.).

Mniophila muscorum (KOCH)

Reutte leg. Knabl (4); E Wasserfall, Mühle, Moos 29. 4. 50 (2).

Dibolia depressiuscula f.? , vielleicht *pelleti* ALL.? , vielleicht nov. spec. ? !

Reutte leg. Knabl (9, davon 3 in coll. Mohr).

Psylliodes affinis (PAYK.)

E 5. 6. 39 (1).

Psylliodes napi (F.)

E 10. 7. 46 (1); Axams leg. Knabl (17);

Psylliodes tölgi HKTR.

Nordtirol leg. Knabl (5 davon 1♂ gen.-präp.), wohl Reutte, vgl. WÖRNDLE (1950) p. 328/329.

Zitierte Literatur:

- FREUDE, H., HARDE, K.W. & LOHSE, G.A. (1971): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. III: Adepnaga 2, Palpicornia, Histeriadea, Staphyliniadea 1. Verl. Goecke & Evers, Krefeld, pp.1-365.
- HEISS, E. (1971); Nachtrag zur Käferfauna Nordtirols, Veröff. Univ. Innsbruck 67, Alpin-Biolog. Studien IV, pp.1-178, Innsbruck.
- HORION, A. (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas, Bd.1 und 2, pp.1-536, Ver. A. Kernen, Stuttgart.
- KOFLER, A. (1973): Zur Kenntnis der Käferfauna (Insecta: Coleoptera) des Lechtals (Nordtirol: Österreich). Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck 60: 131-149.
- MOHR, K.H. (1966); Chrysomelidae in: FREUDE/HARDE/LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. IX: 95-299, Verl. Goecke & Evers, Krefeld.
- WÖRNDLE, A. (1950): Die Käfer von Nordtirol. Schlern-Schriften, Bd. 64: 1-388, Verl. Wagner, Innsbruck.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwissenschaftlichen-medizinischen Verein Innsbruck](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [61](#)

Autor(en)/Author(s): Kofler Alois

Artikel/Article: [Zweiter Beitrag zur Käferfauna \(Insecta: Coleoptera\) des Lechtales \(Tirol: Österreich\). 107-119](#)