lichsten Fortpflanzungsnachweis für *P. nathusii* und den ersten für Niedersachsen dar. Die Habitatstruktur entspricht mit ihrem großen Anteil an feuchtem struktur- und gewässerreichen Wald mit hohem Altholzanteil den Verhältnissen in den vorher bereits bekannten Fortpflanzungsgebieten. Fragen zur weiteren Verbreitung in Niedersachsen, zum Zugverhalten und zur Vergesellschaftung werden diskutiert. Maße werden mitgeteilt.

Summary

During field research on the bat fauna of Friesland (Lower Saxony) in 1988, a large nursery colony, occupied communally by *Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus* and *Myotis brandti*, has been discovered. It was the first nursery record of *Pipistrellus nathusii* in Lower Saxony and the most western one in Europe. Most parts of the habitat consist of wet mature woodland with a high structure diversity and lakes. So the habitat structure is equivalent to descriptions from known areas, in which nursery colonies of *P. nathusii* exist. Questions about further distribution in Lower Sanony, migration and interspecific correlations are discussed. Measurements are given.

6 Literatur

Anschrift des Verfassers: Carsten Dense, Süsterstraße 20, 4500 Osnabrück

Beitr. Naturk. Niedersachsens 44 (1991): 113

Späte Tragezeit bei Feldhasen *(Lepus europaeus)*

Am 16.6.1990 fand ich auf der Schnellstraße am Westrand von Wilhelmshaven einen überfahrenen Hasen, dem ein Junges aus dem Bauch geplatzt war und auf der Straße lag. Das Junge war bereits voll entwickelt.

H. Bub, Postfach 3305, D-2940 Wilhelmshaven 31

Farbberingte Beutelmeisen *(Remiz pendulinus)* **und Sumpfrohrsänger** *(Acrocephalus palustris)*

1991 wurde im Kreis Herford (NRW) begonnen, Alt- und Jungvögel der Beutelmeise farbig zu beringen. Außer einem Aluminium- und einem weißen Farbring am rechten Fuß wurden jedem Vogel mehrere Celluloid-Farbringe am linken Bein angelegt. Da gerade bei der Beutelmeise ein sehr weites Herumstreifen, selbst mitten in der Brutzeit möglich ist, wäre es wichtig, in Niedersachsen auf solche individuell beringten Vögel zu achten. Im selben Gebiet werden auch Sumpfrohrsänger farblich markiert (Alu links).

Informationen über Beobachtungen beider Arten bitte umgehend an:
Jörg Hadasch, Hochstr. 31, W-4900 Herford

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Bub Hans

Artikel/Article: Späte Tragezeit bei Feldhasen (Lepus europaeus); Farbberingte Beutelmeisen (Remiz pendulinus) und Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) 113