

†*Sideritis montana* L. Köpnick: Dampfmühle [7]; *Ajuga pyramidalis* L. Fürstenwalde: Buchte [18]; *Teucrium Botrys* L. †Freienwalde: Schlossgarten [18]!!

*Trientalis europaea* L. P. Labischin: in den Wäldern an der Bromberger Chaussée zum Theil in Menge; Schubin: Moosblotte bei Drogoślaw, Wald bei Lapigrosz [21].

*Salix Caprea* × *aurita* Köpnick: Rüdersdorfer Kalkberge [6]; *S. cinerea* × *aurita* Köpnick: Rüdersdorfer Kalkberge [5, 6]; Berlin: Wilmersdorf; Treptow [5]; *S. purpurea* × *repens* (*S. Doniana* Sm.) Köpnick: Rüdersdorfer Kalkberge [6].

*Potamogeton polygonifolius* Pourr. Sternberg: Pleiske südl. der Kunersdorfer Mühle [9]; *P. acutifolius* Lk. P. Tremessen: im Klostersee [21].

*Orchis incarnata* L. c) *ochroleuca* Wüstnei. Trebbin: Gütchensdorf [6]; *Cephalanthera Xiphophyllum* Rchb. fil. Schermeißel: Zw. den Bächen-Seen [9]; *Epipactis rubiginosa* Crntz. P. Inowrazlaw: Wälder an der Weichsel bei Getau und Catarinchen; Wald bei Philipps-Mühle [19], im benachbarten Westpreussen häufig.

*Gladiolus imbricatus* L. P. Mogilno: Königl. Forst Ruhwalde [14].

*Allium Scorodoprasum* L. P. Inowrazlaw: Orłowo am herrschaftlichen Garten [19].

*Carex ligERICA* Gay. P. Schwerin: Polnisch-Trebisch [9], neu für *P. C. obtusata* Liljeblad a) *supina* Whlnb. P. Inowrazlaw Orłowo [19], neu f. P.

*Bromus patulus* M. u. K. †Putlitz: Laasker Brennerei!! Köpnick: Dampfmühle [7].

Zu berichtigen: Die im Bericht pro 1884 S. LXXXVII als Zwischenform zwischen *Rubus plicatus* und *sulcatus* aufgeführte Brombeere ist *R. sulcatus* Vest; die Zwischenform zw. *R. suberectus* und *R. plicatus* (a. a. O.) heisst jetzt *R. septimus* E. H. L. Krause [13].

#### IV. Schlesien.

Referent: E. FIEK.

#### Literatur.

1. E. FIEK, Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1886 (Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft 1887).<sup>1)</sup> 2. E. FORMANEK, Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes (Oesterr. Botanische

1) Nur citirt, wo anderenfalls Irrthümer entstehen könnten.

Zeitschr. 1886, S. 181—185, 232—237, 271—276, 293—298, 336—341, 371—378, 406—409 und 1887, S. 18—22). 3. J. BUBELA, Novitäten für die Flora Mährens a. a. O. 1886, S. 364—366). 4. ASCHERSON, Eine verkannte *Utricularia*-Art (vgl. Märk. Pos. Geb. No. 1). 5. E. FIGERT, *Carex Gerhardtii* Fig. nov. hybr. (Deutsche bot. Monatsschrift 1886 X S. 153.)

---

### Neu für das Gebiet:

*Rubus macrophyllus* Whe. u. N. Teschen: Boguschowitz. (Ich nehme diese Art hier mit auf, obgleich *R. Wimmeri* Weihe in WIMM. & GRAB. Fl. Sil. I gewiss auch hierzu gehört.)

*Knautia silvatica* (L.) Duby Odrau: Scheuergrund.

*Utricularia ochroleuca* R. Hartm. (vgl. oben S. LXXXVII) Rosenberg: bei Gross-Lassowitz im Sausenberger Forst (nicht bei Klein-Lassowitz!); Myslowitz (4).

*Carex echinata* × *remota* Vierh. (*C. Gerhardtii* Figert, *C. Vierhapperi* Beck), vgl. vorjährigen Bericht S. CCIX) Klaptau, Kreis Lüben [5].

---

### Eingeschleppt oder verwildert:

*Glaucium flavum* Crantz. Schweidnitz: um die Ziegelei Texas.

---

### Wichtigere neue Fundorte u. a.:

*Thalictrum aquilegifolium* L. in der Ebene noch bei Breslau: Wiese bei Kapsdorf; Leschnitz beim Bahnhofe; *Pulsatilla patens* × *vernalis* Oppeln: Grudschützer Forst; *P. alpina* Delarbre f. *sulphurea* (L.) Riesengebirge bei der Riesenbaude 2 Exemplare; *Ranunculus acer* L. var. *alpestris* Wimm. u. Gr. Grosse Schneegrube; *R. repens* L. var. *hirsutus* Uechtr. Breslau: Mahlener Wald.

*Berberis vulgaris* L. Lüben: Wald bei Krummlinde und Klein-Reichen; auf dem Höhenzuge zwischen Probsthain und Neukirch; Schönau: Mühlberg bei Kauffung.

*Corydallis solida* Sm. Loslau: Mschanna, Pschow, Jastrzemb, Pohlom und in fast allen Dörfern der Südhälfte des Rybniker und Ratiborer Kreises.

*Nasturtium amphibium* × *silvestre* Grünberg: Fließwiesen; *Dentaria glandulosa* W. et K. Loslau: Mschanna.

*Drosera anglica* Huds. Kreuzburg: Moor südlich von Gr. Lassowitz; Oppeln: Proskau, neu für die linke Oderseite in Mittel- und Ober-Schlesien.

† *Tunica saxifraga* Scop. Breslau: Sandgrube bei Kapsdorf; *Silene vulgaris* Gke. purpurn blühend, Kleine Schneegrube; *S. gallica*

L. Habelschwerdt: *Maria Schnee*; *Stellaria Frieseana* Ser. Hirschberg: Lomnitzer Haide auf Torf; neu für die West-Sudeten.

*Astragalus arenarius* L. var. *glabrescens* Rchb. Sandgrube bei Trachenberg; *Vicia cassubica* L. f. *glabrescens*. Grünberg: Wittgenauer Chaussee.

*Aruncus silvester* Kostl. Leschnitz; auf der rechten Oderseite sehr selten; *Geum montanum* × *rivale* (*G. sudeticum* Tausch) unterhalb der Riesenbaude 1 Exempl.; *Rubus silesiacus* Weihe. Teschen: in Ropitz; *R. caesius* × *Idaeus* G. Mey. Glogau: Gustau; Haynau: Göllschau; Goldberg: Wolfsberg; *R. hirtus* W. et K. in der Ebene bei Glogau: Dalkauer Berge; *Potentilla canescens* Bess. Odrau; *Cotoneaster integerrimus* Med. Schönau: Mühlberg bei Kauffung.

*Epilobium trigonum* Schreb. Schmiedeberg: Passkretscham, bei nur 723 m; *E. palustre* L. var. *scaturiginum* Wimm. (als Art) Südabhang des Korkonosch; *E. hirsutum* × *parviflorum* (*E. intermedium* Rchb.) Lüben: zwischen Altstadt und Gr.-Krichen; Liegnitz: Arnsdorf; *E. parviflorum* × *roseum* (*E. persicinum* Rchb.) Lüben: Kniegnitz, Zieboldorf; Liegnitz: Wildschütz, Kroitsch; *E. obscurum* × *parviflorum* (*E. dacicum* Borb.) Liegnitz: vor Rüstern; *E. adnatum* × *roseum* (*E. Borbasianum* Hausskn.) Liegnitz: zwischen Dohnau und Kroitsch.

*Hippuris vulgaris* L. var. *fluviatilis* Rth. Breslau: Weide bei Simsdorf.

*Scleranthus annuus* × *perennis* (*S. intermedius* Kittel) Sprottau: Otten-dorf; Lüben: Gr.-Krichen, Krummlinde.

*Hacquetia Epipactis* (L. fil.) DC. Ratibor: Oderwald bei Kreuzenort in Menge (1); Teschen: Zabřeg-Wald (2); *Angelica silvestris* L. var. *montana* (Schleich.) Riesengebirge: Kl. Teich; *Caucalis daucoides* L. Gross-Strehlitz: Schimischow.

*Asperula tinctoria* L. u. *A. cynanchica* L. Gross-Strehlitz: Kalkhügel bei Schimischow; *A. Aparine* Schott. Teschen: Lonkauer Teiche; neu für das Teschener Ländchen; *G. boreale* L. f. *pubescens* Grünberg: Hinterhorst bei Pirnig.

*Eupatorium cannabinum* L. var. *indivisum* DC. Breslau: Mahlener Wald; † *Aster frutetorum* Wimm. Dyhrenfurt: Oderufer bei der Eisenbahnbrücke; *Tanacetum corymbosum* Schultz Bip. Schweidnitz: Tam-padel; *Filago canescens* Jord. Schweidnitz: Leutmannsdorf; *Senecio nemorensis* L. var. *Fuchsii* (Gmel.) Breslau: Laubwald bei Paschkerwitz; in Nied.-Schlesien rechts der Oder sehr selten; *Cirsium lanceolatum* Scop. f. *albiflora* Liegnitz: Schmochwitzer Brücke; *C. oleraceum* Scop. var. *amarantinum* Láng (als Art) Glogau: Dalkauer Berge bei Beiseritz; *C. canum* Mnch. im Quaritzer und Primkenauer Bruche, nördlichster Standort in Schlesien, mit *C. canum* × *palustre* (*C. Wimmeri* Čelk.); *C. oleraceum* × *lanceolatum* Breslau: Kapsdorfer Wiesen am Goi; *Carduus Personata* Jacq. f. *albiflora* Gesenke: Knoblochgraben (2); *C. acan-*



*thoides* L. f. *albiflora* Liegnitz mehrfach; *Lappa nemorosa* Körnicke Glogau: Gustau in den Dalkauer Bergen; vierter Standort; *Centaurea Scabiosa* L. f. *albiflora* Striegau: Kreuzberg; †*C. solstitialis* L. Striegau: Breiter Berg 1886; Teschen: an der Eisenbahn 1884; *Hypochoeris glabra* L. Vorgebirge sehr selten; Hirschberg: zwischen Straupitz und Berbisdorf; *Hieracium stoloniflorum* auct. sil. (*H. flagellare* W.) Riesengebirge aufsteigend bis zur Schlingelbaude (1067 m), Kl. Teich (1185 m); *H. iseranum* Uechtr. Isergebirge: Wittighaus, Kobelhütte, Wazelsbrunn, Buchberg; Riesengebirge: Petersdorf, Elbgrund (1); Gesenke: unweit der Schweizerei am Altvater (1, 4), bei der Lehmbaude (1) neu für die östlichen Sudeten; *H. aurantiacum* L. Landeck: Chaussee nach Johannisberg; *H. Auricula* × *Pilosella* Lüben: Gr.-Krichen; Liegnitz: Kuchelberger Wald, Weg nach Pamsdorf; Kreuzburg: östlich der Miskamühle; *H. floribundum* × *Pilosella* Liegnitz: Briese; Breslau: Graben bei Grüneiche; *H. pratense* × *Pilosella* Liegnitz: um Briese bei Seedorf und Fellendorf; Hirschberg: Weg nach Gotschdorf; *H. aurantiacum* × *Pilosella* Schlingelbaude einzeln; *H. cymigerum* × *Pilosella* Liegnitz: Briese; Schweidnitz: Bahndamm vor Tunkendorf; *H. stoloniflorum* (*flagellare*) × *pratense* Breslau: Wiese bei Kapsdorf; *H. tubulosum* Tausch. Glatzer Schneeberg; neu für die Ostsudeten; *H. calenduliflorum* Backh. im Riesengebirge nah am Rande des Aupagrundes, Teichränder, Ziegenrücken; *H. glandulosodentatum* Uechtr. Seifengrube, kleine Koppe; *H. asperulum* Freyn Südlehne der Kesselkoppe bis zum Gipfel; *H. Schmidtii* Tausch Kynast, Forstberg bei Rohrlach, Schneekoppe, Kl. Koppe; *H. murorum* (L.) Fr. var. *porrectum* Uechtr. Melzergrube; *H. barbatum* Tausch Odrau: Hinrich bei Neudörfel, Haide bei Werdenberg und häufig im Pohorer Walde; neu für Oestr.-Schlesien.

*Vaccinium Myrtillus* L. mit hellpurpurnen Beeren Sprottau: Beiseritz.

*Limnanthemum Nymphaeoides* (L.) Lk. †Breslau: Tschechnitz; *Gentiana asclepiadea* L. Abhänge der Schneekoppe gegen den Riesengrund bis 1450 m.

*Pulmonaria officinalis* L. (*obscura* Dum.) f. *albiflora* Langenau bei Lähn.

*Atropa Belladonna* L. um Odrau verbreitet.

*Verbascum thapsiforme* × *Lychnitis* Glogau: Dalkauer Berge; Lüben: Gr.-Krichen; *V. nigrum* × *Lychnitis* Sprottau: Kaltenbriesnitz; Primkenau: Petersdorf; *V. Thapsus* × *nigrum* Lüben: Gr.-Krichen; *Lindernia Pyxidaria* All. Oderufer oberhalb Dyhrenfurt; *Limosella aquatica* L. im Vorgebirge auch Lähn: Kleppelsdorf; Hirschberg: Teich der Lomnitzer Haide; *Veronica officinalis* L. var. *alpestris* Čelak. Riesengebirge: Spindlerbaude, Ziegenrücken; *Orobanche rubens* Wallr. Gross-Strehlitz: Schimischow.

*Mentha aquatica* × *silvestris* Lüben: zwischen Klein-Krichen und Lerchenborn; *M. arvensis* L. var. *parietariifolia* Becker Liegnitz: Oyas;

Herrnstadt: Lauskowe; Kreuzburg: Kuczna; *M. aquatica* × *arvensis*  
Lüben: Gr.- und Kl.-Krichen, Lerchenborn, Mallnitz, Ziebendorf,  
Talbandorf; *Thymus angustifolius* Pers. f. *albiflora* Kreuzburg: Gr.-  
Lassowitz; *Stachys alpina* L. Odrau verbreitet (1); Teschen: Zabřeg-  
Wald (2); *Teucrium Scordium* L. Quaritz-Primkenauer Bruch verbreitet.

*Utricularia neglecta* Lehm. Warmbrunn: Torfstiche gegen Giersdorf.

*Glaux maritima* L. Grünberg: Obraniederung bei Kontopp. Da-  
mit für Schlesien gesichert, da die beiden Standortsangaben bei Breslau  
jetzt sehr zweifelhaft geworden sind.

*Chenopodium ficifolium* Sm Dyhrenfurt: Oderufer; † *Kochia scoparia*  
Schrad. Schweidnitz: Klefelder gegen Bunzelwitz.

*Rumex arifolius* All. höhere Lagen des Isergebirges verbreitet.

*Asarum europaeum* L. im nördlichen Schlesien sehr selten. Frei-  
stadt: Beiseritz.

*Tithymalus lucidus* × *Esula*. Dyhrenfurt: Gloschkau; Breslau: alte  
Oder hinter der Michaeliskirche.

† *Alnus serrulata* Willd. Striegau: Stannowitzer Erlicht; Schweid-  
nitz: Jacobsdorf.

*Salix amygdalina* × *viminalis* Oderufer bei Dyhrenfurt; *S. cinerea*  
× *viminalis* Goldberg: an der Katzbach bei Neuländel; Striegau: Muhrau;  
*S. aurita* × *silesiaca* Dittmannsdorf bei Waldenburg; *S. cinerea* × *aurita*  
Kreuzburg: Wald nördlich von Gross-Lassowitz.

† *Elodea canadensis* Rich. Hirschberg: Wiesentümpel der Bober-  
niederung von Straupitz und Hartau; Schweidnitz in der Peile ver-  
breitet.

*Sagittaria sagittifolia* L. var. *vallisneriifolia* Coss. et Germ. Breslau:  
Simsdorf in der Weide.

*Potamogeton trichoides* Cham. et Schdl. Glogau: Flachsrostlöcher  
bei Schönau; *Najas minor* All. Dyhrenfurt: Gloschkau; Breslau:  
Bischofswalde.

*Lemna arrhiza* L. Freistadt: Herzogswaldau; Primkenau: Otten-  
dorf; neu für das nördliche Schlesien.

*Orchis Rivini* Gouan. Schönau: Mühlberg bei Kauffung zahlreich;  
*Epipogon aphyllus* Sw. Schmiedeberg: oberhalb Hohenwiese.

*Streptopus amplexifolius* DC. im Isergebirge allgemein verbreitet.

*Scirpus Tabernaemontani* Gmel. Grünberg: Torfwiesengräben bei  
Kontopp; *Eriophorum alpinum* L. am Landeshuter Kamme oberhalb  
Haselbach; *Carex pauciflora* Ligthf. zwischen Warmbrunn und Herms-  
dorf 1838 [1]; Keilig, gr. und kl. Seeberg im Gesenke (2); *C. elongata*  
L. var. *heterostachya* Wimm. Striegau: Stannowitzer Erlicht; *C. remota*  
× *paniculata* (*C. Bönninghausiana* Weihe) in den Thälern der Dal-  
kauer Berge bei Glogau; *C. Hornschuchiana* Hoppe. Kosel: Lenkauer  
Wiesen; dritter oberschlesischer Standort.

*Phleum alpinum* L. im Isergebirge auf allen Hochwiesen verbreitet;

*Calamagrostis Halleriana* DC. im Isergebirge verbreitet; Gipfel der Eule bis herab nach Euldörfel, am Kaschbacher Plänel; *Melica ciliata* L. var. *transsilvanica* Schur (als Art) Schönau: Mühlberg bei Kauffung; Odrau; *Poa Chaixii* Vill. var. *remota* Fr. Glogau: Dalkauer Berge zwischen Gustau und Quaritz; *Festuca heterophylla* Lam. Hirschberg: Harteberg bei Mauer; Mühlberg bei Kauffung; *Bromus erectus* Huds. Schönau: um den Mühlberg bei Kauffung ungemein verbreitet; Vor- gebirge sehr selten.

*Taxus baccata* L. Schönau: Mühlberg bei Kauffung zum Theil starke Bäume.

## V. Obersächsisches Gebiet.

Referenten: O. WÜNSCHE und P. ASCHERSON.

### Quellen:

#### a) Literatur.

1. R. WAGNER, Flora des Löbauer Berges nebst Vorarbeiten zu einer Flora der Umgegend von Löbau. Wissenschaftliche Beilage zum 10. Jahresber. der Realschule zu Löbau für Ostern 1886). 2. HÜTTIG, Ein Beitrag zur Flora von Zeitz (Programm des Gymnasiums zu Zeitz über das Schuljahr 1885/86). 3. E. BARBER, Nachtrag zur Flora der Oberlausitz (Abhandl. der Naturforschend. Gesellschaft zu Görlitz 1887 S. 97—133). 4. P. TAUBERT, Beitrag zur Flora von Zeitz (Verhandl. des Bot. Vereins der Provinz Brandenburg. Jahrg. XXVIII [erschieden 1887], S. 29—31). 5. E. FIEK, (vergl. Schlesien Nr. 1). 6. J. FREYN, Ein kleiner Beitrag zur Flora des Erzgebirges (Deutsche Bot. Monatschr. IV, 1886, S. 33—35). 7. F. LUDWIG, (a. a. O. S. 187, 188). 8. F. LUDWIG, (a. a. O. S. 189, 190). 9. P. ASCHERSON, (vergl. Märkisch-Posener Gebiet Nr 1). 10. G. OERTEL, Beitrag zur Flora von Halle (Zeitschr. für Naturw. Halle. IX (1886) S. 420—422).

#### b) Schriftliche Mittheilungen von:

II. A. REHDER, Gärtner in Muskau.

(L. = Preussische Ober-Lausitz.)

#### Neu für das Gebiet:

*Ranunculus auricomus* L. b. *fallax* Wimm. L. Görlitzer Stadtpark [3].

*Trifolium hybridum* L. b. *prostratum* Sonder L. im Pomologischen Garten in Görlitz [3].

*Rubus lusaticus* Rostock: Löbauer Berg [1], Rothstein bei Sohland, Pichow bei Dretschchen [3]; *Rosa alba* × *canina* Bischof am Rothstein [3].

*Sceleranthus biennis* Reuter. Saodige Felder um Görlitz [3].

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Fiek Emil

Artikel/Article: [Schlesien LXXXIXI-XCIV](#)