© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at


# I. Preussen.

Referent: J. ABROMEIT.

## Quellen:

### a) Literatur.

1. Bericht über die 26. Versammlung des preussischen botanischen Vereins zu Königsberg i. Pr. am 4. October 1887 (Sep.-Abdr. aus Schriften der physikalisch-ökonomischen Ges zu Königsberg, 28. Jahrg.); 2. ABROMEIT: Ueber seltnere Pflanzen Preussens (a. a. O. Sitzungsbericht vom 5. April 1888 und Beilage zu No. 102 der Königsberger Hartung'schen Zeitung); 3. Bericht über die 10. Wanderversammlung des westpreussischen botanischen zoologischen Vereins zu Riesenburg in Westpr. am 31. Mai 1887 (Schriften der naturforsch. Gesellschaft zu Danzig. N. F. VII Bd. 4. Heft 1888, S. 30—107).

### b) Handschriftliche Vermerke von:

4. Professor R. CASPARY †; 5. Hauptlehrer J. KALMUSS-Elbing; 6. Gymnasiallehrer F. SPRIBILLE-Inowrazlaw; 7. Cand. med. WILLUTZKI-Königsberg.

## Neu für das Gebiet:

*Prunus Chamaecerasus* Jacq. Ruhheide, Kr. Thorn, vgl. Märk. Posener Gebiet [6] (früher schon in Schriften der naturf. Gesellschaft in Danzig, N. F. VI. Bd., 3. Heft 1886, S. 201, von H. VON KLINGGRÄFF nach HERWIG b. Kulm angegeben); neu für das norddeutsche Flachland; *Agrimonia Eupatoria* × *odorata* unter den Eltern bei der Mühle Schönwerder, Kreis Schlochau [1].

*Scirpus Duvalii* Hoppe. Hierher gehört höchst wahrscheinlich (wie dass auch die ursprüngliche Ansicht des Finders, Herrn KALMUSS war), die im Bericht 1886, S. LXXXIV irrthümlich als *S. pungens* aufgeführte Pflanze von Kahlberg auf der frischen Nehrung.

*Artemisia scoparia* W. et K. f. **villosa** G. Froel. Thorn: Schloss Nessau; Bazarkämpe [1, 2].

*Platanthera viridis* Lindl. f. *bracteata* Rchb. Bei Schibinnen, Kr. Goldap [2].

## Eingeschleppt oder verwildert:

*Draba nemorosa* L. Kaibahnhof bei Königsberg [1, 2].

**Cuminum Cyminum** L. Ballastplatz vor dem Holländerbaum bei Königsberg [1, 2].

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



*Achillea nobilis* L. Kaibahnhof bei Königsberg [1]; daselbst vom Ref. schon vor mehreren Jahren beobachtet; *Anthemis ruthenica* M. B. Kaibahnhof bei Königsberg [1].

---

## Wichtigere neue Fundorte:

*Batrachium confervoideum* Fr. See von Sichts, Glino- und Schelinken-See, Kr. Schlochau [1]; *Ranunculus Flammula* L. b) *reptans* (L.) Lino-See, Kr. Schlochau [1]; *R. Steveni* Andrzj. †Rain am Bahndamm bei Falkenhorst, Kr. Schwetz [1].

*Nuphar luteum* × *pumilum* (*intermedium* Ledeb.) Kesselsee im Landecker Forst, Czieczewko- oder „Hechtsee" im Eisenbrücker Forst, Kr. Schlochau unter den Eltern [1]; *N. pumilum* Sm. Kreistipko-, Moos- und Kl. Barschsee, Kr. Schlochau [1].

*Nasturtium barbaraeoides* Tausch Schridlau, Kr. Berent, (vgl. Bericht 1886, S. LXXXIV) von Caspary bestätigt [4]; *Barbaraea vulgaris* R. Br. Danzig: im Brückschen Moor; die echte Art selten in Preussen [3]; *Arabis Gerardi* Bess. Wiese zw. Bahrendorfer Chaussee und Milcherei, Kr. Strasburg [1]; †*Diplotaxis muralis* DC. Bei Tolkemit und bei Pillau [1]; *Alyssum montanum* L.† Kaibahnhof bei Königsberg [1].

*Viola epipsila* × *palustris*. Ottoshof, Kr. Schlochau [1]; *V. arenaria* × *silvestris* zw. Lischin und Marienthal, Kr. Schwetz [1]; *V. arenaria* × *canina* Marienfelde, Kr. Schwetz [1]; *V. arenaria* × *Riviniana* zw. Hasenberg und Kobulten, Kr. Ortelsburg [1]; *V. canina* × *silvestris* bei Naymowo und zw. Czarlowitz und Malken, Kr. Strasburg [1].

*Drosera anglica* × *rotundifolia* (*D. obovata* M. et K.) Nusssee, Kr. Kartaus (vgl. Bericht 1886, S. LXXXIV) von Caspary bestätigt [4]; Kl. Karlinkensee, Kr. Schlochau [1]; Saal- u. Sussek-See, Puppener Forst, Kr. Sensburg [1]; *D. intermedia* Hayne am Grossen Lodzin- und am „Bolland"-See, Kr. Schlochau [1].

*Lavatera thuringiaca* L. Grutschno, Kr. Schwetz [1].

†*Ulex europaeus* L. Dolgensee bei Prechlau, Kr. Schlochau [1]; *Trifolium alpestre* L. b) *glabratum* v. Klinggr. I. an 6 Standorten im Kr. Strasburg [1]; *Tr. hybridum* L. b) *elegans* Savi (als Art) bei Zuckau, Kr. Kartaus [3]; *Tr. spadiceum* L. Wiesen bei Drebbolienen, Kr. Insterburg [1].

†*Potentilla intermedia* L. Eisenbahndamm zw. Tuchel und dem Brahefluss; im Scharlok'schen Garten zu Graudenz spontan aufgetreten [1]; *P. mixta* Nolte an Tümpeln bei Woltersdorf, Kr. Schlochau [1]; im Ratzeburger Forst, Kr. Ortelsburg und im Puppener Forst, Kr. Sensburg (in der Nähe von *P. procumbens* Sibth.) [1].

*Sedum villosum* L. 4 Standorte im Kr. Strasburg [1].

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at


*Bupleurum longifolium* L. zwischen Poledno und Wilhelmsmark, Kr. Schwetz [1]; *Silaus pratensis* Bess. Bahrendorf, Kr. Strasburg [1].

*Valeriana polygama* Bess. Schmelzthal bei Sagorsch, Kr. Neustadt [3]; bei Pr. Eylau [7].

*Scabiosa suaveolens* Desf. Gehölz an der Chaussee zw. Tuchel u. Schwiedt [1].

*Cirsium oleraceum* b) *amarantinum* Lang Wiese an der Branitza, zw. Försterei und Mühle Dlugimost, Kreis Strasburg [1]; †*Centaurea nigra* L. Königsberg am Thore der Ostbahn [1]; †*Crepis nicaeensis* Balb. Bahndamm bei Falkenhorst, Kr. Schwetz [1].

*Lobelia Dortmanna* L. in 6 Seen des Kr. Schlochau [1].

*Sweertia perennis* L. Wiesen bei Wilhelmsthal an der Drewenz, Kr. Strasburg [1]; an dem von Körnicke nachgewiesenen Fundorte bei Lautenburg jetzt verschwunden.

*Pulmonaria angustifolia* × *obscura* (*P. notha* Kern.) zw. Poledno u. Wilhelmsmark, Kr. Schwetz [1].

*Verbascum thapsiforme* × *nigrum* Schiede (*V. adulterinum* Koch) im Belauf Gollub nordöstl. von der Lissewo-Mühle, Kr. Strasburg [1]; *V. nigrum* × *phlomoides* am Brück'schen Moor, Kr. Putzig [3]; *Veronica Tournefortii* Gmel.† Königsberg [7].

†*Dracocephalum thymiflorum* L. an einem Standort in Ostpreussen u. an 6 in Westpr.

*Androsace septentrionalis* L. † am Eisenbahndamm zw. Tuchel u. dem Brahefluss eingeschleppt [1].

*Litorella juncea* Bergius im Rüben-, Schelinken-, Kraasen- und Selon-See, Kr. Schlochau [1].

*Salix myrtilloides* L. an der Bahn zw. Tuchel und dem Brahefluss u. an der Chaussee östl. von Gr. Bislaw, Kr. Tuchel [1]; zw. Druszyn und Zgnilloblott, Kr. Strasburg [1]; Geislingen u. Sczcepanken, Kr. Ortelsburg [1]; Sussek-See, Kr. Sensburg [1]; *S. livida* × *repens* (*S. stenoclados* Döll) Stromek-See, Kr. Sensburg [1].

*Alisma Plantago* L. d) *arcuatum* Michalet (als Art) bei Gumbinnen [1]; *A. natans* L. im Kreise Schlochau verbreitet [1].

*Potamogeton gramineus* L. b) *Zizii* Cham. & Schldl. im Gr. Amtssee bei Schlochau u. im Gr. Zinnsee, Kr. Schlochau [1]; *P. nitens* Web. b) *curvifolius* Hartm. Gr. Amtssee bei Schlochau und im Garzer See, Kr. Schlochau [1]; *P. lucens* × *praelongus* (*P. decipiens* Nolte) Müskendorfer See bei Funkermühle, Kr. Konitz [1]; Gr. Röskesee, Kr. Schlochau [1]; *P. pectinatus* L. var. *zosteraceus* Fr. im Zahnefluss an der Schlossmühle bei Hammerstein, Kr. Schlochau [1]; *Naias minor* All. Kl. Wieczíwno- oder Hechtsee, Kr. Schlochau [1].

*Sparganium simplex* Huds. var. *fluitans* A. Br. Kelpiner-, Jaczurko- und Weisser Kuhnkensee, Kr. Schlochau [1]; Mühlenteich der Lissewo-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



mühle, Kr. Strasburg [1]; Kapurrener Mühlenteich, Kreis Insterburg [1].

*Gymnadenia cucullata* Rich. im Nappiwoddaer Forst, Belauf Eichwerder, Kr. Neidenburg [7].

*Juncus Tenagea* Ehrh. Gurtschno, Kr. Strasburg [1]; östlichster Standort in Deutschland! *Cladium Mariscus* R. Br. Kl. Gluchi-, Röske- u. Wangerin-See, Kr. Schlochau [1]; See zu Gajewo, Kreis Strasburg [1]; *Carex cyperoides* L. Pfaffensee bei Bärenwalde, Kr. Schlochau [1]; Moczadlo südlich von Laszewo, Kr. Strasburg [1]; *C. paradoxa* Willd. Suckau-See, Kr. Schlochau [1]; Fritzen'sche Forst, Belauf Gr. Raum bei Königsberg [1, 4]; am Lupinenberg bei Lärchwalde, Landkr. Elbing [5]; *C. elongata* L. var. *Gebhardi* Schk. und *C. canescens* L. var. *subloliacea* Fr. Tzulkinner Forst bei Waldfrieden, Kr. Gumbinnen [1].

*Calamagrostis lanceolata* × *arundinacea* (*C. Hartmaniana* Fr.) unter den Eltern im Tzulkinner Forst bei Waldfrieden, Kr. Gumbinnen [1]. *Poa bulbosa* L. b) *vivipara* †Kaibahnhof bei Königsberg; *Glyceria nemoralis* Uechtr. et Koern. Sternsee, Kr. Schlochau [1]; *Scolochloa festucacea* Lk. Kl. Ziethen- u. Konzug-See, sowie im Brahefluss bei Platzig, Kr. Schlochau [1]; *Bromus asper* Murr. b) *serotinus* Benek. Tzulkinner Forst, Belauf Notz bei Waldfrieden, Kr. Gumbinnen [1]; *B. erectus* Huds. †bei Palmnicken am Parkrande wahrscheinlich mit fremden Grassamen angesäet [5].

---

## II. Baltisches Gebiet.

Referent: Th. Marsson.

---

### Quellen:

---

#### a) Literatur:

1. Winkelmann, Ein Ausflug nach Hinterpommern. (Abhandl. des botan. Vereins für Brandenburg XXX (1888), S. 187—201); 2. Ernst H. L. Krause, Beschreibung der im mittleren Norddeutschland vorkommenden Waldveilchen. Ber. D. Bot. Ges. 1887, S. 24—27; 3. O. Richter, Zur Flora am Cummerowsee (D. Bot. Monatsschr. 1887, S. 159).

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Abromeit Johannes

Artikel/Article: Preussen CVI-CIX