

V. Obersächsisches Gebiet.

Referent: P. ASCHERSON.

Quellen:

E. FRIE (Vergl. Schlesien No. 1.)

L. = Preussische Ober-Lausitz.

Wichtigere neue Fundorte:

Arabis arenosa Scop. L. Görlitzer Haide bei Rauscha; *Lepidium Draba* L. †L. Görlitz: Bahndamm bei Moys.

† *Ulex europaeus* L. L. Görlitz: Hermsdorf; *Rubus nitidus* W. et N. L. (Vgl. Bericht für 1885, S. LXIII) nördliche Görlitzer Haide verbreitet; *Rosa rubiginosa* L. Görlitz: Rauschaer Glashütte, erster sicherer Fundort für L.

† *Polycarpon tetraphyllum* L. fil. L. Görlitz: Botanischer Garten.

† *Scelum spurium* M. B. L. Görlitz: Abhang hinter dem Kirchhof.

† *Matricaria discoidea* DC. L. Görlitz: Waggonfabrik; *Senecio Fuchsii* Gmel. L. Görlitzer Haide bei Rauscha.

Vaccinium Myrtilus × *Vitis idaea* (*V. intermedium* Ruthe) L. Nördl. Görlitzer Haide.

Solanum villosum Lam. L. †Görlitz: Schwedler'sche Villa.

† *Linaria Cymbalaria* Mill. L. Görlitz: Steiniger Abhang am Kirchhofe.

Carex brizoides L. und

Calamagrostis Halleriana DC. L. Nördliche Görlitzer Haide.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Ascherson Paul Friedrich August

Artikel/Article: [Obersächsisches Gebiet CXVIII](#)