

Nachträge

zur

Flora von Schwaben und Neuburg,

insbesondere

neue Fundorte in der Umgegend von Augsburg.

Helleborus viridis L. Auf Wiesen um Untrasried bei Obergünzburg. Lehrer *Wengenmayr* in Oberrieden bei Mindelheim.

Helianthemum Fumana Mill. Heide vor dem Siebentischwalde. *Weinhart*.

Viola stagnina Kit. Am Stießberg bei Oberstaufen. *Weinhart*.

Viola calcarata L. Falken-Eck bei Hinterstein. *Schorer*.

Spergularia rubra Presl. (= *Lepigonum rubrum* Wahlb.) Strassenränder bei Luisensruhe und auf Leimboden am Ziegelstadel bei Stadtbergen. *Lutzenberger*.

Hypericum pulchrum L. Waldweg zwischen Diebelthal und Bannacker. *Lutzenberger*.

Potentilla collina Wiebel. Sonnige Raine bei Friedberg. *Lutzenberger*.

Potentilla minima Haller fil. Daumen und Nebelhorn. *Wengenmayr*.

Rosa alpina L. var. *lagenaria* Vill., am Pöllatfall bei Neuschwanstein, bei Hindelang etc.; var. *laevis* Seringe, Ge-

büsch am Ufer der Weissach bei Oberstaufer und am Schwannsee bei Hohenschwangau, dann am Stuiben bei Immenstadt; var. *curtidens* Chr. und var. *aculeata* Seringe, zwischen Schattwald und Oberjoch bei Hindelang; var. *pyrenaica* Gouan und var. *globosa* Seringe, in Gebüsch um Faulenbach bei Füssen; var. *parvifolia* Favrat, am Steineberg bei Immenstadt. *Weinhart*.

Rosa tomentosa Sm. var. *scabriuscula* Baker. Hecke am Wege von Bad Oberdorf zum Wasserfall. *Weinhart*.

Rosa gallica L. Ackerraine bei Friedberg. *Lutzenberger*.
Alchemilla pubescens M. B. Eckwiesen bei Hinterstein, 900 m. *Schorer*.

Peucedanum Chabraei Rechb. Gräben und Raine bei Stadtbergen und Pfersee. *Lutzenberger*.

Myrrhis odorata Scop. An einem Gartenzaune auf dem Schlossberge bei Oberstaufer. (qu. sp.?) *Weinhart*.

Viscum album L. Auf einem Apfelbaume in Oberzell bei Friedberg. *Lutzenberger*.

Aster parviflorus Jacq. In den Wertachauen bei der Schiessstätte. *Henle*.

Achillea Millefolium L. var. *alpestris* W. u. Gr. (= *Ach. magna* Haenke.) Am Schnee-Eck, 2200 m. *Schorer*.

Matricaria discoidea DC. (= *Chrysanthemum suaveolens* Aschers.) An Wegen bei Alt-Offingen. Stabsveterinär *Kränzle*.

Senecio cordatus × *Jacobaea* (= *S. Reisachii* Grembli) Oberjoch bei Hindelang. *Schorer*.

Cirsium palustre × *oleraceum* Naeg. (= *C. hybridum* Koch.) Feuchte Waldränder im Diebelthal. *Lutzenberger*.

Cardus crispus L. Unter der Eisenbahnbrücke bei Oberhausen. *Lutzenberger*.

Saussurea alpina L. Schnee-Eck, 2200 m. und Kugelhorn, 2148 m. *Schorer*.

Saussurea discolor DC. (Neu für Bayern.) Am Kirchedach, 1480 m., Aelpeleskopf und Glasfeldkopf. *Schorer*.

Lactuca Scariola L. Am hohlen Stein bei Unter-Medlingen. *Wengenmayr*.

Azalea procumbens L. Kugelhorn, Kirchdach, Lahner, Wildsee etc. *Schorer*.

Erica carnea L. An der Iller zwischen Kempten und Kottern. *Wengenmayr*.

Orobanche lucorum A. Br. Auf *Medicago falcata* in der Friedberger-Au. *Lutzenberger*.

Orobanche minor Sutt. Auf Papilionaceen in den Lechauen. *Lutzenberger*.

Utricularia minor L. Wiesenmoore bei Oberrieden. *Wengenmayr*.

Oxyria didyma Campd. Trümmergestein zwischen Ochsenalpe und Schöneberg. *Schorer*.

Daphne striata Trattn. Vordere Heidach, Sulz etc., 860—880 m. *Schorer*.

Potamogeton fluitans L. In der Schmutter bei Batzenhofen. *Lutzenberger*.

Potamogeton lucens L. Weiher bei Oberrieden. *Wengenmayr*.

Nigritella angustifolia × *Gymnadenia odoratissima* (= *N. Heufleri* Kerner). Rothspitze. *Schorer*.

Herminium Monorchis R. Br. Wertachauen bei Pfersee. *Wiedemann*.

Chamaeorchis alpina Rich. Daumen und Glasfeldkopf. *Schorer*.

Listera cordata R. Br. Eisenbreche, Taufersalpe, Sulz etc. *Schorer*; am Grünten bei c. 1200 m. *Wengenmayr*.

Corallorrhiza innata R. Br. Berggündlethal, Willersalpe, Sulz etc. *Schorer*; bei Kempten *Wengenmayr*.

Tulipa silvestris L. Hecken bei Pfersee. *Lutzenberger*

Hemerocallis flava L. In den Lechauen unterhalb Lechhausen. *Henle*.

Tofieldia calyculata Whlb. var. *ramosa* Hoppe. Am Daumen. *Wengenmayr*.

Gagea lutea Schult. Willersalpe, 1440 m. und auf Wiesen bei Hinterstein, 860 m. *Schorer*.

Juncus triglumis L. Wildsee, 1801 m. etc. *Schorer*.

Eriophorum alpinum L. Im Haspelmoor. *Euringer*
und *Henle*.

Carex nigra All. Am Daumen, Koblat. *Schorer*.

Carex capitata L. und *Carex Buxbaumii* Whlb. Wiesen-
moore bei Oberrieden. *Wengenmayr*.

Avena caryophylla Web. Sandige Waldränder bei
Luisensruhe. *Lutzenberger*.

Equisetum hiemale L. var. *viride* Milde. Heide vor
dem Siebentischwalde. *Weinhart*.

Equisetum Telmateja Ehrh. var. *serotinum* A. Br.
Sumpfige Wiese am Krebs-Fall bei Oberstausen. *Weinhart*.

Equisetum ramosum Schleich (= *E. ramosissimum*
Desf.) Trockene Gräben bei Westheim. *Weinhart*.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Nachträge zur Flora von Schwaben und Neuburg, insbesondere neue Fundorte in der Umgegend von Augsburg 307-310](#)