

Verzeichnis

der vom Hauptlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden in den Jahren 1893 mit 1902 und in der Umgegend von Fellheim in den Jahren 1903 mit 1918

gesammelten Käfer.

Rieden, Bezirk Füssen, von dieser Stadt in nördlicher Richtung 5,2 km entfernt, westlich der Staatsstraße in einem vom Riedener Bach durchflossenen Talkessel 814 m ü. d. M. Gegen Osten der Sendenberg, gegen Westen der Faulenberg ca 950 m, nach Norden der 1000 m hohe Zwieselberg. Östl. der Weiler Osterreinen hart am Abhang ins Lechtal. Der Staatsstraße entlang die zerstreuten Häuser von Ehrwang. Südwestl. Hopfen am Hopfensee; am Fuße des Faulenberges der Faulensee und die Höllmühle. Auf dem Ehrwang die Mündung der Weissenseer Ach in den Lech.

Fellheim, Bahnstation der Linie Memmingen—Ulm, vom ersterem 11 km, von letzterem 42 km entfernt, 568 m ü. d. M. in dem hier sehr breiten Illertal, an der Memminger Ach, welche hier durch einen „Gries“ genannten und aus Weiden, Erlen, Eschen und Birken bestehenden Auwald fließt. Der Ort ist von der Iller $\frac{1}{2}$ km entfernt und liegt also hart an der Württemberger Grenze.

Rd. bedeutet Rieden.

Fh. „ Fellheim.

I. Adephaga.

I. Familie **Cicindelidae.**

Sandläufer.

1. Gatt. Cicindel a. Linné.

Sandläufer.

silvicola Latr. Rd. und Fh.

hybrida a. virescens Letzner.

Fh. selten.

hybrida v. riparia Latr. Fh.

hybrida a. transversalis Dej.

Fh. 1 Expl. a. d. Iller gef.

campestris L. Rd. u. Fh. gem.

campestris a. coeruleascens

Schilsky. Fh. sehr selten.

II. Familie **Carabidae.**

Laufkäfer.

2. Gattung. Cychrus. Fabr.

Schaufelläufer.

rostratus L. Rd. und Fh.

attenuatus F. Tegelberg bei

Füssen.

3. Gatt. *Carabus*. Latreille.
 Echte od. Großlaufkäfer.
(Procrustes Bon.) *coriaceus*
 L. Rd. und Fh.
violaceus L. a. *subcrenatus*
 Geh. Fh.
violaceus v. *exasperatus* Dft.
 Fh.
irregularis F. Tegelberg bei
 Füssen.
intricatus L. Altenstadt a.Ill.
auronitens F. Rd.
auronitens a. *perviridis*
 Reitt. Rd. 2 Stück.
convexus F. Rd. und Fh.
nitens L. Rd. Altenstadt a. I.
auratus L. Rd. selten. Fh.
 nicht selten.
auratus a. *picipes* Letz. Fh.
 2 ♂
granulatus L. Rd. und Fh.
granulatus a. *rufofemoratus*
 Letz. Fh.
cancellatus Illg. Rd. u. Fh.
cancellatus a. *femoralis* Geh.
 Fh.
Ullrichi Germ. Rd. u. Fh.
arvensis Hbst. Rd. Senden-
 berg einigemale im Frühj.
 unter Steinen.
arvensis a. *ruficrus* Geh. 1
 ♂ 1894 Sendenberg.
nemoralis Müll. Winterrie-
 den bei Babenhausen u.
 Höhen bei Altenstadt a. I.
silvestris Pz. Tegelbg. b. Fss.
glabratus Payk. Rd. u. Fh.
4. Gatt. *Leistus*. Frölich.
 Bartlaufkäfer.
ferrugineus L. Fh.
 5. Gatt. *Nebria*. Latreille.
 Dammläufer.
picicornis. Rd. a. Lech hfg.
 Fh. im Geniste a. d. Iller.
 nach Hochwasser.
brevicollis F. Rd. und Fh.
 6. Gattung. *Notiophilus*.
 Duméril. Eillaufkäfer.
palustris Duft. Rd.
biguttatus F. Winterrieden.
 7. Gatt. *Omophron*. Latr.
 Grundlaufkäfer.
limbatum F. Fh. a. d. Achsel.
 8. Gatt. *Elaphrus*. Fabri-
 cius. Raschläufer.
uliginosus F. Rd. Achmün-
 dung sehr selten.
cupreus Duft. Rd. feuchte
 Stellen a. Faulenberg. Fh.
 an der Ach.
riparius L. Fh.
Ullrichi W. Redtb. Rd. und
 Fh. selten.
aureus Müll. Fh. selten.
 9. Gattung. *Lorocera*. Lat-
 reille. Riemenhorn auch
 Rennläufer.
pilicornis F. Rd. nicht hfg.
 Fh. an der Ach häufig.
 10. Gattung. *Clivina*. Latr.
 Spreizlaufkäfer.
fossor L. Rd.
collaris Hbst. Fh. im Iller-
 sand häufig.

11. Gatt. *Dyschirius*. Bonelli. Übelhand, auch Fanglaufkäfer.
globosus Hbst. Rd. u. Fh.
12. Gattung. *Broscus*. Panz. Kopflaufkäfer.
cephalotes L. Rd. am Lech nicht häufig.
13. Gatt. *Asaphidion*. Gozis. Schnellaufkäfer.
caraboides Schr. Rd. u. Fh. Lech- u. Illersand gem.
pallipes Duft. Rd. und Fh. Lech- u. Illersand gem.
flavipes L. Rd. u. Fh. hfg.
14. Gatt. *Bembidion*. Latr. Ahlllaufkäfer.
foraminosum St. Rd. auf Lechsand nicht selt. Der Käfer ist ein guter Flieger u. ich konnte die Tierchen bei Sonnenschein nur mit dem Netz erbeuten. Bei dieser Gelegenheit fing ich auch einige Schnarrheuschrecken mit purpurrot. Hinterflügeln. (*Bryodema tuberculata* F.), die in Schwaben nur noch bei Hinterstein i. Allgäu vorkommt. Außerdem (nach Redtenbacher) in Bayern noch im Riß- und Isartal.
pygmaeum F. Rd. auf Lech-sand häufig.
lampros Hbst. Rd. auf Lech-sand häufig.
- punctulatum* Drap. Fh. auf Illersand häufig.
dentellum Thbg. Fh. auf Illersand häufig.
Starcki Schm. Fh. an der Ach selten.
adustum. Fh. zieml. häufig.
prasimum Duft. Fh.
fasciolatum Duft. Fh.
tricolor F. Fh. auf Illersand gemein.
tibiale Duft. Fh. selten.
testaceum Duft. Rd. u. Fh.
Andreae v. *femoratum* Stm. Fh. häufig.
ustulatum L. Rd. und Fh.
rupestre L. Fh.
lunatum Duft. Fh. selten.
modestum F. Rd. am Lech ziemlich häufig.
décorum Pz. Rd. häufig, Fh. gemein.
monticola St. Rd. und Fh.
ruficorne St. Tegelberg bei Füssen 2 St. Fh. selten.
decoratum Duft. Fh. selten.
4 guttatum F. Rd. a. L. hfg.
4 maculatum L. Rd.
tenellum Erichs. Rd.
Schüppelli Dej. Fh. i. Frühj. a. d. Ach unter Laub hfg.
articulatum Gyllh. Fh. nicht selten.
obtusum Serv. Fh. einige Stücke im Herbst unter Baumrinde, wo der Käfer wohl zu überwint. suchte.

- biguttatum F. Rd. und Fh.
15. Gattung. *Ocys*. Stephens.
quinquestriatus Gyllh. Rd.
und Fh.
16. Gatt. *Tachys*. Stephens.
Schnellaufkäfer.
bistriatus Duft. Fh. häufig.
4 signatus Duft. Fh. gemein.
17. Gattung. *Tachyta*. Kirby.
nana. Rd.
18. Gattung. *Trechus*. Clair-
ville. Spitzlaufkäfer.
discus F. Fh. i. Gen. d. Ach s.
micros Herbst. Rd. am
Hopfensee selten.
quadristriatus Schr. Rd. u. Fh.
rubens F. Fh. Bei Alten-
stadt a. Iller im Geniste
des Fabrikkanals 1 Stck.
19. Gatt. *Patrobis*. Steph.
Tropflaufkäfer.
excavatus Payk. Rd. u. Fh.
20. Gatt. *Panagaeus*. Latr.
Kreuzlaufkäfer.
crux major L. unter Steinen
selten. Rd. und Fh.
crux a. Schaumi Ganglb. Fh.
4 Exemplare.
21. Gattung. *Chlaenius*. Bo-
nelli. Sammläufer.
vestitus Payk. Bei Hopfen
sehr selten.
nitidulus Schr. Rd. an den
Abhängen b. Osterreinen.
Fh. an der Ach selten.
nitidulus v. tibialis Dej. w.
d. vor.
- nigricornis F. Bei Oster-
reinen selten.
22. Gattung. *Oodes*. Bonelli.
Zweckenlaufkäfer.
helopoides F. Fh. an der
Ach selten.
23. Gatt. *Badister*. Dejean.
Wanderlaufkäfer.
bipustulatus. Rd. unt. Moos
und Steinen nicht selten.
sodalis Duft. Rd. und Fh.
selten.
24. Gatt. *Ophonus*. Steph.
puncticollis Payk. Winter-
rieden, sandige Äcker.
brevicollis Serv. Fh. Iller-
gries selten.
pubescens Müll. Rd. u. Fh.
in den Blüten von Cirsium
oleraceum nicht selten.
25. Gatt. *Harpalus*. Latr.
Schnellaufkäfer.
aeneus F. Rd.
aeneus v. confusus Dej. Fh.
latus L. Rd.
luteicornis Duft. Fh. selten.
honestus Duft. Rd. selten.
politus Dej. Winterrieden
selten.
tardus Panz. Winterrieden
selten.
26. Gatt. *Trichotichnus*.
Moravitz.
laevicollis Duft. Rd. selten.
27. Gatt. *Acupalpus*. Dej.
Spitzpalpenlaufkäfer.
meridianus L. Fh.

28. Gattung. *Bradyceillus*.
Erichson. Plumpläufer.
collaris Payk. Fh.
29. Gatt. *Diachromus*. Erichson. Farblaufkäfer.
germanus L. Fh. sehr selten.
30. Gatt. *Anisodactylus*.
Dej. Ungleichtarsiger Laufkäfer.
binotatus F. Rd. und Fh.
binotatus v. *spurcaticornis*
Dej. Fh.
31. Gatt. *Zabrus*. Clairville.
Rückenlaufkäfer.
tenebrioides Goeze. Fh.
32. Gattung. *Amarra*. Bonelli.
Knallaufkäfer.
plebeja Gyllh. Fh.
similata Gyllh. Fh.
ovata F. Rd. selten.
montivaga Stm. Fh. sehr selten.
communis Pz. Rd. häufig.
convexior St. Rd.
aenea Deg. Rd.
spreta Dej. Rd.
eurynota Pz. Rd. sehr selten.
familiaris Duft. Rd.
bifrons Gyllh. Fh. selten.
apricaria Payk. Rd. selten.
aulica Pz. Rd.
equestris Duft. Fh. selten.
33. Gatt. *Stomis*. Clairville.
Freßlaufkäfer.
pumicatus. Fh.
34. Gattung. *Abax*. Bonelli.
Kiellaufkäfer.
- ater L. Rd., Fh. nicht selt.
parallelus Duft. Fh. selten.
ovalis Duft. Rd. nicht selt.
carinatus Duft. Rd.
35. Gattung. *Molops*. Bonelli.
Striemenlaufkäfer.
piceus Panz. Rd. und Fh.
ziemlich häufig.
36. Gattung. *Pterostichus*.
Bon. Schlanklaufkäfer.
macer Marsh. Fh. sehr selt.
lepidus Lesk. Rd. nicht hfg.
cupreus L. Rd. und Fh.
coeruleascens L. Fh.
puncticollis Dej. Rd. 1 ♀
vernalis Pz. Rd. häufig.
oblongopunctatus F. Rd.
nicht selten.
niger Schall. Fh.
vulgaris L. Fh. gemein.
nigrita F. Fh.
anthracinus. Rd. nicht hfg.
interstinctus Illg. Rd. gem.
strenuus Pz. Rd. gemein.
melas Creutz. Rd. und Fh.
metallicus F. Rd. und Fh.
multipunctatus Dej. Rd. n.
häufig.
37. Gattung. *Laemostenus*.
Bon. Kellerlaufkäfer.
terricola Hbst. Fh. einige Stücke im Keller des hies. Schulhauses.
38. Gattung. *Calathus*. Bon.
Kreisellaufkäfer.
fuscipes Goeze. Rd. u. Fh.
gemein.

- melanocephalus* L. Rd. hfg.
39. Gattung. *Synuchus*. *Gyl-*
lenhal. Felslaufkäfer.
- nivalis* Pz. Fh.
40. Gattung. *Agonum*. Bon.
Rundhals.
- ruficorne* Gz. am Hopfensee.
Fh. an der Ach häufig.
- assimile* Payk. Rd. und Fh.
häufig.
- 6 punctatum* L. Rd. u. Fh.
- 6 punctatum* a. *montanum*.
Rd. selten.
- Mülleri* Hbst. überall gem.
viduum Pz. Am Hopfensee
Fh. an der Ach häufig.
- micans* Nicol. Fh. a. d. Ach
häufig.
- dorsale* Pont. Fh. gemein.
41. Gattung. *Lebia*. Latreille.
Prunklaufkäfer.
- crux ninor* L. Rd. sehr selt.
42. Gatt. *Lionychus*. Wiss-
mann. Punktlaufkäfer.
- quadrillum* Duft. Rd. u. Fh.
- quadrillum* a. *bipunctatus*
Heer. Fh. nicht häufig.
43. Gatt. *Metabletus*. Schmidt.
Mooslaufkäfer.
- pallipes* Ziegl. Rd.
44. Gattung. *Dromius*. Bon.
Rindenlaufkäfer.
- agilis* F. Fh. häufig.
- fenestratus* F. Rd. sehr selt.
- 4 maculatus* L. Rd. und Fh.
häufig.
- 4 nodatus* Pz. Fh. zieml. hfg.
- III. Familie. **Haliplidae**. Seidl.
Schwimmer.
45. Gattung. *Haliphus*. Latr.
Bachschwimmer.
- ruficollis*. Fh. u. Winterried.
- IV. Familie. **Dytiscidae**. Aubé.
Schwimmkäfer. -
46. Gatt. *Hygrotus*. Steph.
decoratus Gyllh. Rd. selten.
47. Gatt. *Bidessus*. Scharp.
unistriatus Illg. Fh.
- geminus* F. Fh. häufig.
48. Gatt. *Hydroporus*. Clair-
ville. Zwergschwimmk.
assimilis Payk. Fh. häufig.
- pictus* F. Im Hopfensee hfg.
- granularis* L. Fh. häufig.
- palustris* L. Fh. und Um-
gebung gemein.
- marginatus* Duft. Fh.
- discretus* Fairm. Rd., bei
Hopfen.
49. Gattung. *Noterus*. Clair.
Weiher schwimmkäfer.
- clavicornis* Deg. Fh.
50. Gatt. *Laccophilus*. Leach.
Lachenfreund.
- obscurus* Panzer. Fh. und
Winterrieden.
51. Gattung. *Agabus*. Leach.
Klauenschwimmkäfer.
- melanarius* Aubé. Fh. selten.
- guttatus* Payk. Rd. selten.
- bipustulatus* L. Rd. und Fh.
häufig.
- paludosus* F. Rd. u. Fh. hfg.
- uliginosus* L. Fh.

- Sturmi* Gyllh. Rd. in den
Tümpeln b. d. Höllmühle.
undulatus Schrk. Fh. hfg.
52. Gatt. *Platambus* Thomson.
maculatus L. Rd. a. Lech-
ufer.
53. Gatt. *Ilybius*. Erichson.
Schlammschwimmkäfer.
fuliginosus F. Rd. u. Fh.
ater Deg. Rd. a. d. W. Ach.
obscurus Marsh. Rd. selten.
guttiger Gyllh. Fh. selten.
54. Gatt. *Rhantus*. Lacor-
- daire. Besprengter Schk.
punctatus Geoffr. Fh.
55. Gatt. *Acilius*. L. Schei-
benschwimmkäfer.
sulcatus L. Winterrieden.
56. Gatt. *Dytiscus*. L. Groß-
taucher.
marginalis L. Rd. u. Fh.
V. Familie. **Gyrinidae**. Aubé.
Taumel- oder Drehkäfer.
57. Gatt. *Gyrinus*. Geoffroy.
wie oben.
nadator L. Fh.

II. Polyphaga.

A. Staphylinoidea.

Linienkäfer, auch Kurzdecker oder Ohrwurmkäfer.

- VI. Familie. **Staphilinidae**.
wie oben.
58. Gattung. *Micropeplus*.
Latr. Kurzrock.
porcatus F. Rd. und Fh.
59. Gatt. *Megarthrus*. Steph.
Großgliedlinienkäfer.
denticollis Beck. Fh. selten.
60. Gatt. *Proteinus*. Latr.
Vorstrecklinienkäfer.
brachypterus F. Rd. n. selt.
61. Gatt. *Anthobium*. Steph.
Blütenlinienkäfer.
sorbi Gyllh. Rd. selten.
torquatum Marsh. Rd. selt.
limbatum Fr. Rd.
minutum F. Rd.
62. Gattung. *Phyllodrepa*.
Thomson.
floralis Payk. Rd. selten.
63. Gatt. *Omalium*. Graven-
horst. Flachlinienkäfer.
rivulare Payk. Rd. u. Fh.
caesum Grav. Fh.
64. Gatt. *Xylodromus*. Heer.
concinnus Marsh. Fh. hfg.
65. Gattung. *Lathrimaeum*.
Erichson. Feldlinienkäfer.
atrocephalum Gyllh. Fh.
66. Gatt. *Arpedium*. Erichs.
Mauslinienkäfer.
quadrum Grav. Fh. häufig.
In den Wintermonaten
oft. im Zimmer gefang.
67. Gattung. *Lesteva*. Latr.
Lochlinienkäfer.
longelytrata Goeze. Fh. n.
häufig.
68. Gattung. *Geodromicus*.
Redtenbach. Erdlinienk.

- plagiatus F. Fh. häufig.
69. Gattung. *Anthophagus*.
Gravenhorst. Blumenfr.
- bicornis* a. *nivalis* Rd. 1895
1 ♂.
- caraboides* L. Rd. häufig.
praeustus Müller. Fh. selt.
70. Gatt. *Deleaster*. Fabr.
Bockfallenlinienk.
dichrous Grav. Hopfensee.
Fh. hfg; an lauen Sommerabend. im Garten am Lampenschirm oft. gef.
71. Gatt. *Coprophilus*. Latr.
Kotliebhaber.
striatulus F. Rd. nicht hfg.
72. Gatt. *Trogophloeus*.
Mannerheim. Graslinienk.
dilatatus Er. Rd.
corticinus Grav. Fh.
rivularis Motsch. Fh. selt.
73. Gatt. *Haploerus*. Steph.
Geradhalslinienkäfer.
caelatus Grav. Fh.
74. Gatt. *Oxytellus*. Gravenhorst. Scharflinienk.
rugosus F. Rd. u. Fh. hfg.
insecatus Grav. Fh.
sculptus Grav. Fh.
sculpturatus Grav. Fh. hfg.
75. Gattung. *Platystethus*.
Mannh. Breitlinienkäfer.
avenarius Geoffr. Rd. hfg.
76. Gatt. *Bledius*. Mannh.
Wurflinienkäfer.
opacus Block. Fh. sehr selt.
fracticornis Payk. Rd. selt.
- dissimilis* Er. Fh. selten.
77. Gattung. *Oxyporus*. F.
Pilzlinienkäfer.
- rufus* L. Winterrieden in Pilzen häufig.
78. Gattung. *Stenus*. Latr.
Schmallinienkäfer.
- biguttatus* L. Rd. hfg.
bipunctatus Erichs. Rd. hfg.
guttula Müll. am Hopfensee sehr selten.
bimaculatus Gyllh. Fh. u. Rd. gemein.
Juno Payk. Fh.
ater Mannh. Fh. selten.
clavicornis Scp. Rd. zieml. s.
providus Er. Fh.
bupthalmus Gr. Am Hopfensee.
- nanus* Illg. Rd. selten.
humilis Er. Rd.
brunipes Steph. Rd.
tarsalis Ljemgh. Rd. hfg.
similis Herbst. Rd. hfg.
cicindeloides Schall. Rd. nicht selten.
pubescens Steph. Rd. n. selt.
binotatus Ljungh. Am Hopfensee sehr selten.
pallitarsus Steph. Rd. hfg.
bifoveolatus Gyll. Rd. s. selt.
79. Gattung. *Astenus*. Steph.
Rainlinienkäfer.
- filiformis* Latr. Rd. Sendenberg i. Frühj. b. Ameisen.
augustatus Payk. Im Frühjahr bei Ameisen.

80. Gatt. *Paederus*. F. Langlinienkäfer.
sanguinicollis Steph. Fh. hfg.
gemellus Kr. Rd. hfg.
litoralis Grav. Rd. u. Fh. hfg.
brevipennis Lacord. Fh. selt.
81. Gatt. *Stilicus*. Serville.
 Dünnhalslinienkäfer.
augustatus Geoffr. Fh.
rufipes Germ. Rd.
orbiculatus Payk. Fh.
82. Gatt. *Scopaeus*. Kraatz.
sulcicollis Steph. Fh. s. selt.
83. Gatt. *Medon*. Stephens.
melanocephalus F. Fh. s. slt.
84. Gatt. *Lathrobium*. Gravenh. Heimlichlebender.
multipunctatum Grav. Rd.
elongatum L. Rd. sehr selt.
geminum Kr. Fh.
fulvipenne Grav. Rd.
longulum Grav. Rd.
85. Gatt. *Cryptobium*. Mannerheim. Krummlinienk.
fracticorne Payk. Rd.
86. Gattung. *Xantholinus*. Serville. Gelbhaar.
punctulatus Payk. Rd.
augustatus Steph. Rd.
glabratus Grav. Fh. selten.
tricolor F. Rd. häufig.
linearis Oliv. Rd. und Fh.
 nicht selten.
linearis v. longiventris Heer.
 Rd. selten.
87. Gatt. *Nudobius* Thomson.
lentus Grav. Boos bei Fh.
88. Gatt. *Neobisnius*. Ganglb.
prolixus. Fh.
89. Gatt. *Philonthus*. Steph.
 Mistlinienkäfer.
splendens F. Rd. hfg.
laminatus Creutz. Rd.
laevicollis Lac. Fh.
nitidus F. Zwieselb., Fh. slt.
aeneus Rossi. Fh.
carbonarius Gyllh. Rd.
temporalis Rey. Rd.
atratus Grav. Rd.
rotundicollis Mén. Rd.
sordidus Grav. Rd.
fimetarius Grav. Boos.
marginatus Stroem. Rd.
fuscipennis Mannh. Rd.
varius Gyllh. Fh.
immundus Gyllh. Fh.
sanguinolentus Grav. Rd.
ventralis Grav. Rd. u. Fh.
quisquiliarius Gyllh. Fh.
longicornis Steph. Rd.
cruentatus Gmel. Rd.
varians Payk. Rd.
micans Grav. Rd.
fulvipes F. Rd.
tenuis F. Winterrieden.
vernalis Grav. Rd. u. Fh.
splendidulus Grav. Fh.
nigritulus Grav. Fh.
rubripennis Kiesw. Fh.
90. Gatt. *Staphylinus*. L.
 Raublinienkäfer.
pubescens Degeer. Rd.
fossor Scop. Füssen (Kalvariengb.) Altenstadt a. Ill. selt.

- fulvipes Scop. Rd., Altenstadt a. Iller sehr selten.
- caesarius Cederh. Rd. hfg., Fh. selten.
- erythropterus L. Rd. sehr selten.
- olens Müll. (*Ocyphus Kob.*) Rd. häufig, Fh. selten.
- ophthalmicus Scop. Winterrieden und Fh.
- similis F. Rd. häufig.
- fuscatus Grav. Rd. u. Fh.
- brunnipes F. Altenstadt a. I.
- picipennis F. Rd.
- aenocephalus Degeer. Rd.
- ater G. Fh. im Keller des hies. Schulhauses 1 Stck.
- globulifer Geoffr. Winterr.
91. Gattung. *Ontholestes*.
Ganglb. (*Leistotrophus Kr.*)
- tessellatus Geoffr. (*nebulosus F.*) Rd. und Fh.
- murinus L. Rd. und Fh.
92. Gatt. *Emus*. Curtis. Goldhaarlinienkäfer.
- hirtus L. Bei Altenstadt a. I. 1 Stück.
93. Gatt. *Creophilus*. Mannerh. Fleischliebhaber.
- maxillosus L. Rd. u. Fh. b. Aas oft häufig.
94. Gattung. *Quedius*. Steph. Mistfresser.
- ochripennis Mén. Boos.
- fulgidus F. Rd.
- mesomelinus Marsh. Rd.
- cinctus Payk. Rd. und Fh.
- fuliginosus Grav. Rd.
- boops Grav. Fh.
95. Gattung. *Heterothops*. Steph.
- dissimilis Grav. Fh. selten.
96. Gattung. *Mycetoporus*. Mannh. Mooslinienkäfer.
- brunnens Marsh. Rd. selten.
- longulus Mannh. Fh.
97. Gatt. *Bolitobius*. Leach. Schwammlinienkäfer.
- trinotatus Er. Rd. häufig.
- thoracius F. (*pygmaeus F.*) Rd. häufig.
- lunulatus L. Rd. häufig in Steinpilzen.
98. Gattung. *Bryocaris*. La-cordaire.
- analisis Payk. Rd. ziempl. selt.
99. Gatt. *Conosoma*. Kraatz. Kegelkieferlinienkäfer.
- littoreum L. Rd. und Fh.
100. Gattung. *Tachyporus*. Gravenh. Fluchtlinienk.
- chrysomelinus L. Rd. u. Fh.
- hypnorum F. Rd. und Fh.
- solutus Er. Fh.
- abdominalis F. Rd. selten.
- obtusus L. Rd. häufig.
101. Gatt. *Tachinus*. Grav. Flinklinienkäfer.
- flavipes F. Rd. häufig.
- rufipennis Grav. Altenstadt a. Iller selt. a. Fabrikkan.
- rufipes Deg. Rd. häufig.
- laticollis Grav. Rd. häufig.
- collaris Grav. Rd. häufig.

102. Gatt. *Oligota*. Mannh.
Kurzlinienkäfer.
flavicornis Lac. Fh. selten.
103. Gatt. *Leptusa*. Kraatz.
augusta Aubé. Fh.
104. Gattung. *Bolitochara*.
Mannh. Pilzlinienkäfer.
lunulata Payk. Rd. selten.
105. Gatt. *Autalia*. Mannh.
Zwerglinienkäfer.
rivularis Grav. Rd.
106. Gatt. *Falagria*. Mann.
Nachtlinienkäfer.
thoracica Curt. Rd. selten.
nigra Grav. Fh. selten.
obscura Grav. Fh. häufig.
107. Gatt. *Tachyusa*. Erichs.
Eillinienkäfer.
balteata Er. Rd.
108. Gatt. *Gnypeta*. Thomson.
carbonaria Mann. Fh.
109. Gattung. *Atheta*. Thom.
(*Homalota* Man.) Glattlaufk.
suclifrons Steph. Fh.
longicornis Grav. Fh.
110. Gatt. *Astilbus*. Steph.
canaliculatus F. Rd. hfg.
111. Gattung. *Phloeopora*. Er.
Rindenlinienkäfer.
sestacea Mannh. Fh.
112. Gatt. *Oxypoda*. Mannh.
Schmarotzlinienkäfer.
lividipennis Mannh. Rd.
opaca Grav. Rd. und Fh.
113. Gatt. *Aleochara*. Gra-
venhorst. Staublinienk.
curtula Goeze. Rd.
- crassicornis* Lac. Fh.
intricata Man. Fh.
lanuginosa Grav. Rd.
bilineata Gyllh. Rd.
bipustulata L. Rd.
- VII. Familie. **Pselaphidae.**
Sauley. Zwerkgäfer.
114. Gattung. *Brachygluta*.
Thoms.
fossulata Reichb. Fh.
115. Gatt. *Pselaphus*. Herbst.
Ameisenzwerkgäfer.
heisei Herbst. Fh.
- VIII. Familie. **Clavigeridae.**
Preysler. Keulenkäfer.
116. Gatt. *Claviger*. Preys-
ler. Ameisenkeulenkäfer.
testaceus Preysler. Fh.
- IX. Familie. **Scydmaenidae.**
Reitter. Tastkäfer.
117. Gattung. *Scydmaenus*.
Latr. Ameisentastkäfer.
tarsatus Müll. Fh.
- X. Familie **Silphidae.**
Reitter. Aaskäfer.
118. Gattung. *Choleva*. Latr.
Lahmaaskäfer.
cisteloides Fröl. Rd. und
Fh. häufig.
119. Gatt. *Catops*. Paykull.
Moderaaskäfer.
fumatus Spence. Rd.
fuscus Panz. Rd. im Keller
an Fässern.
alpinus Gyll. Rd.
morio F. Fh.

120. Gattung. *Ptomaphagus*. Illiger.
subvillosum Goeze. (*sericeus* Panz.) Winterrieden.
121. Gattung. *Necrophorus*. Fabricius. Scharraask. oder Totengräber.
humator Goeze. Fh.
interruptus Steph. Fh.
 „ *v. centrimaculatus* Rtt.
 Fh. 1 Stück.
investigator Zett. Boos.
vespilloides Hbst. Rd. u. Fh.
vespillo L. Rd.
122. Gatt. *Necrodes*. Leach.
 Leichenhaaskäfer.
littoralis L. Fh.
123. Gatt. *Thanatophilus*. Samouelle.
dispar Herbst. Fh.
sinuatus F. Rd.
rugosus L. Rd.
124. Gatt. *Oeceptoma*. Sam.
thoracicum L. Rd. u. Fh.
125. Gatt. *Blitophaga*. Reitt.
opaca L. Fh.
126. Gatt. *Xylodrepa*. Thoms.
4 punctata Schreber. Fh.
127. Gattung *Silpha*. L. Schabenaaaskäfer.
carinata Hbst. Rd.
obscura L. Rd. und Fh.
tristis Illg. Rd. und Fh.
tyrolensis v. nigrita Creutz.
 Auf d. Schlicker b. Füssen.
128. Gatt. *Ablattaria*. Reitter.
laevigata F. Rd.
129. Gatt. *Phosphuga*. Leach.
atrata L. Rd. und Fh.
- XI. Fam. **Liodidae**. Reitter.
 Feuchtkäfer. Schattenkäfer.
130. Gattung. *Liodes*. Latreille. Schattenfeuchtkäfer.
dubia Kug. Rd.
131. Gatt. *Cyrtusa*. Erichson.
 Krümmerin.
minuta Ahrens. Fh.
132. Gattung. *Amphicyllis*. Erichs. Umherwälzer.
globus v. ferrugineus St. Fh.
133. Gattung. *Agathidium*. Illiger. Rindenfeuchtkäfer.
nigripenne F. Illertissen.
seminulum L. Fh.
laevigatum Er. Fh.
- XII. Familie. **Corylophidae**. Reitter. Schildkäfer.
134. Gattung. *Corylophus*. Leach. Zwergschildkäfer.
cassidoides Marsh. Fh.
- XIII. Fam. **Trichopterygidae**. Flach. Haar- od. Federflügler.
 (Ptiliidae Reitter.)
135. Gatt. *Ptiliolum*. Flach.
 Flaumflügler.
 Kunzei Heer. Rd. Ehrwanger Viehweide aus trock.
 Kuhfladen geklopft.
136. Gatt. *Trichopteryx*. Kirby. Mistfederflügler.
grandicollis Mannh. Ehrwanger Viehweide.
atomaria Deg. Fh., kommt g. i. d. Häus., a. Fenst. gef.

- intermedia Gillm. Rd. u. Fh.
fascicularis Herbst, Fh.
sericans Heer. Rd.
- XIV. Familie. Scaphidiidae.**
Reitter. Nachen- od. Kahnk.
137. Gattung. *Scaphosoma*.
Leach, Fadenkahnkäfer.
assimile Er. Fh.
- XV. Familie. Histeridae.**
Schmidt. Stutzkäfer.
138. Gatt. *Platysoma*. Leach.
Rindenstutzkäfer.
compressum Hrbst. Mindel-
heim unt. morsch. Eichen-
rinde.
139. Gattung. *Cylistosoma*.
Lewis.
augustatum Hoffm. Rd.
140. Gattung. *Hister*. Linné.
Glanzstutzkäfer.
unicolor L. Ehrwanger Vieh-
weide in Kuhfladen hfg.

- terricola Germar. Ehrwang.
Viehweide i. Kuhflad. hfg.
merdarius Hoffm. Fh.
cadaverinus Hoffm. Rd.
funestus Er. Fh. nicht hfg.
bissexstriatus F. Rd.
purpurascens Hbst. Fh. selt.
carbonarius Hoffm. Fh.
v. 14 striatus Gyll. Rd.
bimaculatus L. Fh., b. Alten-
stadt a. Iller selten.
141. Gattung. *Dendrophilus*.
Leach. Baumstutzkäfer.
punctatus Herbst. Fh.
142. Gattung. *Gnathoncus*.
Erichson. Kieferbugst.
punctulatus Thoms. Rd. u.
Fh. ziemlich selten.
143. Gattung. *Saprinus*. Er.
Miststutzkäfer.
semistriatus Sevila. Vieh-
weiden b. Hopfen. Fh. n.
selten.

B. Palpicornia. Latr.

Kolben- oder Palpenhörner.

- XVI. Familie Hydrophilidae.**
Kolbenwasserkäfer.
144. Gatt. *Helephorus*. F.
Runzelwasserkäfer.
nubilis F. Fh. zieml. hfg.
aquaticus L. Rd. u. Fh.
granularis L. Fh.
viridicollis Steph. Rd.
145. Gatt. *Hydraena*. Ku-
gelann. Zwergwasserk.
riparia Kugelann. Fh. hfg.
146. Gatt. *Hydrobius*. Leach.
Schlammwasserk.
fuscipes L. Rd. und Fh.
147. Gattung. *Anacaena*.
Thomson.
limbata F. Fh.
148. Gatt. *Enochrus*. Thom.
melanocephalus Ol. Rd. selt.
149. Gatt. *Helochares*. Mul-
sant. Sumpfwasserkäfer.
griseus F. Rd. häufig.

150. Gattung. *Chaetarthria*.
 Steph. (*Cyllum Er.*)
 Lachenwasserkäfer.
seminulum. Fh. hfg.
151. Gatt. *Laccobius*. Erichs.
 Lachenwasserkäfer.
minutus L. Rd. u. Fh. gem.
scutellaris Motsch. Fh.
gracilis Motsch. Rd.
nigriceps Thom. Altenstadt
 a. Iller.
152. Gatt. *Limnebius*. Leach.
 Pflanzenwasserk.
truncatellus Thunbg. Fh.
153. Gattung. *Coelostoma*.
 Brulle. (*Cyclonotum Er.*)
 Kugelrückenwasserkäfer.
orbiculare F. Am Hopfen-
 see, Fh.
154. Gatt. *Hydrous*. Dahl.
 Riesenkolbenwasserkäf.
aterrimus. Rd.
155. Gattung *Sphaeridium*.
 F. Mistwasserkäfer.
- scarabaeoides L. Rd. und
 Fh. gemein.
bipustulatum F. Rd. u. Fh.
 gemein.
156. Gatt. *Cercyon*. Leach.
 Erd- oder Steinwasserk.
ustulatus Preys. A. Hopfens.
impressus St. Fh.
haemorrhoidalis F. Rd.
melanocephalus L. Rd. und
 Fh.
unipunctatus L. Rd. und
 Fh.
quisquilius L. Rd. u. Fh.
pygmaeus Illg. Rd.
nigriceps Marsh. Rd.
flavipes Thbg. Rd.
157. Gattung. *Megasternum*.
 Muls. Großbrustwasserk.
boletophagum Mars. Win-
 terrieden, Fh.
158. Gatt. *Cryptopleurum*.
 Muls. Punktschwimmk.
minutum F. Rd. u. Fh.

C. Cantharoidea.

- XVII. Familie. **Cantharidae**.
 Leach. Weichkäfer.
159. Gatt. *Homalisus*. Geof-
 froy. Flachweichk.
suturalis v. *monochlorus*.
 Torre. Rd. sehr selten.
160. Gatt. *Dictyopterus*.
 Latr. Blumenweichk.
aurora Herbst. Rd. nur 2
 Stück erbeutet.
rubens Gyllh. Rd. selten.

161. Gatt. *Pyropterus*. Muls.
affinus Payk. Rd. selten.
162. Gatt. *Platycis*. Thoms.
minuta F. Rd. sehr selten.
163. Gattung. *Lygistopterus*.
 Muls. Sommerweichk.
sanguineus L. Rd. u. Fh.
164. Gatt. *Lampyris*. Geoffroy.
 Leuchtweichk. Johannisw.
noctiluca L. Hopferwald,
 Fh. im Gries.

165. Gatt. *Phausis*. Leconte.
Johanniskäferchen, Glühwurm.
splendidola L. Rd. und Fh. gemein.
166. Gatt. *Podabrus*. Westwood. Buschweichkäfer.
alpinus Payk. Rd. häufig. Fh. und Eisenburgerwald selten.
167. Gatt. *Cantharis*. L. (Telephorus Deg.) Warzenträger od. Heckenweichkäfer.
abdominalis F. Rd.
„ v. *cyannipennis* Bach. Rd. nicht hfg.
violacea Payk. Füssen, Weißhaus, Straßen n. Tirol, selten!
fusca L. Rd., Fh. hfg.
rustica Fall. Rd., Fh. hfg.
tristis F. Rd.
obscura L. Rd., Fh.
albomarginata Märk. Fh.
nigricans Müll. Rd., Fh. hfg.
pellucida F. Rd.
livida L. Rd., Fh.
„ v. *rufipes* Herbst (*dispar* F) Rd., Fh.
figurata. Fh. selten.
4 punctata Müll. (*assimilis* Payk). Rd. u. Fh.
rufa L. Fh.
„ v. *liturata* Fall. Rd. u. Fh.
pallida Goeze (*bicolor* Pz.) Rd.
- fulvicollis* Redtb. (*bicolor* Herbst). Rd., Fh.
haemorrhoidalis F. Fh. selt.
168. Gatt. *Absidia*. Mulsant.
pilosa Payk. Rd. i. d. Lechauen 3 ♂.
169. Gattung. *Rhagonycha*. Eschscholtz. Hack.-, auch Hainweichk.
translucida Kryn. Rd.
fulva Scop. (*melanura* Oliv)
Rd. u. Fh. gemein.
limbata Thoms. Rd.
femoralis Brull. Rd.
lignosa Müll. Rd.
atra L. Fh. selten.
170. Gatt. *Malthinus*. Latreille. Kurzweichling.
biguttulus Payk. Rd.
flaveolus Payk. Rd.
171. Gattung. *Malthodes*. Kiesenwetter. Wachsweichkäfer.
marginatus Latr. Rd.
guttifer Kiesew. Fh.
minimus L. Fh.
dispar Germ. Rd.
maurus Cast. „
172. Gattung. *Drilus*. Olivier. Kammweichk.
concolor Arh. Altenstadt a. d. Iller selten.
173. Gatt. *Troglops*. Erichson. Lochdrüsenk.
albicans L. Rd. u. Fh. hfg., vielfach am Fenster des Wohnzimmers gesammelt.

174. Gattung. *Charopus*. Er.
Grasdrüsenk.
flavipes Payk. Fh. an
trockenen Abhängen.
175. Gatt. *Hypebaeus*. Kies.
flavipes F. Fh. wie voriger.
176. Gatt. *Ebaeus*. Erichson.
Kleindrüsenk.
flavicornis Erichs. Fh.
177. Gattung. *Axino tar s u s*.
Motschulsky. Axttarsen-
drüsenk.
ruficollis Oliv. Fh. selten.
178. Gatt. *Malachius*. Fabri-
cius. Warzendrüsenk.
aeneus L. Rd. u. Fh.
marginellus Olov. Rd.
bipustulatus L. Rd. u. Fh.
179. Gattung. *Anthocomus*.
Erichson. Blumendrüsenk.
bipunctatus Harrer (eque-
stris F.) Fh.
fasciatus L. Rd.
180. Gatt. *Dasytes*. Fabricius.
Haardrüsenk.
niger L. Rd.
obscurus Gyllh. Rd.
coeruleus Deg. Fh. selten.
plumbeus Müll. Fh. hfg.
fusculus Illg. Fh. hfg.
181. Gatt. *Haplo n emus*.
Steph. Einfachschiener.
nigricornis F. Fh.
- XVIII. Fam. **Cleridae**. Klug.
Rauchkäfer.
182. Gattung. *Opilo*. Latreille.
Holzrauchk.
- mollis* L. Rd. u. Fh.
183. Gatt. *Thanasimus*. Latr.
Ameisenrauchk.
formicarius L. Rd., Fh.
184. Gatt. *Trichodes*. Herbst.
Bienenrauchk.
apiarius L. Rd., Fh.
185. Gatt. *Corynetes*. Herbst.
Kolbenrauchk.
coeruleus Degeer. Fh. selt.
„ v. *ruficorus* St.
Rd. u. Fh. hfg.
- XIX. Fam. **Byturidae**. Latr.
Himbeerläufer.
186. Gattung. *Byturus*. Latr.
Himbeerlk.
fumatus F. Rd. u. Fh. gemein.
tomentosus F. Rd. u. Fh.
weniger hfg.
- XX. Fam. **Ostomidae**. Reitter.
Schimmerkäfer.
187. Gatt. *Nemosoma*. Latr.
Borkenschimmerk.
elongata L. Fh. nicht hfg.
188. Gatt. *Tenebrioides*.
Piller. (*Trogosita* Olivier)
Hausschimmerk.
mauritanicus L. Fh. nicht
selten.
- XXI. Fam. **Nitidulidae**. Erichs.
Schimmerk.
189. Gatt. *Cateretes*. Herbst
(*Cercus* Latr.) Frühschim-
merk.
pedicularius L. Rd. ziempl.
hfg.
190. Gatt. *Heterhelus*. Duv.

- scutellaris Heer. (sambuci Erichs.) Boos a. *Sambucus racemosus* hfg.
191. Gatt. *Brachypterus*. Kugelann. Blütenschimmerkäfer.
urticae. Rd. auf *Urtica dioica* sehr hfg.
192. Gatt. *Soronia* Erichson.
punctatissima Illg. Fh. unter Rinde selten.
grisea L. Fh. weniger selt.
193. Gatt. *Epuraea* Erichs.
 Saftschimmerk.
depressa Gyllh. Fh. zieml. hfg.
melina Er. Rd. selten auf Blüten.
terminalis Mannh. Fh. selten unter Rinde.
obsoleta F. Fh. am Baum- safte.
longula Er. Rd. selten.
florea Er. Fh. zieml. selten.
variegata Herbst. Fh. selt.
194. Gatt. *Omosita* Erichs.
 Moderschimmerk.
discoidea F. Fh. im trock. Miste nicht hfg.
195. Gatt. *Nitidula* F. Aasschimmerk.
bipunctata L. Hopfen u. Fh.
flavomaculata Rossi. Fh. selt.
196. Gattung. *Meligethes*. Steph. Honigschimmerk.
rufipes Gyllh. Rd. u. Fh. nicht selten.
- lumbaris* Sturm. Fh. nicht selten.
- coracinus* Sturm. Rd. auf Blüten hfg.
- aeneus* F. Rd. u. Fh. gemein.
viridescens F. Rd. zieml. hfg.
umbrosus Sturm. Fh. selten.
flavipes Sturm. Rd. zieml. selten.
197. Gatt. *Pocadius* Erichs. Pilzschimmerk.
ferrugineus F. Fh. u. Winter- rieden in Staubpilzen.
198. Gatt. *Cychramus* Kugel. Schwammschimmerk.
luteus F. Rd. u. Fh. hfg. auf Weißdorn.
199. Gatt. *Glyschrochilus*. Murray (*Ips* F.). Schlupf- schimmerkäfer.
pustulatus L. Rd. zieml. häufig.
200. Gattung. *Pityophagus*. Shuckard.
ferrugineus L. Rd. unter Fichtenrinde.
201. Gattung. *Rhizophagus*. Herbst. Wurzschimmerk.
grandis Gyllh. Rd. und Altenstadt a. I. je 1 Stück.
ferrugineus Payk. Rd. zieml. häufig.
nitidulus F. Altenstadt a. I. zieml. hfg.
bipustulatus F. Fh. nicht selt.
politus Hellw. Fh. u. Alten- stadt a. I. selten.

- dispar Payk. Altenstadt
a. I. sehr selten.
- XXII. Fam. Cucujidae.** Reitt.
Flachkäfer.
202. Gatt. Monotoma Herbst.
Einzelnchnittflachk.
picipes H. Rd. zieml. hfg.
203. Gatt. Silvanus Latreille.
Waldfachk.
fagi Guér (similis Er.) Fh.
selten.
204. Gatt. Laemophloeus.
Stephens. Bastflachk.
ferrugineus Steph. Fh. nicht
selten.
- XXIII. Fam. Cryptophagidae.**
Reitter. Schlupfkäfer.
205. Gatt. Telmatophilus.
Heer. Sumpfschlupfk.
caricis Oliv. Fh. nicht selt.
206. Gatt. Paramecosoma.
Curtis. Langleibschlupfk.
melanocephala Herbst. Fh.
im Geniste an der Iller.
207. Gatt. Cryptophagus.
Herbst. Verborgenfresser.
badius Strm. Fh. selten.
acutangulus Gyllh. Rd. in
altem Stroh.
208. Gatt. Atomaria Steph.
Zwergschlupfk.
fuscicollis Mannh. Fh. unter
abgefall. Laub.
mesomelaena Hbst. Fh. auf
Wiesen.
pusilla Payk. Fh. zieml. hfg.
fuscipes Gyllh. Fh.
209. Gattung. Ephistemus.
Steph. Aufseherschlupfk.
globulus Payk. Rd. nicht
selten.
- XXIV. Fam. Erotylidae.** Bed.
Rindenkäfer.
210. Gatt. Tritoma Fabric.
Dreischnittrindenk.
bipustulata F. Rd. an
Baumschwämmen.
- XXV. Fam. Phalacridae.**
Flach. Glanzk.
211. Gatt. Phalacrus Payk.
Kahlglanzk.
fimetarius F. Rd. u. Fh.
gemein.
212. Gatt. Olibrus Erichs.
Glattglanzk.
aeneus F. Fh. auf Kamille.
affinis Strm. Rd. a. Wiesen
häufig.
bicolor F. Eh. auf Wiesen
nicht selten.
- bimaculatus Küst. Fh. auf
Wiesen zieml. hfg.
213. Gatt. Stilbus Seidlitz.
Blumenglanzk.
testaceus Panz. Fh. nicht
selten.
- XXVI. Fam. Lathridiidae.**
Mannerheim. Saftk., auch
Heimlichnager.
214. Gatt. Lathridius Herbst.
Modersaftk.
angusticollis Gyllh. Rd.
selten.
215. Gatt. Enicmus Thoms.

- minutus L. Rd. u. Fh. gemein.
transversus Oliv. Rd. unt.
abgefall. Laub.
216. Gatt. *Cartoderes*. Thoms.
elongata Curtis. Fh. an
aufgehängter Wäsche.
217. Gattung. *Corticaria*.
Marsham. Rindensaftk.
pubescens Gyllh. Rd. u. Fh.
häufig.
serrata Payk. Rd. häufig.
elongata Gyllh. Fh.
218. Gatt. *Melanophthalma*.
Motschulsky.
fuscula v. *trifoveolata* Redtb.
Fh.
- XXVII. Fam. *Mycetophagidae*.** Reichenbach. Pilz-
fresser.
219. Gatt. *Litargus*. Erichs.
Flinkpilzk.
connexus Geoffr. (bisfas-
ciatus F.) Winterrieden.
220. Gatt. *Typhaea*. Curtis.
Rohrkolbenpilk.
stercoriarea L. (*fumata* L.)
Rd. u. Fh. in Wohnungen
und Scheuern.
- XXVIII. Fam. *Cisidae*.** Mellié.
Baumschwammk.
221. Gatt. *Cis*. Latr. Schwamm-
holzk.
comptus Gyllh. Fh. an
trockenem Holze.
boleti Scop. Fh. hfg.
hispidus Gyllh. Fh. hfg.
micans F. Fh.
- XXIX. Fam. ***Colydiidae***. Reitt.
Fadenk.
222. Gattung. *Cerylon*. Latr.
Splintfadenf.
histeroides F. Illertissen
an alten Stöcken.
ferrugineum Steph. Fh.
unter Rinde.
223. Gatt. *Ditoma*. Herbst.
Zweischnittfadenk.
crenata F. Altenstadt a. I.
- XXX. Fam. *Endomychidae*.**
Reitter. Pilzk.
224. Gatt. *Mycetaea*. Steph.
Stickpilzk.
hirta Marsh. Fh.
- XXXI. Fam. *Coccinellidae*.**
Muls. Kugelk., Marienk.
225. Gatt. *Subcoccinella*.
Huber. Kleekugelk.
24 punctata L. Rd. u. Fh.
hfg., besond. auf Kleefeld.
226. Gattung. *Hippodamia*.
Mulsant.
13 punctata L. Rd. häufig.
7 maculata Deg. Rd. auf
Sumpfwiesen.
227. Gattung. *Adonia*. Muls.
Adoniskäferchen.
variegata. Rd. zieml. hfg.
228. Gatt. *Anisosticta*. Du-
ponchel. Punktkugelk.
19 punctata L. Rd. auf
nassen Wiesen.
229. Gatt. *Aphidecta*. Weise.
obliterata L. Rd. hfg. auf
Kiefern.

230. Gatt. *Adalia*. Mulsant.
bipunctata L. Rd. u. Fh.
 " *a. interpunctata* Haw.
 Fh.
 " *a. 6 pustulata* L. Rd.
 " *a. 4 maculata* Scop. "
 231. Gatt. *Coccinella*. Linné.
 Blattlauskugelk., *Sonnen-*
 kälbchen, *Frauenk.*
 7 *punctata* L. Rd. u. Fh.
 5 " L. Rd. zieml.
 hfg., Fh. selten.
 hieroglyphica L. Rd. nicht
 selten.
 10 *punctata* L. (*variabilis* F.)
 Rd. häufig, besonders am
 Faulensee.
 10 *punctata* a. *bimaculata*
 Pont. Rd. hfg.
 punctata a. 10 *pustulata* L.
 Rd. hfg.
 " *a. austriaca* Schrank.
 Rd. hfg.
 " *a. nigrina* Weise.
 Fh. hfg.
 conglobata. Rd.
 232. Gatt. *Mysia*. Mulsant.
 Stinkkugelk.
 oblongoguttata L. Rd.,
 Altenstadt a. I.
 233. Gattung. *Anatis*. Muls.
 Unschuldkugelk.
 ocellata L. Rd., Altenstadt,
 auf Weißdornblüten.
 234. Gatt. *Halyzia*. Muls.
 Pikanter Kugelk.
 sedecimguttata L. Rd.
235. Gattung. *Vibidia*. Muls.
 Schwielenkugelk.
 12 *guttata* Poda. Rd.
 236. Gatt. *Thea*. Muls. Schau-
 kugelk.
 22 *punctata* L. Rd. u. Fh.
 nicht selten.
 237. Gattung. *Calvia*. Muls.
 Kahlkugelk.
 10 *guttata* L. Rd. sehr selt.
 14 *guttata* L. Rd. zieml.
 häufig.
 238. Gattung. *Sospita*. Muls.
 Retterkugelk.
 20 *guttata* L. Rd. sehr selt.
 239. Gatt. *Propylaea*. Muls.
 14 *punctata* L. Rd. selten.
 240. Gatt. *Chilocorus*. Leach.
 Baumkugelk.
 renipustulatus Scriba. Rd.
 häufig.
 bipustulatus L. Fh. hfg.
 an Weidenstämmen.
 241. Gatt. *Exochomus*. Redtb.
 Dammkugelk.
 4 *pustulatus* L. Rd.
 " *v. distinctus* Brull. Fh.
 1 Stück.
 242. Gatt. *Platynaspis*. Rdtb.
 Breitschildk.
 luteorubra Goeze. Bei Ulm.
 243. Gattung. *Pollus*. Muls.
 ferrugatus Moll. (*Scymnus*
 analisis F.) Rd.
 suturalis Thunb. (*Scymnus*
 discoideus Schneid.) Fh.
 sehr selten.

244. Gatt. *Scymnus*. Kugelann.
Laubkugelk.
frontalis F. Fh. nicht hfg.
rubromaculatus Goeze (pyg-
maeus Fouc.) Rd. n. selt.
245. Gattung. *Nephus*. Muls.
Kleinkugelk.
maculatus Hbst. Fh. im
Herbst unter Baumrinde
nicht selten.
Redtenbacheri Muls. Rd.
sehr selten.
246. Gatt. *Stethorus*. Weise.
punctillum Weise. Rd. sehr
selten.
247. Gattung. *Coccidula*.
Kugelann. Sumpfkugel-
käfer.
scutellata Hbst. Baben-
hausen auf nassen Wiesen
an der Günz.
rufa Hbst. Rd. hfg. auf
Moorwiesen.

D. Dascilloidea.

- XXXII. Fam. **Helodidae.** Klimmkäfer.
248. Gatt. *Helodes*. Latreille.
Zweckenklimmk.
minuta L. Rd. auf Weiden
hfg.
249. Gattung. *Cyphon*. Payk.
Laub- oder Jochklimmk.
variabilis Thunbg. Rd. hfg.
padi L. Rd. hfg.
coarctatus Payk. Rd. hfg.
250. Gatt. *Hydrocyphon*.
Redtb. Wasserklimmk.
deflexicollis Müll. Rd. hfg.
251. Gatt. *Eubria*. Latreille.
palustris Germ. Rd. hfg.
- XXXIII. Fam. **Dryopidae.**
Kuwert. (Parnidae).
Flußkäfer od. auch Schlamm-
käfer.
252. Gatt. *Dryops*. Olivier.
(*Parnus* F.) Klauenflüßk.
striatopunctatus Heer. Fh.
viennensis Heer. Fh.
253. Gattung. *Riolus*. Muls.
cupreus Müller. Fh. hfg.
- XXXIV. Fam. **Georyssidae.**
Fugenkäfer.
254. Gatt. *Georyssus*. Latr.
Erdaufreißer.
substriatus Heer. Rd. auf
Lechsand.
- XXXV. Fam. **Dermestidae.**
Reitt. Speckk.
255. Gattung. *Dermestes*. L.
Hausspeckk., Fellfresser.
Frischi Kugel. Fh. am Aase.
murinus L. Hopfen.
bicolor F. Fh.
lardarius L. Rd. u. Fh.
256. Gattung. *Attagenus*.
Latreille. Schabspeckk.
piceus Oliv. Rd. u. Fh.
häufig.
piceus v. *megatoma* F. Rd.
pellio L. Rd. u. Fh. ziempl.
häufig.
punctatus Scop. Fh. selten.

257. Gattung. *Megatoma*. Samouelle. Holzspeckt.
undata L. Rd. nicht hfg.
258. Gattung. *Trogoderma*. Lartr. Hautzernager.
nigrum Herbst. Rd. selten.
Fh. selten.
259. Gattung. *Anthrenus*. Fabricius. Blumenspeckk.
pimpinellae F. Fh. selten.
scrophulariae L. Rd.
museorum L. Rd. u. Fh.
häufig; seine Larven sind
den Insektsammlungen
sehr schädlich.
fuscus Oliv. (claviger
Erichs.) Rd. nicht häufig.
260. Gatt. *Trinodes*. Latr.
Wandspeckk.
hirtus F. Fh. im ehemal.
isr. Schulhause hfg.
- XXXVI. Fam. *Byrrhidae*.**
Reitter. Pillen- oder Rund-
käfer.
261. Gattung. *Simplocaria*. Marsham. Lockenpillenk.
semistriata Forst. Fh. selten.
262. Gattung. *Morychus*. Er. Beschmiert. Pillenk.
aeneus F. Fh. hfg.
263. Gattung. *Pedilophorus*. Steffahny.
nitidus Schall. Fh.
264. Gattung. *Cytillus*. Erich-
son. Moderpillenk.
sericeus Forst. (varius F.)
Rd. hfg.
265. Gatt. *Byrrhus*. Linné.
Pillenk.
fasciatus Forst. Fh. zieml.
selten.
arietus Steff. Fh. zieml.
selten.
pilula L. Fh. u. Rd. gemein.
pustulatus Forst. Rd. selten.
luniger Germ. Rd. selten.
glabratus Heer. Tegelberg
bei Füssen.
signatus Panz. Säuling bei
Füssen.
- XXXVII. Fam. *Dascillidae*.**
Tourn. Zottenk.
266. Gatt. *Dascillus*. Latr.
(*Atopa* Payk.) w. o.
cervinus L. Rd., Mkt. Ober-
dorf, Illereichen.
- XXXVIII. Fam. *Elateridae*.**
Candèz. Schnellk., Schmiede.
267. Gattung. *Brachylacon*.
Motschulsky. Mausschnell.
murinus L. Rd. u. Fh. gemein.
268. Gattung. *Corymbites*.
Latreille. Scheitel-, auch
Spitzfleckschnellk.
pectinicornis L. Rd. zieml.
hfg. auf Wiesen um Füssen.
cupreus F. Rd. häufig.
cupreus v. aeruginosus F. Rd.
purpureus Poda (haema-
todes F.) Rd. u. Fh.
tesselatus L. Rd. u. Fh. hfg.
269. Gatt. *Selatosomus*. Stph.
(*Diacanthus* Latr.), Breit-,
auch Zweidornschnell.

- aeneus L. Rd. selten, Fh. häufig.
- aeneus a. germanus L., Rd. häufig.
- aeneus a. coeruleus Schilsky. Rd. sehr selten.
- cruciatus L. Fh. ziemlich selten.
- affinis Payk. Rd. sehr selt.
270. Gatt. Prosternon. Latreille, holosericeus Ol. Rd. u. Fh. hfg.
271. Gatt. Sericus. Eschsch. Sericosomus Redtb. Bergschnellk.
- brunneus L. Rd. zieml. selten.
- ” v. tibialis Redtb. Rd. selten.
- subaeneus Redtenbch. Rd. sehr selten.
272. Gatt. Dolopius. Eschsch. Wiesenschnellk.
- marginatus L. Rd. u. Fh. häufig.
273. Gatt. Agriotes. Eschsch. Ackerschnellk.
- ustulatus Schall. Rd. u. Boos häufig.
- ustulatus v. flavigornis Panz. Rd. u. Fh. selten.
- lineatus L. Rd. u. Fh. häufig.
- obscurus L. Rd. u. Fh. gemein.
274. Gatt. Synaptus. Eschsch. Blumenschnellk.
- filiformis F. Rd. sehr häufig, Fh. häufig.
275. Gatt. Adrastus. Eschsch. Erdschnellk.
- limbatus F. Rd. u. Fh. häufig.
- pallens Erichs. Rd. u. Fh.
- montanus Scopoli. Rd. selt.
276. Gatt. Cryptohypnus. Eschsch. Sandschnellk.
- riparius F. Rd. ziemlich selten.
277. Gattung. Hypnoidus. Stephens. Steinschnell.
- dermestoides Herbst. Fh. auf Illersand hfg.
- dermestoides v. tetraphagus Germ. Rd. zieml. selten.
- meridionalis Lap. (lapidicola Germ.) Fh. hfg.
278. Gatt. Cardiophorus. Eschsch. Herzschnellk.
- atramentarius Erichs. Fh. auf Sanddorn sehr selt.
- cinereus Herbst. Fh. nicht selten.
279. Gattung. Melanotus. Eschsch. Schwarzrückenschneller.
- rufipes Herbst. Rd. u. Fh.
- punctolineatus Pelerin (niger F.). Fh. selten.
280. Gatt. Elater. Linné. Feuerschnellk.
- pomonae Step. Rd. selten.
- sanguinolentus Schrank. Rd. u. Fh. ziemlich hfg.
- ferrugatus Lac. Rd. zieml. selten.

- elongatus F. Rd. 1 Expl.
balteatus L. Rd. u. Fh.
zieml. häufig.
- nigroflavus Goeze (crocatus
Lap.). 2 St. auf d. Höhen
bei Hopfen.
- erythrogonus Müll. Rd.
2 Expl.
- tristis L. Rd. (Im Bachthal
bei Ussenburg 2 Expl.)
- aethiops Lac. (scrofa Ger-
mar). Rd. 1 Expl.
281. Gatt. *Limonius*. Eschsch.
Grasschnellk.
- pilosus Leske (nigripes
Gyllh.) Rd. selten.
- aeruginosus Oliv. (cylindri-
cus Payk.). Rd. u. Fh. hfg.
- minutus L. Rd. u. Fh. hfg.
- parvulus Panz. Fh. selten.
282. Gatt. *Pheletes*. Kiesen-
wetter. Betrüger.
- quercus Ol. (lythodes Germ.)
Rd. nicht selten.
283. Gatt. *Athous*. Eschsch.
Blütenschnellk.
- hirtus Herbst. Rd. u. Fh.
sehr häufig.
- niger L. Rd. sehr hfg.
- vittatus Fabr. Rd. u. Fh.
sehr hfg.
- haemorrhoidalis F. Rd. u.
Fh. gemein.
- subfuscus Müll. Rd. u. Fh.
nicht selten.
- Zebei Bach. Rd. manches
Jahr einzelne Stücke.
284. Gatt. *Denticollis*. Piller
(*Campylus* Fisch.), Erlen-
schnellk.
- linearis L. Rd. nicht hfg.
Fh. gemein.
- XXXIX. Fam. **Eucnemidae.**
Bonvouloir = *Trixagidae*
Reitter. Sägek.
285. Gatt. *Trixagus*. Kugelann.
(*Throscus* Latr.) Blattsägek.
- dermestoides L. Rd. u. Fh.
häufig.
- XL. Fam. **Buprestidae.**
Marseul. Prachtkäfer.
286. Gatt. *Poecilonota*. Esch-
scholtz (*Lampra* Meg.)
Laubprachtk.
- rutilans F. Rd. manches
Jahr auf jungen Erlen
nicht selten.
287. Gatt. *Buprestis*. Linné.
(*Ancylochira* Eschsch.)
Holzprachtk.
- rustica L. Rd. u. Fh. nicht
selten.
288. Gatt. *Anthaxia*. Eschsch.
Blumenprachtk.
- nitidula L. Rd. hfg.
- 4 punctata L. Rd. u. Fh.
sehr hfg.
289. Gatt. *Agrius*. Curtis.
Gesträuchprachtk.
- viridis L. Rd. zieml. selten.
- „ a. linearis F. Rd.
- „ a. nocivus Ratzbg. Fh.
- „ a. fagi „ „
- betuleti Ratzbg. Rd. selten.

- integerrimus Ratzbg. Rd.
zieml. selten.
290. Gatt. *Trachys*. Fabricius.
Haselprachtkk.
minuta. Mindelheim u. Fh.
zieml. selten.
- XLI. Fam. **Lymexylidae**.
Walzenk., Holzbohrer.
291. Gatt. *Hylecoetus*. Latr.
Waldwalzenk.
dermestoides L. Rd. u. Fh.
nicht selten.
- XLII. Fam. **Lyctidae**. Reitter.
Splintk.
292. Gatt. **Lyctus**. F. w. oben.
linearis Goeze (*canaliculatus* F.) Fh. zieml. selt.
- XLIII. Fam. **Ptinidae**. Reitter.
Hausk., Holzbohrer.
293. Gatt. *Niptus*. Boieldieu.
hololeucus Falderm. Fh.
ziemlich häufig (im Parame-
tentenschrank d. Schloß-
kapelle u. i. Schulhause).
294. Gatt. *Ptinus* L. Bohrhausk.
fur L. Rd. u. Fh. gemein.
brunneus Duft. Rd. nicht
selten.
- raptor Sturm. Rd. nicht selt.
XLIV. Fam. **Anobiidae**. Kie-
senwetter. Holzk.
295. Gatt. *Hedobia*. Sturm.
Thronholzk.
imperialis L. Fh. selten.
296. Gatt. *Ernobius*. Thoms.
Asthholzk.
abietinus Gyllh. Rd. u.
Altenstadt a. I.
mollis L. Rd. nicht selten.
297. Gatt. *Anobium*. Fabr.
Pochholzk.
pertinax L. Rd. u. Fh. zieml.
häufig.
striatum Oliv. Rd. u. Fh.
in Balk., Möb. etc. gemein.
rufipes F. Fh. nicht selten.
298. Gatt. *Sitodrepa*. Thoms.
panicea L. Fh. in Speise-
kammern.
299. Gatt. *Ptilinus*. Geoffroy.
Federhornholzk.
pectinicornis L. Fh. zieml.
selten.
300. Gattung. *Xyletinus*.
Latreille. Bohrholzk.
ater Panz. Fh. nicht hfg.

E. Heteromera.

- XLV. Fam. **Oedemeridae**.
Schmidt Linnaea.
Schmalk., Scheinböcke.
301. Gatt. *Calopus*. Fabr.
Bergschmalk.
serraticornis L. Fh. selten.
302. Gatt. *Anoncodes*. Du-
ponchel. Sonnenschmalk.,
Schmalbauch.
- rufiventris Scop. Rd., Fh.
nicht selten.
- rufiventris v. ♀ *limbicollis*
Reitter. Fh. selten.
- ustulata* F. Fh. zieml. selt.
303. Gatt. *Phymatodes*.
Latreille. Bohrholzk.
fuscipennis L. Fh. selten.

- fulvicollis Scop. Rd. zieml.
selten.
- adusta Panz. Fh. nicht selt.
303. Gattung. *Chrysanthia*.
Schmidt. Goldschmalk.
- viridissima* L. Rd. u. Fh.
häufig.
- viridis* Schmidt. Rd. u. Fh.
weniger hfg.
304. Gatt. *Oedemera*. Olivier.
Dickschenkel, auch Heide-
schmalk.
- flavipes* F. bei Blaubeuren
gesammelt.
- subulata*. Wie voriger.
- flavescens* L. Rd. u. Fh. gem.
- virescens* L. R. u. Fh. ge-
mein.
- lurida* Marsh. Rd. sehr selt.
- XLVI. Fam. **Pythidae**. Schein-
rüßler oder Schnauzenk.
305. Gatt. *Pytho*. F. Flach-
scheinrüßler.
- depressus* L. Fh. sehr selten.
306. Gatt. *Rhinosimus*. La-
treille. Hainschnauzenk.
- ruficollis* L. Rd. selten.
- planirostris* F. Fh. selten.
- XLVII. Fam. **Pyrochroidae**.
Feuerkäfer.
307. Gatt. *Pyrochroa*. Geoffr.
Kammfeuerk.
- serraticornis* Scop. (*rubens*
F.) Fh. sehr häufig; auch
aus in morsch. Zwetsch-
genbaum gefund. Larven
gezogen.
- pectinicornis* L. Fh. sehr
selten.
- XLVIII. Fam. **Anthicidae**.
Schmidt. Blumenk.
308. Gatt. *Anticus*. Payk.
Schirmblumenk.
- humilis* Germ. Rd. nicht hfg.
- floralis* L. Rd. selt. Fh. 1 St.
- hispidus* Rossi. Rd. zieml. slt.
- formicarius*. Fh. selten.
- XLIX. Fam. **Meloidae**. Reiz-
käfer.
309. Gatt. *Meloë*. Linné. Öl-
reizk., Maiwurm.
- proscarabaeus* L. Rd. u. Fh.
nicht selten.
- violaceus* Marsh. Hopfen,
selten.
- scabriusculus* Brdt. Rd.
zieml. selten.
310. Gatt. *Lytta*. Fabr. Blasen-
reizk., Pflasterk.
- vesicatoria* L., bei Waischen-
feld i. d. fränk. Schweiz
gefäng., im Gebiete nicht
beobachtet.
- L. Fam. **Rhipiphoridae**. Ger-
stäcker. Fächerfühlerk.
311. Gatt. *Meteoculus*. Gerst.
(*Rhipiphorus* F.) w. o.
- paradoxus* L. Altenstadt
a. Iller. (Von Herrn Alt
gefunden).
- LI. Fam. **Mordellidae**. Spring-
käfer.
312. Gattung. *Mordella*. L.
Stachelspringk.

- maculosa Naezen Act. Rd.
u. Fh. nicht selten.
- fasciata F. Rd. u. Fh. hfg.
- aculeata L. Rd. u. Fh. hfg.
313. Gatt. *Mordellisten a.*
Costa.
- abdominalis F. Rd. u. Fh.
zieml. selten.
- humeralis L. Rd. zieml. selt.
- pumila Gyllh. F. nicht selt.
314. Gatt. *Anaspis*. Geoffroy.
Afterspringk.
- frontalis L. Rd. häufig.
- thoracica L. Rd. nicht hfg.
- rufilabris Gyllh. Rd. zieml.
selten.
- LII. Fam. **Melandryidae.**
Seidlitz. Schwarz- auch
Braunk., Düsterk.
315. Gatt. *Melandrya*. Fabr.
Holzbraunk.
- caraboides L. Fh. nicht hfg.
316. Gattung. *Hypulus*. Payk.
Schlupfdüsterk.
- quercinus Quens. bei Alten-
stadt a. Iller.
- LIII. Fam. **Lagriidae**. Wollk.
317. Gatt. *Lagria* F. Busch-
wollk.
- hirta L. Rd. u. Fh. hfg.
- LIV. Fam. **Alleculidae**. Seidlitz.
Auch Cistelidae. Fadenk.
318. Gatt. *Gonodera*. Muls.
- (Cistela Geof.) Pflanzen-
fadenk.
- murina L. Fh. nicht selt.
- murina a. thoracica F. Fh.
nicht selten.
319. Gatt. *Cteniopus*. Solier.
Blütenfadenk.
- sulphureus L. Bei Blau-
beuren gesammelt, im
Gebiet nicht beobachtet.
- LV. Fam. **Tenebrioidae.**
Kraatz. Schattenk. -
320. Gattung. *Blaps*. Fabr.
Trauerschattenk.
- lethifera Marsh. (similis
Latr.) Fh. u. Winterried.
in Kellern nicht selten.
321. Gatt. *Opatrum*. Fabr.
Staubschattenk.
- sabulosum L. Fh. nicht hfg.
322. Gattung. *Scaphidema*.
Redtb. Nachenschattenk.
- v. bicolor F. Fh. zieml.
selten.
323. Gattung. *Hypophloeus*.
Fabr. Rindenschattenk.
- unicolor Piller. Bei Alten-
stadt a. I.
324. Gatt. *Tenebrio*. Linné.
Hausschattenkäfer.
Mehlwurm.
- molitor L. Rd., Fh., insbes.
bei Bäckern gemein.

F. Phytophaga.

- LVI. Fam. **Cerambycidae**.
Ganglbauer. Bockkäfer.
325. Gattung. *Spondylis*. F.
Waldbock.

- buprestoides L. Rd., Fh. selten.
326. Gatt. *Prionus*. Geoffroy. Forstbock, Sägebock.
- coriarius* L. Rd. hfg.
327. Gatt. *Rhagium*. Fabr. Schrotbock.
- sycophanta* Schrank. Fh., Winterrieden nicht hfg.
- mordax* Deg. Rd., Fh. hfg.
- bifasciatum* F. Fh. nicht häufig.
- inquisitor* L. Rd. nicht hfg.
328. Gatt. *Oxymirus*. Muls. Schulterbock.
- cursor* L. Rd., Boos nicht häufig.
329. Gattung. *Stenochorus*. Fabr. (*Toxotus* Serville) Blumenbock.
- meridianus* Panz. Rd., Fh. sehr hfg.
330. Gatt. *Pachyta*. Steph. Vierfleckbock.
- quadrimaculata*. Rd., Fh., Boos nicht selten.
331. Gatt. *Evodius*. Leconte. Fleckenbock. (*Pachyta* Muls.) Feistbock.
- clathratus* F. Auf der roten Wand bei Füssen zu weilen häufig.
- clathratus* F. a. *nigritus* Pic. w. v.
332. Gatt. *Acmaeops*. Leconte. Kugelhalsbock.
- collaris* L. Rd., Fh. hfg.
333. Gatt. *Gaurote*. Leconte. Blaubock.
- virginea* L. Rd., Fh. nicht selten.
334. Gatt. *Pidonia*. Mulsant. Schnürhalsbock.
- lurida* F. Rd., Füssen rote Wand, Fh. zieml. hfg.
335. Gattung. *Leptura*. L. Schmalbock, Halsbock.
- livida* F. Rd. selten.
- maculicornis* Deg. Rd., Fh. häufig.
- rubra* L. Rd., Fh. gemein.
- sanguinolenta* L. Rd. zieml. häufig.
- dubia* Scopoli. Rd. zieml. häufig.
- cerambiciformis* Schrank. (8 *maculata* Fabr.) Rd., Fh. hfg.
336. Gatt. *Strangalia*. Serville. Schmalbock.
- 4 fasciata* L. Fh. selten.
- aethiops* Poda (*atra* Laich). Fh. manches Jahr nicht selten.
- melanura* L. Rd. u. Fh.
- nigra* L. Rd. selten.
- attenuata* L. Rd. selten.
337. Gatt. *Alosterna*. Muls. *tabacicolor* Deg. (*laevis* F.) Rd. u. Fh. häufig.
338. Gatt. *Grammoptera*. Serville. Blütenbock.
- ruficornis* F. Rd. nicht selten.

339. Gattung. *Caenoptera*.
Thoms. Kurzdeckenbock,
auch Fliegenbock.
minor L. Rd., rote Wand
bei Füssen, Fh. hfg.
umbellatarum Schreb., wie
voriger, aber selten.
340. Gatt. *Obrium*. Curtis.
Zwergbock.
brunneum L. Rd., Markt
Oberdorf, Ottobeuren selt.
341. Gatt. *Gracilia*. Serville.
Schlankbock.
minuta F. (*pygmaea* F.)
Markt Oberdorf, Altenstadt
a. I. sehr selten.
342. Gattung. *Criocephalus*.
Muls. Widderbock, auch
Halsgrubenbock.
rusticus L. Rd., Fh. selten.
343. Gatt. *Asemum*. Eschsch.
Düsterbock.
striatum L. Rd. zieml. selt.
„ v. *agreste* F. Rd.
selten.
344. Gatt. *Tetropium*. Kirby
(*Isarthron* Redtenbach.).
Sommerbock, Gleichglied-
hornbock.
castaneum L. Rd. selten.
„ v. *luridum* L. Rd. u.
Fh. selten.
„ v. *aulicum* F. Rd.
nicht selten.
„ v. *fulcratum* F. Rd.
nicht selten.
fuscum F. Rd. selten.
345. Gatt. *Phymatodes*. Mls.
Baumbock.
testaceus L. Rd., Fh.
manchmal häufig.
testaceus a. *variabilis* L.
Rd., Fh. manchmal hfg.
testaceus a. *praeustus* F.
Fh. selten.
346. Gatt. *Callidium*. Fabr.
Scheibenbock.
aeneum Deg. (*dilatum*
Payk.) Rd., Fh. selten.
violaceum L. Rd. u. Fh.
gemein.
347. Gatt. *Hylotrupes*. Ser-
ville. Hausbock, Bohrbock.
bajulus L. Rd. u. Fh. hfg.
Ich beobachtete einige
Exemplare b. Ausschlüpf.
aus einem Sims (Fenster-
brett) des hiesigen Schul-
hauses, der schon einige
Jahre angebracht war, ein
Beweis, daß die Tiere zur
Entwicklung mehr. Jahre
benötigen. Das Brett
mußte später, weil völlig
zerfressen, erneuert wer-
den. In Länge sehr ver-
änderlich (10 bis 20 mm).
348. Gatt. *Aroma*. Serville.
Moschusbock.
moschata L. Rd. u. Fh.
manches Jahr häufig.
349. Gatt. *Xylotrechus*.
Chevrolat.
antilope Zetterst. Rd. selten.

350. Gatt. *Clytus*. Laichartg.
Zierbock.
arietes L. Rd. u. Fh. nicht selten.
rhamni Germ. Rd. u. Fh. selt.
351. Gatt. *Anaglytus*. Muls.
Zierbock.
mysticus L. Rd. selten.
352. Gatt. *Lamia*. Fabricius.
Weberbock.
textor L. Rd. nicht selten;
Fh. häufig.
353. Gatt. *Monochamus*.
Curtis. Langhornbock.
sartor F. Bei Füssen sehr selten.
sutor L. Rd. in 10 Jahren 2 mal beobachtet u. da in mehr. Exempl. beisammen.
354. Gatt. *Acanthoderes*.
Serville. Dornbock.
clavipes Schrank. Hopfen sehr selten.
355. Gatt. *Acanthocinus*.
Steph. (*Astynomus* Deg.) Zimmerbock.
aedilis L. Rd., Altenstadt nicht selten.
356. Gatt. *Liopus*. Serville.
Glattbock.
nebulosus L. Fh., Altenstadt zieml. selten.
357. Gatt. *Pogonochaerus*.
Gemminger. Wimperbock.
hispidus L. Rd. u. Fh. hfg.
fasciculatus Deg. Rd. selt. als der vorige.
358. Gatt. *Agapanthia*. Serv.
Scheckhornbock.
villosoviridescens Deg. (an-gusticollis Gyllh.). Rd. u. Fh. sehr hfg. auf Weiden und Disteln.
359. Gatt. *Saperda*. Fabr.
Pappelbock.
carcharias L. Fh. zieml. selten.
populnea L. Rd. u. Fh. hfg.
scalaris L. Hopfen, Boos, Altenstadt a. I. -
360. Gatt. *Tetrops*. Steph.
Augenbock.
praeusta L. Rd. u. Fh. hfg.
361. Gatt. *Stenostola*. Muls.
Zitterbock.
nigripes. Rd., Fh. nicht selten.
362. Gatt. *Phytoecia*. Muls.
Pflanzenbock.
cylindrica L. Fh. nicht selten.
coeruleascens Scop. (virescenz F.) Fh. nicht hfg.
coeruleascens a. *obscura* Bris. Fh. selten.
363. Gatt. *Oberea*. Mulsant.
Linienbock.
pupillata Gyllh. Rd. u. Fh. auf *Lonicera* selten.
oculata L. Rd. u. Fh. auf *Salix incana* oft hfg.
linearis L. Rd. auf *Corylus avellana* auf dem Sendenberg sehr selten.

LVII. Fam. Chrysomelidae.

Blattkäfer.

364. Gatt. Donacia. Fabr.

Rohrkäfer.

crassipes F. Schwansee
bei Hohenschwangau hfg.*clavipes* F. Rd. hfg.*aquatica* L. (*vittata* Oliv.)

Rd. nicht selten.

vulgaris Zschach. (*typhae*
Ahr.) Rd. nicht selten.*simplex* F. (*linearis* Hoppe).

Rd., Fh. zieml. hfg.

365. Gattung. Plateumaris.

Thomson.

sericea a. *micans* Panzer.

Rd. u. Fh. hfg.

sericea a. *armata* Pak. Fh.
häufig.*sericea* a. *nymphaeae* F. Fh.
sehr selten.*consimilis* Schr. (*discolor*
Hoppe). Rd. sehr selten.*rustica* Kunze. Rd. nicht selt.**366. Gatt. Orsodacne. Latr.**

Keimbeisser.

cerasi L. Rd. zieml. selt." a. *lineola* Lac. Rd.
sehr selten." a. *limbata* Ol. Alten-
stadt a. I. sehr selt." a. *Duftschmidi* Weis.
wie voriger.**367. Gatt. Zeugophora. Kunz,**

Jochblattkäfer.

subspinosa F. Fh. sehr selt.*flavicollis* Marsh. Rd. hfg.**368. Gatt. Lema. Lacordaire.**

Blatthähnchen.

puncticollis Cart. Fh. nicht
selten.*Erichsoni* Suffr. Fh. sehr
selten.*cyanella* L. Rd. u. Fh.
häufig.*melanopus* L. Rd. hfg.**369. Gatt. Crioceris. Geoffr.**Spargelk., Lilienhähnch.
lili Scop. (*merdigera* F.)Rd., Fh. auf Lilien zieml.
häufig.*merdigera* L. (*brunea* F.)
Rd., Fh. wie voriger.*asparagi* L. Fh. auf Spargel-
pflanzen zieml. häufig.**370. Gatt. Labidostomis.**Redtenbach. Sägeblattk.
tridentata L. Rd. auf Berg-
wiesen nicht hfg.*longimana* L. Rd. selten.**371. Gatt. Clytra. Laichart.**
Sägehorn.*quadripunctata* L. Rd. u. Fh.
laevinscula Ratzebg. Fh.

ziemlich häufig.

372. Gatt. Gynandrophtalma. Lacordaire. (Cyaniris Chevrol.)
Haldenblatt-
käfer.*cyanea* L. Rd., Fh. hfg.*flavicollis* Charp. Fh. selt.*affinis* Hellw. Rd. hfg.*xanthaspis* Germ. Rd. nicht
selten.

373. Gatt. *Coptocephala*.
Chevrolat. Stutzkopf.
rubicunda Laich. Rd. hfg.

374. Gatt. *Cryptocephalus*.
Geoffroy. Fallblattk.
sericeus L. Rd. häufig.
„ a. *pratorum* Suffr.
Rd. zieml. selten.
aureolus Suffr. Rd. zieml.
selten.
cristula Duft. Fh. hfg.
violaceus Laich. Rd. hfg.
nitidus L. Rd. hfg.
coryli L. Rd. zieml. hfg.
corylia *dorsosignatus* Reitt.
Rd. selten.
variegatus F. Rd. nicht selt.
octopunctatus Scop. Rd.,
Fh. häufiger als der vor.
signatus Lch. Rd. zieml. hfg.
cordiger L. Rd. nicht selt.
flavipes F. Rd. hfg.
pini L. Rd. häufig.
biguttatus Scop. Rd. nicht
selten.
bipunctatus a. *immaculi-*
pennis Pic. Rd. sehr selt.
bipunctatus v. *sanguino-*
lentus Scop. Rd. sehr selt.
vittatus F. Rd. hfg.
frenatus Laich. Rd. hfg.
Moraei L. Rd. hfg.
ocellatus Drap. (*Geminus*
Gyllh.) Rd. hfg.
labiatus L. Rd. selten.

375. Gatt. *Pachybrachus*.
Redtenb. Scheckenblattk.

hieroglyphicus Laich. Rd.
häufig.
hippophaës Suffr. Fh. hfg.

376. Gatt. *Pachnephorus*.
Redtenbach. Duftblattk.
pilosus Rossi (*avenarius*
Panz.) Rd. hfg.

377. Gatt. *Bromius*. Redten-
bacher. Achselblattk.
obscurus L. Bei Hopfen
zieml. selten.

378. Gatt. *Gastroidea*. Hope.
(*Gastrophysa* Chevr.) Weg-
blattk.
polygoni L. a. *ruficollis* F.
Fh. selten.

379. Gatt. *Timarcha*. Latr.
Tatzenblattk.
metallica Laich. Rd., Fh.,
Winterrieden nicht selten.

380. Gatt. *Chrysomela*. Linné.
Goldblattk.
orichalcea Mull. Rd. nicht
selten.
hyperici Forst. (*fucata* F.)
Rd. sehr selten.
geminata Payk. Rd. sehr
selten.
brunsvicensis Gravh. (*duplicata* Zenk.) Rd. sehr selt.
staphylea L. Rd. zieml.
häufig.
haemoptera L. Rd., Fh.
nicht selten.
purpurascens Germ. Auf
d. Höhen b. Ussenburg u.
a. Zwieselbg. zieml. selt.

- goettingensis L. Rd. hfg.
 varians Schaller. Rd., Fh.
 häufig.
 varians a. pratensis Weise.
 Rd. zieml. selten.
 cerealis L. Rd. selten.
 fastuosa Scop. Rd., Fh.
 häufig.
 graminis L. Rd., bei der
 Hollmühle zieml. hfg.
 coerulans Scriba (violacea
 Panz.) Rd., Fh. hfg.
 coerulans v. menthastris Suffr.
 Fh. zieml. selten.
 polita L. Rd. hfg.
381. Gatt. *Chrysochloa*.
 Hope. (Orina Motsch.)
 intricata a. Anderschi.
 Duftsch. Pöllatschlucht
 u. bei der Marienbrücke
 zu Hohenschwangau
 selten.
 gloriosa a. virgo Ws. bei
 Ussenburg selten.
 gloriosa a. nubila Weise.
 Auf dem Tegelberg
 selten.
 gloriosa a. superba Oliv.
 Rd. sehr selten.
 cacaliae Schrank. Tegel-
 bei Füssen hfg.
 speciosissima Scopoli. Tegel-
 berg selten.
 speciosissima a. Letzneri
 Weise. Tegelberg nicht
 selten.
382. Gattung. *Phytodecta*.
- Kirby. (*Gonioctena*
 Redtenbach.) Hainblattk.
 viminalis L. Rd. sehr selt.
 Linnaeana Schrank. Rd., Fh.
 zieml. hfg.
 Linnaeana a. decostigma
 Duft. Fh. sehr selten.
 Linnaeana a. nigricollis
 Westh. Rd., Fh. sehr hfg.
 Linnaeana a. Satanas Westh.
 Rd., Fh. hfg.
 5 punctata F. Rd. hfg.
 punctata a. unicolor Weise.
 Rd. sehr selten.
383. Gatt. *Phyllodecta*.
 Kirby. (*Phratora* Redten-
 bacher) Weidenblattk.
 tibialis Suffr. Rd. gemein.
 vitellinae L. Rd., Fh. gem.
 „ a. brevicollis Motsch.
 Fh. sehr selten.
384. Gattung. *Hydrothasa*.
 Thomson. (*Helodes* Payk.)
 Bachblattkäfer, Sumpf-
 hähnchen.
- aucta F. Rd. zieml. hfg.
385. Gatt. *Prasocuris*. Latr.
 Lauchhähnchen.
 phellandrii L. Rd. auf Caltha
 palustris hfg.
 junci Brahm (violacea F.)
 bei Hopfen hfg.
386. Gatt. *Phaedon*. Latr.
 Glanzblattk.
 laevigatus Duft. Rd., Fh.
 häufig.
 cochleariae F. Rd., Fh. hfg.

- cochleriae a. neglectus
Sahlbg. Bei Hopfen sehr selten.
- armoraciae L. Rd. u. Fh. häufig.
387. Gattung. *Plagioderma*. Erichson. Weidenblattk.
versicolor Laich. (*armoraciae* F.) Fh. nicht hfg.
388. Gatt. *Melasoma*. Steph. (Lina Redtenb.) Buschblattkäfer.
aenea L. Rd. sehr selten.
cuprea F. Bei Hohen schwangau nicht selten.
20 punctata Scop. Bei Altenstadt a. I. selten.
populi L. Rd., Fh. häufig.
saliceti Weise. Fh. häufig.
tremulae F. Rd., Fh. hfg.
389. Gattung. *Agelastica*. Redtenb. Erlenblattk.
alni L. Fh. nicht selten.
390. Gatt. *Luperus*. Geoffr. Langhorn, Fadenbl.
pinicola Duft. Rd. hfg.
longicornis F. Rd. zieml. häufig.
flavipes L. Rd., Fh. hfg.
391. Gatt. *Lochmaea*. Weise.
capreae L. Rd. hfg.
suturalis Thoms: Rd. sehr selten.
crataegi Forst (*sanguinea* F.) Hopfen, Fh. zieml. selt.
392. Gattung. *Galerucella*. Crotsch. Fallblattk.
- viburni* Payk. Rd., Fh. hfg.
lineola F. Rd., Fh. sehr häufig.
calmariensis L. Rd. zieml. selten.
tenella L. Rd. hfg.
393. Gatt. *Galeruca*. Geoffr. (*Adimonia* Laicharting). Flachblattk.
tanaetii L. Rd. häufig.
pomonae Scop. (*rustica* Schallh.) Rd. häufig.
394. Gattung. *Sermylella*. Reitter. Zierblattk.
halensis L. Fh. nicht hfg.
395. Gattung. *Crepidodera*. Chevrolat. Springblattk.
femorata Gyllh. Rd. zieml. selten.
melanostoma Redtb. Rd. sehr häufig.
ferruginea Scop. Rd. sehr häufig.
396. Gattung. *Chalcoides*. Foudras. Weidenflohk.
aurata Marsh. Rd., Fh. häufig.
397. Gatt. *Hippuriphila*. Foudras. Schachtelhalm-flohkäfer.
Modeeri L. Rd. auf Lech-sand sehr selten.
398. Gatt. *Mantura*. Steph. Matthewsi Curt. Rd. sehr selten.
399. Gatt. *Chaetocnema*. Stephens. (*Plectroscelis*

- Redtenbacher) Schienenzahnblattk.
- concinna* Marsh. Fh. selt.
- aridula* Gyllh. Rd., Fh. nicht selten.
- Sahlbergi* Gyllh. Rd. sehr selten.
400. Gattung. *Psylliodes*. Berthold. Flohblattkäfer.
- napi* F. Fh. nicht selten.
- affinis*. Rd., Fh. häufig.
- hyoscyami* v. *chalcomera* Illg. Fh. zieml. selten.
401. Gatt. *Haltica*. Geoffroy. Hüpfblattk.
- tamaricis* Schrank (*consobrina* Dftsch.) Rd., Fh. häufig.
- oleracea* L. Rd., Fh. hfg.
- pusilla* Duft. Rd. hfg.
402. Gatt. *Hermaeophaga*. Foudr. Bingelkrautflohk.
- mercurialis* F. Rd. auf *Mercurialis perennis* nicht selten.
403. Gattung. *Phylloptreta*. Foudras. Erdfloh.
- armoraciae* Koch. Rd. auf *Cochlearia Armoracia* im Schulgarten sehr selten.
- flexuosa* Illg. Rd. sehr selt. „ a. *fenestrata* Ws. Fh. sehr selten.
- sinuata* Redtenb. (*vittata* F.) Rd., Fh. häufig.
- undulata* Kutsch. Rd., Fh. sehr häufig.
- undulata* a. *bilineata* Ws. Fh. selten.
- nemorum* L. Rd., Fh. auf Kohlarten und Rettig in Gärten gemein.
- nigripes* F. (*lepidii* Koch) wie voriger gemein.
404. Gatt. *Aphtona*. Chevr. Wolfsmilchflohk.
- cyparissiae* Koch. Winterrieden nicht selten.
- venustula* Kutsch. Rd., Fh. häufig.
405. Gattung. *Longitarsus*. Latr. Langfußblattk.
- anchusae* Payk. Rd. hfg.
- holsaticus* L. Rd. hfg.
- luridus* Scop. Rd. hfg. „ a. *signatus* Duft. Rd. selten.
- atricillus* L. Rd. hfg.
- suturellus* L. (*thoracicus* Steph.) Rd. nicht selten.
- melanocephalus* Deg. Rd. häufig.
- longipennis* Kutsch. Fh. selten.
- pratensis* Panz. Rd. nicht selten.
- succineus* Foudr. Fh. nicht selten.
- jacobaeae* Waterh. (*tabidus* Panz.) Fh. zieml. hfg.
406. Gatt. *Sphaeroderma*. Steph. Kugelblattk.
- testaceum* F. (*cardui* Gyllh.) Rd., Fh. auf Disteln hfg.

- rubidum·Graëlls (testaceum
Gyllh.) Selten. als vorig.
407. Gatt. *His pella*. Chapuis.
Dornblattk.
atra L. Um Rd. auf trock.
Bergwiesen nicht selten.
408. Gatt. *Cassida*. Linné.
Schildblattk.
viridis L. Rd. nicht selt.
azurea F. (lucido Suffr.) auf
ein. Kleeacker (*Trifolium*
hybridum) zwisch. Rd. u.
Hopfen im Sommer 1901
auf *Silene*-Arten in mehr.
Exempl. gefangen.
margaritacea Schall. Winter-
rieden nicht selten.
margaritacea a. *melanoce-*
phala Suffr. Winterrd. slt.
flaveola Thunbg. (*obsoleta*
Illg.) Rd. auf Disteln hfg.
nebulosa L. Rd. selten.
atrata F. Rd. zieml. selt.
rubiginosa Mull. Rd., Fh.
sehr hfg.
- vibex L. Rd., Fh. sehr
häufig.
denticollis Suffr. Fh. zieml.
selten.
sanguinolenta Müll. Rd.
nicht hfg.
vittata Villers (*oblonga* Illg.)
Fh. sehr selten.
LVIII. Fam. **Lariidae**. Schilsky.
Samenkäfer.
409. Gatt. *Spermophagus*.
Steven. Distelsamenk.
sericeus Geoffr. (*cardui* Boh.)
Fh. sehr selten.
410. Gattung. *Laria*. Scop.
(*Bruchus* L.) Schotenk.
rufimana Bohem. Fh. 1 Ex.
atomaria L. Fh. nicht selt.
loti Payk. Fh. 1 Stück
1916 gefangen.
411. Gattung. *Bruchidius*.
Schilsky.
unicolor Oliv. (*olivacius*
Germ.) Fh. selten.

G. Rhynchophora.

- LIX. Fam. **Anthribidae**.
Kurzrüssler.
412. Gatt. *Urodon*. Schön-
herr. Resedenrüssler.
suturalis F. Fh. nicht selt.
auf *Reseda lutea*.
rufipes Oliv. Fh. daselbst
häufig.
413. Gatt. *Platyrrhinus*.
Clairville. Breitrüsselk.
resinosus Scop. (*latirostris*
F.) Auf den Höhen von
Illereichen selten.
414. Gatt. *Platystomus*.
Schneider. Rindenrüsselk.
albinus L. Rd. u. Fh. nicht
selten.
415. Gattung. *Anthribus*.
Geoffroy. (*Brachytarsus*
Schönherr.) Kurztarser.
fasciatus Forst. (*scabrosus*
F.) Fh. selten.

- variegatus Geoffr. (varius F.)
Rd. hfg.
- LX. Fam. **Curculionides.**
Rüsselkäfer.
416. Gatt. *Otiorrhynchus.*
Germ. Dickmaulrüssler.
geniculatus Germ. Rd. nicht selten.
armadillo Rossi. Rd. nicht selten.
armadillo v. *obsitus*. Rd. sehr selten.
niger F. Rd. nicht selten.
clavipes Bon. (*tenebricosus*)
Rd. nicht selten.
morio F. (*unicolor*) Rd.,
Fh. hfg.
porcatus Hbst. Rd. hfg.
scaber L. (*septentrionis*
Hbst.) Rd. nicht selten.
singularis L. (*picipes* F.)
Rd. nicht selten.
salicis Ström. (*lepidoptorus*
F.) Rd. hfg.
gemma Scop. Füssen,
rote Wand, häufig.
ovatus L. Rd., Fh. nicht selten.
ligustici L. Rd. u. Fh.
nicht häufig.
417. Gattung. *Phyllobius.*
Schönh. Blattnager, Grün-
rüssler.
calcaratus F. (*glaucus* Scop.)
Rd. nicht selten.
calcaratus a. *atrovirens*
Gyllh. Rd., häufiger Fh.
- calcaratus* v. *densatus*
Schilsky. Rd. nicht selts.,
Fh.
psittacinus Germ. Rd., Fh.
ziemlich hfg.
psittacinus a. *acuminatus*—
Boh. Fh. zieml. hfg.
maculicornis Germ. Rd.
hfg., Fh. nicht selten.
piri L. Rd., Fh. häufig.
„ a. *mali* Gyllh. Fh. 1St.
argentatus L. Rd. häufig.
oblongus L. Rd., Fh. hfg.
„ a. *floricola* Herbst.
Rd. selten.
pomonae Ol. Rd., Fh. hfg.
virideaeris Laich. (*parvulus*
Gyllh.) Rd. nicht häufig.
viridicollis F. Rd. häufig.
418. Gatt. *Polydrusus.* Germ.
Taurüsselkäfer.
impar Gozis (*mollis* Germ.)
Rd., Fh. häufig.
atomarius Ol. Rd., Fh.
häufig.
mollis Ström. (*micans* F.)
Rd. ziemlich selten.
mollis a. *chlorophanus* Wsth.
Fh. selten.
amoenus Germ. Rd. zieml.
häufig.
sericeus Schall. Rd., Fh.
zieml. hfg.
cervinus L. Rd., Fh. zieml.
häufig.
cervinus a. *melanotus* Steph.
Rd., Fh. sehr selten.

- tereticollis Deg. (undatus F.) Rd., Fh. selten.
- pterygomalis Boh. Rd., Illertissen selten.
419. Gatt. *Scaphilus*. Steph. Schattenrüsselk.
- asperatus Bonsd. (muricatus F.) Rd., Fh. häufig. Ich sammelte 1 Stück, das auf der recht. Kopfseite kein Auge besitzt. Die Stelle ist glatt und beschuppt.
420. Gattung. *Liophloeus*. Germar. Rindennager. tessulatus Müller. Rd. nicht selten.
421. Gatt. *Strophosoma*. Steph. Sandrüsselk.
- melanogrammus Forster. (coryli F.) Rd. häufig.
- obesus Marsh. (capitatus Deg.) bei Ulm 1 Stück.
- faber Herbst. Rd. 1 Stück.
422. Gattung. *Barynotus*. Germ. Hochrückenrüssler.
- obscurus F. Rd. nicht selt.
- moerens F. Rd. ziemlich selten.
423. Gatt. *Sitona*. Germar. Schmalrüsselkäfer.
- regensteinensis Herbst. Winterrieden selten.
- tibialis Herbst. Fh. selten.
- lineatus L. Rd., Fh. gemein.
- suturalis Steph. Fh. selten.
- suleifrons Thunbg. Rd., Fh. häufig.
- flavescens Marsh. Rd., Fh. häufig.
- hispidulus F. Rd., Fh. hfg.
424. Gattung. *Tropiphorus*. Schönherr. Kielrüsselk.
- carinatus Mull. (mercurialis F.) Rd. 1 Stück.
425. Gatt. *Chlorophanus*. Germar. Grünrüßler.
- viridis L. Fh. hfg.
- gibbosus. Rd. hfg.
426. Gattung. *Tanymecus*. Schönh. Schlankrüsselk.
- palliatus F. Fh. nicht selt.
427. Gatt. *Cleonus*. Schönh. Heiderüsselk.
- grammicus Panz. Fh. 2 Stck.
428. Gatt. *Lixus*. F. Schwanzrüsselk.
- algiticus L. (angustatus F.) Rd. sehr selten.
429. Gatt. *Larinus*. Germar. Distelrüsselk.
- sturnus Schall. Rd. hfg., Fh. seltener.
- jaceae F. Rd. häufig., Fh. seltener.
- planus Herbst (flavescens Germ.) Rd., Fh. nicht selt.
430. Gattung. *Rhinocyllus*. Germ. Maulrüsselk.
- conicus Froelich. (latirostris L.) Rd., Fh. hfg.
431. Gatt. *Hypera*. Germar. Keulenrüsselk.
- intermedia Boh. Rd. nicht selten.

- comata Boh. Rd. nicht selten.
432. Gattung. *Phytonomus*. Schönh. Eirüsselkäfer.
- punctatus F. Rd., Fh. zieml. hfg.
- ruminis L. Fh. zieml. selt.
- asperatus a. histrio Boh. Rd. 1 Stück.
- arator L. (*polygoni* L.) Fh. 2 Stück.
- pedestris Payk. Rd. nicht selten.
- variabilis Herbst. Rd., Fh. zieml. hfg.
- nigrirostris F. Rd. nicht selten.
- nigrirostris a. Stierlini Cap. Rd. 1 Stück.
433. Gatt. *Alophus*. Schönh. Herzrüsselk.
- triguttatus F. Rd., Fh. nicht häufig.
434. Gatt. *Lepyrus*. Germ. Spindelrüsselk.
- palustris Scop. (*colon* L.) Rd., Fh. nicht selten.
435. Gatt. *Hylobius*. Germ. Forstrüsselk.
- piceus Deg. Auf d. Schlick bei Füssen 1 Stück.
- abietis L. Rd., Fh. gemein.
436. Gatt. *Liparus*. Olivier. (*Molytes* Schönh.) Dickrüsselkäfer.
- glabrirostris Küst. Rd. nicht selten.
- germanus L. Rd. hfg., Fh. zieml. selten.
- coronatus Goeze. Fh. nicht häufig.
437. Gatt. *Liosoma* Steph. Glattleibrüsselk.
- deflexum Panz. Fh. 1 Stck.
438. Gatt. *Pissodes*. Germ. Pechrüsselk.
- piceae Illg. Fh. 1 Stück.
- notatus F. Rd. nicht selt.
- pini L. Rd. selten.
439. Gatt. *Magdalis*. Germ. Walzenrüsselk.
- flavicornis Gyllh. Rd. sehr selten.
- quercicola Weise. Fh. sehr selten.
- cerasi L. Rd., Fh. nicht selten.
- carbonaria L. Rd. sehr selten.
- frontalis Gyllh. Rd. sehr selten.
- duplicata Germ. Rd. sehr selten.
- nitida Gyllh. Rd., Fh. nicht selten.
- violacea L. Rd., Fh. hfg.
440. Gatt. *Anoplus*. Schönh. Fußrüsselk.
- roboris Suffr. Fh. zieml. hfg.
- setulosus Kirsch. Fh. zieml. häufig.
441. Gatt. *Eremotes*. Wolaston. (*Rhyncolus*).
- ater L. (*chloropus* F.) Rd.

442. Gatt. *Rhyncolus* Germ.
Stutzrüsselk.
truncorum Germ. Fh. hfg.
443. Gatt. *Cossonus*. Clairville. Holzwurm.
linearis F. Fh. 1 Stück.
444. Gatt. *Cryptorrhynchus*. Illiger. Fugenrüsselk.
lapathi L. Rd., Fh. nicht selten.
445. Gattung. *Coeliodes*. Schönh. Windrüsselk.
trifasciatus Bach. Fh. sehr selten.
dryados Gml. Rd., Fh. nicht selten.
446. Gattung. *Stenocarus*. Thomson.
fuliginosus Marsh. Rd., Fh. selten.
447. Gatt. *Cidnorrhinus*. Thomson.
4 *maculatus* L. Fh. selten.
448. Gatt. *Ceuthorrhynchidius* Duval.
troglodytes F. Rd., Fh.
449. Gatt. *Ceuthorhynchus*. Germ. Falzrüsselk.
posthumus Germar. Fh. 1 Stück.
geographicus Goeze. Fh. nicht selten.
litura F. Fh. sehr selten.
rugulosus Herbst. Fh. sehr selten.
campestris Gyllh. Rd. nicht selten.
- pollinarius Forst. Fh. zieml. häufig.
denticulatus Schrank. Rd., Fh. ziemlich häufig.
macula = *alba* Herbst. Fh. sehr selten.
punctiger Gyllh. Rd., Fh. nicht selten.
marginatus Payk. Rd. 1 Stck.
syrites Germ. Rd. 1 Stück.
rapae Gyllh. Rd. 1 Stück.
turbatus Schultze. Rd., Fh. nicht selten.
atomus Boh. Rd., Fh. ziemlich häufig.
pleurostigma Mrsh. Rd., Fh. zieml. selten.
erysimi F. Hopfen b. Rd. 1 Stück.
450. Gatt. *Rhinoncus*. Steph. Hackenrüsselkäfer.
pericarpinus L. Rd. nicht selten.
451. Gattung. *Poophagus*. Schönh. Grasrüsselkäfer.
sisymbrii F. Fh. selten.
452. Gattung. *Baris*. Germ. Glanzrüsselk.
picicornis Marh. (abrotani Germ.) Fh. nicht selten.
Auf *Artemisia vulgaris*.
Talbus L. Rd., Fh. nicht selten.
453. Gattung. *Balaninus*. Samouelle. Nußrüssler.
nucum L. Rd. nicht selten, Fh. selten.

454. Gatt. *Balanobius*. Jek.
Bohrrüssler.
crux F. Rd., Fh. nicht selt.
salicivorus Payk. Rd., Fh.
zieml. häufig.
pyrrhoceras Marsh. Fh. selt.
455. Gatt. *Anthonomus*.
Germ. Blütenrüssler.
varians Payk. Rd., Fh.
zieml. häufig.
pomorum L. Rd., Fh. zieml.
selten.
humeralis Panz. Fh. sehr selt.
sorbi Germ. Fh. zieml. hfg.
druparum L. Rd., Fh. selt.
456. Gatt. *Dorytomus*. Steph.
Buschrüsselk.
longimanus Forst. (vorax F.)
Rd., Fh. nicht selten.
longimanus a. *macropus*
Redtenb. Fh. 1 Stück.
tremulae Payk. Rd. 1 Stck.
tortrix L. Rd. nicht selt.
flavipes Panz. Fh. selten.
Schönherri Faust. Rd. selt.
melanophthalmus Payk. Rd.
nicht selten.
melanophthalmus v. *lateralis*
Faust. Rd. sehr selten.
affinis Payk. Rd., Fh. sehr
selten.
salicis Walton. Rd. selten.
dorsalis L. Rd. selten.
" a. *Linnei* Faust.
Rd. sehr selt.
" a. *nigrifrons* Faust.
Rd. sehr selten.
457. Gatt. *Notaris*. Steph.
acridulus L. Am Hopfensee
nicht selten.
458. Gatt. *Grypidius*. Steph.
Krummrüsselk.
equiseti F. Rd., Fh. nicht
selten.
459. Gatt. *Bagous*. Schön-
herr. Sumpfrüsselk.
nigritarsus Thomson. Rd.
nicht selten.
460. Gattung. *Acalyptus*.
Schönh. Unverhüllter.
carpini Herbst. Altenstadt
1 Stück.
carpini a. *alpinus* Villa. Fh.
1 Stück.
461. Gatt. *Tychius*. Germ.
Pfriemrüsselk.
5 punctatus L. Fh. selten.
meliloti Steph. Fh. sehr
selten.
tomentosus Herbst. Rd.,
Fh. nicht selten.
462. Gatt. *Sibinia*. Germ.
Zwergrüßler.
viscariae L. Fh. selten.
463. Gatt. *Orchestes*. Ill.
(*Rhynchaenus* Clairville.)
Hüpfrüsselkäfer.
lonicerae Herbst. Rd. nicht
selten.
fagi L. Fh. selten.
ruvitarsus Germ. F. nicht
selten.
salicis L. Rd.. Fh. nicht
selten.

- populi F. Fh. nicht selten.
464. Gatt. *Rhamphus*. Clairville. Krummschnabel.
- plicarius* Herbst. Fh. hfg.
465. Gatt. *Mecinus*. Germ. Wiesenrüsselk.
- collaris* Germ. Rd. selten.
- pyraster* Herbst. Fh. nicht selten.
466. Gattung. *Gymnetron*. Schönherr. Nackbauchrüßler.
- beccabungae* v. *veronicae* Germ. Rd. nicht selten.
- tetrum* F. Rd., Fh. zieml. häufig.
- antirrhini* Payk. Fh. selt.
467. Gatt. *Miarus*. Steph. *longirostris* Gyllh. Fh. nicht selten.
- graminis* Gyllh. Rd., Fh. zieml. häufig.
- campanulae* L. Rd., Fh. zieml. häufig.
468. Gatt. *Cionus*. Clairville. Wollblumenrüßler.
- tuberculosus* Scop. (*verbasci* F.) Rd. zieml. hfg.
- scrophulariae* L. Rd., Fh. zieml. häufig.
- hortulans* Geoffr. Rd., Fh. nicht selten.
- thapsi*. Rd., Fh. nicht selt.
- alauda* Herbst. Füssen, rote Wand selten.
469. Gattung. *Nanophyes*. Schönh. Kleinrüsselk.
- marmoratus* Goeze (*lythri* F.) Rd., Fh. nicht selt.
470. Gatt. *Apion*. Herbst. Birnrüsselkäfer, Spitzmausrübler.
- pomonae* F. Rd., Fh. nicht selten.
- craccae* L. Rd., Fh. nicht selten.
- cerdo* Gerst. Rd. selten.
- opeticum* Bach. Rd. selt.
- subulatum* Kirby. Fh. selt.
- carduorum* Kirby. Fh. sehr selten.
- onopordi* Kirby. Rd. hfg.
- fuscirostre* F. Rd. selten.
- aeneum* F. Fh. auf Malven nicht selten.
- radiolus* Kirby. Fh. auf Malven nicht selten.
- laevigatum* Payk. (*sorbi* F.) Fh. zieml. häufig.
- urticarium* Herbst (*vernale* Payk.) Rd. sehr selten.
- pallipes* Kirby. Rd., 1 Stck.
- rufirostre* F. Fh. auf Malven nicht selten.
- pubescens* Kirby. Rd., Fh. auf Malven nicht selten.
- atomarium* Kirby. Fh. selt.
- seniculus* Kirby. Rd., Fh. häufig.
- frumentarium* Payk. Rd. selt.
- flavipes* Payk. Rd., Fh. je 1 Stück.
- apricans* Herbst (*fagi* Kirby) Rd. selten.

- aestivum Germ. (trifolii Bach). Auf Kleefeldern nicht selten.
- assimile Kirby. Rd., Fh. häufig.
- sedi Germ. Rd. 1 Stück. brevirostre Herbst. Rd. sehr selten.
- marchium Herbst. Rd., Fh. häufig.
- violaceum Kirby. Fh. selt.
- Spencei Kirby. Fh. 1 Stck.
- meliloti Kirby. Fh. sehr selten.
- virens Herbst. Rd., Fh. häufig.
- ononis Kirby. Rd. selten.
- loti Kirby. Rd., Fh. je 1 Stück.
- aethiops Herbst. Fh. selt.
- 471. Gattung. Rhynchites.** Schneider. Blattroller. betulae L. Rd., Fh. zieml. häufig.
- tomentosus Gyllh. Fh. ziemlich häufig.
- germanicus Herbst. Fh. zieml. häufig.
- cupreus L. Rd. zieml. hfg.
- populi L. Fh. nicht selt.
- 472. Gattung. Attelabus L.** Rollrüssler.
- nitens Scop. (curculionides L.) Fh. selten.
- 473. Gatt. Apoderus. Olivier.** Haselrüssler.
- coryli L. Rd. nicht selten.
- LXI. Fam. Nemonychidae.**
- 474. Gatt. Rhinomacer F.** Langnasenrüssler.
- attelaboides F. Bei Altenstadt 1 ♀.
- LXII. Fam. Ipidae. Eichhoff.** Borkenkäfer.
- (Scolytidae Kirby.
Bostrichidae F.)
- 475. Gatt. Scolytus Geoffr.** Stutzbastkäfer.
- multistriatus Marsh. Fh. sehr selten.
- 476. Gatt. Hylesinus F.** Waldbastkäfer.
- fraxini Pauz. Fh. gemein.
- 477. Gatt. Dendroctonus.** Erichson. Baumtöter.
- micans. Bei Altenstadt 1 St.
- 478. Gattung. Hylurgops.** Leconte.
- palliatus Gyllh. Rd., Fh. hfg.
- 479. Gatt. Hylastes. Erichs.** Holzmacher.
- ater Payk. Rd., Fh. nicht selten.
- cunicularis Erichson. Rd. nicht selten.
- opacus Erichs. Fh. nicht selten.
- 480. Gatt. Myelophilus (Blastophagus). Eichh.**
- piniperda L. Fh. selten.
- 481. Gatt. Polygraphus.** Erichson.
- polygraphus L. (pubescens F.) Fh. zieml. häufig.

-
482. Gattung. *Crypturgus*.
Erichs. Verborgenwirker,
Zwergborkenkäfer.
hispidulus Thomson. Rd.
1 Stück.
pusillus Gyllh. Rd. nicht
selten.
cinereus Herbst. Rd. nicht
selten.
483. Gattung. *Cryphalus*.
Erichs. Baumborkenkäf.
abies Ratzebg. Rd. nicht
selten.
484. Gatt. *Xyloterus*. Erichs.
Holzzerstörer.
lineatus Oliv. Rd. zieml. selt.
485. Gattung. *Xylocleptes*.
Ferrari. Holzdieb.
bispinus Duft. Fh. nicht
selten.
486. Gatt. *Pityophthorus*.
Eichhoff.
micrographus L. Rd., Fh.
nicht häufig.
487. Gattung. *Pityogenes*.
Bedel.
chalcographus L. Rd., Fh.
nicht häufig.
488. Gattung. *Ips*s. Degeer.
(*Bostrychus* F., *Tomicus*
Latr.)
typographus L. Rd. nicht
selten.
- laricis* F. Rd. nicht
selten.
suturalis Gyllh. Rd. selten.
489. Gatt. *Dryocoetes*. Eichh.
autographus Ratzeb. Rd. u.
Fh. nicht selten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s): Pröbstle Leonhard

Artikel/Article: [Verzeichnis der vom Hauptlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden in den Jahren 1893 mit 1902 und in der Umgegend von Fellheim in den Jahren 1903 mit 1918 gesammelten Käfer 187-230](#)