

Beitrag zur Flora des Kaisergebirges

von Franz Hofer, Postassistent, Kufstein.

Auf Wunsch der Vereinsleitung habe ich vorliegendes Verzeichnis der in meinen Ausflügen im Kaisergebirge beobachteten und gesammelten Pflanzen zusammengestellt. Da das Kaisergebirge in geologischer Hinsicht nur aus Triaskalken besteht, wurde die Bezeichnung des Substrates als überflüssig weggelassen. Hinsichtlich der Anordnung der Pflanzen sowie bezüglich der Nomenklatur und der Umgrenzung des Artbegriffes bin ich ganz der Excursionsflora von Oesterreich von Dr. K. Fritsch und dem Handbuch zum Atlas der Alpenflora von Dr. K. W. v. Dalla Torre gefolgt. Allen denjenigen Herrn, die mich in irgend einer Weise bei dieser Arbeit unterstützten, insbesondere Herrn Postcontroleur Rudolf Promberger und Postoffizial Josef Marchesani, Herrn Oberforstcommissär Hans Reiter, Herrn Dr. K. Singer und Dr. Eder, denen ich manche Standortsangaben verdanke, spreche ich auch an dieser Stelle meinen besten Dank aus.

- Polypodium vulgare** L. Wälder, Felsen bei der Teufelskanzel, Rietzerwand, Führl, Winterkopf. In der var. *pygmaeum* Schur. Häufig auf sonnigen Felsen bei der Teufelskanzel (820 m).
- Pteridium aquilinum** (L.) Sm. Waldblößen, Waldränder vom Tale bis 1300 m meistens in der Form *brevipes* Luerssen.
- Blechnum Spicant** (L.) Sm. In den Wäldern der Vorberge und des zahmen Kaisers. Bei 1755 m unter Krummholz des Petersköpfl noch fertile Wedel treibend.
- Scolopendrium vulgare** Sm. Felsen im Führl und Schanzerwand selten.
- Athyrium filix femina** (L.) Roth. In den Wäldern des Kaisergebirges und seiner Vorberge bis 1800 m, je nach dem Standorte in den Formen *dentatum* Milde, *fissidens* Milde, *multidentatum* Milde und *Rhaeticum* Moore.
- Athyrium alpestre** (Hoppe) Rylands. Unter Krummholz am Plateau des zahmen Kaisers 1700 m.
- Asplenium viride** Huds. Auf Felsen in Wäldern des Stadtberges, Winterkopf, Teufelskanzel. In der var. *alpinum* Schleicher am Kopfhörl 2100 m. in der var. *microphyllum* am hohen Winkel.
- Asplenium Trichomanes** L. In Felsspalten am Stadtberg und Teufelskanzel häufig.
- Asplenium Ruta muraria** L. Auf Felsen des Stadtbergs und der Teufelskanzel häufig.
- Phegopteris polypodioides** Fée. In Waldungen der Vorberge häufig. Auch in der var. *obtusidentatum* Warnst.
- Phegopteris Dryopteris** (L.) Fée. Im Kaisergebirge häufig.
- Phegopteris Robertiana** (Hoffm.) A. Br. Auf Felsen des Stadtberges, Duxerköpfl, Teufelskanzel.
- Aspidium Lonchitis** (L.) Sw. Auf Felsen der Alpen-Region, Naunspitze, Steinbergalpe, Brandkogel häufig.

- Aspidium lobatum* (Huds.) Sw. In den Wäldern der Vorberge häufig.
- Aspidium montanum* (Vogler) Aschers. Häufig in den Wäldern der Vorberge. Auch in der var. *crenatum* Milde nicht selten.
- Aspidium rigidum* (Hoffm.) Sw. Im Schneeloch unter der Pyramidenspitze circa 1990 m. Auf Felsen im hohen Winkel.
- Cystopteris montana* (Lam.) Bernh. Auf Felsen des Hohen-Winkels.
- Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. Auf Felsen unter der Geisterschmiedwand, bei der Teufelskanzel.
- Cystopteris alpina* (Wulf) Deso. Im Hohen-Winkel am Plateau des zahmen Kaisers auf Felsen. Auf den Felsen der Naunspitze und des Petersköpfl findet sich eine Form, bei der man im Zweifel ist, ob zu *fragilis* oder zu *alpina* gehörig.
- Onclea Struthopteris* (L.) Hoffm. Im Graben, der sich vom Eiberg gegen den Häringer Bölfen hinzieht, häufig auch fructifizierend.
- Equisetum hiemale* (L.) Häufig an der Strasse gegen Kirchbichl bei Hirnbach.
- Lycopodium Selago* (L.) Im Walde bei der Locherer Kapelle, dann am Plateau des zahmen Kaisers in der Krummholzregion und in einer niederen starren Form im hohen Winkel auf Felsen ca. 2000 m.
- Lycopodium annotinum* (L.) In den Waldungen des Stadtberges, Duxerköpfl, häufig.
- Lycopodium clavatum* (L.) In den Wäldern der Vorberge häufig.
- Selaginella selaginoides* (L.) LK. Auf Matten in der Alpenregion, so Rietzeralm, Naunspitze, Plateau des zahmen Kaisers, Längleck bei Hinterbärenbad.
- Selaginella helvetica* (L.) LK. Auf Felsen in der Sparchenklamm, dann am Aufstieg in das Kaisertal.
- Pinus Cembra* (L.) Nur in einem Exemplar bei Hinterbärenbad.
- Pinus silvestris* (L.) Im zahmen Kaiser bis gegen 1300 m beobachtet. Am Sparchenbach häufig in der kurzadeligen Form.
- Pinus montana* Mill. Häufig in der Alpenregion, geht bis 800 m herab. Die Bestände am Plateau des zahmen Kaisers gehören der *Pinus Pumilio* Haenke an.
- Picea excelsa* (Poir) LK. Steigt in zusammenhängenden Beständen auf der Südseite bis etwa 1650 m. desgleichen *Abies alba* Mill.
- Juniperus communis* (L.) Häufig an der Mündung des Kaiserthales in den Inn.
- Juniperus nana* Willd. Naunspitze, Petersköpfl, Plateau des zahmen Kaisers.
- Taxus baccata* (L.) Hinterkaiser selten, Duxeralp, Vorderkaiserfeldern.
- Setaria virides* (L.) Am Wege beim Kalvarienberg.
- Phleum Michelii* All. Häufig von der Voralpen-Region an.
- Phleum alpinum* (L.) Unter Krummholz am Petersköpfl, Elferkogel, Pyramidenspitze.
- Agrostis alpina* (Scop.) Auf grasigen Hängen des zahmen Kaisers, Rietzeralm.
- Calamagrostis varia* (Schrad) Baumg. In Wäldern der Vorberge.
- Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth, Sparchenklamm.
- Sesleria varia* (Jacq.) Wettst. Auf Wiesen am Eiberg, Kaisertal, Sparchen.
- Melica nutans* (L.) Kalvarienberg.
- Cynosurus cristatus* (L.) Alpen-Wiesen der Rietzeralm bis 1300 m.
- Poa alpina* (L.) Auf Weideplätzen am Plateau des zahmen Kaisers. In der var. *minor* Koch, Pyramidenspitze.
- Trichophorum alpinum* (L.) Pers. Ufer des Hintersteinersee.
- Blasmus compressus* (L.) Panz. Feuchte Uferstellen am Inn.
- Carex brizoides* (L.) Waldränder der Vorberge.
- Carex pallescens* (L.) var. *alpestris* Kohts. Aufstieg zur Gruttenhütte.
- Carex digitata* (L.) Häufig in den Vorbergwäldern.
- Carex ornithopoda*, Kalvarienberg, Duxeralp.
- Carex verna*. Auf trockenen Wiesen der Vorberge.
- Carex ericetorum* Poll. Trockene Wiesen am Sparchenbach.
- Carex montana* (L.) Trockene Wiesen, am Kalvarienberg, Duxerköpfl.
- Carex humilis* Leyss. Felsen des Kalvarienberges, Duxerköpfl, Locherer und Eiberg.

- Carex sempervirens** Will. Auf Felsen am Grutten.
- Carex ferruginea** Scop. Plateau des zahmen Kaisers unter Krummholz.
- Carex mucronata** All. Auf Felsen am Grutten.
- Juncus alpinus** Will. Auf feuchten Stellen am Plateau des zahmen Kaisers.
- Juncus monanthus** Jacq. Auf Triften der Pyramidenspitze, hoher Winkel.
- Luzula pilosa** (L.) Willd. Auf Wiesen der Duxeralm.
- Luzula angustifolia** (Wulf.) Garcke. In den Wäldern der Vorberge häufig, meistens in der Form *rubella*, Hoppe.
- Luzula silvatica** (Huds.) Gaud. Kufsteiner-Stadtwald.
- Tofieldia calyculata** (L.) Wahlbg. Feuchte Stellen vom Tale bis 1900 m. Erscheint in der var. *capitata* Hoppe und var. *sparsiflora* Sond.
- Anthericum ramosum** (L.) Trockene Hänge, Duxerköpfl, Brenntenjoch.
- Gagea lutea** (L.) Ker. Auf Wiesen in Eiberg und Haberg.
- Allium Victorialis** (L.) Auf Matten im Teufels-Wurzgarten und Scharlingerböden.
- Lilium Martagon** (L.) Auf buschigen Hängen, Brenntenjoch, Hoftingerquelle.
- Majanthemum bifolium** (L.) DC. Wälder der Vorberge.
- Streptopus amplexifolius** (L.) DC. In Gebüsch, Waldrändern der Vorberge.
- Polygonatum verticillatum** (L.) All. In Gebüsch am zahmen Kaiser, in die Krummholzregion bis 1800 m. aufsteigend.
- Polygonatum officinale** All. An trockenen Lehnen der Vorberge.
- Polygonatum multiflorum** (L.) All. Gebüsch der Vorberge.
- Convallaria majalis** (L.) Steinige sonnige Lehnen des Kaisertales so unter dem Veiten-, Pfandl- und Hinter-Kaiserhof, Kienbergklamm.
- Paris quadrifolia** (L.) In den Wäldern der Vorberge in die Krummholzregion ansteigend.
- Leucojum vernum** (L.) Wiesen der Vorberge, so in Eiberg und Haberg.
- Cypripedium Calceolus** (L.) Auf Hängen im Kaisertal so bei der Hoffingerquelle.
- Ophris myodes** (L.) Auf trockenen Wiesen in Bärnstatt und unter dem Veitenhof.
- Orchis ustulata** (L.) Wiesen, Matten vom Tale bis in die Alpen, Innauen, Naunspitze, Grutten.
- Orchis militaris** (L.), Innauen, auch ein Exemplar mit rein weissen Blüten sammelte ich bei Hirnbach.
- Orchis latifolia** (L.) Auf Matten bis ins Krummholz. Unter der Ochsenweidschneid noch am 20. September blühend gefunden.
- Nigritella nigra** (L.) Auf Alpenmatten am Grutten, Stripfenjoch, Kopftörl 2100 m.
- Gymnadenia conopea** (L.) R. Br. Wiesen der Vorberge häufig, besonders Eiberg, Duxerköpfl.
- Gymnadenia odoratissima** (L.) Rich. Wiesen der Vorberge häufig, besonders Eiberg, Längleck.
- Platanthera bifolia** (L.) Rchb. Häufig in den Vorberg-Wäldern.
- Cephalanthera longifolia** (L.) Fritsch. Wiesen, Waldränder im Kaisertal, am Wege zur Hoffingerquelle häufig.
- Neottia Nidus avis** (L.) Rich. Häufig in den Buchenwäldern des Kaisertales. Meistens in der F. *glandulosa*.
- Goodyera repens** (L.) R. Br. Häufig in den Wäldern, so im Fürhölzl.
- Salix glabra** Scop: Krummholzregion häufig.
- Salix arbuscula** (L.) Plateau des zahmen Kaisers.
- Salix retusa** (L.) ebenda
- Alnus viridis** (Vill.) DC. In der Krummholzregion häufig. Stripfenkopf, hoher Winkel.
- Viscum album** (L.) Auf Obstbäumen des Duxerbauers.
- Thesium alpinum** (L.) Häufig vom Tale bis in die Krummholzregion.
- Thesium tenuifolium** Saut. Auf der Bödner-Alpe.
- Asarum Europaeum** (L.) In den Wäldern der Vorberge häufig, Stadtberg, Roger.
- Polygonum viviparum** (L.) Häufig im hohen Winkel, Plateau des zahmen Kaisers.

- Silene venosa** (Gilib) Aschers. Auf trockenen Hängen bis in's Krummholz mit allmählichen Uebergängen zur
- Silene alpina** Thoms, die ich in typischer, dichtrasieriger Form im Gerölle bei der Gruttenhütte und Steingrubenschneid sammelte.
- Silene acaulis** (L.) Als *S. longiscapa* Kern. Auf Alpenmatten: Kopftörl, Petersköpfl, Elferkogel, Plateau des zahmen Kaisers.
- Silene rupestris** (L.) Auf Felsen der Vorberge, so Teufelskanzel.
- Heliosperma quadrifidum** (L.) A. Br. In der Krummholzregion häufig auf feuchten Felsen, so Petersköpfl, Stripsenkopf.
- Dianthus Carthusianorum** (L.) An trockenen Hängen der Vorberge.
- Moehringia muscosa** (L.) Auf schattigen Felsen der Vorberge, Kienbergklamm, Hochwacht, Sparchenklamm.
- Herniaria glabra** (L.) Selten am Ufer des Sparchenbaches.
- Scleranthus annuus** (L.) Aufstieg zur Teufelskanzel beim Veitenhof.
- Ceratophyllum demersum** (L.) In den Gräben und Pfützen um den Hintersteinersee.
- Caltha alpestris** Sch. N. K. In einer Pfütze am Plateau des zahmen Kaisers.
- Trollius Europaeus** (L.) Feuchte Wiesen beim Duxerbauern und Haberg-Eiberg.
- Actaea nigra** (L.) In den Wäldern der Vorberge, so am Roger.
- Aquilegia atrovioacea** (Avc Lall). Wiesen, Triften der Vorberge. Häufig im Kaisertal unter den Höhen.
- Aconitum Vulparia** Rchb. Waldränder, Gebüsche der Vorberge, bis 1900 m besonders Teufelskanzel, Brenntenjoch.
- Aconitum rostratum** Bernh. Wälder, Gebüsche der Voralpen-Region, so Aufstieg zur Teufelskanzel vom Innthale aus, Rietzeralm.
- Anemone Hepatica** (L.) Waldränder, Gebüsche häufig bis in's Krummholz noch bei 1800 m beobachtet.
- Anemone alpina** (L.) Auf Alpentriften, so Teufelswurzgarten.
- Clematis alpina**. Auf Felsen unter der Teufelskanzel.
- Ranunculus alpestris** (L.) Wiesen, Triften der Alpen häufig, so Plateau des zahmen Kaisers, Pyramidenspitze (noch am 20. September blühend gefunden), Steinbergalpe, Kopftörl, Haltspitze bis 2300 m. beobachtet.
- Ranunculus fisaria** (L.) Wiesen, Obstanger, bis in die Voralpenregion, so häufig Eiberg, Haberg, Calvarienberg.
- Ranunculus lanuginosus** (L.) Häufig Wälder, Gebüsche der Vorberge, so Duxerköpfl, Roger.
- Berberis vulgaris** (L.). Hecken, Gebüsche gemein bis 1800 m.
- Papaver alpinum** (L.) Geröll, Kopftörl, Hohe Halt häufig.
- Biscutella laevigata** (L.) Steinige Matten, Felsen der Voralpen- und Alpen-Region An der Wasserleitung, Naunspitze gemein.
- Aethionema saxatile** (L.) R. Br. Felsen, Gerölle. Südhang des zahmen Kaisers.
- Thlaspi rotundifolium** (L.) Gaud. Geröll im hohen Winkel, Scharlingerböden.
- Kerneria saxatilis** (L.) Rchb. Felsen der Voralpen und Alpen, an der Wasserleitung.
- Dentaria enneaphyllos** (L.) Wälder der Vorberge Häufig bis 1800 m. Kienbergklamm, Duxerköpfl.
- Dentaria digitata** Lam. Feuchte schattige Stellen der Vorberge, so Kienberg, Schanzerwände.
- Lunaria rediviva** (L.) Wälder bei der Teufelskanzel, Schanzerwand.
- Hutschinsia alpina** (L.) R. Br. Felsen und Gerölle des hohen Winkel, Scharlingerboden, Pyramidenspitze.
- Arabis alpina** (L.) Steinige Triften der Pyramidenspitze, hoher Winkel.
- Arabis Jacquini**. Innufermauern bei Eichelwang.
- Arabis pumila** Jacq. In der mit Schnee gefüllten Vertiefung unter der Pyramidenspitze.
- Sedum atratum** (L.) Steinige Alpentriften, Kopftörl, Zwölferkogel.
- Saxifraga mutata**. Feuchte Felsen in Eiberg (Dr. Singer).

- Saxifraga brevifolia** (Sternbg.) Felsen am Kopftörl und Zwölferkogel, selten auch in der var. *intacta* Willd.
- Saxifraga recta** Lap. Felsen des Eisner und Zwölferkogel. Häufiger als *S. brevifolia*. Auch in der var. *candida* G. Beck.
- Saxifraga caesia** (L.) Felsen, Gerölle der Pyramiden und Naunspitze. Auch im Inntale auf herabgefallenen Felsen bei der Schanz ca. 500 m.
- Saxifraga aizoides** (L.) Feuchte Felsen am Plateau des zahmen Kaisers häufig, bis ins Tal herabgehend.
- Saxifraga stellaris** (L.) Feuchte Matten. Pyramidenspitze in der var. *glabrata* Sternbg. und *pauciflora* Engl. Dann in grösseren Exemplaren im hohen Winkel.
- Saxifraga rotundifolia** (L.) Feuchte Felsen unter Krummholz am Petersköpfl, Zwölferkogel, hoher Winkel, Scharlingerboden.
- Potentilla caulescens** (L.) Felsen, Voralpen und Alpen, so besonders Rietzerwand bis ins Inntal herabsteigend.
- Amelanchier ovalis** Medic. Häufig auf den Vorbergen: so Duxerköpfel, Zahmer Kaiser, Hinterstein.
- Dryas octopetala** (L.) Häufig am Kaisergebirge, am ganzen Zuge des zahmen Kaisers vom Tale 490 m bis 2000 m.
- Dryas octopetala lanata** Kern. Massenhaft im Ufergerölle des Sparchenbaches.
- Alchemilla alpina** (L.) Häufig auf Felsen der Naunspitze, Petersköpfl, Zwölferkogel, dann am Grutten.
- Prunus domestica** (L.) Am Südosthänge des zahmen Kaisers bei den Höhen noch bei 800 m cultiviert. Desgleichen Apfelbäume.
- Melilotus albus** Deso. Inndamm bei Erl häufig.
- Chamaebuxus alpestris** Spach. Waldränder, sonnige Hänge vom Tale bis ins Krummholz gemein.
- Polygala amarellum** Cr. Feuchte Wiesen vom Tale bis in die Voralpen, so Sparchen, Innufer, Dux.
- Polygala microcarpum** Gaud. Teufelskanzel.
- Polygala vulgare**. Waldränder, Wiesen, Raine der Vorberge häufig.
- Ilex Aquifolium** (L.) Wälder, Stadtberg. Winterkopf.
- Rhamnus pumila** (L.) Am Grutten.
- Hypericum quadrangulum** (L.) Unter Krummholz am Plateau des zahmen Kaisers (1800 m).
- Viola biflora**. Feuchte Felsen, Brenntenjoch, Pyramidenspitze, Grutten häufig.
- Viola palustris** (L.) Hintersteinersee.
- Viola hirta** (L.) Trockene Wiesen, Sparchen, Stadtberg.
- Viola rupestris** Schmidt. Trockene Wiesen, Stadtberg, Innufer.
- Viola silvestris** Lam. Waldränder, Gebüsche gemein.
- Viola Riviniana** Rchb. Wälder, Wiesen der Vorberge gemein.
- Daphne Mezereum** (L.) Im zahmen Kaiser bis 1900 m beobachtet.
- Epilobium anagallidifolium** Lam. Feuchte Stellen unter Krummholz am Plateau des zahmen Kaisers, Pyramidenspitze.
- Circaea intermedia** Ehrh. Feuchte Wälder am Roger.
- Sanicula Europaea** (L.) Vorbergwälder häufig. Besonders schön in den Schanzerwänden.
- Astrantia major** (L.) Feuchte Wälder, Gebüsche bis 1900 m.
- Meum Mutellina** Gaertn. Trockene Matten am Grutten, Kopftörl.
- Athamanta Cretensis** (L.) Im Gerölle unter der Ochsenweidschneid.
- Laserpitium latifolium** (L.) Wälder der Vorberge am Aufstieg nach Vorderkaiserfelden.
- Pirola secunda** (L.) Wälder der Vorberge. Stadtberg, Eiberg, Länggeck.
- Pirola uniflora** (L.) Wälder, so Stadtberg, Rietzeralm, Länggeck.
- Monotropa multiflora** (Scop.) Fritsch, Buchenwald am Stadtberg.
- Rhododendron ferrugineum** (L.) In grossen Beständen am Plateau des zahmen Kaisers, Teufelswurzgarten.
- Rhododendron hirsutum** (L.) Im ganzen Zuge des zahmen Kaisers, geht am Stadtberg bis 700 m herab.

- Rhodothamnus Chamaecistus* (L.) Rehb. Felsige Hänge der Alpenregion.
Brenntenjoch, Hoher Winkel.
- Andromeda polifolia* (L.) Ufer des Hintersteiner- und Walchsee.
- Vaccinium Vitis Jlaea* (L.) Wälder der Voralpen und Alpen. Häufig
Petersköpfl.
- Primula officinalis* (L.) Wiesenhänge im Kaiserthale häufig.
- Primula farinosa*. Feuchte Wiesen am Hintersteinersee.
- Primula Auricula* (L.) Felsen der Voralpen und Alpen häufig. Besonders
schön: Rietzerwand, Hofingerquelle, Steinberg.
- Soldanella alpina* (L.) Häufig im Tale bei Hinterbärenbad, Steinbergalpe.
- Gentiana vulgaris* (Neir.) Wiesen der Voralpen gemein, geht am Sparchen-
bach bis in's Inntal herab.
- Gentiana ciliata* (L.) Häufig am Innufer, an den Hängen der Vorberge
- Gentiana asclepiadea* (L.) Wälder, Gebüsche der Vorberge häufig.
- Gentiana verna* (L.) Wiesen. Triften gemein.
- Gentiana utriculosa* (L.) Feuchte Matten der Pyramidenspitze.
- Gentiana nivalis* (L.) In dem Schneeloch unter der Pyramidenspitze.
- Gentiana calycina* (Koch). Inndamm bei Ebbs.
- Gentiana Sturmiiana* Kern. Häufig. Wiesen der Voralpen. Am Inndamm
selten wei-sblühend.
- Gentiana antecedens* Wettst. Innufer bei Hirnbach.
- Cynanchum Vinatoxicum* (L.) R. Br. Sonnige Hänge der Vorberge.
- Myosotis alpestris* Schm. Zwölferkogel, Pyramidenspitze, Grutten, Kopftörl.
- Ajuga Genevensis* (L.) Raine, trockene Wiesen der Vorberge, häufig mit
A. reptans (L.) gemeinsam.
- Teucrium montanum* (L.) Steinige, sonnige Abhänge des Kaisergebirges:
s. Rietzerwand.
- Scutellaria galericulata* (L.) Feuchte Wiesen, Zäune bei Ebbs.
- Brunella grandiflora* (L.) Sonnige Hänge und Raine bei der Rietzeralpe häufig.
- Lamium montanum* (Pers.) Raboth. Wälder bei der Rietzeralpe, Hinter-
kaiserfelden, Grutten.
- Lycopus mollis*. Gruben bei Oberndorf und Ebbs.
- Atropa Belladonna* (L.) Waldschläge der Vorberge gemein.
- Solanum Dulcamara* (L.) Graben, feuchte Zäune häufig.
- Linaria alpina* (L.) Mill. Häufig auf den Geröllfeldern des zahmen und
wilden Kaisers.
- Veronica latifolia* (L.) Häufig in den Wäldern der Vorberge.
- Veronica aphylla* (L.) Steinige Alpentriften. Plateau des zahmen Kaisers
Kopthörl.
- Veronica fruticans* Jacq. Alpenwiesen, Geröll am Grutten.
- Digitalis ambigua* Murr. Sonnige Hänge der Vorberge: Brenntenjoch.
- Euphrasia stricta* Host. Sonnige Hänge der Vorberge: Brenntenjoch.
- Euphrasia minima* Jacq. Pyramidenspitze.
- Euphrasia Salisburgensis* Funk. Vorberge häufig, so Sparchen, Teufelskanzel.
- Bartschia alpina* (L.) Feuchte Alpenwiesen am Grutten.
- Alectorolophus minor* (Ehrh.) Wimm et. Grab. Feuchte Wiesen bei Hirn-
bach, Schweich.
- Alectorolophus ellipticus* Hauss kn. Wiesen der Vorberge häufig.
- Alectorolophus angustifolius* (Gmel) Heynh. Wiesen der Vorberge.
- Alectorolophus lanceolatus* (Neier.) Sterneck. Auf Triften im Kaisertal.
- Pedicularis palustris* (L.) Sumpfwiesen bei Hirnbach.
- Pedicularis recutita* (L.) Wiesen am Hinterstein, Bärenstatt.
- Pedicularis foliosa*. Feuchte Plätze im hohen Winkel, Scharlingerböden.
- Pinguicula alpina* (L.) Feuchte Wiesen und Triften der Vorberge; so
Duxerköpfl, häufig.
- Pinguicula vulgaris* (L.) Feuchte Wiesen vom Tale bis in die Region der
Vorberge.
- Orobanche Salviae* Schltz. Auf *Salvia glutinosa* am Haberg.
- Orobanche Teucrii* Hollanda. Rietzerwand.
- Orobanche flava* Mart. Am Grutten.

- Globularia nudicaulis** (L.) Gerölle, steinige Triften, am Grutten.
Globularia cordifolia (L.) Steinige Hänge, gemein vom Tale (Mündung des Sparchenbaches in den Inn) bis in die Alpen.
Galium Austriacum Jacq. In der Krummholzregion des zahmen und wilden Kaisers gemein.
Galium aristatum (L.) Wälder der Vorberge.
Sambucus racemosa (L.) Waldschläge der Vorberge häufig.
Sambucus Ebulus (L.) Roger und Aufstieg zur Teufelskanzel.
Lonicera nigra (L.) Häufig Gebüsche der Vorberge.
Lonicera alpigena (L.) Einzeln in den Wäldern der Vorberge.
Valeriana tripteris (L.) Häufig in den Wäldern der Vorberge.
Valeriana montana (L.) Steinige Hänge von den Vorbergen bis ins Krummholz.
Valeriana saxatilis (L.) Gerölle, Felsen häufig.
Campanula pusilla Hnke. Feuchte Felsen und Gerölle im Kaisertal.
Adenostyles glabra (Vill) D.C. Feuchte Plätze der Vorberge gemein.
Adenostyles Alliariae (Gouan) Kern. Feuchte Stellen am Plateau des zahmen Kaisers, Petersköpfl.
Solidago virga aurea (L.) Häufig in den Vorbergen.
Aster Bellidiastrum (L.) Scop. Wiesen, Wälder der Vorberge häufig.
Erigeron alpinus (L.) Auf Felsen im zahmen Kaiser. Pyramidenspitze.
Bupthalmum salicifolium (L.) Gebüsche, trockene Wiesen der Vorberge.
Achillea atrata (L.) Feuchte Felsen am Plateau des zahmen Kaisers.
Achillea Clavenae (L.) Felsen, steinige Triften am Plateau des zahmen Kaisers, Kopftörl u. s. w.
Chrysanthemum alpinum (L.) Naunspitze, Pyramidenspitze.
Homogyne alpina (L.) Cass. Wälder der Vorberge häufig.
Senecio Tirolensis Kern. Pyramidenspitze.
Carlina acaulis (L.) Trockene Triften der Vorberge: so Teufelskanzel, Rietzeralpe.
Cirsium spinosissimum (L.) Scop. Elferkogel.
Centaurea alpestris Heg. et Heer. Wiesen der Voralpen: Rietzeralpe.
Centaurea montana (L.) Wälder, Gebüsche der Vorberge: Stadtberg.
Aposeris foetida (L.) Cass. In den Vorbergwäldern gemein.
Taraxacum alpinum (Hoppe) Koch. Geröllhalden des zahmen Kaisers.
Crepis aurea (L.) Cass. Plateau des zahmen Kaisers.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht des Vereins zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [2_1902](#)

Autor(en)/Author(s): Hofer Franz

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora des Kaisergebirges 34-40](#)