Noctuiden

(Schmetterlingsfamilie der Eulen)
des Bamberger Umlandes.

von Karl-Heinz Müller-Köllges, Zeil am Main

unter Mitarbeit von Dr. E. Garthe, Bamberg - G. Derra, Bamberg - W. Pilotek, BA-Gaustadt - A. Richter, Ebern - W. Schaupp, Forchheim - H. Schiller, Fürth - H. Seidlein, Schweinfurt - B. Stöckert, Memmelsdorf - R. Weidner, Memmelsdorf/Drosendorf.

Abgrenzung des Gebietes

Das besammelte und bearbeitete Gebiet entspricht in seinen Abgrenzungen den Festlegungen von Dr. E. Garthe in seinen Arbeiten über die Geometriden und Kleinschmetterlinge des Bamberger Umlandes.

Danach erstreckt sich das Gebiet etwa in einem Radius von 25 km um Bamberg, die Fläche beträgt rund 2 000 Quadrat-Kilometer. Die Fundorte lassen sich in drei geologische Strukturen einteilen: Sandgebiete, Keupergebiete und Juragebiets.

Sandgebiete: Börstig, Flurname 4 km nördl. BA
Strullendorf, Hauptsmoorwald 9 km südl. BA
Pettstadt, 9 km südl. BA
Forsthof Johannishof bei Oberheid, 8 km nw BA
Hesselberg, Weihergebiet bei Höchststadt/Aisch, 25 km südl. BA

Keupergebiet: Altenburg in Bamberg, Berggebiet
Daschendorf/Itz, 14 km nördl. BA
Ebern, 23 km nw BA
Zeil/Main, 25 km nordw. BA

Juragebiet: Tiefenellern, 15 km östl. BA
Pünzendorf, 13 km ono BA
Ludweg, 15 km ono BA
Dörrnwasserlos, 19 km nordöstl. BA
Veilbronn, 25 km oso BA
Dietzhof am "Walberla" bei Leutenbach, 30 km südöstl. BA

Allgemeine Bemerkungen zu den Noctuiden.

Die Eulen (*Noctua* die Eule) bilden die artenreichste Lepidopterenfamilie mit über 25 000 bis jetzt beschriebenen Arten, von denen die meisten in den Tropen verbreitet sind.

In Deutschland kommen unter Ausschluß der Alpengebiete etwa knapp 500 Arten vor. Es sind meist mittelgroße Falter von ziemlich gleichmäßigem Bau, so daß sie mit wenigen Ausnahmen leicht als Eulen zu erkennen sind (Abb. 1). Der Körper ist meist robust, nicht plump, der Hinterleib ziemlich schlank. Die Falter sind meist dicht behaart und haben auf Thorax und Abdomen oft Schöpfe. Die Vorderflügel sind länglich dreieckig und tragen ein für diese Familie typisches Zeichnungsmuster, die sogen. Eulenzeichnung (Abb. 2). Auffallendste Elemente dieses Zeichnungsschemas sind die Nieren-, Ring- und Zapfenmakel (NM, RM, ZM). Sie sind in der Regel gut ausgeprägt und kontrastieren oft stark zur Grundfarbe der Vorderflügel. Die Querlinien (Q 2, Q3) sind meist gut zu erkennen und teilen den Vorderflügel in Wurzel-, Mittel- und Saumfeld auf. Im Saumfeld befindet sich die oft stark gezackte Wellenlinie (W), auf deren Innenseite häufig dunkle Pfeilflecke (PF) liegen.

Die Wurzelstrieme (WS) ist bei vielen Eulen gut ausgeprägt und reicht bei einigen Arten bis in das Mittelfeld.

Ein weiteres Element der Eulenzeichnung ist der Mittelschatten (MS), der bei manchen Arten ein Bestimmungsmerkmal ist.

Die Hinterflügel besitzen in der Regel keine auffallende Zeichnung. Mittelmond (M) und Mittellinie (Q4) sind hierbei die wenigen Zeichnungselemente. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist meist bräunlich, grau oder gelblich, durch die Zeichnung meist rindenähnlich gemustert. Einige Arten haben lebhaft gefärbte Vorderflügel in gelb, orange oder grün. Die Arten der Unterfamilie Plusiinae sind meist sehr prächtig verziert durch glänzende Gold- und Silberflecke (Goldeulen).

Die Hinterflügel haben meist eine graue Grundfarbe, vielfach am Saum verdunkelt. Auffallende Hinterflügel haben die Bändeulen (z. B. *Tr. fimbria* mit orangefarbener Grundfarbe und breitem, tiefschwarzem Saumband), sowie die Unterfamilie der größten einheimischen Eulen, den Ordensbändern oder *Catocalen*. Diese Gruppe hat prächtig gebänderte Hinterflügel in rot, blau und gelb. Die Mehrzahl der Eulenfalter führt als Falter und Raupe eine nächtliche Lebensweise, einige wenige Arten jedoch sind tagaktiv und sonnenscheinliebend.

Die Eier gehören dem aufrecht stehenden Typ an (Abb. 3) und werden meist einzeln abgelegt, seltener in ganzen Gelegen.

Die Eulendraupen (Abb 4) sind meist zylindrisch, haben in der Regel die volle Zahl der Bauchbeinpaare (vier) und sind meist nackt. Bei einigen Arten sind die beiden ersten Bauchfußpaare verkümmert oder fehlen. Die Raupen der Unterfamilie Apatelinae sind m dicht bunt behaart.

Die Raupe verwandelt sich, meist in einem lockeren Erdgehäuse, in eine Mumienpuppe (Abb. 5).

Die Determination der Noctuiden bereitet bei einigen Arten erhebliche Schwierigkeiten. Eine begrenzte Anzahl davon läßt sich nach äußeren Merkmalen meist nicht eindeutig bestimmen, in diesen Fällen kann dies nur durch Genitaluntersuchung erfolgen. Von diesen Arten wird jeweils eine Valve des o abgebildet. Einige dieser Arten wurden bisher für unser Gebiet noch nicht nachgewiesen, dürften aber noch zu erwarten sein. Um hier für die weitere Arbeit der entomologischen Arbeitsgruppe Bestimmungshilfe zu bieten, wurden diese Präparate gezeichnet.

Bemerkungen zu dieser Veröffentlichung und zu Nomenklaturproblemen

Im 37. Bericht unserer Gesellschaft erschien 1960 die Arbeit von Heinrich Wittstadt über die Großschmetterlinge des Regnitzgebietes. Soweit diese Angaben auf das begrenzte Bamberger Umland zutreffen, werden sie mit einem (W) aufgenommen.

Arten, die bisher nur im Regnitzgebiet außerhalb der 25 km - Zone von Wittstadt erwähnt wurden, sowie Arten, die aus anderen angrenzenden Nachbargebieten gemeldet wurden, werden in eckige Klammern gesetzt.

Wie in den Arbeiten von Dr. Garthe über die Microlepidopteren, (48. Bericht 1973) und Geometriden (50. Bericht 1975) angeführt, wird die Verbreitungsskizze einschließlich der römisch-bezifferten Fundstellen übernommen. Diese Ziffern finden sich bei den Fundortangaben der einzelnen Arten im systematischen Teil wieder.

Liegen von einer Art nur wenige Fundortangaben vor, werden alle Nachweise namentlich aufgeführt.

Wie bei den Geometriden wurde die weitaus größte Zahl der Beobachtungen von Noctuiden "am Licht" gemacht, entweder an stationären Lichtquellen an Häusern, oder durch Lichtfang mit transportablen Geräten wie Notstromaggregaten. Eine Vielzahl von Beobachtungen beruht auf dem leider viel zu wenig betriebenen Köderfang. Dieses Verfahren ist zwar etwas umständlich mit den Vorbereitungen, auch gehen viele Arten nicht an den Köder, doch lassen sich gerade für Zuchtzwecke die Weibchen häufiger mit diesem

Verfahren als mit dem Lichtfang erbeuten.

Die Häufigkeitsangaben beruhen meist auf Sammlungsangaben, ausführliche Unterlagen in Form von Tagebüchern oder regelmäßig geführten systematischen Verzeichnissen lagen nur wenig vor.

Auch wenn auf dem Gebiet der Erfassung von Noctuiden und Lepidopteren allgemein von den Liebhaberentomologen gerade in unserer Zeit mehr getan werden sollte, möchte ich an dieser Stelle allen Mitarbeitern, Mitgliedern und Freunden unserer Gesellschaft sehr herzlich danken, die durch ihre Artenlisten, Sammlungsverzeichnisse und Faltervorlagen diese Arbeit erst ermöglichten.

Ganz besonders danken möchte ich Herrn Dr. Garthe, der mich in die Gemeinschaft der Bamberger Entomologen einführte und mir dadurch einen interessanten Aktionskreis verschaffte. Sein hervorragend geführtes Noctuidenverzeichnis bildet die Hauptsubstanz dieser Arbeit, die ihm hiermit gewidmet sei.

Dieser Arbeit liegen die Systematik und Nomenklatur des Werkes von A. SEITZ (Großschmetterlinge der Erde, Stuttgart 1910 ff) zugrunde, die ebenfalls im Eulenband von Koch Anwendung fanden. Durch ständige systematische Umgruppierungen in den letzten Jahrzehnten und laufende Änderungen alteingebürgerter Namen ist bis heute noch kein beständiges System mit gültigen Namen erstellt worden.

Aus diesem Grunde, und um der allgemeinen Anwendung der verbreiteten Fachliteratur gerecht zu werden, wird in dieser Arbeit des Seitz'sche System weiterverwendet. Außerdem wird die fortlaufende Numerierung der Arten des Eulenbandes von Koch übernommen.

Um den Benutzern des Systems nach CH. Boursin das Auffinden der Arten zu erleichtern, werden die abgeänderten Namen in runden Klammern beigelegt.

Um auch die zahlreichen Änderungen im System zu berücksichtigen, werden die laufenden Nummern aus dem Band IV Eulen von Forster-Wohlfahrt dem abgeänderten Namen vorangestellt.

1. Unterfamilie Acronyctinae

1 *Panthea coenobita* Esp.

(1142)

Im Gebiet überwiegend im Jura nachgewiesen: X, XI, XII, XV, Memmelsdorf, Stübig, ferner V, meist Einzelfunde vom 5. 6. bis 14. 7. (De, Kramer, St, Schi, W)

[2 *Moma ludifica* L.]

(1143 *Trichosea ludifica* L.)

Nur von Wittstadt erwähnt:

Selten und sehr lokal 1933 bei Dechsendorf, 1921 und 1924 im Bubenreuther Wald, Flugzeit Mai/Juni (Raupen auf Vogelbeere, Weißdorn und Weide). Aus unserem Gebiet bisher noch kein Nachweis.

3 *Diphthera alpium* Osb. Seladoneule

(1144 *Daseochaeta alpium* Osb).

Verbreitet in Laub- und Mischwäldern, IV, XI, XII, Memmelsdorf, Würgau und Ebern, 28. 5. bis 15. 7. (Ga, Ri, Scha, Schi, St, W).

4 *Colocasia coryl* L. Haseleule

(1145)

Weit verbreitet und im Gebiet meist nicht selten, 9. 4. bis 20. 6. und in einer unvollständigen 2. Generation 11. bis 16. 8. nachgewiesen. (Ga, M-K, Pi, Ri, Schi, St, W).

[6 *Arsilonche albovenosa* Goetze]

(1149)

Nur von Wittstadt erwähnt:

Dechsendorfer Weihergebiet 1 o 16. 8. 54. Dürfte in unserem Gebiet noch zu finden sein.

7 *Acronycta strigosa* F.

(1157 *Hyboma strigosa* Schiff)

Wittstadt erwähnt als sichere Fundorte Bubenreuther Wald, Erlenstegen bei Nürnberg., Michelsberger Wald bei Bamberg. Recht selten, Juni und Mitte Juli. In den letzten Jahren kein neuer Nachweis.

8 *Acronycta rumicis* L. Ampfereule

(1162 *Phaetra rumicis* L.)

Im ganzen Gebiet meist häufig in zwei sich überschneidenden Generationen: 23. 4. bis 23. 6., sowie 20. 7. bis 29. 8. (Ga, M-K, Pi, Scha, St, We, W).

9 *Acronycta psi* L. Pfeileule

(1156 *Apatele psi* L.)

Verbreitet und häufig in zwei Generationen von Mitte 5 bis Ende 8, von fast allen Mitarbeitern beobachtet.

(Abb. Valve, Gen. Pr.-Nr. 13 Ga)

10 *Acronycta tridens* Schiff. Dreizackeule

(1155 *Apatele tridens* Schiff.)

Die Art ähnelt äußerlich sehr der vorigen, und läßt sich mit Sicherheit nur durch Genitaluntersuchung bestimmen. Bisher nur ein Nachweis vom Kaulberg/BA 22. 8. 56, leg. Garthe, (W). (Abb. Valve, Gen. Pr.-Nr. 15 Ga).

[11 *Acronycta cuspidata* Hbn.]

(1154 *Apatele cuspidata* Hbn.)

Nur Wittstadt erwähnt Einzelfunde. 1929 E. 5 bei Erlangen, sowie bei Fürth. In unserem Gebiet sicher noch zu finden. (Abb. Valve, Gen. Pr.-Nr. 11 Ga)

12 *Acronycta aceris* L. Ahorneule.

(1151 *Acronycta aceris* L.)

Verbreitet, doch meist nur Einzelfunde, X, XII, Bamberg, Gaustadt, Oberhaid, Memmelsdorf, Stübig, Forchheim, 26. 4. bis 29. 6., eine gelegentlich partiell auftretende 2. Generation wird nur von Wittstadt gemeldet. (Ga, Pi, Scha, St, W)

13 *Acronycta alni* L. Erleneule

(1153 *Apatele alni* L.)

Im Gebiet verbreitet und in Einzelfunden nachgewiesen, IV, X, XII, Kaulberg/BA, Memmelsdorf, Zeil/Main, 8. 5. bis E 6. Eine unvollständige 2. Generation wird nur aus dem angrenzenden Schweinfurter Raum gemeldet: Schwebheim 3. 8. 75 1 o (leg. H. Seidlein). (Ga, M-K, Schi, St, W)

14 *Acronycta auricoma* F.

(1159 *Pharetra auricoma* Schiff.)

Allgemein verbreitet, I, IV, X, XIII, Bamberg, Lohndorf, Ebern, Zeil/M., nicht selten in 2 Generationen 11. 4. bis 18. 6. und 26. 7. bis 17. 8. (Ga, M-K, R1, Scha, St, W, We)

15 *Acronycta manyanthidis* F.

(1158 *Pharetra manyanthidis* View.)

Nur von Wittstadt erwähnt: Hauptsmoorwald bei Bamberg, um 1900 nicht selten, ferner in der Brucker Lache (Erlangen). In der letzten Zeit keine Neufunde.

16 *Acronycta megacephala* F.

(1150 *Subacronycta megacephala* Schiff.)

Im gesamten Gebiet weit verbreitet und regelmäßig beobachtet in einer, möglicherweise zwei Generationen vom 28. 5. bis 13. 8. (Ga, M-K, Pi, Scha, Schi, St, W)

17 *Acronycta euphorbiae* F.

(1160 *Pharetra euphorbiae* Schiff.)

Im Gebiet nur wenig nachgewiesen: BA-Kaulberg, Hauptsmoorwald bei Bamberg, Geisdorf, in zwei Generationen 20. 4. und 17. 7. bis 20. 8. (Ga, Scha, W)

19 *Acronycta leporina* L.

(1152 *Acronycta leporina* L.)

Verbreitet und nicht selten in zwei ineinander übergehenden Generationen, Mitte Mai bis Anfang September. (Ga, M-K, Pi, St, W)

20 *Craniophora ligustri* F. *Ligustereule*

(1163 *Craniophora ligustri* Schiff.)

Lokal und nur in Einzelstücken nachgewiesen: Veilbronn 6. 6. 56 (Schi), Hallstadt/Kreuzberg "Rabenhorst" 26. 6. 68 (Ga), Sträublingshof/Staffelstein 24. 6. 70 (Ga), Zeil/M. 6. 7. 73 (1 o, M-K).
Nach Wittstadt bei Bamberg noch nicht festgestellt.

3. Unterfamilie Bryophilinae, Flechteneulen

21 *Bryophila divisa* Esp.

(1137 *Bryoleuca raptricula* Schiff.)

Im Gebiet besonders in Ortschaften beobachtet: BA-Michelsberg 8. 8. 56 häufig (Ga), Memmelsdorf, Drosendorf, Forchheim, Zeil/M., Im August (Ga, M-K, Scha, St, We, W). H. Seidlein meldet die Art regelmäßig für das Schweinfurter Stadtgebiet.

23 *Bryophila ravula* Hbn.

(1135 *Bryoleuca ravula* Hbn.)

Wittstadt führt einen Fund an der Teuchatzer Höhe 1937 auf.
Sonst kein weiterer Nachweis.

24 *Bryophila algae* F.

(1133 *Euthales algae* F.)

Nur vereinzelt beobachtet, I, IV, X, Memmelsdorf, Zeil/M., BA-Teufelsgraben 1971 häufig (W), 8. 8. bis 29. 8. (De, Ga, M-K, St, W).

25 *Bryophila muralis* Forst. **Mauerflechteneule**

(1141)

Nach Wittstadt im Juli vereinzelt und stets lokal, z. B. bei Streitberg, an der Giechburg bei Bamberg. Wurde sonst nicht gemeldet.

26 *Bryophila perla* F.

(1140 *Bryoleuca domestica* Hufn.)

Im Gebiet nur wenig festgestellt, Scheßlitz, Dörrnwasserlos, Stübig, Veilbronn, 7. 7. bis 31. 7. (De, Schi, St, W).

3. Unterfamilie Agrotinae, Erdeulen

27 *Euxoa aquilina* Schiff.

(648)

Bisher nur einmal nachgewiesen: Johannishof/Oberhaid 8. 8. 75
1 ♀ (leg. Garthe, Gen. Pr. Nr. 160 ♀)

29 *Euxoa obelisca* Schiff.

(639)

Auf Sandböden ziemlich verbreitet und gelegentlich häufig,
Börstig, Strullendorf, Johannishof, Unterhaid, Bamberg-
Stadt, Zeil/M., 5. bis 28. 8. (De, Ga, M-K, W).

33 *Euxoa nigricans* L.

(647)

Im Gebiet bisner nur vereinzelt beobachtet: Bamberg, Börstig,
Scheßlitz, Geisdorf, Unterhaid, Zeil/M. und Veilbronn,
2. bis 23. 8. (De, Ga, M-K, Schi, W)

34 *Euxoa triciti* L. Weizeneule

(643)

Verbreitet, I, IV, Ba-Kaulberg, Gaustadt, Memmelsdorf, Unter-
haid, Forchheim, Zeil/M. Mitte 7 bis Ende 8, (Ga, M-K, Pi,
Scha, St, W, We).

37 *Agrotis ypsilon* Rott.

(663 *Scotia ypsilon* Hufn.)

Im Gebiet eine häufige und allgemein verbreitete Art, erste
Funde 21. 6. (Einflüge aus dem Süden - Binnenwanderer, 2. Ord-
nung) bis 18. 7. Weitere Beobachtungen ab 2. 9. bis 5. 11.
(2. Generation - Rückwanderer), (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Scha,
St, W)

38 *Agrotis segetis* Hbn. Saataule

(659 *Scotia segetum* Schiff.)

Überall vorkommend und häufig, ab Anfang Juni bis Ende Juli,
und in einer 2. Generation vom 28. 8. bis 23. 10. (De, Ga,
M-K, Scha, Schi, St, W, We)

39 *Agrotis corticea* Hbn.

(660 *Scotia clavis* Hufn.)

Nur lokal festgestellt, sicher gelegentlich mit *segetis* (3ö) verwechselt und übersehen, Heroldsmühle/Oberleinleiter Jura, Geisdorf, Ludwag, Stübig, Kobelsberg bei Aufseß, Dörrnwasserlos, 21. 6. bis 12. 7. (De, Ga, M-K, St. W).

40 *Agrotis crassa* Hbn.

(666 *Scotia crassa* Hbn.)

Von dieser südöstlichen Art, die bisher in Deutschland nur an wenigen Orten gefunden wurde, liegt aus unserem Gebiet eine Meldung vor: Pettstadt bei Bamberg, 9.8.72, ein abgeflogenes ♂, leg. Garthe. Wittstadt erwähnt Nürnberg (H. Schiller) und Erlangen (W) als Fundorte.

41 *Agrotis vestigialis* Rott.

(658 *Scotia vestigialis* Hufn.)

In Heidegebieten und auf trockenen warmen Sandböden verbreitet, I, II, III, BA-Kaulberg, Unterhaid, Memmelsdorf, Forchheim Ebern, Zeil/M., meist einzeln, gelegentlich häufig, 1968 massenhaft (Ga), 26. 7. bis 5. 9. (De, Ga, M-K, Ri, Scha, St, We, W)

42 *Agrotis cinerea* Schiff.

(656 *Scotia cinerea* Schiff.)

Im Gebiet an vielen Plätzen festgestellt, BA-Kaulberg, Kreuzberg, Johannishof, Wiesenthau, Egloffstein, Ludwag, Pünzendorf, Zeil/M., einzeln, nur gelegentlich zahlreich, vom 14. 5. bis 8. 6., einmal im August gemeldet (Ga), (De, Ga, M-K, Scha, St, W)

43 *Agrotis exclamatoris* L. Gemeine Gräseule

(661 *Scotia exclamatoris* L.)

Überall verbreitet und sehr häufig, 10. 5. bis 29. 8., wobei die Augusttiere einer zweiten unvollständigen Generation angehören. (Ga, De, M-K, Pi, Scha, St, We)

45 a *Agrotis nigrescens* Hübner

(670 *Ogygia nigrescens* Hübner)

Die Art wurde bisher nur von Zeil/M. gemeldet, 20. 6. 73 1 ♂[?]
sowie 6. 7. 73 ein frisches ♀, beide Funde vom Kapellenberg,
350 m (M-K). Aus den Nachbargebieten von der Fränkischen Schweiz
und dem nördlichen Frankenjura gemeldet, z.B. regelmäßig von
Wallersberg im Klein Ziegenfelder Tal (Lukasch).

46 *Agrotis multangula* Hbn.

(694 *Chersotis multangula* Schiff.)

Diese Art wurde im Gebiet nur vom Jura gemeldet: Dörrnwasserlos
7. 7. 73 (De) und Ludwig 25. 6. 71 (De).

Wittstadt gibt nur 2 Einzelfunde von der langen Meile/Drügendorf
(W) und Dietzhof (Kramer) an.

47 *Agrotis polygona* F.

(711 *Opigena polygona* Schiff.)

Für unser Gebiet nur eine Beobachtung aus dem Stadtgebiet von Bam-
berg, 18. 9. 64 (Ga). Zwei weitere Einzelfunde wurden noch von
Wittstadt für Erlangen und Bamberg aufgeführt.

49 *Rhyacia glareosa* Esp.

(716 *Paradiarsia glareosa* Esp.)

Westliche Art, die neuerdings an einigen Plätzen regelmäßig und
meist in Anzahl gefunden wird: Strullendorf/Hauptsmoorwald bei BA,
Leidingshof/Ebermannstadt, 28. 8. bis 21. 9. (De, Ga, St). Die
vorliegenden Beobachtungen wurden ab 1968 gemacht. W. meldet nur
einen Falter am 19. 9. 50 aus Erlangen.

[50 *Rhyacia margaritacea* Vill.]

(695 *Chersotis margaritacea* Vill.)

Für das Bamberger Umland bisher noch kein Nachweis. Aus den
Nachbargebieten von Wallersberg/Weismain regelmäßig im August
gemeldet (Lukasch), Wittstadt führt Einzelfunde im Bubenreuther
Wald und in Wellucken auf.

51 *Rhyacia depuncta* L.

(680 *Eugnorisma depuncta* L.)

Bisher nur wenige Einzelfunde: Ebern 10. 8. 70 (Ri), Dörrnwas-
serlos 18. 8. 73 (De), Heroldsmühle/Oberleinleiter Jura 17. 8.
76 1 ♀ (Ga).

53 *Rhyacia latens* Hbn.

(685 *Epipsilia latens* Hbn.)

Nur ein Nachweis aus Memmelsdorf 4. 7. 69 (St). Wittstadt gibt
nur einen Fund bei Dechsendorf 30. 6. 38 an, am Tage fliegend.

55 *Rhyadia ravidia* Schiff

(708 *Spaelotis ravidia* Schiff.)

Lokal auf Sandböden verbreitet, für unser Gebiet nur eine Mel-
dung aus Memmelsdorf/Drosendorf, Juli 76, leg. R. Weidner
(1 ♀ det. Garthe). Wittstadt führt als Fundorte Rathsberg/Er-
langen, sowie 1 F. bei Bamberg, 2. 8. 48, an.

56 *Rhyacia simulans* Hufn.

(686)

Wie vorige Art vorwiegend auf Sandplätzen verbreitet, bisher
nur von Wittstadt für Bamberg aufgeführt, ferner Bubenreuth,
Erlangen, mehrfach im Fürther Stadtgarten (Schi).

57 *Rhyadia lucipeta* Schiff.

(687)

Bisher nur von wenigen Plätzen gemeldet, Bamberg-Stadt (Eis-
grube 6, am Hauseingang, 21. 8. 72, leg. Garthe), Ludwag 3. 9.
71 (De), Zeil/M. Stadtgebiet 5. 9. 74 1 ♀ (M-K).

58 *Rhyacia candelarum* Stgr.

(735 *Amathes ashworthii* ssp. *candelarum* Stgr.)

Im Gebiet erst wenig beobachtet, Hangerberg bei Unterhaid 28.
6. 74 (De), Johannishof/Oberhaid 22. 7. 74 (Ga). Förtschwind/
Zentbechhofen 12. 7. 1967 (Ga).

59 *Rhyacia saucia* Hbn.

(721 *Peridroma saucia* Hbn.)

Binnenwanderer 2. Ordnung, der jahrweise unterschiedlich stark
aus dem Süden in Mitteleuropa einwandert, nur eine Meldung,

Ebern 4. 3. 62 (Ri). Wittstadt gibt Bubenreuth, Forchheim und Bamberg an. Ferner 1950 und 1959 mehrere Falter in Dietzhof (Kramer).

61 *Rhyadia porphyrea* Schiff.

(720 *Lycophotia pophyrea* Schiff.)

In Heidegebieten verbreitet und gelegentlich häufig, IV, X, Bamberg-Stadt, Hallstadt, Aufseß, Unterhaid, Zeil/M., Mitte Juni bis Ende Juli, (De, Ga, M-K, St, W).

62 *Rhyacia dahlii* Hbn.

(723 *Diarsia dahlii* Hbn.)

Forchheim 4. 8. 36 1 ♀, leg. Wittstadt, aus neuerer Zeit keine weiteren Nachweise. Aus dem Nachbargebiet Schweinfurt regelmäßig vom Schwebheimer Wald gemeldet (Seidlein).

63 *Rhyacia festiva* Schiff

(722 *Diarsia mendica* F.)

Im Gebiet verbreitet und meist einzeln, BA-Michelsberg, Johannis-hof, Ebern, Zeil/M., Forchheim, Veilbronn, im Juni (Ga, M-K, Ri, Scha, Schi, W).

64 *Rhyadia brunnea* Schiff

(724 *Diarsia brunnea* Schiff.)

Verbreitet und gelegentlich häufig, I, III, IV, IX, X, XI, XII usw., Juni bis August (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, St, W).

66 *Rhyadia baja* F.

(736 *Amathes baja* Schiff.)

Im Gebiet einzeln, manchmal häufig IX, X, Bamberg, Heroldsmühle, Stübig, Zeil/M., Mitte Juli bis Ende August, (De, Ga, M-K, Scha, St, W)

67 *Rhyadia rubi* View.

(725 *Diarsia rubi* View.)

Bisher aus dem Bamberger Umland nur wenig gemeldet, Börstig 29. 8. 72 (De), 29. 8. 68 häufig (Ga) und Rättenbach/Forchheim 17. 6. 68 häufig (Ga), vereinzelt bei Bamberg (W).

68 *Rhyadia florida* Schmidt

(726 *Diarsia florida* Schmidt)

Heroldsmühle/Oberleinleiter Jura 22. 6. 76 (Ga), Hohengüßbach
15. 6. 74 (De), aus dem Nachbargebiet Schweinfurt ein Nachweis
aus Zell 16. 6. 74 ein ♂ (Seidlein).

69 *Rhyacia c-nigrum* L. Schwarzes C

(732 *Amathes c-nigrum* L.)

In zwei Generationen überall verbreitet und häufig bis sehr
häufig, von Mitte Mai bis Ende Juni, Mitte Juli bis Mitte Ok-
tober (De, Ga, M-K, Pi, Scha, St, W).

70 *Rhyacia triangulum* Hufn.

(734 *Amathes triangulum* Hufn.)

Verbreitet und meist nicht selten, I, IV, X, XI, XII und an-
dere Plätze, Juni bis Juli (De, Ga, M-K, Schi, St, W).

71 *Rhyacia ditrapezium* Bkh.

(733 *Amathes ditrapezium* Schiff.)

Wesentlich seltener als *triangulum*, bisher nur zwei Nachweise:
Börstig, 27. 7. 74 (leg. Weidner) Pettstadt 12. 7. 74 (Derra)
Von Wittstadt vereinzelt für das Gebiet aufgeführt.

72 *Rhyadia plecta* L.

(677 *Ochropleura plecta* L.)

Überall häufig in 2 Generationen, bereits ab 9. 4. bis Ende
August, (De, Ga, M-K, Pi, Scha, W, We).

73 *Rhyacia sigma* Schiff.

(713 *Eugraphe sigma* Schiff.)

Im Gebiet eine Seltenheit, nur zwei Meldungen: Dörrnwasserlos
20. 6. 73 (De), Walberla 8. 5. 57 (e.l. Schiller). Weitere An-
gaben bei Wittstadt: Bruderwald bei BA, Altenburg/BA, sowie
Raupenfunde Ende April im Bamberger Hain.

74 *Rhyadia rhomboidea* Esp.

(737 *Amathes rhomboidea* Esp.)

Verbreitet, meist einzeln gefunden, I, IV, Sträublingshof/
Staffelstein, Stübig, Zeil/M., Unterhaid, Memmelsdorf, Geis-

dorf, vom 3. 7. bis 27. 8. (De, Ga, M-K, St, W).

[75 *Rhyacia umbrosa* Hbn.]

(740 *Amathes sextrigata* Haw.)

Die Art ist vorwiegend westlich und nordwestlich verbreitet und bei uns noch nicht beobachtet. Aus den Nachbargebieten von der Rhön gemeldet (Waldberg, leg. Seidlein), ferner als östlichster Punkt Sambachshof in den nördlichen Haßbergen, ca. 50 km nordwestlich von Bamberg (Seidlein).

76 *Rhyadia xanthographa* Schiff

(741 *Amathes xanthographa* Schiff.)

Verbreitet und im Gebiet meist häufig, beobachtet von Mitte August bis Anfang September, (De, Ga, M-K, Pi, Scha, St, W).

77 *Rhyacia putris* L.

(1128 *Axylia putris* L.)

Die Art wird im Gebiet überall nicht selten bis häufig gefunden, vom 6. 6. bis 21. 7. (Ga, M-K, Pi, Scha, Schi, St, W, We).

78 *Rhyacia molothina* Esp.

(718 *Lycophotia molothina* Esp.)

Bisher nur wenige Nachweise aus unserem Gebiet: Hallstadt, BA-Kreuzberg, Stephansberg, Johannishof, 26. 5. bis 3. 7. (Dr. Garthe). Wittstadt erwähnt Einzelfunde aus Erlangen, Hauptmoorwald bei Bamberg, Wellucken.

79 *Rhyacia castanea* Esp.

(738 *Amathes castanea* Esp.)

Bisher nur von Wittstadt aufgeführt für Altenburg/BA, sowie ab. *neglecta* 1920 bei Bughof/BA. Aus neuerer Zeit keine weiteren Funde.

80 *Rhyacia cupra* Schiff.

(698 *Chersotis cuprea* Schiff.)

Diese in den Alpen verbreitete Art wird im Jura gelegentlich häufig gefunden, Dörrnwasserlos 10. 8. 73 häufig (De, Ga), Ludwag, Scheßlitz, Veilbronn, Heroldsmühle, Stackendorf, 31. 7. bis 31. 8 (De, Ga, St).

81 *Rhyacia augur* F.

(712 *Graphiphora augur* F.)

Von dieser weit verbreiteten Art liegen aus dem Gebiet nur einige Beobachtungen vor, Bärstig, BA-Kreuzberg, Hesselberg bei Höchststadt/Aisch, Ende Juni bis Juli (De, Ga, W)

82 *Rhyacia praecox* L.

(673 *Ochropleura praecox* L.)

Auf Sandboden verbreitet, lokal und meist selten, nur ein Nachweis vom Michelsberg/Bamberg, 17. 8. 55 leg. Garthe.

85 *Eurois prasina* F.

(746 *Anaplectoides prasina* Schiff.)

Im Gebiet weit verbreitet und nicht selten, Juni bis Juli (De, Ga, M-K, Scha, Schi, St, W.).

86 *Eurois occulta* L.

(745)

In Waldgebieten mit *Vaccinium*-Beständen, bisher nur gemeldet vom Johannishof 3. 7. 69 (Ga), Dörrnwasserlos/Scheßlitz 10. 7. 73 (St), Kobelsberg bei Aufseß 12. 7. 70 (De) sowie (W).

87 *Cerastis leucographa* Schiff.

(748)

Im Gebiet verbreitet und einzeln, IV, XII, Ba-Kaulberg, Gaustadt Sträublingshof, Memmelsdorf, Ebern, Zeil/M., 10. 4. bis 10. 5. (Ga, M-K, Pi, Ri, Schi, St, W).

88 *Cerastis rubricosa* F.

(747 *Cerastis rubricosa* Schiff.)

Häufiger als vorige Art und von den meisten Fundorten nachgewiesen, vom 30. 3. bis 3. 5. (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, St, W, We).

90 *Orthosia caecimacula* Schiff.

(1080 *Ammoconia caecimacula* Schiff.)

Lokal an warmen Plätzen regelmäßig und gelegentlich häufig beobachtet: BA-Kaulberg, Würgau, Altenburg, Veilbronn, Ludwag, Memmelsdorf, Bärstig, Zeil/M., im September. (Ga, M-K, Schi, St, W).

92 *Mythimna acetosellae* Schiff.

(749 *Mesogona acetosellae* Schiff.)

Bisher nur wenig nachgewiesen, Leidingshof, Veilbronn (mehrfach, Ludwig, im September (De, Ga, Schi, W)).

93 *Mythimna oxalina* Hbn.

(750 *Mesogona oxalina* Hbn.)

Im Gebiet eine Seltenheit, nur gemeldet vom Bärstig 21. 8. 71 (De, Ga) und von Zeil-Stadt 8. 9. 1973, 3 ♀♀ (M-K). Wittstadt erwähnt Bamberg (1958) und Altenburg / Ba (1947).

94 *Naenia typica* L.

(744 *Phalaena typica* L.)

Nur wenig beachtet, von den meisten Fundorten fehlt bisher der Nachweis über das Vorkommen dieser in anderen Gebieten meist häufigen Art. Pettstadt, Drosendorf, Hesselberg, Mitte Juli bis Anfang August (De, Ga, W, We).

95 *Epilecta linogrisea* Schiff.

(707)

Auf warmen sandigen Plätzen sehr lokal, bisher nur eine Meldung aus Veilbronn 1956 (Schiller). Aus den Nachbargebieten ein Falter Wellucken bei Erlangen, 3. 9. 54 (leg. Kramer, in Coll. Garthe).

96 *Triphaena pronuba* L. Hausmutter

(700 *Noctua pronuba* L.)

Überall verbreitet und häufig, in einer Generation vom 7. Juni bis 10. Oktober, (De, Ga, M-K, Pi, Ri, St, We, W).

97 *Triphaena fimbria* L. Gelbe Bandeule

(703 *Noctua fimbriata* Schreber)

Verbreitet und gelegentlich häufig, I, IV, IX, Ba-Kaulberg, Gaustadt, Heroldsmühle, Wiesenthau, Ebern, Zeil/M., von Anfang Juli bis Anfang September (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, St, W).

98 *Triphaena interjecta* Hbn.

(705 *Noctua interjecta* Hbn.)

Bisher nur ein Nachweis: Dörfleins, Altmain 14. 8. 76 ein ♂,
leg. Derra. Aus Unterfranken meldet H. Seidlein diese westli-
che Art häufig aus Gumbach bei Karlstadt/Main am 30. 7. 75.

99 *Triphaena janthina* Schiff.

(704 *Noctua janthina* Schiff.)

Weit verbreitet und nicht selten, I, II, VII, XI,
BA-Kaulberg, Gaustadt, Sträublingshof, Unterheid, Stak-
kendorf, Forchheim, Heroldsmühle, Zeil/M., Juli bis Mit-
te September (De, Ga, M-K, Pi, Scha, St, W).

100 *Triphaena comes* Hbn.

(702 *Noctua comes* Hbn.)

Ohne schwarzen Apicalfleck auf dem Vorderflügel. Verbreitet,
I, II, III, VIII, XII, Sträublingshof, BA-Kaulberg, Unterheid,
Zeil/M., Juni bis Anfang September (De, Ga, M-K, Pi, Schi,
St, W).

104 *Actinotia polydon* Cl.

(884)

In Gebieten mit *Hypericum*-Beständen regelmäßig nachgewiesen:
I, IV, X, XII, BA-Kreuzberg, Mommelsdorf, Zeil/M., usw., von
Mitte Mai bis Ende Juli (Ga, M-K, Scha, Schi, St, W).

[106 *Auchmis comma* Schiff.]

(883)

Nur von Wittstadt für Erlangen aufgeführt (einige Falter).
Aus Unterfranken gemeldet von Wiesenfeld bei Karlstadt/Main,
ein Pärchen am 8. 7. 1972 am Köder (M-K).

4. Unterfamilie *Handeninae*

107 *Barathra brassicae* L. Kohleule

(770 *Mamestra brassicae* L.)

Überall gefunden und häufig, ein Falter bereits am 8. 3. 75 in Zeil/M. (an der Südseite der Stadtmauer), Mai bis September in 2-3 Generationen (De, Ga, M-K, Pi, Scha, St, W, We).

108 *Scotogramma trifolii* Rott.

(755 *Discestra trifolii* Rufn.)

Im Gebiet überall häufig, von Mitte Mai bis Ende August (De, Ga, M-K, Pi, Scha, St, W).

109 *Scotogramma marmorosa* Bkh.

(756 *Discestra marmorosa* Bkh.)

Im Juragebiet vereinzelt nachgewiesen, Ludwag, Dörrnwasserlos, Veilbronn, in 2 Generationen, Mai und Ende Juli (De, Schi, St, W). Erwähnenswert ferner der Nachweis für Zell bei Schweinfurt (Seidlein).

111 *Polia contigua* Schiff.

(772 *Mamestra contigua* Schiff.)

Verbreitet, meist einzeln, I, X, XII, Leidingshof, Memmelsdorf, Forchheim Ende Mai bis Juli, ein Falter noch am 5. 9. (partiell 2. Generation), (Ga, Scha, Schi, St, W).

112 *Polia genistae* Bkh.

(773 *Mamestra w-latinum* Hufn.)

Häufiger als vorige Art, im Gebiet überall nachgewiesen, 17. 5. bis 12. 7. (Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, St, W).

113 *Polia thalassina* Rott.

(774 *Mamestra thalassina* Hufn.)

Verbreitet, meist häufig, Mitte Mai bis Mitte Juli, Einzel-funde einer unvollständigen 2. Generation Ende September. (Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, St, W).

114 *Polia dissimilis* Knoch

(775 *Mamestra suasa* Schiff.)

Verbreitet und wie vorige Art meist häufig, bereits ab Ende April bis Juni und in einer 2. Generation von Mitte Juli bis August (Ga, M-K, Scha, Schi, St, W).

115 *Polia aliena* Hbn.

(778 *Mamestra aliena* Hbn.)

Bisher überwiegend aus dem Juragebiet gemeldet, Ludweg 25. 26. 6. 71 (De, St), 9. 6. 76 (De), ferner ein abgeflogenes ♂ am 20. 6. 73 bei Zeil am Kapellenberg (M-K). Wittstadt erwähnt Einzelfalter im August bei Bamberg.

116 *Polia persicariae* L.

(771 *Mamestra persicariae* L.)

Überall verbreitet und häufig, Anfang Juni bis Ende Juli (Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, St, W, We).

118 *Polia oleracea* L. Gemüseeule

(777 *Mamestra oleracea* L.)

Im Gebiet verbreitet und ziemlich häufig, in 2 Generationen ab Ende April bis August (Ga, M-K, Pi, Ri, St, W, We).

119 *Polia pisi* L. Erbseneule

(779 *Mamestra pisi* L.)

Verbreitet, meist einzeln, nur gelegentlich häufiger, I, IV, X, XII, BA-Kaulberg, Gaustadt, Forchheim usw., von Mitte Mai bis Anfang Juli (Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, St, W).

120 *Polia nana* Hufn.

(803 *Lasionycta nana* Hufn.)

Verbreitet, manchmal häufig, I, XII, Bamberg, Memmelsdorf, Forchheim, Ebern, Zeil/M., Mitte Mai bis Ende Juni, Fangdaten der 2. Generation (7-9) lagen nicht vor, (Ga, M-K, Ri, Scha, Schi, St, W).

121 *Polia glauca* Hbn.

(780 *Mamestra glauca* Hbn.)

Nur wenige Nachweise, Börstig, Johannishof, Strullendorf, Hauptsmoorwald, Mitte Mai bis Mitte Juni (De, Ga).

122 *Polia serena* Schiff.

(781 *Mamestra bicolorata* Hufn.)

Im Gebiet lokal und einzeln festgestellt, Börstig, Veilbronn, Memmelsdorf, Anfang Juni bis Ende Juli (De, Ga, St, W).

123 *Polia spinaciae* View.

(782 *Mamestra dysodea* Schiff.)

Bisher nur gelegentlich festgestellt, BA-Friedrichsbrunnen 27. 8. 59 (Ga), Hallstadt 8. 8. 61 (Ga), Zeil/M., 1. 8. 74 (M-K)

124 *Harmodia rivularis* F.

(784 *Hadena rivularis* F.)

Verbreitet, vielfach häufig, Mitte Mai bis Anfang September (Ga, M-K, Ri, Schi, St, W, We).

125 *Harmodia lepida* Esp.

(785 *Hadena lepida* Esp.)

Lokal, nur gelegentlich häufig, Ba-Michelsberg, Kaulberg, Kreuzberg, Pettstadt, Förtschenried, Zeil/M., 1. 6. bis 19. 8. (Ga, M-K, St, W).

126 *Harmodia bicruris* Hufn.)

(799 *Hadena bicruris* Hufn.)

Von dieser weitverbreiteten, ziemlich häufigen Art liegt aus unserem Gebiet bisher nur ein Nachweis aus Forchheim vor, 26. 6. 76 leg. Schaupp. Wittstadt führt die Art bei Fürth und der Langen Meile auf.

127 *Harmodia filigrama* Esp.

(791 *Hadena filigrama* Esp.)

Im Gebiet lokal und einzeln festgestellt, BA-Kreuzberg, Börstig Veilbronn, Ebern, Mitte Mai bis Ende Juni (Ga, Ri, Schi, St).

129 *Harmodia albimacula* Bkh.

(793 *Hadena albimacula* Bkh.)

Bisher aus dem Jura gemeldet, Veilbronn 3. und 6. 6. (Schi), Ludwag 19. 5. 71 (St), sowie aus dem Keupergebiet Ebern 4. 7. 64 (Ri). Wittstadt gibt Bamberg, Wellucken und Dietzhof an.

130 *Harmodia nana* Rott.

(797 *Hadena confusa* Hufn.)

Lokal und nur einzeln gefunden, BA-Kaulberg, Börstig, Forchheim, Stübig, Memmelsdorf, Geisdorf, Anfang Juni bis Ende Juli (Ga, Scha, St, W).

131 *Harmodia compta* Schiff.

(795 *Hadena compta* Schiff.)

Verbreitet und nicht selten, BA-Michelsberg, Börstig, Memmelsdorf, Veilbronn, Ludwag, Forchheim, Ebern, Zeil/M., Juni und Juli (Dr, Ga, M-K, Ri, Scha, Schi, St, W).

135 *Aplecta advena* Schiff.

(758 *Polia bombycina* Hufn.)

Bisher nur wenig festgestellt, Veilbronn 24. 6. 71 (Ga) Ludwag 25. 6. 71 (6 Falter, De u. St), Dörrnwasserlos 29. 6. 73 (De), um Bamberg (W).

136 *Aplecta tinctoria* Brahm

(759 *Polia hepatica* Cl.)

Seltener als vorige Art, Dörrnwasserlos 7. 7. 73 (St), Ebern 4. 8. 72 (Ri), Gaustadt 10. 7. 75 (Pi), Zeil/M. 24. 6. 74 (M-K), Bamberg(W).

137 *Aplecta nebulosa* Hufn.

(760 *Polia nebulosa* Hufn.)

Im Gebiet verbreitet und meist häufig, Anfang Juni bis Anfang August (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, St, W).

138 *Pachetra fulminea* F.

(762 *Pachetra sagittigera* Hufn.)

Verbreitet und gelegentlich häufig, Mitte Mai bis Ende Juni (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, St, W).

139 *Hadena reticulata* Vill.

(768 *Heliophobus reticulata* Goeze)

Verbreitet und einzeln, zuweilen häufig, Mitte Mai bis Anfang Juli (Ga, M-K, Scha, Schi, St, W).

141 *Tholera popularis* F.

(808 *Tholera popularis* Poda)

Verbreitet und ziemlich häufig, I, IV, IX, X, XII, BA-Kaulberg, Gaustadt, Memmelsdorf, Zeil/M., Anfang August bis Mitte September (Ga, M-K, Pi, Schi, W, We).

142 *Tholera cespitis* F.

(807 *Tholera cespitis* Schiff.)

Im Gebiet vereinzelt nachgewiesen (Jahrweise häufig), I, II, IV, VIII, XII, Forchheim, Ba-Kaulberg, Kreuzberg, Memmelsdorf, Mitte August bis Mitte September (De, Ga, M-K, Pi, Scha, Schi, St, W).

145 *Trichoclea albicolon* Hbn.

(765 *Sideridis albicolon* Sepp)

Nur wenig nachgewiesen und meist selten, bevorzugt Sandböden, Birstig, Johannishof, Burk bei Forchheim, Gaustadt, BA-Michelsberg, Zeil/M., Anfang Juni bis Juli (Ga, M-K, Pi, Scha, St, W).

147 *Xylomania conspicillaris* L.

(810 *Xylomyges conspicillaris* L.)

Verbreitet, nicht selten, II, IV, X, XII, Gaustadt, BA-Kaulberg, Leidingshof, Memmelsdorf, Ebern, Zeil/M., vom 31. 3. bis 20. 5. (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, St, W).

148 *Monima gothica* L.

(821 *Orthosia gothica* L.)

Wie die meisten Arten dieser Gattung verbreitet und häufig, die Falter besuchen nachts blühende Weidenkätzchen, Mitte März bis Anfang Mai (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, St, W, We).

149 *Monima munda* Esp.

(820 *Orthosia munda* Schiff.)

Wie vorige Art, gelegentlich häufig, von Mitte März bis Ende April (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, St, W, We).

150 *Monima populi* Ström

(816 *Orthosia populi* Ström)

Im Gebiet verbreitet, doch stets einzeln, BA-Stephansberg, Hallstadt, Memmelsdorf, Burggrub bei Heiligenstadt, Wiesenthau, Veilbronn, Zeil/M. Ende März bis Anfang Mai (De, Ga, M-K, Scha, Schi, St, W).

151 *Monima miniosa* F.

(814 *Orthosia miniosa* Schiff.)

Nur wenig nachgewiesen, meist selten, BA-Kaulberg, Johannishof, Ebern, Lange Meile, Veilbronn, Ende März bis Anfang Mai (Ga, Ri, Scha, Schi, St, W).

152 *Monima stabilis* View.

(818 *Orthosia stabiliis* Schiff.)

Im Gebiet die häufigste Art der Gattung, Mitte März bis Ende April (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, St, W).

153 *Monima pulverulenta* Esp.

(812 *Orthosia cruda* Schiff.)

Im Gebiet ziemlich häufig, bereits ab 1. 2. (ein o an der Südseite der Stadtmauer Zeil/M., 1975, M-K), Mitte März bis Anfang Mai (Ga, M-K, Scha, Schi, St, W).

154 *Monima incerta* Hufn.

(819 *Orthosia incerta* Hufn.)

Verbreitet und häufig, von Anfang März bis Anfang Mai (De, Ga, M-K, Pi, Scha, Schi, St, W, We).

155 *Monima opima* Hbn.

(815 *Orthosia opima* Hbn.)

Im Gebiet lokal und einzeln gefunden, BA-Kaulberg, Hallstadt, Johannishof, Baunach, Memmelsdorf, Ebern, Mitte März bis Mitte Mai (De, Ga, Ri, St, W).

156 *Monima gracilis* F.

(817 *Orthosia gracilis* Schiff.)

Verbreitet, gelegentlich häufig, Bamberg, Johannishof, Leidingshof, Börstig, Gaustadt, Forchheim, Ebern, Zeil/M., Ende März bis Mitte Mai (Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, St, W, We).

157 *Cerapteryx graminis* L.

(806)

Bisher nur in der Form *tricuspis* Esp. lokal und zuweilen häufig nachgewiesen, Bürstig, Johannishof, Pettstadt, Mitte Juli bis Ende August (Ga, St, W).

158 *Hyperiodes turca* L.

(825 *Mythimna turca* L.)

Nur von Wittstadt für die Umgebung von Bamberg gemeldet, jahrweise völlig fehlend. Aus neuerer Zeit keine weiteren Funde, Aus den Nachbargebieten für Zell bei Schweinfurt nachgewiesen, ein ♂ am 10. 6. 73 (H. Seidlein).

159 *Hyphilare lithargyria* Esp.

(827 *Mythimna ferrago* F.)

Verbreitet und meist häufig, Ende Juni bis Anfang September, wobei die späten Falter einer partiellen 2 Generation angehören dürften (De, Ga, M-K, Pi, Scha, St, W, We).

160 *Hyphilare albipuncta* F.

(828 *Mythimna albipuncta* Schiff.)

Im Gebiet ziemlich verbreitet und jahrweise häufig, Bamberg, Gaustadt, Forchheim, Zeil/M., usw., von Mitte Mai bis Mitte Oktober in 2 Generationen (De, Ga, M-K, Pi, Scha, St, W).

161 *Hyphilare l-album* L.

(837 *Mythimna l-album* L.)

Verbreitet, meist einzeln, BA-Kaulberg, Kreuzberg, Sträublingshof, Ludwag, Ebern, Zeil/M., im Juni (1. Generation) nur ein Nachweis (Ga), Ende August bis Ende September (2. Generation) zahlreicher (Ga, M-K, Ri, St, W).

163 *Sideridis conigera* Schiff.

(826 *Mythimna conigera* Schiff.)

Überall verbreitet und ziemlich häufig, von Mitte Juni bis Mitte August (Ga, M-K, Pi, Scha, St, W, Ri).

166 *Sideridis comma* L.

(843 *Leucania comma* L.)

Verbreitet, meist einzeln gefunden, IV, Gaustadt, Kreuzberg, Rüttenbach, Feuerstein, Heroldsmühle, Geisdorf, Ende Mai bis Ende Juni, eine 2. Generation wird nur von Wittstadt erwähnt, (Ga, Pi, Scha, W).

167 *Sideridis sicula* Tr. ssp. *bavarica* Hörh.

(939 *Mythimna sicula* Tr.)

Im Gebiet nur im Jura lokal gefunden, Veilbronn Ende Mai bis Ende Juni (Ga, Schi). (Die Erstbeschreibung der ssp. *bavarica* von Dr. Clemens Hörhammer in Mitt.Münchner Ent. Ges., XXIX - 1934, S. 66 - 71)

169 *Sideridis impura* Hbn.

(833 *Mythimna impura* Hbn.)

Im Gebiet nicht häufig, Börstig, Johannishof, BA-Kreuzberg, Rüttenbach, Veilbronn, Zeil/M., Mitte Juni bis August in zwei Generationen (Ga, M-K, St, We).

170 *Sideridis straminea* Tr.

(832 *Mythimna straminea* Tr.)

Bisher nur wenig beobachtet, Förtsch 12. 7. 1967 (Ga), Börstig, 8. 8. 1970 (Ga), Zeil/M., 6. 7. 1973 (M-K).

171 *Sideridis pallens* L.

(834 *Mythimna pallens* L.)

Verbreitet und häufig, Mitte Mai bis Ende September in zwei sich überschneidenden Generationen (De, Ga, M-K, Pr, Ri, Scha, St, W, We).

172 *Sideridis obsoleta* Hbn.

(842 *Leucania obsoleta* Hbn.)

Nur lokal und selten beobachtet, BA-Kaulberg, Börstig, Rüttenbach, Memmelsdorf, Mitte Juni bis August (Ga, St, W). Die Raupen können Ende August nachts an den Halmen von Schilfrohr geleuchtet werden. An den typischen Fraßbildern der Schilfrohrblätter kann man am Tage leicht die Biotope ausfindig machen (M-K).

173 *Sideridis pudorina* Schiff.

(831 *Mythimna pudorina* Schiff.)

Lokal und meist vereinzelt, Börstig, Johannishof, Memmels-
dorf, Ebern, Zeil/M., Juni bis Juli (Ga, M-K, Ri, St, W).

5. Unterfamilie Cucullianae

175 *Cucullia argentea* Hufn. Silbermönch

(994)

Nur von Wittstadt erwähnt: Ziemlich selten, 1923 ein Falter bei Alterlangen, 1926 1 Flt bei Bamberg, August 1931 1 Flt bei Bug/Bamberg, Raupen bei Alterlangen, 1954 mehrere Raupen bei Nürnberg (v. Klossowski).

177 *Cucullia artemisiae* Hufn. Beifußmönch

(996)

Bisher nur wenige Nachweise, Börstig 13. 7. 71, 18. 7. 72, (Ga), Zeil/M., als Falter selten, die Raupen dagegen an *Artemisia vulgaris* regelmäßig und meist in Anzahl (M-K, W).

178 *Cucullia absinthii* L.

(991)

Nur wenig beobachtet, seltener als vorige Art, Dörrwasserlos 31. 7. 71 (De), Wittstadt gibt Sandgebiete bei Fürth, Erlangen und Wellucken an.

179 *Cucullia umbratica* L.

(1002)

Überall verbreitet und häufig, Mitte Juni bis Anfang August (De, Ga, M-K, Pi, Ri, St, W, We).

180 *Cucullia chamomillae* Schiff.

(997)

Nur vereinzelt nachgewiesen, BA-Kaulberg, Hallstadt, Gaustadt, Burk/Forchheim, Memmelsdorf, Zeil/M., Mitte April bis Ende Mai, ein Falter am 9. 10. 1963 aus Hallstadt (leg. Dr. Garthe), (Ga, M-K, Pi, Scha, St, W).

182 *Cucullia lactucae* Schiff.

(1001)

Nur von Schiller aus Veilbronn gemeldet, Ende Mai/Anfang Juni 1956. Wittstadt erwähnt die Art vereinzelt für das Regnitzgebiet und Wellucken. Für den Schweinfurter Raum bei Schwebheim (Seidlein).

[184 *Cucullia campanulae* Frr.]

(1004)

Bisher im Gebiet noch nicht gefunden. Wittstadt gibt Tüchersfeld und Pottenstein an (Raupenfunde). Schiller meldet die Art ebenfalls für Pottenstein/Fränkische Schweiz.

185 *Cucullia lucifuga* Hbn.

(1000 *Cucullia lucifuga* Schiff.)

Lokal, meist einzeln, Börstig Obertrubach, Johannishof Memmelsdorf, in zwei Generationen, Juni und Ende Juli, sowie Raupenfunde Mitte Juni (Schaupp), (Ga, Scha, St, W).

187 *Cucullia gnaphalii* Hbn.

(1009)

Nur aus dem Jura sehr lokal und einzeln nachgewiesen, Veilbronn, 7. und 20. 6. 67 (Ga), Ludwag, 19. 5. 1971, (St).

188 *Cucullia asteris* Schiff. Astermönch

(1008)

Im Gebiet nicht regelmäßig beobachtet, als Falter meist einzeln, Raupen gelegentlich in Anzahl, Bamberg (W), Dietzhof 25. 7. 63 (Kramer), Dörrnwasserlos 10. 7. 63 (St), Memmelsdorf Ende Mai aus Raupen gezogen (Ga, St), Roßstadt 12. 8. 73 etwa 80 z. T. erwachsene Raupen auf einem Kahlschlag an der B 26 (M-K).

191 *Cucullia verbasci* L. Brauner Mönch

(1013)

Vereinzelt, als Raupe an Königskerze häufiger, BA-Kaulberg, Ebern, Tiefenellern, Drügendorf, Zeil/M., Mai und Juni (Ga, M-K, Hi, Scha, W).

192 *Cucullia scrophulariae* Cap.

(1012 *Cucullia scrophulariae* Schiff.)

Im Gebiet bisher nur wenig nachgewiesen, Veilbronn, im Juni (Schiller), sowie ein Fund (De).

[193 *Cucullia prenanthis* Esd.]

(1010)

Aus dem Bamberger Umland bisher noch nicht nachgewiesen. Wittstadt zählt als Fundorte Schwarzenbach bei Höchststadt sowie die Umgebung von Fürth (Dort auch Raupenfunde an Braunwurz) auf.

194 *Callierges ramosa* Esp.

(1023)

Lokal und selten, Veilbronn 7. 7. 67 (Ga), Memmelsdorf 28. 6. 1973 (2 Falter, St) Bamberg, Heiligenstadt, Bubenreuth, Dechsendorf und Fürth (W).

Omphalophana antirrhini Hbn.

(1024)

Koch führt diese südöstliche Art nicht für Deutschland auf. Wittstadt gibt mehrere Einzelfunde an: "Der Falter spärlich in dem Gebiet: 1924 August 1 Falter bei Altelangen, 1927 August 1 Falter bei Kosbach, 1935 Ende Juni 1 Falter auf der Langen Meile (W)".

195 *Calophasia lunula* Hufn.

(1017)

Im Gebiet lokal und meist einzeln, BA-Kaulberg, Börstig, Wellucken, Pettstadt, Zeil/Ziegelanger, in zwei Generationen Mai und Juli (Ga, M-K, St, W). Die bunt gezeichneten Raupen sitzen am Tage an Leinkraut und sind häufiger und regelmäßiger zu finden (M-K).

196 *Derthisa glaucina* Esp.

(1025 *Episema claucina* Esp.)

Bisher nur zwei Fundorte, sicher ist die Art im Gebiet verbreiteter und an geeigneten Plätzen mit Beständen von kleinwüchsigen Liliengewächsen (*Anthericum*, *Muscari* usw.) häufiger zu finden. Leidingshof 17. 9. 68 (2 Falter leg. Garthe), Zeil/M. Stadtgebiet, 25. 8. 73 ein frisches ♂ f. *dentimacula* am Licht (M-K).

197 *Brachionycha sphinx* Hufn.

(1029)

Verbreitet, meist einzeln, BA-Kaulberg, Friedrichsbrunnen, Drosendorf, Memmelsdorf, Forchheim, Veilbronn, Oktober bis Anfang November (Ga, Scha, Schi, St, W, We).

198 *Brachionycha nubeculosa* Esp.

(1031)

Lokal und selten, Johannishof, Meedensdorf, Memmelsdorf, Veilbronn, Mitte März bis Anfang April (De, Ga, Schi, St, W).

200 *Bombycia viminalis* F.

(1034 *Cleoceris viminalis* F.)

Verbreitet und meist einzeln, I, IV, VII, IX, XII, Forchheim, Zeil/M., im Juli (Ga, M-K, Scha, Schi, St, W).

202 *Aporophila nigra* Haw.

(1037)

Nach Wittstadt sehr lokal, Rathsberger Wald, Michelsberger Wald bei Bamberg, im September. Keine neueren Funde. Aus dem Nachbarraum Schweinfurt aus Schwebheim gemeldet, 25. 9. 73 und 17. 9. 74 (2 Falter, H. Seidlein).

203 *Chloantha solidaginis* Hbn.

(1047 *Lithomoia solidaginis* Hbn.)

Im Gebiet lokal und selten, Strullendorf, Johannishof, Ebern, Zeil/M., Ende August bis Ende Oktober (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Schi, W).

205 *Lithophane socia* Hufn.

(1040 *Lithophane socia* Hufn.)

Wenig festgestellt, Leidingshof, Höfen bei Bamberg, BA-Kaulberg, Forchheim, Mitte September und nach der Überwinterung bis Anfang Mai (Ga, Scha, W).

206 *Lithophane ornitopus* Rott.

(1041 *Lithophane ornitopus* Hufn.)

Verbreitet, nicht selten, BA-Kaulberg, Gaustadt, Johannishof, Memmelsdorf, Veilbronn, Ebern, Zeil/M., Mitte September bis Mitte Mai (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Schi, St, W).

208 *Lithophane furcifera* Hufn.

(1042)

Bisher nur wenig beobachtet, BA-Kaulberg, Johannishof, Baunach, Memmelsdorf, September bis Ende April (De, Ga, St, W).

210 *Xylina vetusta* Hbn.

(1049 *Xylina vetusta* Hbn.)

Im Gebiet nur vereinzelt festgestellt, BA-Kaulberg, Leidingshof, Drosendorf, Ebern, Zeil/M., September bis Anfang Mai (Ga, M-K, Ri, Scha, W, We).

211 *Xylina exoleta* L.

(1050 *Xylina exoleta* L.)

Wie vorige Art nur vereinzelt, Baunach, Burggrub bei Heiligenstadt/Jura, Zeil/M., September bis April (De, Ga, M-K, W).

212 *Dichonia areola* Esp.

(1051 *Xylocampa areola* Esp.)

Nur von Wittstadt erwähnt, 1906 bei Bamberg im April ein Falter am Licht, sowie 1949 2 Falter (W). In den letzten Jahren keine Neufunde.

213 *Meganephria oxyacanthae* L.

(1055 *Allophytes oxyacanthae* L.)

Verbreitet und gelegentlich häufig, BA-Kaulberg, Altenburg, Würgau, Veilbronn, Memmelsdorf, Forchheim, Zeil/M., September bis Oktober, (Ga, M-K, Scha, Schi, St, W).

215 *Calotaenia celsia* L. Malachiteule

(944 *Staurophora celsia* L.)

Im Gebiet lokal und selten, Veilbronn 22. 9. 56 (Schi), Veilbronn 24. 9. 60 (Ga), Leidingshof 26. 9. 67 (Sadowsky), bei Bamberg ein Falter 1902 (W).

216 *Crino satura* Schiff.

(1067 *Blepharita satura* Schiff.)

Verbreitet, nicht häufig, BA-Kaulberg, Würgau, Veilbronn, Zeil/M., Ende August bis Anfang Oktober, (Ga, M-K, Schi, W).

217 *Crino adusta* Esp.

(106d *Blepharita adusta* Esp.)

Im Gebiet nur von Dr. Garthe festgestellt: Börstig, BA-Kaulberg, 3. 6. und 29. 7. Wittstadt gibt als weitere Fundorte außerhalb unseres Gebietes Erlangen, Baiersdorf und Wellucken an.

218 *Agriopsis aprilina* L.

(1058 *Griposia aprilina* L.)

Mehrfach nachgewiesen, meist einzeln, jahrweise (z. B. 1956) häufig, Bamberg, Würgau, Veilbronn, Schammelsdorf, Ebern, Mitte September bis Oktober (Ga, Ri, Schi, St, W).

220 *Agriopsis convergens* F.

(1059 *Griposia convergens* Schiff.)

Nur aus Ebern gemeldet, 4. 9. 73 (A. Richter), ferner gibt Wittstadt noch Michelsberger Wald bei Bamberg an, sowie Bubenreuther Hang (W).

221 *Lamprosticta viridana* Walch.

(1061 *Lamprosticta culta* Schiff.)

Nur wenige Einzelfunde von Wittstadt aufgeführt, in den letzten Jahrzehnten keine Neufunde. 1903 im Juni ein Falter bei Bamberg (W), 1921 und 1929 je ein Falter in der Wildnis bei Marloffstein (W), sowie 1938 am 7. 8.(?) ein Falter am Licht bei Erlangen (W).

222 *Crypsedra gemnea* Tr.

(1077)

Bisher nur von Wittstadt erwähnt, 1923 Kreuzberg bei Bamberg, 1927 Erlangen und 1942 Lange Meile, im Juli und August (W).

[223 *Dryobotodes protea* Bkh.]

(1062 *Dryobotodes protea* Schiff.)

Im Gebiet noch nicht gefunden, Wittstadt fand die Art nur bei Dechsendorf im September, die Raupen dort Anfang Mai von Eiche geklopft (W).

224 *Valeria oleagina* F.

(1056 *Synvaleria oleagina* Schiff.)

Sehr lokal und selten, aus neuerer Zeit nur von Ebern gemeldet, Steinberg, 20. bis 28. 4., 1964 bis 1974 (Ri).
Bruderwald bei Bamberg vor 1920. (W).

225 *Valeria jaspidea* Vill.

(1057 *Synvaleria jaspidea* Vill.)

Nur von Wittstadt erwähnt: Dechsendorf 1936 und 1941, am Walberla 1946 Anfang April ein Falter, sowie ein Raupenfund 1932 am Walberla.

228 *Antitype xanthomista* Hbn.

(1075 *Polymixis xanthomista* Hbn.)

Im Gebiet besonders im Jura verbreitet, gelegentlich häufig, Leidingshof (1967 - 1968 massenhaft - Ga), Veilbronn, Moritz bei Behringersmühle, Ludwag, BA-Kaulberg, Mitte September bis Anfang Oktober (De, Ga, Ri, Schi, St, W).

229 *Antitype chi* L.

(1078)

Verbreitet, meist einzeln, II, X, XII, BA-Kaulberg, Würgau, Memmelsdorf, Ebern, Zeil/M., Mitte August bis Ende September (Ga, M-K, Ri, St, W).

230 *Eupsilia satellitia* L.

(1083 *Eupsilia transversa* Hufn.)

Im Gebiet häufig, überall nachgewiesen, September bis Mitte Mai, bereits im Januar am Köder (M-K), (De, Ga, M-K, Ri, Scha, Schi, St, W, We).

232 *Xantholeuca croceago* F.

(1084 *Xanthia croceago* Schiff.)

Nur wenige Fundorte und stets einzeln, Bamberg, Röbersdorf, Mainberg, Johannishof, September bis April (Ga, W).

233 *Conistra erythrocephala* F.

(1091 *Dasycampa erythrocephala* Schiff.)

Bisher nur von wenigen Plätzen gemeldet, dürfte aber verbreiteter sein, Ebern, 18. 9. 59 (Ri), Schammelsdorf 9. 10. 76 (De), Zeil/M., am Kapellenberg häufig am Köder, 7. bis 14. 10. 76 (M-K), nach Wittstadt überall am Köder.

234 *Conistra vau-punctatum* Esp.

(1087 *Conistra rubiginosa* scop.)

Verbreitet, an günstigen Plätzen ziemlich häufig, besonders am Köder, BA-Kaulberg, Gaustadt, Ebelsbach, Memmelsdorf, Veilbronn, Zeil/M., Ebern, Oktober bis April (Ga, M-K, Pi, Ri, Schi, St, W).

235 *Conistra veronicae* Hbn.

(1088)

Südliche Art, deren Vorkommen bei uns erst noch durch Neufunde belegt werden muß. Nur von Altenstein bei Ebern gemeldet, im September wenige Stücke (leg. A. Richter). Wittstadt hatte diese südliche Art recht selten am Köder gefangen, Kosbacher Wald, Memmelsdorf (1925), um Erlangen 1920 1 Falter, Bamberg 1949 und 1953 (W).

236 *Conistra vaccinii* L.

(1085)

Verbreitet und besonders am Köder häufig, Ende September bis Ende April (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, St, W).

237 *Conistra ligula* Esp.

(1086)

Im Gebiet nur von wenigen Plätzen gemeldet, Forchheim 9. 11. 73 (Scha), Ebern 20. 10. 64 (Ri), Zeil-Schmachtenberg, 7. und 14. 10. 76 in Anzahl am Köder (M-K), Schammelsdorf bei Memmelsdorf. 9. 10. 76 (De), sowie (W).

238 *Conistra rubiginea* F.

(1092 *Dasycampa rubiginea* Schiff.)

Vereinzelt, Bamberg-Stadtgebiet, Johannishof, Veilbronn, Ebern, Forchheim, Lange Meile, Wiesenthau, September bis Mitte April (Ga, Ri, Scha, St, W).

241 *Amathes humilis* F.

(1097 *Agrochola humilis* Schiff.)

Bisher nur aus der Umgebung von Ebern (Altenstein¹) gemeldet
20. 10. 61 (leg. A. Richter). **Südl. Art, deren Vorkommen im Bbg.
Umland durch Neufunde belegt werden muß.**

242 *Amathes lychnidis* F.

(1099 *Agrochola lychnidis* Schiff.)

Verbreitet und meist häufig, Bamberg, Johannishof, Veil-
bronn, Memmelsdorf, Zeil/M., usw., September bis Oktober
(Ga, M-K, St, W).

[243 *Amathes laevis* Hbn.]

(1100 *Agrochola laevis* Hbn.)

Bisher eine nicht gesicherte Meldung aus Veilbronn,
8. 10. 55 (Schi). 1921 bei Dechsendorf am Köder ein Fal-
ter (W).

244 *Amathes lota* L.

(1101 *Agrochola lota* Cl.)

Verbreitet, besonders in feuchten Niederungen mit Weiden-
beständen ziemlich häufig, September bis Mitte Oktober
(Da, Ga, M-K, W, We).

245 *Amathes macilenta* Hbn.

(1094 *Agrochola macilenta* Hbn.)

Im Gebiet recht lokal, vereinzelt, nur gelegentlich an
günstigen Plätzen häufig, BA-Kaulberg, Altenburg, Lei-
dingshof, Johannishof, Zeil/M., (am Köder häufig), Sep-
tember bis Ende Oktober (Ga, M-K, St, W).

246 *Amathes circellaris* Hufn.

(1093 *Agrochola circellaris* Hufn.)

Verbreitet und häufig bis sehr häufig, Anfang August bis
Anfang Oktober (Ga, M-K, Scha, St, W).

247 *Amathes helvola* L.

(1096 *Agrochola helvola* L.)

Verbreitet und meist häufig, Mitte September bis Ende Ok-
tober (Ga, M-K, Ri, Schi, St, W).

248 *Amathes litura* L.

(1098 *Agrochola litural*.)

Verbreitet, nicht selten, nur gelegentlich häufig, I, IV, VIII, X, XII, usw. Anfang September bis Mitte Oktober (De, Ga, M-K, Schi, St, W).

249 *Amathes lucida* Hufn.

(1095 *Agrochola nitida* Schiff.)

Bisher nur wenig festgestellt, BA-Altenburg, 1. 10. 65 (Ga), Moritz bei Behringersmühle 19. 9. 68 (Ga), Ebern 14. 10. 62 (Ri), Veilbronn 22. 9. 56 (Schi), sowie Umgebung Bamberg am Köder (W).

250 *Amathes iners* Germ.

(1103 *Parastichtis suspecta* Hbn.)

Im Gebiet sehr lokal, nur ein Fund: Börstig 26. 7. 71 (Ga), ferner von Erlangen gemeldet (1. 8. 70 Menhofer).

251 *Atethmia ambusta* F.

(1106 *Atethmia ambusta* Schiff.)

Nur von Wittstadt erwähnt: "Bamberg (Teufelsgraben) Ende August 1949 4 ♂♂ am Lichte, Ende September 1953 2 ♀♀ (W). Fundort ein großer Garten am Fuße der Altenburg mit alten Birnbäumen, an denen vermutlich die Raupe lebt (W),"

252 *Atethmia xerampelina* Hbn.

(1105 *Atethmia centrigo* Haw.)

Im Gebiet sehr lokal, BA-Kaulberg, 4. 9. 56 (Ga), BA-Stephansberg 14. 9. 61 (Ga), bei Bamberg, Bubenreuth, Sieglitzhof (W), H. Seidlein gibt für den Schweinfurter Raum ein häufiges Vorkommen bei Schwebheim an.

253 *Cosmia aurago* F.

(1107 *Cirrhia aurago* Schiff.)

Verbreitet, nicht selten, VI, VII, X, XII, Gaustadt, Ebern, Zeil/M., usw. Ende August bis Oktober (De, Ga, M-K, Pi, Ri, Schi, St, W, We).

254 *Cosmia lutea* Ström.

(1108 *Cirrhia togata* Esp.)

Bisher nicht überall nachgewiesen und seltener als vorige Art, I, IV, XII, BA-Kaulberg, Ebern, Memmelsdorf, Zeil/M., Ende August bis Anfang Oktober (Ga, M-K, Pi, Ri, St, W).

255 *Cosmia fulvago* L.

(1109 *Cirrhia icteritia* Hufn.)

Im Gebiet verbreitet und nicht selten, Mitte August bis Ende September (De, Ga, M-K, Ri, Scha, St, W).

[256 *Cosmia gilvago* Esp.]

(1110 *Cirrhia gilvago* Schiff.)

Nur aus den Nachbargebieten gemeldet, Bubenreuth am Köder (W), Fürther Stadtpark (Schi), Schweinfurt 4. 9. 50 (Ri).

257 *Cosmia ocellaris* Bkh.

(1111 *Cirrhia ocellaris* Bkh.)

Lokal und selten, Bamberg, Kaulberg, Hallstadt, Ebern, Zeil/M., Anfang September bis Mitte Oktober (Ga, M-K, Ri, W).

259 *Cosmia citrigo* L.

(1113 *Cirrhia cotrigo* L.)

Im Gebiet verbreitet, meist einzeln, IV, VIII, X, XII, Würgau, Ebern, Ende August bis Anfang Oktober, (De, Ga, Ri, Schi, St, W).

6. Unterfamilie Amphipyrinae

261 *Amphipyra pyramidea* L. Pyramideneule
(853)

Verbreitet und häufig, August bis September (Ga, M-K,
Pi, Ri, Scha, St, W, We) (Gen. Pr.-Nr. 167 Ga).

[261 a *Amphipyra berbera* Rungs]
(853 a)

Sehr ähnlich *pyramidea*, aus dem vorgelegten Material
aus unserem Gebiet konnte bisher kein Exemplar dieser
Art zugeordnet werden. Im Bamberger Umland sicher noch
zu finden, (Abb. Valve, Gen. Pr.-Nr. 165 Ga).

263 *Amphipyra perflua* F.
(854)

Wittstadt erwähnt für Bamberg einen Einzelfund am 8. 6. 31
am Licht (W). (Zweifelhaft der frühe Zeitpunkt). Aus dem
angrenzenden Schweinfurter Raum 1976 von Seidlein mehrfach
bei Zell geködert, mit anschließender erfolgreicher Eiab-
lage.

264 *Amphipyra tragopoginis* L.
(857 *Amphipyra tragopoginis* Cl.)

Überall verbreitet und meist häufig, Mitte Juli bis Mitte
September (Ga, M-K, Pi, St, W, We).

265 *Stygiostola umbretica* Goeze
(860 *Rusina ferruginea* Esp.)

Verbreitet und gelegentlich häufig, Anfang Juni bis Juli
(Ga, M-K, Scha, Schi, St, W, We).

266 *Mania maura* L. Schwarzes Ordensband
(858 *Mormo maura* L.)

Im Gebiet an einigen Plätzen nachgewiesen, doch stets ein-
zeln, Börstig, 21. 8. 63 (Ga), Ebelsbach-Stettfeld 14. 8. 74
(M-K, Drosendorf 27. 7. 74 (We), Ebern 12. 8. 64 (Ri), Mem-
meldorf, (mehrfach - St), vereinzelt (W).

267 *Dipterygia scabriuscula* L.

(159)

Ziemlich verbreitet, meist nur einzeln gefunden, BA-Kaulberg, Börstig, Johannishof, Gaustadt, Memmelsdorf, Zeil/M., Mitte Juni bis Mitte August (Ga, M-K, Pi, St, W, We).

268 *Parastichtis lithoxylea* F.

(888 *Apamea lithoxylea* Schiff.)

Im Gebiet allgemein verbreitet und nicht selten, Ende Juni bis Mitte August (Ga, M-K, Pi, Ri, St, W, We).

269 *Parastichtis sublustris* Esp.

(889 *Apamea sublustris* Esp.)

Wie vorige Art verbreitet und meist einzeln, Anfang Juni bis Anfang Juli (Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, St, W, We).

270 *Parastichtis hepatica* Hbn.

(892 *Apamea caracterea* Hbn.)

Im Gebiet sehr lokal, nur von Wittstadt erwähnt für Forchheim, bei Streitberg mehrmals am Köder. Aus dem Nachbargebiet Schweinfurt vom Schwebheimer Wald gemeldet, 19. 6. 74 (Seidlein).

271 *Parastichtis rurea* F.

(890 *Apamea crenata* Hufn.)

Verbreitet und ziemlich häufig, Ende Mai bis Anfang Juli (Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, W).

273 *Parastichtis monoglypha* Hufn.

(887 *Apamea monoglypha* Hufn.)

Überall verbreitet und häufig, Ende Juni bis Ende August (De, Ga, M-K, Pi, Ri, St, W, We).

274 *Parastichtis lateritia* Hufn.

(893 *Apamea lateritia* Hufn.)

Im Gebiet lokal, meist nur einzeln, Börstig (mehrfach), Joahnishof, Veilbronn, Memmelsdorf, Zeil/M., Mitte Juni bis Juli (Ga, M-K, St, W).

275 *Parastichtis sordida* Bkh.

(904 *Apamea anceps* Schiff.)

Weit verbreitet und im Gebiet ziemlich häufig, Anfang Ju-
bis Mitte August (Ga, M-K, Pi, Scha, Schi, St, We).

[276 *Parastichtis oblonga* Haw.]

(899 *Apamea oblonga* Haw.)

Bisher nur eine Meldung aus dem Nachbargebiet Schweinfurt:
Schwebheim 1974 2 ♂♂ (leg. Seidlein).

277 *Parastichtis illyria* Frr.

(903 *Apamea illyria* Frr.)

Im Gebiet sehr lokal und selten, Johannishof 26. 5. 73,
20. 5. 74 (De, Ga), Veilbronn 7. 6. 67 (Ga), Ludweg
19. 5. 71 (3 Falter, St,).

278 *Parastichtis obscura* Haw.

(900 *Apamea remissa* Hbn.)

Bisher nur wenige Nachweise, Börstig, Johannishof, Lud-
weg, Veilbronn, Ende Mai bis Mitte Juli (Ga, Schi, St,
W).

279 *Parastichtis unanimitis* Tr.

(901 *Apamea unanimitis* Hbn.)

Nur festgestellt von Dr. Garthe: BA-Kaulberg, 20. 6. 58,
sowie Johannishof 28. 5. 73. Wittstadt gibt wenige Einzel-
stücke bei Bamberg an.

281 *Parastichtis basilinea* F.

(905 *Apamea sordens* Hufn.)

Im Gebiet verbreitet und nicht selten, Mitte Mai bis Juni
(Ga, M-K, Pi, Schi, St, W).

282 *Parastichtis scolopacina* Esp.

(906 *Apamea scolopacina* Esp.)

Bisher wenig beobachtet, Börstig 13. 7. 71 (3 Falter, Ga),
Daschendorf 18. 7. (Ga), Bamberg, Wellucken stets selten
(W), In der Umgebung von Schweinfurt bei Schwebheim sehr
häufig (Seidlein).

283 *Parastichtis ophiogramma* Esp.

(907 *Apamea ophiogramma* Esp.).

Nur lokal festgestellt, Hallstadt, BA-Kaulberg, Gaustadt, Birstig, Dörrnwasserlos, Mitte Juli bis Anfang August (De, Ga, St, W). Schwebheim bei Schweinfurt: sehr häufig (Seidlein).

284 *Parastichtis secalis* L.

(915 *Mesapamea secalis* L.)

Im Gebiet verbreitet und häufig, Anfang Juni bis Ende August (Ga, M-K, Scha, St, W, We).

285 *Oligia strigilis* L.

(908)

Im Gebiet häufig, Anfang Juni bis Juli (Ga, M-K, Scha, St, W). Die Arten 285, 286 und 287 sind äußerlich sehr ähnlich und in Zweifelsfällen nur durch Genitaluntersuchungen zu determinieren (Abb. Valve, Gen. Pr.- Nr. 103 Ga).

[286 *Oligia versicolor* Bkh.]

(909)

Sichere Nachweise bisher nur aus der Rhön, Bischofsheim, Mitte Juli 73 (Dr. Beck). Für unser Gebiet dürfte die Art noch zu erwarten sein (Abb. Valve, Gen. Pr. - Nr. 150 Ga).

287 *Oligia latruncula* Hbn.

(911 *Oligia latruncula* Schiff.)

Im Gebiet häufig, Mitte Juni bis Juli (Ga, Scha, St, We,). (Abb. Valve, Gen.- Pr.- Nr. 100 Ga).

288 *Oligia fasciuncula* Haw.

(912)

Westliche Art, die sich in den letzten Jahrzehnten nach Osten ausgebreitet hat. Bamberg, Erlangen, Fürth (Schi) im Juli, nur von Wittstadt aufgeführt. Keine Neufunde in den letzten Jahren.

289 *Oligia literosa* Haw.

(914 *Miana literosa* Haw.)

Im Gebiet bisher ein Nachweis aus dem Jura, Dörrnwasserlos
10. 7. 73 (De, St, Gen.Pr.-Nr. 104 Ga).

290 *Oligia bicoloria* Vill.

(913 *Miana furuncula* Schiff.)

Verbreitet und meist häufig, I, III, IV, VII, BA-Kaulberg,
Gaustadt, Stübzig, Zeil/M., Juli bis Anfang September (De,
Ga, M-K, Pi, St, W, We).

294 *Crymodes platinea* Tr.

(898 *Apamea platinea* Tr.)

Im Jura lokal in der ssp. *franconiae* Menhofer nachgewiesen:
Dörrnwasserlos 10. 7. 73 (De, St), Veilbronn 6. 6. 59,
(Schi), sowie bei Bamberg am 14. 7. 53 ein Falter (W).

297 *Sidemia fissipuncta* Haw.

(876 *Enargia ipsilon* Schiff.)

Bisher nur wenig festgestellt, Börstzig, Förtsch, Altenburg
bei Bamberg, Juli und August (Ga, W).

298 *Palluperina testacea* Hbn.

(925 *Luperina testacea* Schiff.)

Verbreitet und meist häufig, BA-Kaulberg, Börstzig, Gaustadt,
Memmelsdorf, Zeil/M., August bis Anfang September (De, Ga,
M-K, Pi, St, W).

301 *Trachea atriplicis* L. Grüne Meldeneule

(863)

Bisher nur selten im Gebiet gefunden, Hesselberg/Höchstadt
14. 7. 72 (De), Gaustadt 9. 7. 75 (1 Falter, Pi), nach Witt-
stadt überall und nicht häufig.

302 *Euplexia lucipara* L.

(864)

Verbreitet und manchmal häufig, I, IV, XII, Bamberg, Gaustadt,
Forchheim usw., im Juni (Ga, Pi, Scha, Schi, St, W).

303 *Trigonophora meticulosa* L. Achateule

(865 *Phlogophora meticulosa* L.)

Im Gebiet überall, meist häufig, südliche Art, bei uns Einflüge ab Ende Mai bis Mitte Juli (Binnenwanderer 1. Ordnung), häufiger in der 2. Generation, Mitte August bis Mitte Oktober. (Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, St, W, We).

305 *Eriopus juvenina* Cr.

(867 *Callopietria juvenina* Cr.)

Bisher nur von Wittstadt gefunden: Bamberg, Bubenreuther Wald, selten im Juni.

306 *Telesilla amethystina* Hbn. Amethysteule

(869)

Im Gebiet lokal, an zusagenden Plätzen regelmäßig nicht selten, Börstig, Mitte Juni bis Anfang August (De, Ga, St), ferner Dietzhof, Wellucken, Michelsberger Wald bei Bamberg (W), sowie aus dem Nachbargebiet Schweinfurt bei Schwabheim häufig (Seidlein). Zuchten ab ovo mit frischen Blättern von *Silaum silaus* gelangen stets ohne Verluste (Ga, M-K).

308 *Talpophila matura* Hufn.

(862)

Lokal nachgewiesen, gelegentlich zahlreich, Ba-Michelsberg, Kaulberg, Hallstadt, Börstig, Johannishof, Mitte Juli bis Mitte August (Ga, W).

309 *Lithomoia rectilinea* Esp.

(862 *Hyppa retilinea* Esp.)

Bisher nur aus dem Juragebiet bei Veilbronn Ende Mai/Anfang Juni 1956 gemeldet (H. Schiller).

312 *Hoplodrina alsines* Brahm

(960)

Überall verbreitet und häufig, Mitte Juni bis Ende Juli (De, Ga, M-K, Pi, St, W, We).

313 *Hoplodrina blanda* Schiff.

(961)

Lokaler als vorige Art und nur gelegentlich häufig, I, IV, VII, X, Bamberg, Heroldsmühle, Forchheim, Memmelsdorf, Anfang Juni bis Ende Juli, sowie ein Falter 5. 9. (Ga), (Ga, Scha, St, W).

314 *Hoplodrina ambigua* Schiff.

(962)

Überall im Gebiet und meist häufig, in zwei Generationen, Anfang Juni bis Mitte Juli und Mitte August bis Mitte Oktober (Ga, M-K, Pi, St, W).

315 *Hoplodrina superstes* Tr.

(963)

Bisher nur von zwei Plätzen gemeldet, Memmelsdorf 24. 7. 71 (St), Zeil/M. am Kapellenberg, 4. und 6. 7. 73 (je ein ♀) und 1. 8. 74 ein ♀ (M-K). Aus einer leichten Nachzucht schlüpfen im Oktober/November 1974 die Falter (M-K).

316 *Hoplodrina respersa* Schiff.

(964)

Im Jura verbreitet und gelegentlich häufig, Leidingshof, Dörrwasserlos, Memmelsdorf, Veilbronn, im Juni (Ga, Schi, St, W).

317 *Elaphria morpheus* Hufn.

(967 *Caradrina morpheus* Hufn.)

Im Gebiet verbreitet und nicht selten, Mitte Juni bis Ende Juli (Ga, M-K, Ri, Scha, St, W, We).

319 *Elaphria selini* Bsd.

(972 *Paradrina selini* B.)

Im Gebiet sehr lokal, Börstig, Ludwag, Mitte Mai bis Mitte Juli (Ga, St), Bamberg, Bubenreuther Wald (W).

320 *Elaphria clavipalpis* Scop.

(973 *Paradrina clavipalpis* Scop.)

Verbreitet, gern in Ortschaften und in Häusern, in zwei Generationen Ende April bis Oktober (Ga, M-K, W).

322 *Atypha pulmonaris* Esp.

(965)

Bisher nur aus dem Nachbargebiet Schweinfurt gemeldet, einzeln bei Schwebheim (H. Seidlein). Für unser Gebiet an günstigen Plätzen mit Lungenkrautbeständen sicher noch zu finden. Nachtrag: 26.3. u. 3.4.77 am Stadtrand v. Zeil/M. an blühenden *Pulmonaria officinalis* eine Anzahl Raupen dieser Art gef. (M-K).

323 *Acosmetica caliginosa* Hbn.

(984)

Ein Einzelfund am 26. 6. 54 bei Bamberg (W), Altheimer Wald bei Neustadt/Aisch von Dr. Garthe lokal häufig am 15. 6. 65 und am 27. 5. 67 gefunden. Leichte Zucht an Färberscharte (*Serratula tinctoria*), an die diese seltene Art gebunden ist (Ga).

324 *Petilampa minima* Haw.

(917 *Photades minima* Haw.)

Im Gebiet lokal und wenig beobachtet, BA-Friedrichsbrunnen, Börstig, Johannishof, Forchheim, Ende Juni bis Ende Juli (Ga, Scha). Schwebheim bei Schweinfurt ein Fund am 16. 6. 74 (Seidlein).

325 *Athetis gluteosa* Tr.

(979)

Bisher nur einmal gefunden, Zeil/M., Kapellenberg, 1. 8. 74 ein ♀ (M-K). Eine Nachzucht ergab eine Anzahl Falter im November/Dezember 1974 (M-K).

326 *Athetis pallustris* Hbn.

(983)

Wie vorige Art äußerst selten, nur ein Fund Bamberg-Kreuzberg am 19. 5. 62 (Ga). Seidlein erwähnt die Art für den Schweinfurter Raum bei Schwebheim.

327 *Psilomonodes venustula* Hbn.

(989 *Agrotis venustula* Hbn.)

Lokal und sehr vereinzelt festgestellt, Bamberg-Teufelsgraben, Johannishof, Zeil/M., Anfang Juni bis Juli (Ga, M-K, W).

328 *Gortyna leucostigma* Hbn.

(946 *Celaena leucostigma* Hbn.)

Nur selten festgestellt, Börstig 22.7.71 (St), Memmelsdorf 15. 8. 71 (St), Zeil/M. 26. 8. 74 ein Falter am Mainufer geködert (M-K), Dörfleins, Altmain 14. 8. 76 (De).

329 *Apamea oculea* L.

(932 *Amphipoea oculea* L.)

Ziemlich verbreitet und meist einzeln, gelegentlich häufig, I, IV, X, BA-Kaulberg, Forchheim, Ebern usw., Anfang August bis Mitte September (Ga, Ri, Scha, St, W). Die Arten 329, 330 und 331 sind äußerlich sehr ähnlich. Zur sicheren Bestimmung ist oft eine Genitaluntersuchung erforderlich (Abb. Valve, Gen.Pr.-Nr. 91 Ga).

330 *Apamea fucosa* Frr.

(933 *Amphipoea fucosa* Frr.)

Die häufigste dieser drei Arten, überall gefunden von Ende Juni bis Ende August (Ga, M-K, Pi, Scha, St, W, We). (Abb, Valve, Gen.Pr.-Nr. 92 Ga).

[331 *Apamea lucens* Frr.]

(934 *Amphipoea lucens* Frr.)

Wittstatt erwähnt Funde, die wahrscheinlich hierher gerechnet werden können, eine sichere Determination blieb jedoch aus. Bisher konnte die Art für unser Gebiet nicht nachgewiesen werden. Die Art bevorzugt Mooregebiete und ist im Durchschnitt die größte der 3 Arten (Abb. Valve).

332 *Xanthoecia flavago* Schiff.

(940 *Gortyna flavago* Schiff.)

Im Gebiet nur sehr vereinzelt festgestellt, BA-Kaulberg, Leidingshof, Sträublingshof, Ebern, Ende August bis Ende September (Ga, Ri, W).

[333 *Hydroecia petastitis* Obl.]

(939 *Hydraecia petastitis* Dbl.)

Wittstadt gibt für das Regnitzgebiet einen Falter am Licht im September 50 in der Wellucken an (leg. Kramer). Die Art ist mit der Pestwurz weiter verbreitet als allgemein angenommen. Der Falter wird wenig gefunden, dagegen lassen sich an ihren Biotopen die ersten Stände, besonders die Raupen, gelegentlich in großer Menge finden. Diese Art läßt sich in unserem Gebiet sicher noch nachweisen.

334 *Hydroecia micacea* Esp.

(937 *Hydraecia micacea* Esp.)

Verbreitet, meist einzeln, BA-Kaulberg, Börstig, Memmelsdorf, Heroldsmühle, Zeil/M., Anfang August bis Mitte Oktober (Ga, M-K, St, W).

[335 *Hydroecia leucogrpha* Bkh.]

(941 *Gortyna borelii* Pierr.)

Im Gebiet nicht nachgewiesen. Nach Angaben von A. Richter kam diese seltene Art 1939 im alten Mainbett bei Schweinfurt vor, durch Zuschüttung dieser Biotope und damit der Vernichtung der Futterpflanzen (*Peucedanum*) verschwand dort die Art völlig. Es ist wahrscheinlich, daß in Gebieten mit Haarstrangbeständen die Art noch zu finden ist.

336 *Pyrrhia umbra* Hufn.

(1124)

Im Gebiet fast überall nachgewiesen, meist einzeln, gelegentlich häufig, I, VII, X, XII, Bamberg, Gaustadt, Ebern, Zeil/M., usw., Mitte Mai bis Anfang August (Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, St, W).

337 *Ipimorpha retusa* L.

(871)

Im Gebiet lokal und stets einzeln, I, III, XII, BA-Kaulberg, Giech, Waizendorf, Ebern, Zeil/M., Mitte Juli bis Mitte August (Ga, M-K, Ri, Schi, St, W, We).

338 *Ipimorpha subtusa* F.

(872 *Ipimorpha subtusa* Schiff.)

Lokaler als vorige Art, doch gelegentlich häufig, Börstig, Pettstadt, Tütschengereuth (De, Ga, St, W, We).

340 *Meristis trigrammica* Hufn.

(959)

Im Gebiet verbreitet, in manchen Jahren häufig, Bamberg-Stadt, Börstig, Gaustadt, Drosendorf, Veilbronn, Wiesenthau, Ende Mai bis Mitte Juli (De, Ga, Pi, Scha, Schi, W, We).

341 *Calymnia affinis* L.

(878 *Cosmia affinis* L.)

Im Gebiet nur wenig beobachtet, Börstig 18. 8. 71 (Ga), Zeil/M. 18. 8. 73 und 21. 8. 74 (M-K). Im Nachbargebiet Schweinfurt an Waldrändern mit Ulmen verbreitet, Schwebheim 1976 häufig (Seidlein), Sulzheim am 6. 9. 73 häufig am Köder (M-K). Die Falter waren meist frisch, und wurden zur Ablage mitgenommen. Wahrscheinlich wurde in dem warmen Sommer 1973 eine 2. Generation gebildet, eine Copula wurde am 8. am 9. 9. beobachtet, nach erfolgter Ablage konnten die Falter bis Mitte Oktober lebend erhalten werden. Die Zucht läßt sich problemlos mit Ulme durchführen (M-K).

[342 *Calymnia diffinis* L.]

(879 *Cosmia diffinis* L.)

Nur von Wittstadt vereinzelt für das Regnitztal aufgeführt, sonst nicht beobachtet.

343 *Calymnia pyralina* Schiff.

(881 *Cosmia pyralina* Schiff.)

Verbreitet, im Gebiet nicht selten und manchmal häufig, im Juli (Fa, M-K, Scha, Schi, St, W, We).

344 *Calymnia trapezina* L. Trapezeule

(880 *Cosmia trapezina* L.)

Verbreitet und häufig, Juli bis September (De, Ga, M-K, Ri, Scha, Schi, St, W, We).

345 *Dicycla* oo L.

(877)

In der Bamberger Gegend mehrmals am Licht Mitte Juni bis August (W), aus neuerer Zeit ein Fund Altheimer Wald bei Neustadt/Aisch (e.l. 22. 7. 67, leg. Garthe). Im Nachbargebiet Schweinfurt 1976 bei Schwebheim gefunden (Seidlein).

346 *Enargia paleacea* Esp.

(874)

Lokal und einzeln, nur gelegentlich häufig (1972 - Ga), Johannishof, Tütschengereuth, Zeil/M., Mitte Juli bis Anfang September (Ga, M-K, W).

348 *Phragmitiphila typhae* Thnbg.

(947 *Noangria typhae* Thnbg.)

Bisher nur wenig festgestellt, Bamberg-Stadt, Kaulberg, Mitte August bis Anfang Oktober (Ga, W). Bei Zeil/M. in den Mainauen an Teichrändern in den Stengeln von *Typha latifolia* die Puppen (M-K). Die Art ist im Gebiet sicher weit verbreitet und als Raupe oder Puppe häufiger zu finden (M-K).

349 *Rhizedra lutosa* Hbn.

(954)

Im Gebiet mehrfach gefunden, gelegentlich in Anzahl, BA-Kaulberg, Veilbronn, Leidingshof, Memmelsdorf, Zeil/M., Mitte September bis Ende Oktober (Ga, M-K, St, W).

354 *Arenostola fluxa* Hbn.

(920 *Photedes fluxa* Hbn.)

Lokal, im Gebiet ziemlich selten, BA-Kaulberg, Börstig, Johannishof, Tütschengereuth, Zeil/M., Anfang Juli bis Ende August (De, Ga, M-K).

355 *Arenostola pygmina* Haw.

(921 *Photedes pygmina* Haw.)

Seltener als vorige Art, Börstig, Johannishof, Mitte August bis Anfang September (De, Ga, W).

356 *Arenostola extrema* Hbn.

(918 *Photedes extrema* Hbn.)

Erst in neuerer Zeit in unserem Gebiet nachgewiesen: Börstig, 6. bis 21 Juli einzeln gefunden (De, Ga). Aus dem Schweinfurter Raum bei Schwebheim regelmäßig gemeldet (Seidlein).

358 *Archana geminipuncta* Haw.

(949)

Bisher nur wenige Einzelfunde: Börstig 18. und 21. 8. 71 (De, Ga) und Zeil/M. 19. und 26. 8. 76 je ein o (M-K). Die Art wird als Falter meist nur selten gefunden. läßt sich jedoch in ihren Lebensräumen (Schilfgebiete) als Puppe gelegentlich in Anzahl finden (M-K).

362 *Archana algae* Esp.

(952)

Nur wenige Funde, BA-Kaulberg 15. 8. 58 (leg. Mück), Gaustadt 2. 9. 75 (Pilotek), Zeil-Stadtgebiet 26. 8. 74 ein ♀ (M-K). Wie 348 sicher als Raupe oder Puppe im Gebiet häufiger zu finden (in den Stengeln von Typha).

364 *Nonagra maritima* Tausch.

(977 *Chilodes maritima* Tausch.)

Bisher nur wenige Einzelfunde: Börstig 6. 7. 69 (Ga), 21. 7. 72 (De), Zeil/M. 6. 7. 73 am Licht (M-K).

365 *Oria musculosa* Hbn.

(957)

Bisher nur ein Fund aus Zeil-Stadtgebiet, 13. 8. 74, ein gut erhaltenes ♂ (M-K).

366 *Calamia virens* L.

(943 *Calamia tridens* Hufn.)

Im Gebiet nur wenig festgestellt, Börstig, Strullendorf, Veilbronn, Mitte Juli bis Ende August (De, Ga, Schi, St, W).

7. Unterfamilie Melicleptriinae

363 *Chloridea dipsacea* L.

(1117 *Chloridea viriplaca* Hufn.)

Südliche Art, die jahrweise unterschiedlich häufig einfliegt. Zeil/M. 13. 8. 74 ein Falter am Licht (M-K), nach Wittstadt überall in 2 Generationen Ende April/Mai und August, im Jura häufig.

369 *Chlorides ononidis* Schiff.

(1116 *Chloridea ononis* Schiff.)

Nur wenig gefunden, Pettstadt, Börstig, Mitte Juli bis Anfang August (De, Ga), an warmen Hängen wohl bodenständig, Einzelfunde Bamberg, Brucker Lache (W).

[372 *Chariclea delphinii* L.]

(1123 *Periphanes delphinii* L.)

Diese südöstliche Steppenart wird nur von Wittstadt für das Regnitzgebiet erwähnt: 1950 im Juli auf Ackerrittersporn bei Erlangen 7 Raupen, sie ergaben restlos die Falter (W).

373 *Melicleptria scutosa* Schiff.

(1122 *Chloridea scutosa* Schiff.)

Südöstliche Art, die wechselnd häufig nach Mitteleuropa einwandert, nur ein Nachweis aus Zeil/M. - Stadtgebiet 12. 7. 75 ein ♀ am Licht (M-K und J. Köhler). Die Ablage gelang leicht, jedoch waren sämtliche Eier unbefruchtet. Wittstadt erwähnt Funde von 1948 aus Fürth und Erlangen.

8. Unterfamilie Heliothidinae

374 *Anarta myrtilli* L.

(751)

Lokal, an ihren Flugstellen (Calluna-Heiden) meist häufig, Strullendorf, Hauptsmoorwald, Bamberg-Abtsdorf, Herrnsdorf in 2 Generationen Juni und August am Tage fliegend (De, Ga, W).

376 *Panolis flammea* Schiff. Kieferneule, Forleule

(809)

Verbreitet und gelegentlich häufig bis massenhaft, Ende März bis Anfang Mai (Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, Schi, St, W). Gefürchteter Forstschädling, die Raupen verursachen in Monokulturen von Kiefern in m. o. w. langen Zeitabständen große Schäden (in den Jahren 1922 - 24 wurden östlich von Berlin 170 000 ha Kiefernwald vernichtet).

377 *Heliothis cardui* Hbn.

(1114 *Meliclectria cardui* Esp.)

Nur von Wittstadt selten für die Lange Meile aufgeführt, 1950 auffallend häufig um Herzogenaurach (Dr. Walther).

378 *Panemeria tenebrata* Scop.

(1127)

Im Gebiet überall nachgewiesen, meist häufig, im Mai (Ga, M-K, Scha, Schi, St, W, We).

9. Unterfamilie Erestrianinae

380 *Porphyrinia noctualis* Hbn.

(1171)

Im Gebiet nur sehr lokal, an Sandgebiete mit *Helichrysum arenarium* (Sandstrohblume) gebunden, Börsting, Pettsstädter Sande, Mitte Juli bis Mitte August (De, Ga). Diese Art ist in ihrem Bestand sehr gefährdet durch zunehmende Vernichtung ihrer Lebensräume, bis 1964 noch häufig, ab 1968 stets nur einzeln gefunden (Ga).

301 *Lithacodia fasciana* L.

(1179 *Jaspidia pygarga* Hufn.)

Verbreitet und ziemlich häufig, Anfang Juni bis Ende Juli
(Ga, M-K, Schi, St, We).

302 *Lithacodia deceptor*a Scop.

(1178 *Jaspidia deceptor*a Scop.)

Im Gebiet verbreitet und nicht selten, Ende Mai bis Anfang Juli (Ga, M-K, Scha, ST, W, We).

303 *Eustrotia uncula* Cl.

(1180)

Lokal, Börstig, Fürtsch, Röttenbach, Johannishof, Hesselberg, Weihergebiet bei Höchststadt/Aisch, Mitte Juni bis Mitte Juli, gelegentlich in Anzahl (Ga). Wellucken, Dechsendorf (W).

304 *Eustrotia olivana* Schiff.

(1181)

Bisher nur von Memmelsdorf gemeldet, 7. 7. 70 (St). Aus dem Schweinfurter Raum regelmäßig bei Schwebheim (Seidlein).

305 *Eustrotia candidula* Schiff.

(1182)

Wie vorige Art nur ein Fund aus Memmelsdorf am 12. 6. 70 (Stöckert).

306 *Erastria trabealis* Scop.

(1183 *Emmelia trabealis* Scop.)

Ziemlich verbreitet, Strullendorf, Johannishof, Börstig, Memmelsdorf, Pettstadt, Veilbronn, Zeil/M., Juni bis Juli, sowie eine unvollständige 2 Generation im August (De, Ga, M-K, Schi, St, W).

308 *Tarache luctuosa* Esp.

(1185 *Acontia luctuosa* Esp.)

Verbreitet, gelegentlich häufig, I, IV, VII, VIII, X, usw., in zwei Generationen Mitte Mai bis Ende Juni, Anfang Juli bis Mitte August (Ga, M-K, Pi, Scha, W, We).

10. Unterfamilie Sarrothripinae

369 *Sarrothripus revayanus* Scop.

(1136 *Nycteola revayana* Scop.)

Im Gebiet lokal, Johannishof, Tiefenellern, Veilbronn, Sträublingshof, Strullendorf, Hohengüßbach, im August und nach der Überwinterung Ende März, April und Mai, manchmal häufig (De, Ga).

11. Unterfamilie Acontiinae

391 *Earias chlorana* L.

(1192)

Bisher wenig beobachtet, Waizendorf, Dietzhof, Forchheim Zeil/Main, in 2 Generationen Juni und August (De, Ga, M-K, Scha, W). 1976 die Raupen häufig in zusammengesponnenen Weidentrieben am Main bei Zeil (M-K).

393 *Hylophila prasinana* L.

(1193 *Bena prasinana* L.)

Verbreitet und meist häufig, im Juni (Ga, M-K, Pi, Scha, St, W).

394 *Hylophilina bicolorana* Fuessl.

(1194 *Pseudoips bicolorana* Fuessl.)

Lokal und einzeln, Würgau, Forchheim, Memmelsdorf, Zeil/M. Mitte Juni bis Anfang August (M-K, Scha, St, W).

12. Unterfamilie Catocalinae

395 *Mormonia sponsa* L. Eichenkarmin

(1227 *Astiodes sponsa* L.)

Nur vereinzelt festgestellt, Memmelsdorf 15. 7. 68 (e.L. St.), Stübig 31. 7. 71 (St), Ebern 24. 9. 69 (Ri), Zeil/M. 3. 9. 73 (M-K), Michelsberger Wald bei Bamberg (W).

396 *Catocala fraxini* L. Blaues Ordensband

(1228)

Im Gebiet verbreitet, einzeln, BA-Kaulberg, Michelsberg, Friedrichsbrunnen, Veilbronn, Würgau, Lohndorf, Johannishof, Ebern usw., Mitte August bis Mitte Oktober (Ga, Pi, Ri, St, W, We).

397 *Catocala nupta* L. Rotes Ordensband

(1229)

Verbreitet, nicht selten, Mitte Juli bis Anfang Oktober (Ga, M-K, Pi, St, W, We).

398 *Catocala elocata* Esp. Pappelkarmin

(1231)

Nur von Wittstadt erwähnt, vereinzelt, Ende Juli bis September, Bruderwald bei Bamberg, Michelsberger Wald, in Bamberg am Alten Rathaus an der Lampe auf der Unteren Brücke mehrmals (W).

399 *Catocala electa* Bkh. Weidenkarmin

(1233)

Ebenfalls nur von Wittstadt nachgewiesen, Michelsberger Wald bei Bamberg, Bamberger Hain am Köder, August bis Anfang September,

400 *Catocala promissa* Esp. Kleiner Eichenkarmin

(1234)

Nur ein Nachweis: Bamberg-Stephansberg, 11. 8. 64 (leg. Garthe). Von Wittstadt für Erlangen und Schwabach nachgewiesen, bei Zell aus dem Raum Schweinfurt 1976 häufig nachgewiesen (Seidlein).

402 *Ephesia fulminea* Scop. Gelbes Ordensband

(1243)

Im Gebiet lokal und meist selten, Johannishof, Daschendorf, Tütschengereuth, Ebern, Mitte Juli bis Mitte August, (Ga, Ri, W).

403 *Minucia lunaris* Schiff. Braunes Ordensband

(1246)

Lokal, Börstig, Johannishof, Memmelsdorf, Veilbronn,
Wiesenthau, Ebern, vereinzelt Mitte Mai bis Ende Juni,
(Ga, Ri, Scha, Schi, St, W).

404 *Gonospileia mi* Cl.

(1251 *Callistege mi* Cl.)

Im Gebiet überall und häufig, Mai bis Juni (Ga, M-K, Pi,
St, W, We).

405 *Gonospileia glyphica* L.

(1252 *Ectypa glyphica* L.)

Wie vorige Art überall und häufig, Mai bis Mitte Juli
(Ga, M-K, Pi, Schi, St, W, We).

13. Unterfamilie Plusiinae

408 *Phytometra festucae* L.

(1201 *Chrysaspidia festucae* L.)

Im Gebiet ziemlich verbreitet, meist einzeln, Börstig,
Johannishof, Röttenbach, Gaustadt, Forchheim Memmelsdorf,
Drosendorf, Heroldsmühle, Zeil/M., Anfang Juni bis Ende
August (De, Ga, M-K, Pi, Scha, St, W, We). (Abb. Valve).

[408 a *Autographa putnami* Grote]

(1202 *Chrysaspidia putnami* Grote)

Äußerst ähnlich der vorigen Art, bisher jedoch durch Ge-
nitaluntersuchung des vorliegenden Materials für unser
Gebiet noch nicht nachgewiesen. (Abb. Valve).

409 *Phytometra bractea* F.

(1206 *Autographa bractea* Schiff.)

Verbreitet, nur einzeln auftretend, I, IV, VII, X, Ebern,
Stübig, Drügendorf, Feuerstein, Zeil/M., Anfang Juni bis
Mitte August (Ga, M-K, Ri, Scha, St, W).

[410 *Phytometra chryson* Esp.]

(1213 *Plusia chryson* Esp.)

Wittstadt erwähnt einen Einzelfund aus Pinzberg, 5 km südöstlich Forchheim, 1954 (Kramer). Schiller gibt Potenstein in der Fränkischen Schweiz an, im Juli.

411 *Phytometra chrysitis* L. Messingeule

(1211 *Plusia chrysitis* L.)

Allgemein verbreitet und meist häufig, zuweilen massenhaft, in zwei Generationen, Mitte Mai mit Überschneidung bis Mitte September (De, Ga, M-K, Pi, Scha, Schi, St, W, We).

412 *Phytometra jota* L.

(1204 *Autographa jota* L.)

Nur wenig nachgewiesen, Memmelsdorf, Stübig, Ende Juni bis Mitte Juli (Stöckert), ferner Bamberger Hain (W).

413 *Phytometra pulchrina* Haw.

(1205 *Autographa pulchrina* Haw.)

Verbreitet, nicht selten, gelegentlich häufig, Mitte Mai bis Ende Juli (De, Ga, Scha, St, W).

414 *Phytometra gamma* L. Gammaeule

(1203 *Autographa gamma* L.)

Im Gebiet ab Mitte Mai bis 11. November (Ga) überall und meist sehr häufig, gelegentlich massenhaft, die Falter wandern in der Regel ab Ende April nach Mitteleuropa ein (Saisonwanderer) und bilden eine bis zwei Generationen, von denen die Herbsttiere nach Süden zurückwandern. (Ga, M-K, Pi, Ri, Scha, St, W, We).

415 *Phytometra confusa* Steph.

(1208 *Macedunoughia confusa* Steph.)

Die Art hat sich in den letzten Jahren ausgebreitet (Wanderfalter) und wird heute überall im Gebiet regelmäßig und meist nicht selten gefunden, von Mitte Mai bis Ende September (De, Ga, M-K, Pi, Scha, St, W, We).

416 *Phytometra variabilis* Pill.

(1213 *Euchalcia variabilis* Pill.)

Im Jura lokal und einzeln, Leidingshof, Dörrnwasserlos, Heroldsmühle, Stübig, Juni bis Mitte Juli (De, Ga, M-K, St).
Aus dem Schweinfurter Raum bei Schwebheim jährlich 1 bis 2 Funde (Seidlein).

417 *Phytometra consona* F.

(1219 *Euchalcia consona* F.)

Nur 2 Einzelfunde von Wittstadt aufgeführt, 1924 bei Streitberg an Felsen sitzend, 1931 ein Falter bei Tüchersfeld am Licht.

420 *Chrysoptera moneta* F.

(1216 *Polychrysia moneta* F.)

Einzeln um Bamberg, Streitberger Raum, Erlangen, Ende Juni / Juli (W). Aus letzter Zeit keine Neufunde gemeldet.

421 *Abrostola triplasia* L.

(1225 *Abrostola trigemina* Wernbg.)

Im Gebiet vereinzelt, I, IV, VII, BA-Kaulberg, Drosendorf, Forchheim, Ebern, Zeil/M., in zwei Generationen Ende Mai bis Ende Juni, Ende Juli bis Mitte September (Ga, M-K, Ri, Scha, W, We, Abb. Valve, Gen. Pr. - Nr. 162 Ga).

422 *Abrostola asclepiadis* Schiff.

(1223)

Lokal, im Jura verbreitet, an den Fundstellen nicht selten. gelegentlich häufig, (Ga), Börstig, Veilbronn, Dörrnwasserlos, Heroldsmühle, Ludwag, Anfang Juni bis Mitte Juli (De, Ga, Schi, St, W, Abb. Valve, Gen. - Pr. - Nr. 124 Ga).

423 *Abrostola tripartita* Hufn.

(1222 *Abrostola triplasia* L.)

Vereinzelt, Bamberg, Mammelsdorf, Ludwag, Veilbronn, Heroldsmühle, Forchheim Mitte Mai bis Juni, Ende Juli eine unvollständige 2. Generation (Ga, Scha, Schi, St, W, Abb. Valve, Gen. Pr.- Nr. 126 Ga).

14. Unterfamilie Noctiunae

424 *Scoliopteryx libatrix* L. Zimtele, Zackeneule
(1254)

Verbreitet, in zwei Generationen im Juni und im Herbst,
nach der Überwinterung bis April (Ga, M-K, Ri, Scha, St,
W, We).

425 *Toxocampa pastinum* Tr.
(1259 *Lygephila pastinum* Tr.)

Im Gebiet vereinzelt, I, IV, IX, X, XII, Bamberg-Kreuz-
berg, Gaustadt, Heroldsmühle, Geisdorf, Anfang Juni bis
Juli (Ga, Pi, St, W, We).

426 *Toxocampa viciae* Hbn.
(1258 *Lygephila vicinae* Hbn.)

Im Jura ziemlich verbreitet und zuweilen häufig, Veil-
bronn, Heroldsmühle, Geisdorf, Memmelsdorf, Ludwag, BA-
Kreuzberg, Hallstadt, Ende Mai bis Anfang Juli (Ga, Scha,
Schi, St, W).

427 *Toxocampa craccae* F.
(1257 *Lygephila craccae* Schiff.)

Nur wenig festgestellt, BA-Kreuzberg, Veilbronn, Roßdach
bei Scheßlitz, selten, in 2 Generationen, Ende Mai/Juni
und August (Ga, W).

[428 *Catephia alchymista* Schiff. Weißes Ordensband]
(1262)

Aus dem Regnitzgebiet einzelne Falter im Mai/Juni am Ten-
nenloher - Neunhofer Waldsaum (W), sowie Raupenfunde bei
Tennenlohe.

430 *Aethia emortualis* Schiff.
(1285 *Trisateles emortualis* Schiff.)

Im Gebiet ziemlich verbreitet, wegen ihres spannerähnli-
chen Aussehens wohl gelegentlich übersehen, Bamberg - Bru-
derwald, Veilbronn, Johannishof, Daschendorf, Memmelsdorf,
Zeil/M., nicht selten Anfang Juni bis Ende Juli (Ga, M-K,
Schi, St, We).

431 *Laspeyria flexula* Schiff.

(1270)

Verbreitet, I, VII, XII, Hallstadt, Geisdorf, Memmelsdorf, Stübig, Zeil/M., einzeln, gelegentlich zahlreich (Ga), Ende Juni bis Mitte August (De, Ga, M-K, Schi, St, W, We).

432 *Colobochyla salicalis* Schiff.

(1271)

Lokal und selten, BA-Kreuzberg, Oberhaid, Strullendorf, Börstig, Anfang Juni bis Ende Juli (Ga, St, W).

433 *Parascotia fuliginaria* L. Pilzeule

(1266)

Im Gebiet besonders in Ortschaften gefunden, Bamberg-Kaulberg, Stephansberg, Memmelsdorf, Forchheim, Johannishof, Drosendorf, usw., stets einzeln, Mitte Juni bis Mitte August (De, Ga, Scha, St, W, We).

434 *Epizeuxis calvaria* F.

(1272 *Epizeuxis calvaria* Schiff.)

Bisher nur bei Memmelsdorf festgestellt, Mitte Juli 1966 und 13. 8. 68 (Stöckert). Aus dem Regnitzgebiet nur auf der Wellucken von Kramer nachgewiesen (W).

435 *Prothmia viridaria* Cl.

(1267 *Phytometra viridaria* Cl.)

Im Gebiet nicht überall, Börstig, Waizendorf, Daschendorf, Ebelsbach, Memmelsdorf, Stübig, gelegentlich häufig (Ga, M-K, St, W).

436 *Rivula sericealis* Scop.

(1269)

Verbreitet und meist häufig, Anfang Juni bis Ende September (Ga, Schi, St, W, We).

438 *Zanclognatha tarsiplumalis* Hbn.

(1279 *Zanclognatha lunalis* Scop.)

Daschendorf bei Baunach, 18. 7. 69 (Ga), vereinzelt am Licht in Bamberg Ende Juni (W).

440 *Zanclognatha tarsipennalis* Tr.

(1278)

Im Gebiet mehrfach gefunden, Birstig, Bamberg-Stadt, Memmelsdorf, Ludwig, Forchheim, Mitte Juni bis Ende Juli (Ga, Scha, St, W).

441 *Zanclognatha nemoralis* F.

(1281 *Zanclognatha grisealis* Schiff.)

Ziemlich verbreitet, Bruderwald bei Bamberg, BA-Kreuzberg, Drosendorf, Memmelsdorf, Johannishof, Veilbronn, Anfang Juni bis Mitte Juli (Ga, Schi, St, We).

442 *Zanclognatha tarsicrinalis* Knoch

(1280)

Lokal, BA-Kreuzberg, Kaulberg, Leidingshof, Drosendorf, Memmelsdorf, Mitte Juni bis Mitte Juli (Ga, St, We).

443 *Herminia cribrumalis* Hbn.

(1276 *Chytolitha cribrumalis* Hbn.)

Nördliche Art, in Süddeutschland sehr lokal, nur von Hesselberg bei Neustadt/Aisch aus dem Weihergebiet gemeldet. 12. 7. 66 zwei ♂♂, leg. Dr. Garthe. Aus den angrenzenden Gebieten keine Nachweise. Für Nordbay. Erstfund (Garthe, E.: Seltene Falter im Bbg. Umland, Naturforsch. Ges. Bbg. 41. Ber. 1966, S. 88f).

445 *Herminia tentacularia* L.

(1277 *Polypogon tentacularia* L.)

Aus dem Gebiet nur ein Nachweis, Memmelsdorf, 26. 6. 68 (St). Wittstadt erwähnt die Art im Juni/Juli für den Tenenloher Wald.

446 *Herminia derivalis* Hbn.

(1286 *Paracolax glaucinalis* Schiff.)

Ziemlich verbreitet, gelegentlich häufig, Birstig, Johannishof, Daschendorf, Drosendorf, Ende Juni bis Mitte August, (Ga, W, We).

447 *Pechipogon barbalis* Cl.

(1273 *Herminia barbalis* Cl.)

Im Gebiet nicht selten, gelegentlich häufig, Bruderwald bei Bamberg, BA-Kreuzberg, Eltmann, Börstig, Memmelsdorf, Veilbronn, Ende Mai bis Ende Juni (Ga, Schi, St, W).

448 *Bomolocha fontis* Thnbg.

(1237 *Bomolocha crassalis* F.)

Lokal, Börstig, Johannishof, Stübig, Ebelsbach, Juni bis Mitte August (Ga, M-K, W, We).

450 *Hypena proboscidalis* L.

(1289)

Im Gebiet verbreitet und meist häufig, Anfang Juni bis Ende September in zwei Generationen (De, Ga, Schi, St, W, We).

451 *Hypena rostralis* L.

(1288)

Ziemlich verbreitet, Börstig, BA-Kaulberg, Johannishof, Veilbronn, Memmelsdorf, Anfang Juli bis September, nach der Überwinterung bis April (Ga, St, W).

L i t e r a t u r

- Forster, Dr. W. und
Wohlfahrt, Dr. Th. A. Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Band IV
Eulen (Noctuidae), Stuttgart 1971
- Garthe, Dr. Erich, Nachtfalter an Straßenbeleuchtungen des
Bamberger Berggebietes. 36. Bericht d.
Naturforsch. Ges. Bamberg, S. 51 - 61
(1958) und Nachtrag 39. Bericht d. Natur-
forsch. Ges. Bamberg, S. 70 - 73 (1964).
- Koch, Manfred, Wir bestimmen Schmetterlinge, III Eulen,
Radebeul, 2. erweiterte Auflage 1972.
- Seitz Die Großschmetterlinge des Paläarktischen
Faunengebietes. III. Band: Eulenartige Nacht-
falter. Stuttgart 1914.
- Wittstadt, Heinrich, Die Großschmetterlinge des Regnitzgebietes
(ohne Geometriden). 37. Bericht d. Naturforsch.
Ges. Bamberg, Noctuidae S. 121 - 154 (1960).

A b k ü r z u n g e n

- (De) Derra, G.
(Ga) Garthe, Dr. E.
(M-K) Müller-Köllges, K.-H.
(Pi) Pilotek, W.
(Ri) Richter, A.
(Scha) Schaupp, W.
(Schi) Schiller, H.
(St) Stöckert, B.
(W) Wittstadt, H.
(We) Weidner, R.

Anschrift des Verfassers: K.-H. Müller-Köllges, Karl-Link-Str. 6 , D-8729 Zeil/M.

Abb. 1 Eulenfalter in Ruhestellung
(Nr. 43 - *Agrotis exclamationis* L.)

Abb. 3 Ei von *Rhyacia saucia* Hbn., Nr. 60
(D = 0,55 - 0,65 mm, H = 0,40 mm, nach E. Döring)

Abb. 2 Eulenzeichnung

Abb. 4 Raupe von *Xylina vetusta* Hbn., Nr. 210

Abb. 5 Puppe von *Catocala nupta* L., Nr. 397

Nr.27 *aquilina* (♂)

Nr.34 *tritici* (♂)
(nach E.M.Hering)

Nr.261 *pyramidea*

Nr.261a *berbera*

Nr.285 *strigilis*

Nr.286 *versicolor*

Nr.287 *latruncula*

Nr. 329 *oculea*

Nr. 330 *fucosa*

Nr. 331 *lucens*

Nr. 421 *triplasia*

Nr. 422 *asclepiadis*

Nr. 423 *tripartita*

Nr. 408 *festucae*

Nr. 408a *gracilis*

1

BAMBERGER RAUM

mit Halbmesser 25 km um Bamberg

- I Börstig, 4 km nördl. BA
- II Strullendorf, 7 km s.
- III Pettstadt, 9 km s.
- IV Johannishof 8 km nw.
- V Hesselberg, Weihergebiet

- VI Altenburg / Bamberg
- VII Daschendorf / Itz, 14 km n.
- VIII Tiefenellern, 15 km o.
- IX Pünzendorf, 13 km ono.
- X Ludwag, 15 km ono.

- XI Dörrnwasserlos, 19 km no.
- XII Veilbronn, 25 km oso.
- XIII Drügendorf, 19 km so.
- XIV Kobelsberg, 30 km o
- XV Dietzhof, 30 km so.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der naturforschenden Gesellschaft Bamberg](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [51](#)

Autor(en)/Author(s): Müller-Köllges Karl-Heinz

Artikel/Article: [Noctuiden \(Schmetterlingsfamilie der Eulen\) des Bamberger Umlandes 246-309](#)